



*Novi commentarii Academiae
scientiarum imperialis ...*

Imperatorskaiā akademīā nauk (Russia)

L Soc 3983.6



pro Anno MDCCLXXI



TYPIS ACADEMIAE SCIENTIARVM
c. MDCCLXXII.

LSoc3983.6



9468
53-43
8-13

**SVMMARIVM
DISSERTATIONVM,
QVAS CONTINET
NOVORVM COMMENTARIORVM
TOMVS XVI**

8 2

MATHE-

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

CHICAGO

1907



MATHEMATICA.

I.

De Solidis quorum superficiem in planum explicare licet.

Auctore L. Eulero pag. 3.

Notum est ex ipsa Geometria elementari cylindros, et conos ea gaudere proprietate, quod eorum superficies in planum explicari queat, quae proprietas ad omnia deinde corpora cylindrica et conica extenditur, quorum basibus figura quaecunque tribuitur; contra vero de sphaera constat, eius superficiem nullo modo in planum explicari sine superficie plana obduci posse; quaestio igitur hinc nascitur maxime notatu digna, quo caractere ea solida instructa esse oportet, quorum superficiem in planum explicare licet, atque eius quaestionis tres omnino solutiones ab Illustr.

Eulero in praesenti Dissertatione allatae sunt. Primae solutionis, quae quasi ex meris principiis Analyticis deriuata est, fundamentum in eo versatur, quod elementum quodcunque superficiei solidi, aequetur elemento superficiei planae. Hoc modo quaestio ista Geometrica reducitur ad resolutionem sequentis problematis Analytici: *binarum variabilium* u et v , *sex inuenire functiones* $l, m, n, \lambda, \mu, \nu$ *ita comparatas ut formulae* $l\,d\,t + \lambda\,d\,u; m\,d\,t + \mu\,d\,u; n\,d\,t + \nu\,d\,u$ *sint integrabiles; praeterea vero sit* $ll + mm + nn = 1; \lambda\lambda + \mu\mu + \nu\nu = 1; l\lambda + m\mu + \nu n = 0$. Hoc autem problema primo intuitu adeo arduum videtur, ut nisi ipsa haec quaestio Geometrica media suppeditaasset pro eo soluendo, vix aliquam solutionem inueniri potuisse videtur. Secundae solutionis ex principiis Geometricis deductae, fundamentum in eo imprimis situm est, quod corpora quorum superficies in planum explicari possint, ita comparata esse debeant, ut ex vnoquoque huius superficiei puncto, saltem una educi possit linea recta, quae tota in superficie sit sita, tum vero ut binae quaecunque huiusmodi inter se proximae in eodem plano sint constitutae, ideoque nisi sint parallelae in aliquo puncto concurrant. Hoc modo igitur planum fit, per concursum harum rectarum oriri lineam curuam duplicis curuaturae, cuius omnes tangentes productae in ipsam superficiem corporis quaesiti incidunt. Quum igitur infinita detur varietas linearum curuarum duplicis curuaturae, iam nullum quidem est dubium, quin praeter corpora cylindrica

et

et conica infinita detur varietas corporum, quorum superficies superficie plana obduci possit. Postquam autem Illustr. Auctor ipsam huius quaestionis solutionem expediuit, operae pretium quoque duxit fusius ostendere, quomodo haec solutio perducatur ad resolutionem istius Problematis Analytici, de quo modo loquuti fuimus. Formulae autem quae tum pro valoribus litterarum l ; m ; n ; λ ; μ ; ν , cum etiam pro valoribus integralium $\int(l\,ds + \lambda\,du)$; $\int(m\,ds + \mu\,du)$; $\int(n\,ds + \nu\,du)$ proponuntur tanta concinnitate et elegantia se commendant, ut non possint non Geometris esse gratissimae. Tertia demum solutio Problematis commemorati deducitur ex Theoria lucis et umbrae, facili scilicet attentione adhibita liquet, omnes figuras umbrarum ita esse comparatas, ut in planum explicari queant, quum enim radii luminis propagentur secundum lines rectas, quae dum corpus opacum stringunt umbram formant, omnes vero hi radii simul tam corpus lucidum, quam opacum tangant adeoque bini proximi in eodem plano siti sint, iam omnino patet eas conditiones impletas esse, quae ad hoc requiruntur, ut superficies solidi in planum sit explicabilis. Admodum autem simplex est solutio, quae ex hac consideratione deducitur, scilicet si tres coordinatae ad superficiem dicantur x , y , z inuenit Illustr. Auctor naturam huius superficiei his duabus exhiberi aequationibus $y = P + Qx$ et $z = R + Sx$, positis P , Q , R , S functionibus quibuscunque nouae variabilis ϕ , modo ista impleatur conditio, ut sit

$$\frac{d^2 \phi}{ds^2}$$

$\frac{ds}{dR} = \frac{dQ}{dP}$. Facile autem ostendi potest secundam Illustr. Auctoris solutionem cum hac tertia perfecte convenire, adeo ut inter omnes tres allatas solutiones egregius sit consensus.

II.

Methodus nova et facilis calculum variationum tractandi.

Auctore L. Eulero pag. 35.

Quamquam hoc argumentum de calculo variationum ab Illustr. Eulero multoties antea sit tractatum, imprimis in opusculo Tertio Calculi Integralis Volumini annexo, tamen quae in hac Dissertatione occurrunt ut plane nova considerari mereantur, siquidem heic in eo occupatus est, ut ostendat calculum variationum, quem antea novum calculi genus constituere ratus erat, levi facta immutatione referri posse ad secundam partem calculi integralis, qua de integrationibus formularum differentialium disquiritur, in quibus functiones duarum variabilium occurrunt. Quum enim calculus variationum in eo versetur, ut si proposita fuerit quaecunque relatio binarum variabilium x et y et ea aliquantillum varietur, inuestigandum sit, quam mutationem subeant non solum x et y sed etiam eorum differentialia quaecunque ex huiusmodi variatione;

tione; omnino liquet has variationes facile assignari posse si y consideretur ut functio binarum variabilium x et t , quo ipso variatio quaesita ipsius y aliam signo δ y exprimi solita, iam exprimeretur hac formula $dt(\frac{dy}{dx})$. Si nimirum y concipiatur ut applicata alicuius lineae curvae cuius abscissa sit x , in calculo variationum requiritur, ut relatio assignetur, quae omnes alias curvas huic proximas complectitur; manifestum autem est omnes has curvas exprimi posse aequatione $y = V$, ubi V functio est quaecunque ipsorum x et t , modo ita fuerit comparata, ut posito $t = 0$ prodeat $V = X$, ideoque $y = X$ aequatio quae pro curua principali locum habere debet. In ipsis vero variationibus investigandis ita versatur Illustr. Eulerus, ut consideret functiones secundum ordinem expressionum, tractando scilicet primum formulas quae x et y tantum continent, deinde formulas quae praeter x et y eorum differentialia primi, secundi vel altiorum graduum complectuntur, tum vero progreditur ad expressiones quae formulas quoque integrales inuoluunt, invenit autem variationem formulae integralis $\int Z dx$, posito

$$dZ = M dx + N dy + P dp + Q dq \text{ etc.}$$

ubi

$$p = \frac{dy}{dx}; q = \frac{dp}{dx} \text{ etc.}$$

hac exprimi formula:

$$dt \{ dx (N(\frac{dy}{dx}) + P(\frac{d^2y}{dx^2})) + Q(\frac{d^3y}{dx^3}) + R(\frac{d^4y}{dx^4}) + \text{etc.} \}$$

Tom. XVI. Nou. Comm.

b

Per-

Perſpicuum autem eſt huiusmodi expreſſiones $(\frac{dy}{dx})$ $(\frac{d^2y}{dx^2})$ determinatos valores adipiſci non poſſe, niſi y conſideretur vt determinata functio ipſorum x et t , in doctrina autem variationum eiſusmodi relatio inter x et y vt plane incognita ſpectari ſolet, imprimis quando huius doctrinae applicatio fit, ad quaestiones de maximis et minimis, vbi requiritur vt huiusmodi variatio in nihilum abeat. Oſtendendum igitur fuit, quomodo formula ſupra allata in aliam transformari poſſit, ita comparatam, vt ſub ſigno ſummatorio non occurrat niſi $(\frac{dy}{dx})$, ex quo colligitur, pro caſu variationis euaneſcentis, membrum iſtud ſigno ſummatorio affectum in nihilum abire. Methodus haec, quae ad quacunq; expreſſiones duarum variabilium patet, etiam facile adplicari poteſt, ad formulas quae tres variables x, y, z inuoluit, in hoc autem negotio neceſſum eſt vnā earum vti z tamquam functionem binarum reliquarum x et y conſiderare. Heic igitur regulae praefcribuntur pro inuenienda variatione expreſſionum quae vel ſolas variables x, y, z inuoluunt, vel praeterea differentialia quaecunq; ipſius z , vel denique formulam integram duplicatam $\iint Z dx dy$ vbi Z eſt functio quaecunq; variabilium x, y, z et differentialium quorumcunq; ipſius z , integratio autem ita inſtituenda eſt, vt pro prima integratione ſola x vt variabilis tractetur, pro ſecunda autem ſola y . Simili vero modo patet huius Methodi applicationem facile fieri poſſe, ad formulas quatuor vel plures variables invol-

voluentes. Huiusmodi autem formularum complicatiorum evolutio, quum parum fructuosa sit, et praeterea vix rite adumbrari possit, nisi omnia phaenomena formularum quae binas tantum variabiles inuoluunt accurate fuerint explicata; hunc in finem Illustr. Auctor singulas partes, quae expressionem pro variatione formulae $\int Z dx$ ingrediuntur ad examen reuocare vtile duxit. Huic autem explanationi demum subiunxit dilucidationes quasdam circa curuas maximi minimae proprietate praeditas, idque eo potiori cum iure, quod vsus calculi variationum imprimis in huiusmodi quaestionibus resolvendis, sit insignis. Quaestiones autem de maximis et minimis in varias distribui possunt classes, prout scilicet aequatio pro maximo vel minimo, vel finita est, vel differentialia primi, secundi aut altiorum graduum inuoluat. Animaduertit autem Illustr. Auctor, quod quemadmodum pro prima classe aequatio omnino est determinata, et curua huiusmodi quaestionibus satisfaciens, non detur nisi vnica, ita pro reliquis classibus certas praescribi condiciones, vt determinata assignari possit curua quaestioni satisfaciens, easque tanto plures, quanto sublimioris gradus differentialia inuoluit formula maximi et minimi. Sic pro secunda classe, vbi differentialia primi gradus inuoluuntur, haec praescribitur conditio, vt curuae inter quas maxima exquiri debet, per data duo transeat puncta, pro tertia autem classe quae differentialia secundi gradus inuoluit, insuper praescribitur, vt datae sint tangentes curvarum in datis his punctis.

b 2

III.

III.

De summatione serierum quarundam
incongrue veris earumque inter-
pretatione et usu.

Auctore Dan. Bernoulli pag. 71.

Quamvis Scientiae Mathematicae et principiorum
evidentia et conclusionum certitudine, reliquis
omnibus palmam praeripiant, farendum tamen est;
multa in iisdem occurrere, quae primo intuitu non
solum paradoxa, sed adeo absurda videntur; huius-
modi est summatio serierum recurrentium, quippe
quae saepius indicat summam seriei alicuius proposi-
tae, magis vel minus a veritate discrepantem, quum
tamen ipsa operatio Analytica indicaret summatio-
nem allatam pro genuina esse habendam. Sic pro
serie simplicissima $1 - 1 + 1 - 1 + 1$ etc. cuius sum-
ma statuitur $= \frac{1}{2}$; facile quidem liquet ubicunque
haec series abrumperetur summam allatam semper
fore erroneam, ratio autem cur pro vera haberi
queat in eo sita est, quod quum series nunquam
finiri supponatur, aequalis ratio sit quae urgeat ut
eius summa sit 1 et 0, unde summa statuenda est
 $= \frac{1}{2}$, quod etiam operationes Analyticae indicant ex.
gratia si evoluaturs fractio $\frac{1}{1+x}$ et post evolutionem
ponatur $x = 1$. Neque tamen haec summa *proprie*
loquen-

loquendo siue vera seu falsa dici potest, quod non solum pro exemplo allato, ubi series ad summam neque conuergit, nec ea diuergit, sed etiam pro seriebus diuergentibus locum habet. Sic summa seriei $1 - 2 + 3 - 4$ etc. inuenitur esse $\frac{1}{2}$, eiusque asserti veritas non solum per operationes Analyticas demonstrari potest, sed etiam inde confirmatur, quod ex hac summa aliarum quantitatum valores deducantur. veritati plane congruae. Quum enim per euolutionem formulae $\frac{1}{(1+x)^2}$ oriatur $\frac{1}{(1+x)^2} = 1 - 2x + 3x^2 - 4x^3 + 5x^4$ etc., inde facile deducitur $x - \frac{1}{2}xx + \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x^3$ etc. $\equiv \text{Log.}(1+x)$, atque si ponatur $x = 1$ inde habetur $\text{Log. } 2 = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \frac{1}{16}$ etc., de cuius veritate quum dubitare non liceat, neque diffidendum est, quin summa seriei $1 - 2 + 3 - 4 + 5$ etc. sit $\frac{1}{2}$. Pro seriebus recurrentibus ubi datur certa periodus terminorum, quae continuo recurrit, facile summa assignari potest, si enim in periodo continuo recurrente primus terminus sit a , summa primi et secundi b , summa ter priorum c etc. et numerus terminorum in hac periodo n , erit summa seriei $\frac{a+b+c \text{ etc.}}{n}$, modo summa cuiusuis periodi integrae sit 0 ; ratio autem in eo sita est, quod si series circa primum periodi terminum abruptatur summa sit a , si circa secundum b , circa tertium c etc. igitur quum hi valores pro summa aequo iure gaudeant, summa statuenda erit $\frac{a+b+c \text{ etc.}}{n}$. Ad huiusmodi series pertinent, qui formantur ex sinibus vel cosinibus arcuum se-

cundum arithmeticam progressionem procedentium, et quum in genere sit:

$\cos. x + \cos. 2x + \cos. 3x + \cos. 4x + \text{etc.} = -\frac{1}{2}$
 seu a plurimis Auctoribus demonstratum reperitur, si pro x ponatur $2q, \frac{1}{2}q; q; \frac{3}{2}q$ etc. designante q angulum rectum, habebuntur series recurrentes diversae, pro quibus summa continuo est $= -\frac{1}{2}$. Singularis autem heic occurrit casus, qui a regula generali differt, si scilicet ponatur $x = 4nq$, designante n numerum integrum, tum enim haec series abit in

$$1 + 1 + 1 + 1 \text{ etc.}$$

eius summa certe nullo sensu statui potest $= -\frac{1}{2}$. Pro sinuum progressionem sequens habetur formula:

$$\sin. x + \sin. 2x + \sin. 3x + \sin. 4x + \text{etc.} = \frac{\sin. x}{2(1 - \cos. x)},$$

eius aequationis veritas, quamvis ab Illustr. huius dissertationis Auctore iam egregiae stabilita sit, tamen eandem facillimo hoc ratiocinio illustrare non pigebit: ponatur

$$\sin. x + \sin. 2x + \sin. 3x + \sin. 4x + \text{etc.} = S,$$

multiplicetur tota aequatio per $\cos. x$ et fiet

$$\sin. x + 2 \sin. 2x + 2 \sin. 3x + 2 \sin. 4x + \text{etc.} = 2 S \cos. x$$

ideoque

$$\sin. x = 2 S (1 - \cos. x).$$

Licet ea quae in hac Dissertatione ab Illustr. *Bernoullio* allata sunt, multis in casibus iis dubiis quae circa

circa summationes serierum oriuntur, diluendis sufficere queant; tamen alii atque alii dantur casus, quibus explicationes ab Ipso allatae minus satisfacere videntur, quamobrem non diffitemur nobis magis placere eam explicationem, quam Illustr. *Eulerus* in Institutionibus Calculi Differentialis Cap. III. §. 110. adfert, quippe qua omnibus dubiis plane satisfieri posse existimamus.

IV.

Euolutio formulae integralis

$$\int x^{m-1} dx (l x)^{\frac{n}{m}}$$

integratione a valore $x=0$ ad $x=1$ extensa.

Auctore L. Eulero pag. 91.

Quoniam qui in hac Dissertatione occurrunt calculi Analytici ita comparati sint, ut eorum summarium quoddam vix tradi queat, Mathematicum peritos ad ipsam dissertationem ablegamus, id tantum monuisse contenti, quod Illustr. *Eulerus* heic fusius prosequutus sit, quae olim in Tomo V. Comment. Petropol. de integrationibus formularum differentialium sub certis conditionibus peragendis iam exposuit.

Problematis cuiusdam Geometrici
prorsus singularis evolutio.

Auctore L. Eulero pag. 140.

Problema Geometricum, cuius evolutionem heic tradit Illustr. Eulerus in eo consistit, ut quaeratur linea curva, cuius dum ducitur tangens quaecunque datae lineae rectae occurrens, et angulus inter tangentem et rectam datam interceptus bisecetur, recta ista bisecans curvae perpetuo sit normalis. Perspicuum quidem est omnes circulos qui datam rectam habent tangentem, huic problemati satisfacere, dubium tamen adhuc relinquitur utrum praeter circulum aliae dentur lineae curvae, quae conditione Problematis adimpleant. Hanc igitur quaestionem eo maiori attentione dignam iudicavit Illustr. Auctor, quod inuenta iam solutio Analytica, tamen dubium supersit, utrum unica curva an plures ei satisfaciant. Quod vero ad ipsam solutionem Analyticam attinet, ea inter difficiliore haberi meretur, quod primo intuitu nexus inter bina ista puncta curvae, prius ubi tangitur et alterum ei correlatum ubi normaliter traicitur, se non manifestet. Ad nexum autem huic indagandum tangens curvae ducta quoque concipiatur ad punctum posterius, quo ipso evidens est angulum quem haec tangens facit cum

cum recta data, dimidium fore illius quem tangens prior cum eadem recta facit, vnde demum deducitur, si angulus dimidius dicatur ω , tangens ipsi respondens t et Tangens prior T , fore T similem functionem 2ω ac t est ipse ω . Hac autem proprietate præsupposita, facillimum iam est, æquationem Analyticam pro curva inuenire, cum scilicet duplex quaeritur valor portionis rectæ datæ interceptæ inter binas tangentes, quam æquationem Analyticam præter T et t angulus ω ingreditur. Loco autem æquationis inter T , t et ω , alia quaeri potest inter resectas rectæ datæ et angulum ω , vel etiam inter normales ad curvam in binis punctis correlatis et hunc angulum, vel etiam inter binos arcus curvæ et hunc angulum, vel inter curvæ radios osculi ad bina puncta correlata et eundem angulum etc. Quum autem his æquationibus tres incognitæ insint, videretur easdem problemati resoluendo non sufficere, notandum tamen est, reapse binas heic occurrere æquationes, quarum altera exinde defumitur, quod sit ex, causa T talis functio ipsius 2ω ac t est ipse ω . Et si hæc conditio in calculum introducatur inueniri potest æquatio, quæ præter angulum ω , unicam tantum variabilem inuoluit. Ad hoc comprobandum consideremus æquationem Illustr. Auctoris §. 8. qua relatio definitur inter resectas rectæ datæ x , X et angulum ω , quæ ita est expressa

$$X \cos. \omega = \frac{d}{dx} x. \sin. \omega + x \cos. \omega,$$

et posito $x \sin. \omega = y$, nec non $X \sin. 2\omega = Y$,

Tom. XVI. Nou. Comm.

c

in

in hanc abit

$$Y = \frac{d y}{d \omega} \sin. \omega,$$

vbi Y similis debet esse functio ipsius 2ω , ac est y ipsius ω . Ponamus igitur esse $y = \Phi: \omega$ eritque

$$Y = \Phi: (2 \omega) = \Phi: \omega + \omega \frac{d \Phi: \omega}{d \omega} + \frac{\omega^2}{1.2} \frac{d^2 \Phi: \omega}{d \omega^2} + \frac{\omega^3}{1.2.3} \frac{d^3 \Phi: \omega}{d \omega^3} + \text{etc.}$$

vnde pro $\Phi: \omega$ iterum substitutus y habebitur

$$y + \frac{\omega d y}{d \omega} + \frac{\omega^2}{1.2} \frac{d^2 y}{d \omega^2} + \frac{\omega^3}{1.2.3} \frac{d^3 y}{d \omega^3} + \text{etc.} = \frac{d y}{d \omega} \sin. \omega$$

aequatio quae binas tantum variables y et ω inuoluit. Quaestio igitur eo reducitur, vtrum praeter circulum aliae lineae curuae dentur, quae hanc aequationem adimpleant? Si valor ipsius y exprimitur per seriem, in qua potestates ipsius ω exponentes integros et positivos tantum habent, facile quidem ostendi potest, pro huiusmodi suppositione, circulum solum satisfacere, quum vero nulla adesse videatur ratio, cur pro y eiusmodi expressionem supponere non liceret, vbi exponentes potestatum ipsius ω occurrerent siue negatiui, siue fracti, omnino probabile est praeter circulum dari infinitas lineas curuas quae Problemati allato satisfaciunt.

VI.

Considerationes Cyclometricae.

Auctore L. Eulero pag. 160.

Varia in hac dissertatione proponuntur ab Illustr. eius Auctore circa constructionem Lunularum quadrabilium, notum autem est hanc quaestionem eo redire, ut quaerantur bini anguli, qui inter se duplicatam tenent rationem sinuum, adeo ut si unus eorum dicatur m alter n , esse debeat $m:n::\sin m^\circ:\sin n^\circ$. Communiter quidem in resolutione problematis de lunulis quadrabilibus supponi solet numeros m et n esse commensurabiles, demonstratum tamen adhuc non inuenimus, nullo alio casu solutionem Geometricam expectari posse. Ex ipsa quaestionis natura intelligitur quidem rationem sinuum esse debere algebraicam quum alioquin ratio angulorum algebraice definiri non possit, inde tamen non sequi videtur, hanc rationem numeris tantum integris circumscribi. Quam vero Methodus adhuc desideretur quo hoc problema etiam per angulos non commensurabiles expediri potest, Illustr. Auctor heic praeprimis sibi considerandos proposuit casus, quibus problematis solutio per circulum et normam expediri potest, qui casus numero habentur quinque. Si enim statuatur $m = \frac{1}{2}\mu\omega$ et $n = \frac{1}{2}\nu\omega$, sequentes casus Geometricam admittunt constructionem per circulum

c 2

culum

culum et normam I°. si $m = 45^\circ$ et $n = 90^\circ$, qui est casus notissimae Lunulae Hippocratis, II. si $m = \frac{1}{2}\omega$ et $n = \frac{1}{2}\omega$, III. si $m = \omega$ et $n = \frac{1}{2}\omega$, IV. si $m = \frac{1}{2}\omega$ et $n = \frac{3}{2}\omega$, denique V. si $m = \frac{1}{2}\omega$ et $n = \frac{5}{2}\omega$. Possunt vero omnes hi casus facillime deregri, si statuatur $m = \mu z$ et $n = \nu z$, quo facto erit

$\mu : \nu :: \sin \mu z : \sin \nu z$ seu $\sin \mu z : \sin \nu z :: \sqrt{\mu} : \sqrt{\nu}$, quum enim sit

$$\begin{aligned} \sin \mu z &= \sin z (z^{\mu-1} \cos z^{\mu-1} - (\mu-2) z^{\mu-3} \cos z^{\mu-3} \\ &\quad + \frac{(\mu-1)(\mu-3)}{1 \cdot 3} z^{\mu-5} \cos z^{\mu-5} - \text{etc.}) \\ \sin \nu z &= \sin z (z^{\nu-1} \cos z^{\nu-1} - (\nu-2) z^{\nu-3} \cos z^{\nu-3} \\ &\quad + \frac{(\nu-1)(\nu-3)}{1 \cdot 3} z^{\nu-5} \cos z^{\nu-5} - \text{etc.}) \end{aligned}$$

inde fiet

$$\begin{aligned} \sqrt{\nu} (z^{\mu-1} \cos z^{\mu-1} - (\mu-2) z^{\mu-3} \cos z^{\mu-3} + \frac{(\mu-1)(\mu-3)}{1 \cdot 3} z^{\mu-5} \cos z^{\mu-5} - \text{etc.}) = \\ \sqrt{\mu} (z^{\nu-1} \cos z^{\nu-1} - (\nu-2) z^{\nu-3} \cos z^{\nu-3} + \frac{(\nu-1)(\nu-3)}{1 \cdot 3} z^{\nu-5} \cos z^{\nu-5} - \text{etc.}) \end{aligned}$$

Ponamus iam μ esse numerum minorem, et substituamus pro μ numeros integros 1, 2, 3 etc., quo facto patebit pro $\mu = 1$, ν tres adipisci posse valores, ut aequatio fiat quadratica vel ad quadraticam facile deprimenda, erit scilicet ν vel $= 2$, quo casu $\cos z = \frac{1}{\sqrt{1}}$, vel $\nu = 3$, unde oritur aequatio

$$\sqrt{3} = 4 \cos z^2 - 1, \text{ seu } \cos z^2 = \frac{1 + \sqrt{3}}{4}, \text{ vel } \nu = 5,$$

ex quo fit

$$\sqrt{5} = 16 \cos z^4 - 3 \cdot 4 \cos z^2 + 1,$$

aequatio biquadratica sed quae ad quadraticam facile deprimi-

deprimetur. Si μ ponatur = 2, vnicuique habetur va-
lor ipsius ν scilicet = 3, unde prodit aequatio qua-
dratica

$$2\sqrt{3} \cos z = 4\sqrt{2} \cos z^2 - \sqrt{2}.$$

Denique pro $\mu = 3$, prodit $\nu = 5$ ut aequatio fiat
biquadratica, ad quadraticam deprimenda:

$$4\sqrt{5} \cos z^2 - \sqrt{5} = 16\sqrt{3} \cos z^2 - 3 \cdot 4\sqrt{3} \cos z + \sqrt{3}.$$

Si alia supponatur ratio inter μ et ν , constructio
lunularum ad altiores locos Geometricos assurgit,
quae tamen semper haberi debet pro Geometrica si
 μ et ν inter se sint commensurabiles.

VII.

De criteriis integrabilitatis formula- rum differentialium Dissertatio Secunda.

Auctore A. I. Lexell pag. 171.

Quam in priori de hoc argumento Dissertatione,
Tomo XV. Nov. Comment. inserta nulla al-
lata sint exempla, quibus usus et applicatio doctri-
nae de criteriis integrabilitatis illustrari posset, Cl.
Auctor in praesenti dissertatione huiusmodi defectum
supplere constituit, in antecessum autem varia prae-
mittere ipsi e re visum est, quae ad ea aut stabi-
lienda aut vltius explicanda, quae in priori Dis-

sertatione tradita sunt, necessaria esse poterunt. Et primum quidem multo exactiorem hęc proponere constituit demonstrationem insignis istius Theorematis *Euleriani*, quod ipsum quasi fundamentum totius huius doctrinæ censeretur potest, quam quæ in priori Dissertatione occurrit, et de quâ obseruat, eam haud leuibus dubiis esse obnoxiam, quum contra hæc iam allata summum præ se ferat rigorem. Deinde formulas recenset, quæ integrabiles esse debent, ut formulæ $dx \int V dx$ vel $dx \int dx \int V dx$ integrabiles fiant. Porro cum in priori dissertatione conditiones quidem exposuisset, quibus integrabilitas formulæ differentialis duplicatae $\iint V dx dy$ continetur, iam quoque tradidit conditiones quæ locum habere debent, ut huiusmodi formula duplicata bis vel ter etc. sit integrabilis, hoc est ut $\iint dx dy \iint V dx dy$ vel $\iint dx dy \iint dx dy \iint V dx dy$ vera sint integralia, quæ regulæ maximam habere possunt utilitatem, quando disquirendum, an huiusmodi formula differentialis duplicata integrale finitum admittat. Et hinc quidem iam facile concluditur, quomodo eiusdem generis conditiones detegi possint, pro formulis differentialibus triplicatis, vel adeo complicationibus. Quod autem imprimis spectat ea exempla, quæ ad doctrinam de criteriis integrabilitatis illustrandam hęc allata sunt, in iis proponendis ita versatus est Cl. Auctor, ut primum eiusmodi adducat formulas differentiales duarum variabilium x, y , quæ per se integrabiles sunt, deinde progrediatur ad formulas differentiales quæ licet per se integrabiles non sint, certo

certo tamen multiplicatore adhibito ad integrabilitatem perducere possunt, pro huiusmodi enim casibus usus doctrinae de criteriis integrabilitatis insignis esse solet, ad hos multiplicatores detegendos. Et hinc quidem occasionem nactus est, generaliter demonstrandi formulam differentialem homogeneam $R dx + S dy$ fieri integrabilem, si dividatur per $Rx + Sy$. Deinde formulae proponuntur differentiales, quae tres variables x, y, z involuunt, quae iterum duplicis generis sunt, aut per se integrabiles, aut quae in certum multiplicatorem ductae ad integrabilitatem perducuntur. Ex posteriori genere variae haec considerantur formulae differentiales homogeneae, pro quibus multiplicatores idonei eas ad integrabilitatem perducentes inuestigantur, tum vero demum generaliter demonstratur formulam differentialem homogeneam quaecunque primi gradus

$$X dx + Y dy + Z dz + V dv \text{ etc.}$$

fieri integrabilem si dividatur per

$$Xx + Yy + Zz + Vv,$$

quod tamen tantum sub ea conditione valet, quod haec formula sit possibilis, nam quemadmodum quaecunque formula differentialis binas variables involvens $R dx + S dy$, semper sit realis, ita contra pro formulis differentialibus tres vel plures variables involventibus tenendum est, eas non semper esse possibiles sed certam praescribi conditionem ex qua de earum realitate iudicium ferro licet. Quoties autem

tem huiusmodi formulae differentiales homogeneae fuerint possibiles, toties integrabiles euadent, si diuidantur per formulam supra allatam. Exempla autem formularum differentialium duplicatarum, quae haec quoque adferre in animum induxerat Cl. Auditor, sententia mutata in aliam occasionem referuasse satis vixit.

VIII.

Demonstratio Theorematis Analytici a Cel. la Grange inuenti.

Auctore A. I. Lexell pag. 230.

Dum Cel. la Grange in Tomo XXIV. Actuum Academiae Scientiarum Berolinensis in modum inquireret, quo cuiuscunque aequationis algebraicae radices per series exprimi possint, ad elegantissimum deuenit Theorema, quo forma vniuscuiusque radices exprimitur, inuenit enim quod si sit $i - x + \Phi x = 0$, ubi i et x sunt binae variables et Φx functio quocunque ipsius x , esse debere:

$$\psi x = \psi i + \Phi i \cdot \psi' i + \frac{d\Phi i}{dx} \cdot \frac{\psi'' i}{2} + \frac{d^2\Phi i}{dx^2} \cdot \frac{\psi''' i}{6} + \frac{d^3\Phi i}{dx^3} \cdot \frac{\psi'''' i}{24} + \text{etc.}$$

Quum vero ratiocinium quo Cel. la Grange ad hoc Theorema perductus sit, non nisi pro inductione admodum particulari haberi queat, ipsumque Theorema

ma

ma sit generalissimum, adeo ut non solum locum habeat quando Φx est functio algebraica ipsius x , sed etiam pro quibuscunque functionibus transcendentibus; hinc Cl. huius dissertationis Auctor operae pretium duxit in generalem et latissimam patenter eius demonstrationem inquirere. Hac autem demonstratione tradita, Theorematis usum adhuc generaliore esse ostendit, adeo ut eius ope non solum functio quaecunque ipsius x , sed adeo functio binarum variabilium x et t exhiberi queat. Deinde vero Theorema adhuc multo latius extenditur, si fuerit $t - x + P = 0$, ubi P designat quantitatem quomodocunque ex x et t constam, pro hoc enim casu non solum quaecunque functio ipsius x , sed etiam functio quaecunque binarum variabilium x et t , per solam t satis concinne exhiberi potest, quod etiam vicissim valere de functionibus ipsius t , vel ipsarum x et t , per x exprimendis per se evidens est. Ut deinde de usu huius Theorematis aliqua constarent Cl. Auctor eius applicationem demonstravit, ad exprimendas aequationum algebraicarum radices per series, ubi tamen id observat, has series saepius non fieri convergentes ideoque radices aequationis non exhibere, neque criterium constare ex quo demonstrari possit pro uniuscuiusque aequationis algebraicae radicibus, tot exhiberi posse series convergentes, quot radices illa habuerit reales. Porro quum Φx quascunque functiones transcendentis involvere possit, huius Theorematis applicatio ad huiusmodi casus

Tom. XVI. Non. Comm. d quo.

quoque se extendit, ex quo genere notissimum est Problema *Keplerianum* pro quo scilicet habetur $t = x + n \sin. x$, hincque variae deduci possunt expressiones pro determinando angulo x ope anguli t , non solum enim ipse hic angulus x sed etiam eius sinus vel cosinus, vel Tangens satis concinne per t exprimi potest, ubi tamen et observari meretur expressiones hinc deductas, raro adeo fieri convergentes, ut cum usu in Astronomia adhiberi possent.

PHYSICO- MATHEMATICA.

I.

De Vibrationibus chordarum, ex duabus partibus tam longitudine quam crassitie ab inuicem diuersis compositarum.

Auctore Daniele Bernoulli pag. 257.

Theoria de motu chordarum vibratorio quanquam dudum est a summis Geometris omni studio pertractata, ita tamen reconditis et abstrusis disquisitionibus implicatur, vt iis euoluendis et extricandis mathematicorum adeo principes ingenii sui acumen etiamnum adplicare operae omnino pretium arbitrentur. Neque vero solum ipsa sua natura singulari attentione digna est ista quaestio, sed eam quoque ob causam summi momenti reputanda, quod a cognitione naturae minimorum istorum motuum tremulorum primaria totius Acustices fundamenta deriuantur, id quod Illustres Geometrae, *Dan. Bernoulli* et *Leon. Eulerus* in variis huius argumenti dissertationibus de sono instrumentorum musicorum, tiliarum varii generis, tympanorum, vt et campanarum,

narum, summo ingenio docuerunt. In praesenti tractatione quo magis lectores suos ad perspicendas meditationes suas accommodet quasi et praepararet III. Auctor, praecipua theorematum theoriae communis de chordis vibrantibus tota sua longitudine uniformibus passim demonstratae praemittit; atque hoc modo viam sternit ad indagandam naturam motus vibratorii chordarum ex duabus partibus constructarum et longitudine et crassitie inaequalibus.

Principio autem casum aliquem simpliciorum II. Auctor contemplatur, chordam scilicet uniformiter gravem, sed connexam cum filo omni gravitate destitutum; quale quidem etsi actu in rerum natura nullibi datur, illius tamen casus imaginarii evolutio haud parum confert ad explicationem argumenti primarii, ubi scilicet in fili illius gravitate carentis locum alius chordae portio, suo quoque pondere denata et cum priori connexa substituitur. Ad sonos a vibrationibus chordae eiusmodi compositae oriundos quod attinet, ii quidem, si binae partes nodo aliove simili modo connecterentur, nimis rauci forent, quam ut sonis musicis annumerari possent; alio autem exemplo optime dilucidat III. Auctor argumentum suum a fidibus, quibus musici utuntur, petito, filo metallico ad augendam gravitatem toni involutis; quarum, quid obstat? quin fingi possint tales species, ubi chordae certa tantum pars filo metallico est implicata, parte reliqua manente nuda.

Hanc

Hanc itaque questionem maxime memorabilem III. Auctor ita pertrahat; ut omnes et singulas vibrationum species pro eiusmodi chordis veterinet simulque in valores inquirat sonorum istis motuum vibratorum speciebus debitorum.

Sub finem dissertationis suae III. Auctor alios quoque modi mentionem facit; quos in chorda aliqua vibrante lex continuitatis interrumpi potest; si scilicet ea quidem tota sua longitudine sit uniformis, sed in puncto quodam arbitrario annexum habeat pondusculum; cuius quidem casus evolutio motusque vibratorii pro tali chorda determinatio Geometricarum attentionem utique est mereri existimanda.

II.

Sectio quarta de motu Aeris in Tubis.

Auctore L. Eulero pag. 287.

Tractatus hydrodynamici, quem per partes hic Commentarius inseruimus, ab III. Eulero conscripti quatuor, quae hic spectant sectio, addit ad theoriam de motu fluidorum lineari, iam in tertia sectione tracturi coeptam, perficit. Huius scilicet argumenti primariam diuisionem III. Auctor 4 fluidorum diuersa indole, quatuor eorum densitas vel

constans vel variabilis est, commodissime repetendam statuit omnemque fluidorum diuersitatem hoc intuitu ad duas species, aquae et aëris, reuocauit.

Expedita itaque in praecedente sectione tota de motu aquae lineari doctrina; hic ad alteram fluidorum speciem, elasticorum nempe, generali aëris nomine contentorum, progreditur. At vero etiam hic variatio amplitudinis tuborum tantopere istos calculos omnemque argumenti tractationem adficit, ut eius peculiaris ratio fuerit habenda. Hanc ob rem Ill. Auctor in tribus prioribus capitibus motum aëris non, nisi in tubis *aequaliter amplis* contemplatur. Statim vero, quantis difficultatibus implicata sit determinatio motus aëris, vel primo tentamine Ill. Auctor ostendit, dum scilicet casum simplicissimum, quo aër eodem ubique caloris gradu praeditus in tubo aequaliter amplo, remoto adeo grauitatis effectui, moueri concipitur, ad aequationem quidem differentialem secundi gradus perducere liquit, sed talem, cuius resolutio nullo consuetae Analyseos artificio expediri potest. Commodissime tamen hac in re vsu venit, ut ista aequatio felici successu ad aëris agitationes *minimas*, ubi scilicet singulae particulae non nisi quam minime a loco initiali recedunt, accommodari possit; quo igitur praesupposito, si in statu initiali pro quouis tubi loco aëris tam densitas quam celeritas sit data, ad quoduis elapsum tempus statum et motum aëris in tubo Ill. Auctor in primo capite definire docet. Quan-

Quaquam vero iam hic inficias ire non licet, solutionem istam adeo non esse generalem, ut potius ultra speciem motus quam maxime particularem nullo modo pateat: tamen hoc non obstat, quin ea in pluribus summi momenti disquisitionibus physicis usum praestet amplissimum; id quod in sequentibus ipse Ill. Vir insignibus exemplis comprobatur; dum scilicet in secundo capite theoriam suam ad doctrinam de propagatione soni adplicat, a Geometrarum nullo, si a Cel. *La Graugio* discesseris, felici satis successu pertractatam. Hoc igitur gravissimum argumentum Ill. Auctor pro tubis aequaliter amplis ita expedit, ut, si in iis pulsus alicubi in spatio minimo fuerit excitatus, quo aer utcumque a statu aequilibrii recesserit, huius agitationis minimae propagatorem ad quodvis tempus definire doceat et quidem 1°. si tubus fuerit utrinque in infinitum extensus 2°. ab una parte in infinitum extensus ab altera vero vel clausus vel apertus 3°. utrinque apertus 4°. denique ab una parte apertus, ab altera vero clausus. Alterum phaenomenon, cui explicando Ill. Auctor theoriae suae principia haecenus tradita adplicat, et in quo a naturae scrutatoribus vix quidquam praestitum est, in sono, quem tibiae edunt inflatae, eiusque explicatione versatur. Dudum quidem Ill. Auctor elegantem similitudinem inter naturam eiusmodi soni et leges chordarum vibrantium detexit; nullo autem modo ipsi eo usque progredi licuit, ut ipsam aeris agitationem, qua isti soni generantur, calculis definire potuerit: Iam vero in

capite

capite tertio abstrusum hoc argumentum III. Auctor ope theoriae suae tam felici successu persequitur, ut omnes istos motus aëris, oscillatorios in tubis aequaliter amplis determinare sonosque tiliarum varii generis, siue sint ytriueque siue ab vna parte tantum apertae, siue etiam ytriueque clausae, dilucide explicare eorumque leges ex genuinis principiis, consentiente experientia, deriuare possit. Hic vero; ubi theoriam cum experientia comparare quis velit, id probe perpendi necesse est, in omni isto calculo latera tubi tanto rigore praedicta assumi, ut nullius plane impressionis et agitationis sine capacia; quam conditionem cum praxis perfectae non admittat, experientiam tamen eo minus a theoria, quod durior fuerit tubi materia, discrepaturam, dubitari non potest.

His absolutis III. Auctor ad tubos *inaequaliter amplis* progreditur; quae quidem inuestigatio multo pluribus, quam praecedens, obaculis et difficultatibus premittitur. In capite igitur quarta ante omnia motus aëris in tubo inaequaliter amplo ad formulas analyticas reuocatur, quae vero cum ob defectum Analysis resolui non queant, tantum ad agitationes aëris *minimas* adcommodantur. Neque vero etiam admittit hac restrictione, generalis obtenta est resolutio; quanquam enim singularibus artificiis continuo plures reperiuntur tuborum figurae, in quibus aëris agitationes minimas definire licet; infinito tamen multae tuborum figurae locum hic prorsus non inue-

inueniunt, pro quibus etiamnum motus aëris determinari non potest. Ex eorum igitur tuborum classe, quorum figuris principia theoriae hactenus traditae adcommodari licuit, Illustr. Auctor species aliquot simplicissimas examini peculiari subiicit; atque hunc in finem in capite quinto aëris agitationes minimas in tubis figuram conoidicam hyperbolicam habentibus inuestigat, in quibus motus isti tremuli, modo sint minimi, perinde ac in tubis aequaliter amplis, licet calculo paululum operosiore, definiri possunt. Post hos deinceps in capite sexto. III. Auctor eadem methodo circa tubos figurae conicae versatur; cuius argumenti evolutio etiam eam ob causam notatu quam maxime digna est, quod inde colligere licet, qua ratione pulsus quicumque in libero aëre quaquaversum propagetur, si quidem uniuersum aërem circumfluum circa centrum quasi pulsus in infinite multos conos, quorum vertex in isto centro concurrant, distributum concipere licet.

III.

De Perturbatione motus Terrae ab
actione Veneris oriunda.

Auctore L. Eulero pag. 426.

Quum ex doctrina gravitatis *Newtoniana* sequatur, omnia corpora coelestia mutua et reciproca inter se affici actione, inde quoque intelligitur Plane-
Tom. XVI. Nou. Comm. c tam

tam quemcunque primarium qui si sola vi versus Solem attrahente ageretur, ellipsem circa Solem describeret, accedente actione reliquorum Planetarum, ab hoc motu regulari et elliptico multum deturbari. Res igitur est in Astronomia maximi momenti, has perturbaciones et inaequalitates in motibus Planetarum ex actione eorum mutua oriundas perspicue definire et explicare, quamobrem etiam summi nostri aevi Geometrae *Clairautius*, *d' Alembertus* et imprimis Illustr. huius dissertationis Auctor in perturbationibus his definiendis, insignem collocarunt operam. Quod autem imprimis motum Telluris nostrae attinet, notum est, cum praeter vim principalem, qua versus Solem agitur, actionibus Iouis, Veneris et Lunae admodum sensibilibus adfici. In praesenti igitur Dissertatione Illustr. *Eulerus* perturbationem motus Terrae ab actione Veneris oriundam examini subicere operae pretium duxit, idque eo maiori cum iure, quod in hac inaequalitate definienda secundum consuetas in huiusmodi operationibus Methodos procedere non liceat. Scilicet in formulis istis quae pro actione Veneris in Terram inveniuntur, quum duplicis generis occurrant termini, alii quos distantia Veneris a Sole ingreditur, alii vero in quibus distantia Veneris a Terra reperitur, utraque horum terminorum species singularem meretur considerationem. Prior enim, quam Illustr. Auctor partem actionis Veneris Solarem nominavit, ita comparata est, ut siue tantum ad motum medium Veneris respiciatur seu etiam excentricita-

citatis ratio habeatur, satis commodè per seriem conuergentem exprimi queat. Cum posteriori autem, quae heic pars terrestris actionis Veneris dicitur, res longe aliter se habet, scilicet quum formulam irrationalem quam distantia Veneris a Terra ingreditur, nullo modo in seriem conuergentem resolvere liceat, omnia integralia, in quibus expressio huius distantiae reperitur mechanice tantum definienda sunt, quod etiam heic pro singulis 5 gradibus elongationis mediae Veneris a Terra praestitum est. Valoribus autem horum integralium definitis, si parti terrestri actionis Veneris addatur pars Solaris, facile tota perturbatio ab actione Veneris orta definitur, quam igitur Illustr. Auctor in Tabella ad finem dissertationis subnexa repraesentat. • Si haec Tabula conferatur cum ea, quam adfert Celeb. *de la Caille* in Tabulis suis Solaribus, insignis inter eas reperietur discrepantia, in Tabula scilicet Dni *de la Caille*, a 0 Sig. vsque ad II Sig. 3°. expressio pro actione Veneris est negatiua, et maximum eius reperitur circa I Sig. 1°. vbi est $-5,6$; a II Sig. 3°. vero vsque ad VI Sig. perturbatio haec positiua statuitur, et maximum adipiscitur valorem circa IV Sig. 3°. scilicet $+15'',2$. In Tabula praesenti per sex signa praecedentia perturbatio est negatiua et maximum induit valorem circa II Sig. 10°. vbi est $-22'',3$. Liqueat igitur hinc maximum discrimen quod inter hanc Tabulam et eam Dni *de la Caille* oritur vsque ad 30ⁿ assurgere, quae differentia in loco Solis definiendo certe pro insigni habenda est.

PHYSICA.

I.

De Corde Leonis.

Auctore C. F. Wolff pag. 471.

Solum cor leonis, quoad singularia, quae in eo occurrunt, anatomice describitur. Deinde effectus, quos singularis illa structura in functionibus cordis producit, qui notabiles sunt, et ipsam quoque corporis humani physiologiam illustrent, explicantur.

Pericardium in hoc animali plenum spisso cruore et adeo distentum inueniebatur, ut maximam partem cavitatis thoracis, quae multum sanguinem ipsidem continebat, replet. Ventriculi contra et auriculae cordis vacuae erant. Haec ergo omnino causa mortis fuit; cum neque cor se dilatare, neque cerebro sufficiens, (quae ad sustinendas actiones animales et vitales in eo continuo requiritur,) copia sanguinis suppeditari potuerit.

Quae circa figuram cordis leonini, eiusque structuram internam et partes, auriculas, septum, ventriculos, orificia eorumdem et valvulas, hisce praefixas, columinasque carneas, notabilia occurrunt, ea in ipsa Dissertatione legenda sunt. Praecipuae tantum-

tantummodo observationis mentionem faciemus, quae in oeconomiam vitalem maximum sibi influxum vindicat, et unde patebit, quo usque in variis animalibus actiones vitales variare possint. Leoni cor datum est, pro mole corporis paruum, sed ventriculis instructum praegrandibus; unde parietes eiusdem aequae ac septum; si ad alia animalia comparantur, mire tenues sunt. Hoc haecenus etiam a *Parifinis Scriptoribus* iam observatum et pro rei dignitate traditum fuit (videantur, quae in hac Diss. pag. 477 et 478. deinde quae pag. 491. dicta sunt). Sed, quod magis forte attentionem Anatomici meretur, quodque minus ab aliis observatum fuit, illud est, quod trunci arteriarum, quae ex ventriculis oriuntur, quemadmodum ventriculi ipsi proportionem aliorum animalium magni sunt, parvi potius existant proportionem eadem, et quod rami earum arteriarum simili modo decrefcere pergant. Nam, si arteriae leonis ad arterias aliorum animalium in eadem ratione iterum essent, uti ventriculi cordis sunt, quod tamen verisimile videri potuisset, nihil eo mutaretur in motu sanguinis. Massa sanguinis maior per vasa maiora simili modo in leone quam in aliis animalibus moveretur. Quo magis autem ratio arteriarum leonis ad aliorum animalium arterias successine decrefcit; eo magis quoque celeritas, qua sanguis in leone movetur, celeritatem superabit, qua idem in aliis animalibus propellitur. Haec itaque ut accuratius definiri et aestimari possint, ventriculos cordis et arterias praecipuas maiores in leo-

ne et in homine, aliisque in animalibus metitus est Clar. Auctor, ventriculosque cum magnitudine cordis, arterias vero cum ventriculis eorundem animalium comparavit, unde apparuit, quantum in leone ventriculi proportionem cordis totius maiores, arteriae vero proportionem ventriculorum minores sint quam in aliis animalibus. Media cordis humani longitudo 4 pollicum et 10 linearum, circumferentia transversalis autem 10 pollicum est. Ventrículus dexter pro hac cordis magnitudine longitudine gaudet 3 poll. 8 lin. et circumferentia 5. poll. 4 lin. In corde leonis igitur, cum eius longitudo sit 5 poll. 3 lin. et circumferentia 11 poll. 4 lin. ventriculus dexter, siquidem iste nunc ad cor eandem quam in homine rationem haberet, longitudine esse deberet 3 poll. 10 lin. et circumferentia 6 poll. Sed invenitur longitudine 4 poll. 7 lin. et circumferentia 9 poll. 6 lin. Adeoque ventriculus dexter in leone quinta fere parte proportionem cordis longior quam in homine, et plus quam tertia parte amplior est. Ne vero haec differentia, quae sane notabilis est, paruitati potius ventriculi cordis humani, quam magnitudini leonini adscribenda esse videatur, ventriculus humanus porro cum felino et vitulino comparatus est. Felino ventriculo proportionem corculi sui ad normam humanam longitudo esse debuisset 12 lin. et amplitudo 15½ lin. Sed illa nonnisi 10 lin. haec tantummodo 11½ lin. inventa fuit. Vitulinus, qui longitudine 3 poll. ½ lin. et amplitudine 4 poll. 3½ lin. esse debuisset, nonnisi

nisi 2 poll. 1 lin. longus et 3 poll. 10 lin. amplius inueniebatur, unde patet, in his animalibus ventriculū etiam humano minorem, nec ergo periculum errandi esse, si magnitudo ventriculorum leonis ex comparatione ventriculorum hominis diiudicatur. Ventriculus cordis sinister in leone proportionē cordis esse debuisset longitudine 3 poll. $7\frac{1}{2}$ lin. et ambitu 4 poll. $4\frac{1}{2}$ lin. Sed obseruatus est longitudine 5 poll. et ambitu 8 poll. 2 lin. Proinde iste ventriculus in leone plus quam quarta parte solito longior et duplo fere amplior est. In sele nempe et vitulo mensurae itidem humanis, quibus cum leoninae comparatae sunt, minores fuisse, excepta sola circumferentia in corde vitulino, quae paullulo humana maior fuit. Pro hac enormi ventriculorum magnitudine fieri non potuit, quin et mire tenuis sit substantia carnea, qua cor efficitur. Paries ventriculi sinistri in corde vitulino et felino duplo fere crassior est quam idem paries eodem in loco in corde humano. At iste paries humanus tamen est ad leoninum vt $9\frac{1}{2} : 5$.

De magnitudine arteriarum vltima modo resultata repetemus. Ambitus trunci aortae proportionē ventriculi sui in leone fere dimidio quam in homine minor est. Nimirum ante ramos maiores editos maximam partem leonis aorta ad humanam est vt $1 : (2 - \frac{1}{2})$. Sed hoc magno decremento non obstante tamen aorta post ramos maiores illos editos adhuc porro erga hominis aortam decrescit, ea-

que

que multo plus quam dimidio minor euadit. Nam ubi ad columnam vertebrarum se applicat, antequam primam intercostalem arteriam ediderit, ad humanam est vti $1 : 2\frac{1}{2}$, prope diaphragma autem vti $1 : 2\frac{1}{2}$. Idemque de caeteris trunci aortae ramis valet. Arteria subclauia dextra ad eandem hominis arteriam est vti $1 : 2\frac{1}{2}$. Subclauia sinistra vti $1 : 2\frac{1}{2}$ et carotides adeo fere sunt vti $1 : 3$. Neque aliter comparatum est cum arteriis pulmonalibus. Truncus arteriarum pulmonalium ad eundem truncum in homine proportionem ventriculi sui dextri se habet vti $1 : 1\frac{1}{2}$. Sed eius ramus dexter vti $1 : 2$ et sinister vti $1 : 2\frac{1}{2}$. Probabile igitur est, idem vasorum decrementum continuatum iri porro per succedentes ramificationes, adeo, ut in ordinibus ultimis, veluti in decimo quinto, vel sexto, vascula decuplo quoque circiter in ambitu suo humanis proportionem ventriculi sinistri minora sint.

Hinc facile colligitur, quanto celeritas motus sanguinis in leone maior sit quam in homine et in aliis animalibus. Etiam si in calculo multa largiamur; (nam in imminuendis potius, quam in augendis mirabilibus Auctor peccare voluit) sanguis tamen quamprimum ex corde crumpit, et in ea parte Aortae, quae citra ramos est, quadruplo iam celerius in leone quam in homine et in aliis animalibus quadrupedibus mouebitur; noncuplo autem in ramis secundi vel tertii ordinis, quorum, veluti carotidum, peripheriae triplo et lumina igitur non cuplo

cuplo quam in homine minora sunt ; denique centuplo celerius in ramis decimis quintis, quorum peripheriae decuplo et lumina centuplo in leone minora sunt quam in homine.

Quum sanguinis motum in homine ob lumina ramorum, qui ex trunco quouis oriuntur, conjuncta semper multo maiora lumine trunci, continuo retardari notum sit, prout sanguis successive per systema arteriarum progreditur ; eaque retardatio secundum calculos, a Celeberrimis Physiologis institutos enormis fere euadat ; (KEILIVS celeritatem, qua in ultimis arteriis sanguis mouetur, ad eam, qua per aortam propellitur, passim se habere inuenit ut $1 : 44307$. vid. *Perill. HALL. El. Phys. Tom. II. p. 174.*) non minus mirum forte videbitur, si pericula docuerint, in leone retardationem nullam fieri, sed potius accelerari sanguinem prouti per arterias progreditur. Nam istaec retardatio tanta cum sit in homine ; credidisses, eam necessariam esse ad vitam animalis. Quum ergo non sit, sequitur, aliam et peculiarem causam esse debere, cur tanta sit in homine. Sic alia alia illustrent. Ratio summae luminum ramorum, qui ex trunco aortae oriuntur, aortae nempe dorsalis, subclaviae utriusque et carotidis utriusque ad lumen trunci aortae in leone est ut $94\frac{1}{2} : 147$ vel ut $1 : (1\frac{1}{2} + \frac{1}{17})$. Ratio summae luminum ramorum pulmonalium, dextri nempe et sinistri, ad lumen trunci pulmonalis est ut $88\frac{1}{2} : 133\frac{1}{2}$, quae est $1 : (1\frac{1}{2} + \text{circa } \frac{1}{10})$.

Tom. XVI. Nou. Comm.

f

Vnde

Vnde patet, non modo retardationem nullam, sed magnam potius accelerationem sanguini leonis contingere, dum ex trunco aortae, vel etiam arteriarum pulmonalium in ramos eorum ingreditur.

Haec tandem incredibilis fere celeritas sanguinis influxum quoque habere videtur in naturam et attributa leonis. Robur. non modo corporis quoad partem et agilitatem huius animalis, sed audaciam quoque et atrocitatem inde deriuat Clar. Auctor, quod quo pacto quibusue argumentis fiat, in ipsa Dissertatione legi meretur.

II.

Observationes splachnologicae ad *Acipenseris Rutheni Linn.* anatomen spectantes.

Auctore I. T. Koelreuter pag. 511.

Quanquam ea, quae in hac Dissertatione de structura interna *Acipenseris rutheni* traduntur, eius indolis non sint, ut oeconomia vitalis piscium iis aliqua ratione illustrari, vel physiologia incrementum inde aliquod capere possit, (sunt nempe merae partium abdominalium descriptiones Zootomicae), tamen non ingrata fore sperauimus cultoribus scientiae

tiae naturalis, qui quippe in condendis animalium characteribus nonnunquam etiam interiori partium conformatione utuntur; atque in hunc finem imprimis hae descriptiones inferuire posse videntur. Hepar primum consideratur. Agitur de eius colore, figura, diuisione in duodecim lobos, qui omnes secundum figuram, quae singulis diuersa et irregularis est, prolixè describuntur. Caeterum nihil in his occurrit, quod se distinguat, vel quod notabile sit. Vesiculae felleae deinde et ductus cystici mentio fit. in quibus nihil insoliti est. Oesophagi pars prior intus glabra, ea autem, quae propior ventriculo papillis in superficie interiori obrita est. Ventriculus ipse figura ouatus, caeterum carnosus, crassus et durus est et ventriculo animum graniuarum similis. Duodenum teres, itidem durum. Pancreas figura reniformi gaudet, idemque dissectum etiam intus structuram monstrat renum structurae quodammodo similem. Substantia scilicet exteriori corticali duriori, coloreque distincta et interiori molliori praeditum est, illaque radiatim quasi ex peripheria versus centrum producitur. His viscerum abdominalium descriptionibus figuras cordis Clar. Auctor adiunxit.

III.

De Hermaphrodito ad sexum virilem
pertinente.

Auctore I. Lepechin pag. 525.

Egregiae observationes sunt, et quae non possunt non gratissimae esse: physiologis, quas Clar. Auctor in hac Dissertatione Academiae communicavit. Si nihil aliud per hermaphroditum intellexeris, quam hominem, qui inter naturam femineam et masculam vere ambigit, hic certe, quem descripi-
tum tenemus, hermaphroditus fuit. Hoc solo respectu ei, vt caeteris hactenus in scenam productis, nomen illud desegari poterit, si hominem postules, qui officio utroque, femineo et masculo pro lubitu in negotio generationis fungi possit. Hoc enim respectu mas ille fuit, sed tamen probe distinguendus non modo a feminis illis quae ob solam maiorem clitoridem, membrum virile mentientem, immerito et sine vlla causa pro hermaphroditis habitae fuerunt, sed etiam a maribus, quorum testiculi in abdomine retenti aliquam ouariorum speciem retulerunt. Scrotum nostro homini longitudinaliter diuisum erat in duos sacculos oblongos, rima profunda distinctos, quorum quisque suum testiculum interdum continebat, et qui extremitate sua anteriori supra basin penis coniungebantur, adeo, vt sacculi labia
maiora

maiora vulvae, rima hanc ipsam et penis, solito brevior, a labiis inclusus, clitoridem ad amissim referret. Sed iste penis imperforatus quoque et loco vrethrae nonnisi sulco longitudinali instructus erat, cum vrethra iam sub radice penis intra labia terminaretur. Quid ergo obstat, quo minus pro vera clitoride habeatur haec pars, quae neque specie externa, neque structura membrum virile sed omni respectu clitoridem refert. His notis sexus feminini accedunt facies imberbis! vox feminea! (nam hominem nonnisi viuum observare licuit,) et tandem mammae muliebres, turgidae, papillis crassioribus, areola cinctis, instructae! Recte monuit Clar. Auctor non casu haec omnia accidisse. Nam inter ipsas causas formatrices, quaecunque hae fuerint, et quantumcunque easdem nos latere velis, tamen aliquid fuisse, quod ad fingendam feminam requiritur, vel aliquid defuisse, quod ad producendum marem necessarium est, res ipsa loquitur, confirmatque observatio, quam Clar. Auctor addit duorum fratrum, qui hermaphrodito nostro fuere, et quibus ambobus eadem partium genitalium conformatio, idemque muliebris habitus erat. Neque autem verisimile est, praedelineata fuisse primordia horum hominum in ovis matris. Nam aut feminae aut mares perfecti, non homines dubii, praedelineati fuissent, aequae minus ac monstra illa, quae, postquam nata sunt, perire necesse est. Caeterum viros tamen esse hos hermaphroditos pericula docuerunt: Nam maximus eorum natu uxorem duxit ex eaque liberos genuit.

IV.

Salmo Leucichthys et Cyprinus Chalcoides descripti.

Auctore A. I. Gueldenstaedt pag. 531.

Mare Caspium, quorsum Clar. huius Dissertationis Auctor indagandorum naturae productorum causa missus est, piscibus quidem, eodem referente, omnino abundat, sed magis tamen individuorum copia, quam varietate specierum superbit. Hae enim ad decades quattuor vix accedunt, maximamque partem Europae et aquis dulcibus communes sunt. Plerasque Clar. Auctor recentet et nonnullas ex Acipenserum genere, characteribus a capitis partibus desumptis, determinat. Deinde duas species producit, quarum altera ad *Salmonum* altera ad *Cyprinorum* genus pertinet, quaeque plane indigenae mari Caspio et Ichthyologis minus notae sunt. Salmoni nomen specificum triuiale *Leucichthydis*, Cyprino vero *Chalcoidis* addidit et vtriusque piscis descriptionem concinnauit. Prior vbique per Russiam *Belaia Rybyza*, id est *albi piscis* posterior vero *Harengi Kislariensis* nomine venit, vnde nomina triuialia petita. Ille ob maxillas edentulas, inferioremque longiorem facile cum *Salmone Albula* LINNAEI confundi posset, quamobrem sequentes amborum specierum characteres essentialis constituti sunt:

Leu-

Leucichthys erit: Salmo maxillis edentulis inferiore longiore; radiis membranae branchioſtegæ decem. *Albula* autem: Salmo maxillis inferiore longiore, radiis membranae branchioſtegæ ſeptem. Hic poſterior, *Cyprinus* nempe *Cbalcoides*, a congeneribus ſpeciebus ſequenti caractere diſtinguitur: *Cyprinus* pedalis, radiis pinnae ani nouemdecim maxilla inferiore longiore incurua.

V.

Kraſcheninnikouia, nouum plantarum genus.

Auctore A. I. Gueldenſtaedt p. 548.

Nouum hoc plantarum genus, quod Clar. Auctor hic nobis offert, quodque in memoriam Viri meritiffimi, membri olim Academiae noſtræ, *Kraſcheninnikouiam* appellat, a pluribus quidem Botanicis hætenus viſum et collectum, ſed non ſatis accurate, uti Clar. Auctor obſeruat, examinatum, neque adeo recte determinatum fuit. **TOVRNEFORTIUS** primus hanc plantam inuenit in Oriente, eamque *Ceratoidis* ſui generi adiunxit, quod idem *Ceratopus*. **LINNAEI** eſt. Deinde **STELLERVS** eandem in campis ſibiricis reperit; ſed varie, nunc ad *Biſi*, nunc ad *Campboratae* genus retulit. Illuſtr. **LINNAEVS** prius *Vrticam* poſt hæc *Axiridem* eandem

dem appellauit, quem etiam GMELINVS in Flora Sibirica secutus est, adeo tamen, vt ipse de vero genere adhuc dubius permaneret. Hos omnes itaque Clar. Auctor non modo in assignatione generis sed eatenus etiam errasse existimat, quod generatim ad vnum horum generum, iamiam notorum, inter quae quasi ambigua sit, hanc plantam referendam esse, vnanimi licet sensu, crediderint. Nam novam prorsus, propriique generis illam iudicat, quamvis tamen omnino concedit, multa illi cum *Urtica* et plura adhuc cum *Ceratocarpo* communia esse, adeo, vt media quasi inter dicta haec genera et *Atriplicem* sit, eaque coniungat. Constituit eius characterem genericum, cuius notae praecipue in florum masculorum *Perianthio* tetraphyllo, persistente; *Corolla* nulla; *Staminum* filamentis quatuor capillaribus, thalamo insertis, antherisque subrotundis didymis; in florum femineorum *Perianthio* monophyllo *Corolla* nulla *Germine* ovato supero, *Stylo* simplici, *Stigmatibus* duobus capillaribus reflexis, *Pericarpium* calyce dilatato, semen vndique tegente; *Semineque* vnico, ovato-compresso consistunt. Et cum characterem *Ceratocarpi*, quocum magna *Krascheninnikouiae* similitudo est, haecenus notum aeque erroneum inuenerit, correctionem reddit. Denique descriptionem plantae, quae noui generis est, addit, speciemque eiusdem, quam *Cerataidem* tri-
viali nomine vocat, determinat.

VI.

Koelreuteria, nouum plantarum genus.

Auctore E. Laxmann pag. 561.

Diu iam plantae huius, in horto Academico nostro perennantis flores expectauerant, qui illi prioribus temporibus praeerant Botanici, sed frustra haecenus; donec tandem nuper aestate valde calida exoptatos flores produxit. Clar. itaque huius Diff. Auctor, cui occasio fauebat, plantam delineari curauit, genus eiusdem, quod nouum fore ab aliis coniectura iam prospectum erat, descripsit, nomenque *Koelreuteriae paniculatae* eidem imposuit. Character genericus consistit in calyce pentaphyllo, infero, foliolis inaequalibus; corolla tetrapetala, petalis aequalibus; nectariis petaloidis, et corpusculo receptaculi analogo genitalia tantum sustinente.

ASTRONOMICA.

I.

Experimenta circa Longitudinem Penduli simplicis minuta secunda Kolae et Archangelopoli oscillantis.

Auctore Stephano Rumovski pag. 567.

Ab eo tempore, quo *Richerus* Horologium Astronomicum Cayennam translatum singulis diebus duobus minutis primis retardasse, ac longitudinem penduli $1\frac{1}{2}$ lin. minuendam fuisse obseruauit, ut illud motu suo singula minuta secunda temporis aequae ac Parisiis indicaret, Astronomi nullam praetermittunt occasionem inquirendi in longitudinem penduli simplicis, ut certius constet, quantum figura telluris a sphaeroica aberret. Non inanem itaque operam collocasse censendus est Cl. Auctor, dum Kolae sub latitudine $68^{\circ} 52'$ longitudinem penduli simplicis per experimenta definire allaborauerit.

Duplex hic occurrit determinatio penduli simplicis minuta secunda Kolae oscillantis: altera ab experimentis authomato pendulo inuariabili instructo institutis petita, altera ab experimentis pendulo simplici peractis. Ex his longitudo penduli simplicis in

in temperie aeris 12° supra 0 thermometri Reaumuriani deducitur 3 ped. 9, 46 lin.; ex illis vero in temperie aeris 61° supra 0 eiusdem thermometri longitudo penduli eruitur 3 ped. 9, 34 lin., quam priori praeferendam esse non sine ratione existimat Cl. Auctor.

Ad calcem huius dissertationis stabilitur longitudo penduli simplicis Archangelopoli 3 ped. 9, 15 lin. verum determinatio haec non aequae certa est ac praecedens; innititur enim determinationi longitudinis penduli simplicis Kolae, dein supponitur horologium Astronomicum Kola Archangelopolin translatum nullam in itinere mutationem fuisse passum. Interim tamen negari nequit determinationem hanc magis veritati consentaneam videri ac *De l'Islii*, prout patet ex comparatione longitudinum pendulorum Kolae, in Ponoï et in Pello inuentarum.

II.

De Parallaxi Solis conclusa ex transitu Veneris per Solem A. 1769.
in Insula Regis Georgii
observato.

Auctore A. I. Lexell pag. 586.

Dum in Parte II da Tom. XIV. horum Commentariorum, observationum super transitu Veneris

ris ad sinum Hudsonis et in California factarum, instituta est comparatio, cum illis observationibus quae in Europa factae fuerunt, euidenter quidem demonstratum est, valorem parallaxis tempore transitus 8 secunda superare, neque tamen ad 9 secunda excrecere, sed probabiliter $8\frac{1}{2}$ sec. aliquanto esse maiorem; quia tamen haec disquisitio ita comparata erat, ut leues in observationibus commissi errores ipsam conclusionum certitudinem multum debilitare possent, summo omnium Astronomorum desiderio expectabantur observationes, quae super hoc phaenomeno ab Astronomia Anglis in Insula quadam maris Pacifici *King-Georg Eyland* dicta institutae fuerunt, quippe ex quarum observationum comparatione cum Europeis de vera quantitate Parallaxis Solaris tutissimum institui posset iudicium, siquidem pro hac insula effectus parallaxis ad durationem transitus Veneris imminuendam erat insignis adeoque contrarius illi, qui pro locis Europeis obtinuit, qui scilicet valuit ad durationem transitus augendam. Statim igitur ac Illustr. Societas Scientiarum Regia Londinensis, observationes has cum nostra Academia Scientiarum communicare dignata est, Cl. huius dissertationis Auctor easdem ad praescriptum Methodi *Eulerianae* in Tomo XIV. Comment expositae, calculo subiecit, easque pro Parallaxi Soli inuenit conclusiones, quas in hac Dissertatione fusius exponit, et cuius summa tantum capta hoc loco perstringere suffecerit. Ut Cl. Auctor eo certiores pro Parallaxi Solis inueniret conclusiones, singulas obser-

vationes

rationes Americanas cum insigni numero earum, quae in Europa institutae fuerunt, comparare necessum duxit, in quo negotio exsequendo duo casus seorsim considerandi fuerunt, prior quo ratio habetur tam contactuum internorum quam externorum, alter quo ad contactus tantum internos utpote certiores tantum respicitur. His itaque praesuppositis, si π designat Parallaxin Solis, tempore transitus, y autem correctionem Latitudinis Geocentricae Veneris ex Tabulis assumptae pro tempore conjunctionis, inuenit combinationem observationum pro Insula Regis Georgii cum Europeicis praebere pro priori casu $\pi = 8'', 68 - 0,0077 y$ et pro posteriori $\pi = 8'', 58 - 0,0080 y$. Simili modo combinatione observationum ad sinum Hudsonis factarum cum Europeicis dat pro priori casu $\pi = 8'', 52 - 0,0019 y$ et pro posteriori $\pi = 8'', 74 - 0,0029 y$. Denique observationes Californiae institutae, si cum Europeicis comparentur, praebent pro posteriori casu $\pi = 8, 61 - 0,0062 y$, pro hoc scilicet loco observationes tantum contactuum internorum in computum ductae fuerunt. Ut autem nunc ex his diversis conclusionibus valor medius rite exquiratur, unicuique earum ea tribuenda est probabilitas, quae ipsi reapse competit, et quae proportionalis est censenda coefficienti ipsius π in aequatione unde eius valor deductus est. Hoc modo igitur probabilitates aestimando, inuenit Cl. Auctor valorem parallaxis medium tempore transitus fore $\pi = 8'', 63 - 0,0062 y$, si ad omnes observationes attendatur, vel $\pi = 8, 57$

— 0,0062.y, si observationes in Insula Regis Georgii pro contactibus externis excludantur, vel $\pi'' = 8'',62$ — 0,0065.y si observationes contactuum externorum pro sinu Hudsonis etiam excludantur, unde exacte quidem statuere licuit $\pi = 8,60$ — 0,006.y. Ad huius autem conclusionis vltiorem confirmationem Cl. Auctor observationes Americanas scorsim cum observationibus in iis Lapponiae locis factis, vbi totum transitum obseruare licuit comparat, tum etiam ipsas observationes Americanas inter se confert, ex priori disquisitione inuenit medio sumto $\pi = 8,64$ — 0,0075.y, et ex posteriori $\pi = 8'',47$ — 0,01.y. Denique vt valor absolutus ipsius π inueniatur correctionem Latitudinis Geocentricae supponit $8''$, vnde habetur $\pi = 8'',55$ de qua Auctor noster affirmare non dubitat eam vltra partem decimam secundi a veritate non fore discrepantem. Si contactuum externorum pro Insula Regis Georgii ratio haberetur, nullum quidem est dubium, quin valor Parallaxis aliquanto maior prodiret, ostendit igitur Cl. Auctor has observationes imprimis pro contactu externo circa egressum insignibus erroribus esse obnoxias, qua etiam occasione in Longitudinem Geographicam Insulae Regis Georgii a Parisiis inquit, quae ab ipso inuenta est $10^b. 7'. 22''$ versus Occid. Vltimo demum loco exponit quales errores in observationibus admittere necesse foret, si Parallaxis ad 10 sec. vel ad 9 sec., augenda esset: Et pro Parallaxi quidem 10 sec. medius valor errorum vsque ad duo minuta prima cresceret, pro hypothesi autem

autem Parallaxis 9'' hic error vix infra 20 aut 30
sec. subsistere posset.

III.

Elementa Astronomica Theoriae Veneris deducta ex obseruatione transitus Veneris sub Sole ad sinum Hudsonis, Californiae et in Insula Regis Georgii instituta.

Auctore W. L. Krafft pag. 649.

Coniunctiones eclipticae Veneris cum Sole, etiam si a principali istiusmodi obseruationum, in definienda parallaxi Solis horizontali, vsu discefferis, eam quoque ob causam Astronomorum attentionem summo iure prouocant, quod ad perficienda theoriae huius planetae primaria elementa maxime sunt accommodatae. Nostri igitur acui Astronomis cum tam contigerit esse felicibus, vt bis intra nouem annos rarissimo hoc fruerentur phaenomeno; quin in motuum Veneris cognitionem insignis inde redundauerit utilitas, dubitari non potest. Hunc ipsum quoque scopum in hac dissertatione sibi fixit Cl. Auctor, dum vltimi transitus Veneris sub Sole 1769. visi tres omnibus numeris absolutae obseruationes ad Academiam essent transmissae, Principio itaque

itaque Cl. Auctor id operam dat, ut motus Veneris horarios in ecliptica, in orbita relativa et in latitudinem summa cum praecisione definiat; quibus praemissis ex mora ingressus vel egressus per effectus parallacticos in hypothese parallaxis Solis $= 8''{,}55$ computatos ad centrum terrae reducta quantitatem semidiametri Veneris determinat; unde porro ad distantiam centrorum minimam, latitudinem Veneris geocentricam atque coniunctionis tempus verum, inuestiganda progreditur. Locum Nodi Veneris ex hac ipsa observatione deductum cum eo, quem observatio anni 1761. praebet, comparando motus annuus lineae Nodorum Veneris respectu aequinoctiorum colligitur $32''{,}03$ adeoque $- 18''{,}30$ intuitu fixarum; quae quidem determinatio parum ab ea discrepat, quae ex theoria attractionis vniuersalis deriuatur.

IV.

Tentamen Orbitae Veneris excentricitatem et aphelium huiusque motum annuum definiendi.

Auctore W. L. Krafft pag. 658.

Methodus, planetarum excentricitates et aphelia definiendi, quam Cassinio prolatam inprimis Col. la Lande in Comment. Paris. 1755. insigniter

gniter excoluit, quantumvis sit egregia et ad calculi facilitatem apta; eo tamen haud mediocri incommodo premi videtur, quod ipsos apheliorum motus annuos tanquam elementa calculi supponat cognitos; quodsi enim, quae adhibentur, observationes magno temporis intervallo inter se sint disiunctae; omnis calculi praecisio pro orbitis praesertim valde excentricis haud parum inde labefactari videtur. Remedium huic difficultati adferre conatus est Cl. Auctor, dum correctionem aliquam ipsius quoque aphelii annuo motui adplicandam, tanquam incognitam quantitatem, in calculum introducit et ex quaternis observationibus, debite inter se dispositis, tres elicit aequationes analyticas, unde correctiones pro excentricitate, aphelii positione eiusque praecessione annua definiuntur. Ad elementorum, quae hic pro Veneris theoria inuenit Cl. Auctor, praecisionem quod attinet; ea plures observationes, in idoneis huic disquisitioni orbitae punctis institutas, comparando etiam magis perfici et comprobari poterit. Ceterum excentricitas et positio aphelii hic stabilita, illa a Cassinianis, haec ab Halleianis, tabulis vix discrepat; motus vero aphelii annuus 45 minutis secundis maior fuit inuentus eo, quem Cel. *Cassini* statuit adoptandum.

V.

De Latitudine Veneris Geocentrica
tempore transitus A. 1769.

Auctore A. I. Lexell pag. 669.

Quam ex observationibus contactuum Veneris cum Sole pro Latitudine Veneris Geocentrica prodeat valor aliquanto maior eo, qui reperitur si ad observationes distantiarum minimarum attendatur, Cl. huius dissertationis Auctor in veram et exactam quantitatem latitudinis Geocentricae ex observationibus distantiarum inter centra Solis et Veneris deducendam, inquirere constituit, ut eo ipso constaret, cuiusmodi observationum speciei potior tribuenda sit fides. Hunc in finem eas imprimis computo subiecit observationes, quae Noritoni in Pensylvania circa distantias proximas inter limbos Solis et Veneris institutae sunt, ex quarum inter se combinatione valor distantiae minimae inter centra Solis et Veneris facile exquiritur. Si enim pro datis duobus temporibus, innotescant distantiae apparentes centrorum Solis et Veneris eadem effectu parallaxis correctae dabunt veras distantias inter haec ipsa centra, tum vero ex tempore inter observationes praeterlapso dabitur chorda a Venere eo tempore percursa, ideoque in triangulo cuius tria dantur latera, inveniri quoque potest perpendicularis in basin (chordam

a Ye-

a Venere percurfam), quae erit ipsa distantia minima. Hoc autem modo ex 36 diuersis comparationibus, quarum maxima discrepantia 5" non excedit, colligitur valor distantiae minimae 10'. 9", 4 pro semidiametro Solis 15'. 47", si autem binae observationes, quae reliquis sunt incertiores excludantur, maximus dissensus conclusionum 2" non superabit, tumque medio sumto habebitur distantia minima 10'. 10", quam tamen vno secundo maiorem esse suspicatur Cl. Auctor, quod etiam per observationes Philadelpiae institutas confirmare agnoscitur. Deinde observationes quoque a Cel. *Krafft* Orenburgi institutas circa appulsus Solis et Veneris ad eadem fila Quadrantis horizontalia et verticalia in computum duxit, indeque valorem Latitudinis Geocentricae Veneris quaesivit, quam tamen vera maiorem reperit, ostendit igitur ex huiusmodi observationibus licet quam maxime exactis, vic quicquam certi de valore Latitudinis Geocentricae statui posse, quum vnus secundi error in appulsu notando, in valore Latitudinis producat errorem 8. sec., igitur vt conclusiones ex huiusmodi observationibus deduci possent, quae non vltra 3 aut 4 secunda inter se discreparent, necessum esset, vt momenta appulsus ad praecisionem dimidia vel tertiae partis minuti secundi notari possent, qualem exactitudinem in huiusmodi observationibus expectare frustraneum esset. Denique reticendum non est, si valor diametri Solaris aliquantum imminuatur, observationes contactuum cum observationibus Micrometricis melius

conciliari posse, immo perfectum obtineri confensum si cum Cel. *de la Lande* diameter Solis $7''$ imminuatur, quo facto prodibit distantia minima $10' 8''$ circiter. Verum quum tanta diminutio diametri Solaris vix admittenda sit, nisi per mensuras actuales Micrometris captas comprobari possit, Cl. Auctor tutissimum iudicavit pro valore diametri Solis $10' 45'' 5$, qui ipsi admodum probabilis visus est, statuere valorem distantiae minimae Veneris a centro Solis $10' 10''$, ex quo Latitudo Veneris Geocentrica tempore coniunctionis habebitur $10' 17''$.

IV.

Epitome Observationum meteorologicarum, anno 1771. secundum Calendarium Iulianum Petropoli institutarum.

Auctore I. A. Eulero pag. 693.

Observationes meteorologicas anni 1771. eadem Cel. Auctor et instituit et heic exponit methodo, quam in horum Commentariorum Tomo decimo quarto fusius ab Ipso legimus explicatam. Barometri maxima altitudo observata fuit 28.77 poll. ped. Paris. cum spatio variationis annuo 1.81, ad menstruas vero variationes quod attinet, eas, vti

com-

communiter, ita et hoc anno, in mensibus aestivis, longe minores, quam hybernis,prehendimus. Frigus intensissimum fuit 198° . divisionis *Deslilianae*, quod ergo vix tribus gradibus a summo frigore absuit Petropoli adhuc observato; calor maximus fuit 109° seu 22° supra punctum congelationis in divisione Reaumuriana. Observationes aurorarum borealium, quales quidem viginti novem hoc anno adparuerunt, aliorumque phaenomenorum Cael. Auctor singulis mensibus subnectit.



INDEX.

DISSERTATIONVM.

Mathematica.

Leon. Euler, De Solidis, quorum superficiem in planum explicare licet pag. [3.](#)

Eiusdem, Methodus noua et facilis calculum variationum tractandi pag. [35.](#)

Dan. Bernoulli, De summationibus serierum quarundam incongrue veris earumque interpretatione et vsu pag. [71.](#)

Leon. Euler, Euolutio formulae integralis $\int x^{f-1} dx (lx)^{\frac{m}{n}}$ integratione a valore $x=0$ ad $x=1$ extensa pag. [91.](#)

Eiusdem, Problematis cuiusdam Geometrici prorsus singularis euolutio pag. [140.](#)

Eiusdem, Considerationes Cyclometricae p. [160.](#)

A. L. Lexell, De criteriis integrabilitatis formularum differentialium Dissertatio secunda p. [171.](#)

Eiusdem, Demonstratio Theorematis Analytici a Cel. la Grange inuenti pag. [230.](#)

Physico-Mathematica.

Dan. Bernoulli, De Vibrationibus chordarum, ex duabus partibus tam longitudine quam crassitie

fitie ab inuicem diuersis compositarum
pag. 257.

Leon. Euler, Sectio quarta de motu Aeris in Tubis
pag. 281.

— *Eiusdem*, De Perturbatione motus Terrae ab actione Veneris oriunda pag. 426.

P h y s i c a.

C. F. Wolff, De Corde Leonis pag. 471.

I. T. Koelreuter, Obseruationes splanchnologicae ad Acipenseris Rutheni Linn. anatomen spectantes pag. 511.

I. Lepechin, De Hermaphrodito ad sexum virilem pertinente pag. 525.

A. I. Gueldenstaeds, Salmo Leucichthys et Cyprinus Chalcoides descripti pag. 531.

Eiusdem, Krascheninnikouia, nouum plantarum genus pag. 548.

E. Laxmann, Koelreuteria, nouum plantarum genus pag. 561.

A s t r o n o m i c a.

— *Steph. Rumowski*, Experimenta circa Longitudinem Penduli simplicis minuta secunda Kolae et Archangelopoli oscillantibus pag. 567.

A. L.

- A. I. Lexell*, De Parallaxi Solis conclusa ex transitu Veneris per Solem A. 1769. in Insula Regis Georgii obseruato pag. 586.
- W. L. Krafft*, Elementa Astronomica Theoriae Veneris deducta ex obseruatione transitus Veneris sub Sole ad sinum Hudlonis, Californiae et in Insula Regis Georgii instituta pag. 649.
- Eiusdem*, Tentamen Orbitae Veneris excentricitatem et aphelium huiusque motum annum definiendi pag. 658.
- A. I. Lexell*, De Latitudine Veneris Geocentrica tempore transitus A. 1769. pag. 669.
- I. A. Euler*, Epitome Obseruationum meteorologicarum, anno 1771. secundum Calendarium Iulianum Petropoli institutarum p. 693.



MATHEMATICA.

Tom. XVI. Nou. Comm.

A

DE

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
CHICAGO, ILLINOIS

DE
SOLIDIS QVORVM
SVPERFICIEM IN PLANVM
EXPLICARE LICET.

Auctore

L. EVLERO.

1.

Notissima est proprietas cylindri et coni, quae eorum superficiem in planum explicare licet atque adeo haec proprietas ad omnia corpora cylindrica et conica extenditur, quorum bases figuram habeant quamcunque; contra vero sphaera hac proprietate destituitur, quum eius superficies nullo modo in planum explicari neque superficie plana obduci queat; ex quo nascitur quaestio aequae curiosa ac notatu digna, vtrum praeter conos et cylindros alia quoque corporum genera existant, quorum superficiem itidem in planum explicare liceat nec ne? quam ob rem in hac dissertatione sequens considerare constitui Problema:

Inuenire aequationem generalem pro omnibus solidis, quorum superficiem in planum explicare licet, cuius solutionem varijs modis sum aggressurus.

A 2

SOLV-

SOLVTIO PRIMA.

ex meris principiis Analyticis petita.

Tab. I. 2. Sit Z punctum quodcunque in superficie
 Fig. 1. solidi quaesiti, cuius locus more solito per has ternas coordinatas inter se normales $AX=x$, $XY=y$ et $YZ=z$ exprimat, ita ut aequatio inter has coordinatas sit inuestiganda, qua problemati satisfaciat. Deinde concipiamus superficiem huius solidi, iam in planum esse explicatam eamque in Fig. 2. repraesentari, in qua punctum illud Z incidat in V , cuius locus per binas coordinatas orthogonales ita definiatur ut sit, $OT=t$ et $TV=u$ atque manifestum est, ternas coordinatas priores x , y et z certo quodam modo ab his binis t et u pendere debere, ideoque singulas earum tamquam certas functiones istarum t et u spectari posse.

3. Quo hanc conditionem commodius in calculum introducamus eam in differentialibus consideremus et quoniam tam x , quam y et z sunt functiones binarum variabilium t et u , earum differentialia his formulis definiamus:

$$dx = ldt + \lambda du; \quad dy = mdt + \mu du \quad \text{et} \quad dz = ndt + \nu du$$

vbi quum litterae l , m , n et λ , μ , ν itidem certas functiones binarum variabilium t et u significant, ex natura huiusmodi functionum constat esse debere:

$$\left(\frac{d^2 l}{dt^2}\right) = \left(\frac{d^2 \lambda}{dt^2}\right); \quad \left(\frac{d^2 m}{dt^2}\right) = \left(\frac{d^2 \mu}{dt^2}\right) \quad \text{et} \quad \left(\frac{d^2 n}{dt^2}\right) = \left(\frac{d^2 \nu}{dt^2}\right).$$

4. Iam in superficie explanata praeter punctum Tab. I. V duo alia infinite propinqua v et v' contemplemur, Fig. 2. pro quorum illo coordinatae sint $OT = t$ et $Tv = u + du$ pro hoc vero $Os = s + ds$ et $s v' = u$, ita ut puncta V et v' communem habeant abscissam $OT = t$, at puncta V et v' communem applicatam $= u$. Hinc iunctis lineolis $V v'$ et $v v'$ latera trianguli elementaris $V v v'$ ita determinantur, ut sit $V v = du$, $V v' = ds$, et $v v' = \sqrt{(du^2 + ds^2)}$, atque nunc facile intelligitur, hoc idem triangulum in superficie solidi quaesiti reperiri debere.

5. Sint igitur in superficie solidi puncta z et z' , quae punctis v et v' respondeant, atque videamus quo modo pro illis punctis z et z' ternae coordinatae se sint habiturae? Quemadmodum autem ipsum punctum Z per has tres coordinatas primam $= x$ secundam $= y$ et tertiam $= z$ definitur, quae singulae sunt functiones binarum t et u , quoniam pro puncto v abscissa t manet, applicata vero u suo differentiali du augetur, pro puncto solidi z ternae coordinatae ita se habebunt:

$$I^{ma} x + \lambda du \quad II^{da} y + \mu du \quad \text{et} \quad III^{tia} z + \nu du$$

simili modo quia pro puncto v' applicata u manet abscissa vero t suo differentiali dt augetur, pro puncto z' ternae coordinatae erunt:

$$I^{ma} x + \lambda dt \quad II^{da} y + \mu dt \quad \text{et} \quad III^{tia} z + \nu dt.$$

6. Constat autem si pro puncto quocunque in superficie solidi coordinatae fuerint x, y et z pro

6 DE SOLIDIS QVOR. SVPERFIC.

alio vero puncto proximo x' , y' , et z' , tum eorum punctorum distantiam fore $= \sqrt{(x'-x)^2 + (y'-y)^2 + (z'-z)^2}$; hinc pro triangulo $Z z z'$ habebimus singula eius latera 1°. $Z z = du \sqrt{\lambda^2 + \mu^2 + \nu^2}$; 2°. $Z z' = dt \sqrt{l^2 + m^2 + n^2}$ et 3°. $z z' = \sqrt{(\lambda du - l dt)^2 + (\mu du - m dt)^2 + (\nu du - n dt)^2}$ siue $z z' = \sqrt{dt^2(l^2 + mm + nn) + du^2(\lambda\lambda + \mu\mu + \nu\nu) - 2 dt du(l\lambda + m\mu + n\nu)}$.

7. Iam quum superficies solidi prorsus debeat convenire cum figura plana (Fig. 2) necesse est, vt triangula $Z z z'$ et $V v v'$ sint non solum aequalia, sed etiam similia ideoque latera homologa aequalia, scilicet:

I°. $Z z = V v$, II°. $Z z' = V v'$ et $z z' = v v'$ unde tres sequentes nanciscimur aequationes

$$\text{I}^\circ. \lambda^2 + \mu^2 + \nu^2 = 1; \text{II}^\circ. l^2 + m^2 + n^2 = 1;$$

$$\text{III}^\circ. dt^2(l^2 + m^2 + n^2) + du^2(\lambda^2 + \mu^2 + \nu^2) - 2 dt du(l\lambda + m\mu + n\nu) = dt^2 + du^2$$

tertia autem, ob binas priores reducitur ad hanc

$$l\lambda + m\mu + n\nu = 0,$$

quibus tribus aequationibus solutio problematis nostri continetur, ex quo intelligitur eam reduci ad sequens problema analyticum:

Propositis duabus variabilibus t et u earum sex inuenire functiones l, m, n et λ, μ, ν ita comparatas, vt sex sequentibus conditionibus satisfiat

$$\text{I}^\circ. \left(\frac{d l}{d u}\right) = \left(\frac{d \lambda}{d t}\right); \text{II}^\circ. \left(\frac{d m}{d u}\right) = \left(\frac{d \mu}{d t}\right); \text{III}^\circ. \left(\frac{d n}{d u}\right) = \left(\frac{d \nu}{d t}\right)$$

$$\text{IV}^\circ. l l + m m + n n = 1; \text{V}^\circ. \lambda \lambda + \mu \mu + \nu \nu = 1;$$

$$\text{VI}^\circ. l \lambda + m \mu + n \nu = 0$$

quod

quod problema in se consideratum longe videtur difficillimum, cuius tamen solutionem satis concinnam *infra* exhibere licebit.

SECUNDA SOLVTIO.

ex principiis Geometricis petita.

8. Vt hanc solutionem a primis principiis repetamus, consideremus corpora vel prismatica vel pyramidica, quae basibus exceptis charta obducta intelligantur, atque in hac charta plicae rectilineae deprehenduntur vel inter se parallelae, vel ad certum punctum verticem scilicet pyramidis conuergentes, quae lineae rectae quocunque fuerint, litteris Aa , Bb , Cc , Dd etc. designentur. Quodsi ergo charta in planum expandatur, in ea eadem lineae rectae Aa , Bb , Cc etc. occurrent, eruntque vel inter se parallelae vel ad certum punctum conuergentes. Vnde vicissim si super charta plana huiusmodi lineae rectae ducantur, secundum quas chartam plicare liceat, ea certo corpori vel prismatico vel pyramidico obducendo erit apta.

9. Quin etiam in ista charta plana rectas Aa , Bb , Cc etc. pro lubitu ducere licebit, ita ut neque inter se sint parallelae neque ad certum punctum conuergant, dummodo se mutuo nusquam decessent, quemadmodum (Fig. 3.) declarat quocunque
 Tab. I.
 Fig. 3.
 enim modo ista charta secundum has rectas plicetur semper concipere licebit eiusmodi solidum, cui ista charta plicata adaptari possit. Ex quo patet praeter corpora

corpora prismatica et pyramidica, alia quoque dari corporum genera quae hoc modo charta obducantur, quorumque adeo superficiem in planum explicare liceat.

10. In superficie ergo horum corporum dantur etiam quaecunque lineae rectae Aa , Bb , Cc , Dd etc. quae etiam si neque inter se sint parallelae, neque ad quodpiam punctum conuergentes, tamen ita erunt comparatae, ut binae quaeque proximae veluti Aa et Bb , vel Bb et Cc , vel Cc et Dd etc. nisi sint parallelae, productae saltem in vno puncto concurrant, nisi enim hoc eueniret, spatium inter huiusmodi binas rectas proximas in superficie corporis interceptum non foret planum, neque propterea ipsam superficiem in planum explicare liceret, quamuis in ea darentur quaecunque lineae rectae Aa , Bb , Cc etc. Ex quo concludimus ad corpora scopo nostro satisfacienda non sufficere, ut super iis quaecunque rectas Aa , Bb , Cc ducere liceat; sed insuper imprimis requiri ut binae proximae in eodem plano existant, spatiumque inter eas interceptum ipsum sit planum.

11. Nunc iam in infinitum augeamus rectas illas Aa , Bb , Cc etc. ut corpus nostrum obtineat superficiem vbique incuruatam, quemadmodum Problema nostrum ob continuitatis legem postulat. Atque nunc quidem statim apparet, superficiem huiusmodi corporum ita comparatam esse debere, ut ex quolibet in ea sumto puncto vna saltem linea recta educi

eluci possit, quae tota in ipsa superficie sit sita, verum haec conditio sola nondum indolem Problematis nostri exhaurit, sed insuper necesse est, ut quacuis huiusmodi binae rectae inter se proximae in eodem plano sint constitutae, hoc est ut nisi sint parallelae, eae saltem productae in vno puncto concurrant. Quare si singulae illae rectae hoc modo ad concursum vsque producantur, omnia concursuum puncta in certa quadam linea curva sita reperientur, quae cum tota non sit in eodem plano duplici curvatura erit praedita atque ita comparata, ut singula eius elementa si producantur, ipsas illas rectas Aa , Bb , Cc supra memoratas in superficie corporis exhibeant.

12. Quemadmodum igitur quodvis corpus nostro Problemati conveniens ad certam quandam lineam curvam duplicis curvaturae deducit; ita vicissim sumta pro lubitu huiusmodi linea curva ex ea corpus determinare poterimus, quod problemati nostro satisfaciet. Talis autem linea curva primo proponiatur in plano tabulae, sitque eius projectio aUu pro qua ponamus abscissam $AT = t$ et applicatam $TU = u$, ita ut aequatio inter t et u tamquam data spectetur, sitque recta UM tangens huius curvae in puncto U , recta vero um tangens in puncto proximo u ; hoc posito sit $b'Vv$ ipsa curva duplicis curvaturae, cuius applicata ad planum nostrum normalis ponatur $UV = v$, sitque v proximum in eadem curva punctum, atque ex utroque puncto V , v educantur tangentes quarum illa VS rectae UM in puncto S , haec vero vs rectae um in puncto

Tab. I.
Fig. 4.

puncto s occurrat. Hic quidem ductu tangentium proximarum in punctis u et v carere potuissimus, sed quia in sequentibus iis opus erit, hic eas in Figura indicare vitum est.

13. Quum igitur natura curvae bV duplici aequatione inter ternas coordinatas $AT = t$, $TU = u$ et $UV = v$ exprimatur, tam littera u , quam v vt functio ipsius t spectari poterit, vnde simul definitur positio vtriusque tangentis UM et VS , quocirca vocemus angulos $TUM = \zeta$ et $UVS = \theta$, atque posito elemento $Tt = dt$ erit $du = \frac{dt}{\tan \zeta}$, $Uu = \frac{dt}{\sin \zeta}$, tum vero $dv = \frac{dt}{\sin \zeta \tan \theta}$, ac denique elementum curvae $Vv = \frac{dt}{\sin \zeta \sin \theta}$. Pro situ autem tangentium habebimus $TM = u \tan \zeta$; $UM = \frac{u}{\cos \zeta}$, at recta $US = v \tan \theta$ et $VS = v \sec \theta = \frac{v}{\cos \theta}$.

14. Quoniam nunc tota recta VS sita est in superficie corporis quod quaerimus, capiamus in ea punctum quodcunque indefinitum Z , vnde in planum tabulae demisso perpendicularo ZY et ex Y ad axem AT ducta normali YX habebimus pro superficie quaesita ipsas ternas coordinatas, quas supra sumus contemplati, scilicet $AX = x$, $XY = y$ et $YZ = z$, inter quas ergo debitam aequationem investigari oportet, qua huius superficiei natura exprimatur.

15. Hunc in finem vocemus intervallum indefinitum $VZ = s$, quae ergo est quantitas variabilis neutiquam a puncto V pendens, ideoque probe distinguen-

IN PLANVM EXPLICARE LICET. ¶

stinguenda a variabili t , cuius functiones non solum sunt binæ applicatae $TU = u$, et $UV = v$, sed etiam bini anguli ζ et θ . Hinc autem adipiscimur $ZY = z = v - s \cos. \theta$ et intervallum $UY = s \sin. \theta$, vnde porro concludimus $XY = y = u - s \sin. \theta \cos. \zeta$ et $XT = s \sin. \theta \sin. \zeta$, sicque tandem obtinemus abscissam $AX = x = t - s \sin. \theta \sin. \zeta$ ita vt per binas variables t et s , tres nostrae coordinatae hoc modo succincte determinentur :

$$\text{I}^{\circ}. x = t - s \sin. \theta \sin. \zeta \quad \text{II}^{\circ}. y = u - s \sin. \theta \cos. \zeta \\ \text{III. } z = v - s \cos. \theta.$$

16. Praeter omnem igitur expectationem hic vsu venit, vt formulas adeo algebraicas pro ternis coordinatis x, y, z elicuerimus, siquidem pro quantitativibus u et v functiones algebraicae ipsius t accipiantur. Hae enim functiones penitus arbitrio nostro permittuntur, iis autem assumtis, bini anguli ζ et θ ita determinantur, vt sit $\tan. \zeta = \frac{d t}{d u}$ vel $\sin. \zeta = \frac{d t}{\sqrt{(d t)^2 + d u^2}}$, et $\cos. \zeta = \frac{d u}{\sqrt{(d t)^2 + d u^2}}$, tum vero $\tan. \theta = \frac{d t}{d v \sin. \zeta} = \frac{\sqrt{(d t)^2 + d u^2}}{d v}$, ideoque $\sin. \theta = \frac{\sqrt{(d t)^2 + d u^2}}{\sqrt{(d t)^2 + d u^2 + d v^2}}$ et $\cos. \theta = \frac{d v}{\sqrt{(d t)^2 + d u^2 + d v^2}}$. Quodsi autem vicissim bini anguli ζ et θ per variabilem t , fuerint dati, ipsae applicatae u et v , per sequentes formulas integrales reperientur expressae $u = \int \frac{d t}{\tan. \zeta}$ et $v = \int \frac{d t}{\sin. \zeta \tan. \theta}$.

17. In his ergo formulis omnia plane solida, quorum superficiem in planum explicare licet contineri necesse est. Ante omnia igitur operae pretium

tium erit ostendere quomodo quaecumque corpora constituta in iis contineantur, siquidem cylindrica in conicis iam continentur, vertice in infinitum remoto. Sit igitur punctum V vertex conici, qui quum sit fixus coordinatae t , u et v constantes habebunt valores. Quoniam igitur nihil impedit, quo minus hic vertex in ipso puncto fixo A accipiatur, ponere poterimus $t = 0$, $u = 0$ et $v = 0$, tum autem ob $\text{tang. } \zeta = \frac{dt}{du}$ et $\text{tang. } \theta = \frac{dt}{dv} = \frac{v(dt + du^2)}{v \frac{dt}{du} + du^2}$, hi anguli ζ et θ prodeunt indefiniti, ita tamen, ut alter tamquam functio quaedam alterius spectari possit, quandoquidem omnia quae ad positionem rectarum VS pertinent, ad unicam variabilem sunt referenda.

18. Quum igitur sit $t = 0$, $u = 0$ et $v = 0$ habebimus:

$$\text{I}^\circ. x = -t \sin. \theta \sin. \zeta, \text{ II}^\circ. y = -t \sin. \theta \cos. \zeta \text{ et} \\ \text{III}^\circ. z = -t \cos. \theta,$$

unde fit $\frac{x}{y} = \text{tang. } \zeta$ et $\frac{x}{z} = \text{tang. } \theta \sin. \zeta$, ex illa colligitur $\sin. \zeta = \frac{x}{\sqrt{(x^2 + y^2)}}$, ideoque ex hac $\text{tang. } \theta = \frac{\sqrt{(x^2 + y^2)}}{z}$; quum igitur $\text{tang. } \theta$ functioni cuicunque ipsius $\text{tang. } \zeta$ aequetur, habebimus talem aequationem: $\frac{\sqrt{(x^2 + y^2)}}{z} = \Phi(\frac{x}{y})$, sicque quantitas $\frac{\sqrt{(x^2 + y^2)}}{z}$ aequabitur functioni homogeneae nullius dimensionis ipsarum x et y hincque porro ipsa quantitas z aequabitur functioni homogeneae cuius dimensionis ipsarum x et y , siue quod eodem redit aequatio igitur x , y et z , ita erit comparata, ut in

ca

et tres variables x , y et z ubique eundem dimensionum numerum adimpleant. Quodsi una coordinatarum x , y , z in infinitum abeat, æquatio præ solido duas tantum reliquas implicabit coordinatas, quod est criterium corporum cylindricorum.

19. Aliis solidis nostro problemati satisficientibus hic euoluendis non immoramur; quum infra ubi tertiam Methodum trademus, multo facilius cuncta huiusmodi corporum genera cognoscere queamus. Interea dum ista secunda Methodus, tam facilem nobis suppeditauit solutionem, cum per Methodum priorem vix ullam solutionem sperare liquisset; nunc etiam priorem solutionem uberius euolvere atque adeo formulas illas analyticas primo intuitu summopere arduas, resolvere poterimus unde in Analysin plurimum lucis inferetur. Ad hoc præstandum tantum opus erit, vt hanc posteriorem solutionem ad elementa prioris sollicitè reuocemus.

Applicatio Methodi posterioris ad solutionem priorem.

20. Quoniam in posteriori solutione iam formulas pro ternis coordinatis x , y et z quibus natura solidi continetur, eliciuimus, in eo nobis erit elaborandum vt etiam formulas pro figura plana in quam superficies solidi explicatur, inuestigemus. Hic ante omnia curua illa duplicis curuaturæ $b V v$ accuratius est perpendenda, quippe quæ per explicationem illius superficie etiam ad planam perducitur.

cur. Quum autem haec curva per inflexionem infinitis modis ad planum reduci atque adeo in lineam rectam extendi queat, ante omnia inquirendum est, quamvis lege haec reductionem ad planum fieri oporteat. Ex superioribus autem manifestum est, haec reductionem ita fieri debere, ut binae quaeque tan-

Tab. I. gentes proximae $V S$, et $c s$ eundem situm inter se
Fig. 4. conferuent, siue ut angulus inter eas interceptus $S V s$ maneat idem. Scilicet ipsa linea curva $B V \theta$ ita ad planum est redigenda, ut bina eius quaeque elementa proxima eandem inclinationem inter se conferuent.

21. Praecipuum igitur negotium huc redit, ut angulum infinite paruum $S V s$ inuestigemus, quem in finem ab angulo $M U m$ est exordium. Quum autem sit angulus $T U M = \zeta$, et angulus $t u m = \zeta + d\zeta$, manifesto sequitur angulus $M U m = d\zeta$, deinde quia supra iam inuenimus $U S = v \tan \theta$, erit ex natura differentialium $u s = v \tan \theta + d(v \tan \theta) = v \tan \theta + dv \tan \theta + \frac{v d\theta}{\cos^2 \theta}$, ubi $dv = \frac{dt}{\sin \zeta \tan \theta}$, quum igitur sit $U u = \frac{dt}{\sin \zeta}$, erit $U s = v \tan \theta + dv \tan \theta + \frac{v d\theta}{\cos^2 \theta} - \frac{dt}{\sin \zeta} = v \tan \theta + \frac{v d\theta}{\cos^2 \theta}$. Ex S itaque in $U s$ ducatur perpendicularum $S r$, ut habeatur $r s = \frac{v d\theta}{\cos^2 \theta}$, tum vero erit $S r = v d\zeta \tan \theta$, unde etiam elementum $S s$ definire liceret, siquidem eo opus haberemus.

22. Nunc ex puncto r in tangentem θs quocumque perpendicularum ducamus $r q$, ut ducta $S q$ fiat norma-

normalis in vs , ubi notandum triangulum Srq fore rectangulum ad r , quia Sr ad ipsum planum sIV est normalis. Quia nunc, angulus $rsq = 90^\circ - \theta$ erit $rq = sr$, $\sin. rsq = \frac{v d \theta}{\cos. \theta}$, unde colligitur $Sq = V(v d \zeta^2 \tan g. \theta^2 + \frac{v d \theta^2}{\cos. \theta^2}) = \frac{v}{\cos. \theta} V(d \zeta^2 \sin. \theta^2 + d \theta^2)$. Quum igitur sit $VS = \frac{v}{\cos. \theta}$, hinc concluditur angulus $SVs = \frac{Sq}{VS} = V(d \zeta^2 \sin. \theta^2 + d \theta^2)$.

23. Sic itaque inuenimus angulum SVs , quo bina elementa curvae proxima inter se inclinantur ex quo promtissime radius oculi huius curvae in puncto V definiri potest, quippe qui est $\frac{v \phi}{SVs} = \frac{d \phi}{\sin. \zeta \sin. \theta \sqrt{d \zeta^2 \sin. \theta^2 + d \theta^2}}$ quod ergo negotium ob duplicem curuaturam non impeditur, quae in transitu monuisse sat est. Quoniam autem hic cardo rei in hoc angulo elementari SVs versatur, vocemus hunc angulum $SVs = d\omega$, ita ut sit $d\omega = V(d \zeta^2 \sin. \theta^2 + d \theta^2)$, siue $d\omega^2 - d\theta^2 = d \zeta^2 \sin. \theta^2$, ubi quum ambo anguli ζ et θ per variabilem s determinentur, cuius etiam functiones sunt ambae applicatae u et ϕ , patet quoque angulum ω tamquam functionem eiusdem variabilis s spectari debere.

24. Iam secundum praecepta supra data curva illa duplicis curuaturae $bV\phi$, in plano sit de Tab. 1. scripta, ita ut angulus inter tangentes proximas in- Fig. 5. terceptus SVs sit $= d\omega$, atque hac curva ad axem OP per applicatam PV relata, euidens est fore angulum $PVS = \omega$. Statuamus autem has coordinatas $OP = p$ et $PV = q$, atque habebimus $\frac{d p}{d q} = \tan g. \omega$
et

et elementum curvae $Nb = \frac{dP}{\sin \zeta}$ est, veron per coor-
 dinatas praecedentes t , u et v cum angulis ζ et θ ,
 erat idem elementum $Vv = \frac{dP}{\sin \zeta \sin \theta}$, unde conse-
 quimur $dt \sin \omega = dp \sin \zeta \sin \theta$, hinc cum illa ae-
 quatione $dp = \text{tang. } \omega$ coniuncta, dabit pro praesenti-
 tibus coordinatis p et q , sequentes valores integrales
 $p = \int \frac{dt \sin \omega}{\sin \zeta \sin \theta}$ et $q = \int \frac{dt \cos \omega}{\sin \zeta \sin \theta}$ inuentis his quanti-
 tatibus p et q , quae itidem sunt functiones eiusdem
 variabilis t , capiatur intervallum $vZ = \int$ quae
 est altera variabilis in calculum introducenda atque
 ex puncto Z ad axem demisso perpendicularo ZT ,
 inuenimus $OT = p - s \sin \omega$ et $TZ = q - s \cos \omega$.

25. Quoniam igitur pro puncto Z ad pla-
 num reducto determinationem sumus adepti, ponamus
 eius coordinatas $OT = T$ et $TZ = U$, quae
 ita per binas variables t et s definiuntur, ut sit

$$T = p - s \sin \omega = \int \frac{dt \sin \omega}{\sin \zeta \sin \theta} - s \sin \omega$$

$$U = q - s \cos \omega = \int \frac{dt \cos \omega}{\sin \zeta \sin \theta} - s \cos \omega$$

ubi notandum angulum ω ita pendere ab angulis ζ
 et θ , ut sit $d\omega = \sqrt{(d\zeta \sin \theta + d\theta)^2}$. Sunt vero
 hae coordinatae T et U eadem, quas in prima so-
 lutione litteris r et z designauimus, unde eadem mu-

1. dat ratione libi nota si formulas pro solidis ibi inuentas

2. ad has redeunt

$$dx = h dT + \lambda dU, dy = m dT + \mu dU, dz = n dT + \nu dU$$

manentibus conditionib, quas ibi inuenimus scilicet:

$$\omega h + m + n = k, \lambda h + \mu + \nu = l, h + m + n = o, \lambda + \mu + \nu = o,$$

26. Hic autem pro iisdem coordinatis solidi, x, y et z , sequentes inuenimus valores:

$$x = s - s \sin. \theta \sin. \zeta; \quad y = u - s \sin. \theta \cos. \zeta \quad \text{et} \quad z = v - s \cos. \theta$$

qui ob $du = \frac{dt}{\tan. \zeta}$ et $dv = \frac{dt}{\sin. \zeta \tan. \theta}$,

differentiati. praebeant:

$$dx = ds - ds \sin. \theta \sin. \zeta - s d\zeta \sin. \theta \cos. \zeta - s d\theta \sin. \zeta \cos. \theta$$

$$dy = \frac{dt}{\tan. \zeta} - ds \sin. \theta \cos. \zeta + s d\zeta \sin. \zeta \sin. \theta - s d\theta \cos. \zeta \cos. \theta$$

$$dz = \frac{dt}{\sin. \zeta \tan. \theta} - ds \cos. \theta + s d\theta \sin. \theta.$$

27. Antequam ulterius progrediamur, haud abs re erit praecipuas harum formularum relationes annotasse, ac primo quidem pro ipsis formulis finitis eliminando s obtinemus has relationes:

$$x \cos. \zeta - y \sin. \zeta = s \cos. \zeta - u \sin. \zeta;$$

$$x \sin. \zeta + y \cos. \zeta = s \sin. \zeta + u \cos. \zeta - s \sin. \theta;$$

$$x \sin. \zeta \cos. \theta + y \cos. \zeta \cos. \theta - z \sin. \theta = s \sin. \zeta \cos. \theta + u \cos. \zeta \cos. \theta - v \sin. \theta.$$

Deinde vero pro differentialibus sequentes:

$$\text{I. } dx \cos. \zeta - dy \sin. \zeta = -s d\zeta \sin. \theta$$

$$\text{II. } dx \sin. \zeta + dy \cos. \zeta = \frac{dt}{\sin. \zeta} - ds \sin. \theta - s d\theta \cos. \theta \quad \text{et}$$

$$\text{III. } dx \sin. \zeta \cos. \theta + dy \cos. \zeta \cos. \theta - dz \sin. \theta = -s d\theta.$$

28. Quoniam autem hoc nouo calculo omnia ad binas variables t et s reduximus, dum in priori calculo vsu sumus binis variabilibus T et U , videamus quomodo hae per illas exprimantur, atque

Tom. XVI. Nou. Comm.

C

ex

13 DE SOLIDIS QVOR. SVPERFICII

ex formulis quidem pro **T** et **U** inuentis statim habemus:

$$dT = \frac{d\zeta \cdot \sin.\omega}{\sin.\zeta \cdot \sin.\theta} + d\zeta \sin.\omega - s d\omega \cdot \cos.\omega \text{ et}$$

$$dU = \frac{d\zeta \cdot \cos.\omega}{\sin.\zeta \cdot \sin.\theta} - d\zeta \cos.\omega + s d\omega \cdot \sin.\omega$$

quos valores si in formulis dx , dy et dz ante inuentis substituamus et litteras variables ζ et s probe distinguamus; sequentes pandicemur expressiones:

$$dx = d\zeta \frac{(l \sin.\omega + \lambda \cos.\omega)}{\sin.\zeta \cdot \sin.\theta} - s d\omega (l \cos.\omega - \lambda \sin.\omega) - ds (l \sin.\omega + \lambda \cos.\omega)$$

$$dy = d\zeta \frac{(m \sin.\omega + \mu \cos.\omega)}{\sin.\zeta \cdot \sin.\theta} - s d\omega (m \cos.\omega - \mu \sin.\omega) - ds (m \sin.\omega + \mu \cos.\omega)$$

$$dz = d\zeta \frac{(n \sin.\omega + v \cos.\omega)}{\sin.\zeta \cdot \sin.\theta} - s d\omega (n \cos.\omega - v \sin.\omega) - ds (n \sin.\omega + v \cos.\omega)$$

quas cum iis quae per posteriorem solutionem prodierunt comparemus, quae sunt

$$dx = d\zeta - s d\zeta \sin.\theta \cos.\zeta - s d\theta \sin.\zeta \cos.\theta - ds \sin.\zeta \sin.\theta$$

$$dy = \frac{d\zeta}{\tan\theta} + s d\zeta \sin.\zeta \sin.\theta - s d\theta \cos.\zeta \cos.\theta - ds \cos.\zeta \sin.\theta$$

$$dz = \frac{d\zeta}{\sin.\zeta \tan\theta} + s d\theta \sin.\theta - ds \cos.\theta$$

atque primo membra per ds affecta utrinque aequalia esse debent, unde obtinemus has aequationes:

$$I. l \sin.\omega + \lambda \cos.\omega = \sin.\zeta \cdot \sin.\theta$$

$$II. m \sin.\omega + \mu \cos.\omega = \cos.\zeta \cdot \sin.\theta$$

$$III. n \sin.\omega + v \cos.\omega = \cos.\theta$$

29. Quod si iam hi valores in prioribus membris, quae differentiale ds et ab eo pendentia, $d\zeta$, $d\theta$ et $d\omega$ inuolunt, substituuntur, adipiscemur sequentes aequationes:

$$I \cos. \omega - \lambda \sin. \omega = \frac{d(\sin. \zeta \cdot \sin. \theta)}{d\omega}$$

$$m \cos. \omega - \mu \sin. \omega = \frac{d(\sin. \zeta \cdot \sin. \theta)}{d\omega}$$

$$n \cos. \omega - \nu \sin. \omega = \frac{d(\sin. \zeta \cdot \sin. \theta)}{d\omega}$$

Hic imprimis notari meretur, ex his formulis inventis alteram variabilem s prorsus excessisse, ita ut iam quantitates λ , λ , m , μ , n , ν per unicam variabilem, s determinentur, alteramque s prorsus non inuoluant, dum contra ipsae quantitates T et λ ambas variables s et θ implicanti.

30. Nunc pro functionibus T et λ definiendis has duas inuenimus aequationes:

$$I \sin. \omega + \lambda \cos. \omega = \sin. \zeta \sin. \theta$$

$$T \cos. \omega - \lambda \sin. \omega = \frac{d(\sin. \zeta \cdot \sin. \theta)}{d\omega}$$

Hinc prior in $\sin. \omega$ posterior in $\cos. \omega$ dat:

$$I = \sin. \zeta \cdot \sin. \theta \cdot \sin. \omega + \cos. \omega \cdot \frac{d(\sin. \zeta \cdot \sin. \theta)}{d\omega}$$

at $I \cos. \omega - II \sin. \omega$ dat.

$$\lambda = \sin. \zeta \cdot \sin. \theta \cdot \cos. \omega - \sin. \omega \cdot \frac{d(\sin. \zeta \cdot \sin. \theta)}{d\omega}$$

Simili modo reliquae literae reperientur, ut sequitur

$$m = \cos. \zeta \cdot \sin. \theta \cdot \sin. \omega + \cos. \omega \cdot \frac{d(\cos. \zeta \cdot \sin. \theta)}{d\omega}$$

$$\mu = \cos. \zeta \cdot \sin. \theta \cdot \cos. \omega - \sin. \omega \cdot \frac{d(\cos. \zeta \cdot \sin. \theta)}{d\omega}$$

$$n = \cos. \theta \cdot \sin. \omega + \frac{\cos. \omega \cdot d(\cos. \theta)}{d\omega}$$

$$\nu = \cos. \theta \cdot \cos. \omega - \frac{\sin. \omega \cdot d(\cos. \theta)}{d\omega}$$

En ergo idoneos valores pro litteris l, λ, m, μ et n, ν , qui ita sunt comparati, vt tres illas formulas $l dT + \lambda dU$, $m dT + \mu dU$ et $n dT + \nu dU$ fiant integrabiles, atque adeo ipsa integralia facile exhiberi queant, quippe quae sunt

$$x = t - s \sin. \theta \sin. \zeta; y = u - s \sin. \theta \cos. \zeta; z = v - s \cos. \theta.$$

31. Quoniam ambae nostrae solutiones penitus inter se conuenire debent, nullum est dubium, quin etiam reliquae conditiones supra memoratae impleantur, scilicet certo erit:

$$ll + mm + nn = 1; \lambda\lambda + \mu\mu + \nu\nu = 1; l\lambda + m\mu + n\nu = 0.$$

Ad quod ostendendum ponamus breuitatis gratia $\sin. \zeta. \sin. \theta = p$; $\cos. \zeta. \sin. \theta = q$ et $\cos. \theta = r$, ita vt sit

$$pp + qq + rr = 1, \text{ ideoque } p dp + q dq + r dr = 0, \text{ iam vero quum habeamus}$$

$$l = p \sin. \omega + \frac{d p}{d \omega} \cos. \omega; m = q \sin. \omega + \frac{d q}{d \omega} \cos. \omega; n = r \sin. \omega + \frac{d r}{d \omega} \cos. \omega$$

$$\lambda = p \cos. \omega - \frac{d p}{d \omega} \sin. \omega; \mu = q \cos. \omega - \frac{d q}{d \omega} \sin. \omega; \nu = r \cos. \omega - \frac{d r}{d \omega} \sin. \omega$$

hinc instituto calculo reperiemus,

$$x \cdot ll + mm + nn = (pp + qq + rr) \sin. \omega^2 + \frac{2 \sin. \omega \cos. \omega}{d \omega} (p dp + q dq + r dr) + \frac{\cos. \omega^2}{d \omega^2} (dp^2 + dq^2 + dr^2) \text{ siue}$$

$$ll + mm + nn = \sin. \omega^2 + \frac{2 \sin. \omega \cos. \omega}{d \omega} (dp^2 + dq^2 + dr^2),$$

sicque tota quaestio in valore $dp^2 + dq^2 + dr^2$ investigando versatur. Quum autem sit

$$dp = d \zeta \cos. \zeta \sin. \theta + d \theta \sin. \zeta \cos. \theta$$

$$dq = -d \zeta \sin. \zeta \sin. \theta + d \theta \cos. \zeta \cos. \theta \text{ et } dr = -d \theta \sin. \theta;$$

colli-

colligemus

$$d p^2 + d q^2 + d r^2 = d \zeta^2 \sin. \theta^2 + d \theta^2 = d \omega^2,$$

ita vt iam certum sit esse

$$\frac{d p^2 + d q^2 + d r^2}{d \omega^2} = 1$$

quocirca manifestum est fore :

$$l l + m m + n n = \sin. \omega^2 + \cos. \omega^2 = 1.$$

32. Simili modo pro litteris Graecis reperiemus :

$$\lambda \lambda + \mu \mu + \nu \nu = (p p + q q + r r) \cos. \omega^2 - \frac{\sin. \omega \cos. \omega}{d \omega} (p d p + q d q + r d r) \\ - \frac{\sin. \omega^2}{d \omega^2} (d p^2 + d q^2 + d r^2),$$

quae manifesto praebet vt ante

$$\lambda \lambda + \mu \mu + \nu \nu = \cos. \omega^2 + \sin. \omega^2 = 1.$$

Superest igitur vt tertiam proprietatem examinemus pro qua nanciscimur :

$$l \lambda = p p \sin. \omega \cos. \omega - \frac{p d p}{d \omega} \sin. \omega^2 + \frac{p d p}{d \omega} \cos. \omega^2 - \frac{d p^2}{d \omega^2} \sin. \omega \cos. \omega \\ m \mu = q q \sin. \omega \cos. \omega - \frac{q d q}{d \omega} \sin. \omega^2 + \frac{q d q}{d \omega} \cos. \omega^2 - \frac{d q^2}{d \omega^2} \sin. \omega \cos. \omega \\ n \nu = r r \sin. \omega \cos. \omega - \frac{r d r}{d \omega} \sin. \omega^2 + \frac{r d r}{d \omega} \cos. \omega^2 - \frac{d r^2}{d \omega^2} \sin. \omega \cos. \omega$$

quibus in vnam summam collectis fiet

$$l \lambda + m \mu + n \nu = \sin. \omega \cos. \omega - \sin. \omega \cos. \omega = 0.$$

Atque hoc modo Problema illud Analyticum supra commemoratum (7) felicissime solutum dedimus, quae solutio ita succincte se habet.

Problema Analyticum.

33. Propositis duabus variabilibus T et U earum sex inuenire functiones l, m, n et λ, μ, ν , ita comparatas, vt sex sequentibus conditionibus satisfiat:

$$\text{I}^{\circ}. \left(\frac{d l}{d T}\right) = \left(\frac{d \lambda}{d T}\right); \text{II}^{\circ}. \left(\frac{d m}{d U}\right) = \left(\frac{d \mu}{d U}\right); \text{III}^{\circ}. \left(\frac{d n}{d U}\right) = \left(\frac{d \nu}{d U}\right)$$

$$\text{IV}^{\circ}. l l + m m + n n = 1; \text{V}^{\circ}. \lambda \lambda + \mu \mu + \nu \nu = 1;$$

$$\text{VI}^{\circ}. l \lambda + m \mu + n \nu = 0.$$

Solutio.

Introducitis in calculum duabus nouis variabilibus s et t , huius posterioris t capiantur duae functiones quaecunque ζ et θ , quae scilicet vt anguli spectentur, e quibus formetur nouus angulus ω , ita vt sit $d \omega = \sqrt{(d \zeta^2 \sin. \theta^2 + d \theta^2)}$, tum vero hinc binae variables T et U, ita determinentur, vt sit

$$T = \int \frac{d t \sin. \omega}{\sin. \zeta \sin. \theta} - s \sin. \omega$$

$$U = \int \frac{d t \cos. \omega}{\sin. \zeta \sin. \theta} - s \cos. \omega$$

quo facto sex functiones quaesitae ita se habebunt

$$l = \sin. \zeta \sin. \theta \sin. \omega + \frac{\cos. \omega}{d \omega} d(\sin. \zeta \sin. \theta); \lambda = \sin. \zeta \sin. \theta \cos. \omega - \frac{\sin. \omega}{d \omega} d(\sin. \zeta \sin. \theta)$$

$$m = \cos. \zeta \sin. \theta \sin. \omega + \frac{\cos. \omega}{d \omega} d(\cos. \zeta \sin. \theta); \mu = \cos. \zeta \sin. \theta \cos. \omega - \frac{\sin. \omega}{d \omega} d(\cos. \zeta \sin. \theta)$$

$$n = \cos. \theta \sin. \omega + \frac{\cos. \omega}{d \omega} d \cos. \theta; \nu = \cos. \theta \cos. \omega - \frac{\sin. \omega}{d \omega} d \cos. \theta.$$

His autem valoribus, sequentes tres formulae differentiales:

$$\text{I}^{\circ}. l d T + \lambda d U; \text{II}^{\circ}. m d T + \mu d U; \text{III}^{\circ}. n d T + \nu d U$$

quip-

quippe quibus tres priores conditiones continentur, non solum integrabiles redduntur, sed etiam ipsa integralia sequenti modo exprimentur:

$$I^{\circ}. \int (l dT + \lambda dU) = s - s \sin. \theta \sin. \zeta$$

$$II^{\circ}. \int (m dT + \mu dU) = s \frac{d\theta}{\tan. \zeta} - s \sin. \theta \cos. \zeta$$

$$III^{\circ}. \int (n dT + \nu dU) = s \frac{d\theta}{\sin. \zeta \tan. \theta} - s \cos. \theta,$$

quae solutio adeo pro completa haberi debet propterea quod duas functiones arbitrarias complectitur.

34. Haec evolutio sine dubio maximi est momenti atque imprimis meretur, ut omni studio in singula eius elementa inquiramus. Ac primo quidem quum introductis litteris p, q et r , ita ut fit

$$pp + qq + rr = 1 \text{ et } dp^2 + dq^2 + dr^2 = d\omega^2$$

inuenerimus

$$l \sin. \omega + \lambda \cos. \omega = p \text{ et } l \cos. \omega - \lambda \sin. \omega = \frac{d p}{d \omega},$$

si illam differentiemus habebimus

$$d l \sin. \omega + d \lambda \cos. \omega + l d \omega \cos. \omega - \lambda d \omega \sin. \omega = d p$$

ideoque

$$d l \sin. \omega + d \lambda \cos. \omega = 0, \text{ ita ut sit } \frac{d \lambda}{d l} = - \tan. \omega.$$

Simili vero modo etiam reperiemus

$$\frac{d \mu}{d m} = - \tan. \omega \text{ et } \frac{d \nu}{d n} = - \tan. \omega.$$

En ergo pulcherrimam proprietatem, quae inter sex nostras functiones l, m, n et λ, μ, ν intercedit, quam hoc modo praesentare licet, ut fit

$$d l : d \lambda = d m : d \mu = d n : d \nu = - \cos. \omega : \sin. \omega$$

35. Quod si haec probe perpendamus, vestigia quaedam deprehendimus quibus insistentes solutionem directam problematis huius difficillimi indagare poterimus. Scilicet constitutis his aequationibus:

$$dx = l dT + \lambda dU; dy = m dT + \mu dU; dz = n dT + \nu dU$$

primum observari convenit quantitates l, m, n et λ, μ, ν functiones esse debere univae novae variabilis, quae tamen ad binas principes variables T et U certam quandam teneat relationem. Sit igitur ω ista nova variabilis, cuius sex nostrae quantitates sint certae quaedam functiones. Atque iam vidimus si litterae p, q et r tales functiones ipsius ω denotent, ut sit

$$pp + qq + rr = 1 \text{ et } dp^2 + dq^2 + dr^2 = d\omega^2,$$

tum statuendo:

$$l = p \sin. \omega + \frac{d p}{d \omega} \cos. \omega; m = q \sin. \omega + \frac{d q}{d \omega} \cos. \omega;$$

$$n = r \sin. \omega + \frac{d r}{d \omega} \cos. \omega$$

$$\lambda = p \cos. \omega - \frac{d p}{d \omega} \sin. \omega; \mu = q \cos. \omega - \frac{d q}{d \omega} \sin. \omega;$$

$$d \nu = r \cos. \omega - \frac{d r}{d \omega} \sin. \omega$$

has tres conditiones iam adimpleri scilicet:

$$ll + mm + nn = 1; \lambda\lambda + \mu\mu + \nu\nu = 1; \text{ et } l\lambda + m\mu + n\nu = 0$$

praeterea vero hinc modo deduximus istam insignem proprietatem, ut sit

$$d\lambda = -d l \tan. \omega; d\mu = -d m \tan. \omega; \text{ et } d\nu = -d n \tan. \omega$$

quae nobis insignem praestabit usum ad reliquas conditiones adimplendas uti mox patebit.

36. Hæc scilicet tres conditiones id possulant, ut formulæ illæ differentiales pro dx , dy et dz exhibitæ integrabiles reddantur, quem in finem relationem illam, quæ inter binas variables T et U et inter ω intercedere debet, inuestigari oportet. Ad hoc præstandum conuertantur illæ æquationes differentiales per integrationem in sequentes formas:

$$x = lT + \lambda U - f(Tdl + U d\lambda);$$

$$y = mT + \mu U - f(Tdm + U d\mu);$$

$$z = nT + \nu U - f(Tdn + U d\nu);$$

nunc vero hæc tres novæ formulæ integrales inducunt sequentes formas:

$$x = lT + \lambda U - fdl(T - U \text{ tang. } \omega);$$

$$y = mT + \mu U - fdm(T - U \text{ tang. } \omega);$$

$$z = nT + \nu U - fdn(T - U \text{ tang. } \omega).$$

Quum igitur l , m et n sint functiones eiusdem variabilis ω , manifestum est ternas has formulas reuera integrabiles reddi, si modo expressio $T - U \text{ tang. } \omega$ fuerit functio quaecunque novæ variabilis ω ; quare si talis functio indicetur littera Ω habebimus $T - U \text{ tang. } \omega = \Omega$, qua æquatione quaesita illa relatio, quæ inter variables T , U et ω intercedere debet determinatur.

37. Quare si pro Ω accipiatur pro lubitu functio quaecunque ipsius ω , cuius etiam ut vidimus litteræ p , q et r sunt certæ functiones, per quas iam litteras l , m , n et λ , μ , ν definiuimus, binæ variables T et U , ita debent esse comparatæ, ut

fiat $T = \Omega + U \text{ tang. } \omega$, scilicet nunc tantum binas variables U et ω in calculo retineamus et loco T istum valorem introducamus, tum igitur ternae. nostrae formulae integrales ita repraesentari poterunt:

$$x = l \Omega + l U \text{ tang. } \omega + \lambda U - \int \Omega dl$$

$$y = m \Omega + m U \text{ tang. } \omega + \mu U - \int \Omega dm$$

$$z = n \Omega + n U \text{ tang. } \omega + \nu U - \int \Omega dn$$

quae expressiones facile transformantur in sequentes

$$x = U(l \text{ tang. } \omega + \lambda) + \int l d\Omega = \frac{U p}{\text{cof. } \omega} + \int p \sin. \omega. d\Omega + \int \frac{d p d\Omega}{d \omega} \text{cof. } \omega$$

$$y = U(m \text{ tang. } \omega + \mu) + \int m d\Omega = \frac{U q}{\text{cof. } \omega} + \int q \sin. \omega. d\Omega + \int \frac{d q d\Omega}{d \omega} \text{cof. } \omega$$

$$z = U(n \text{ tang. } \omega + \nu) + \int n d\Omega = \frac{U r}{\text{cof. } \omega} + \int r \sin. \omega. d\Omega + \int \frac{d r d\Omega}{d \omega} \text{cof. } \omega$$

TERTIA SOLVTIO

Problematis principalis, ex Theoria Lucis et vmbrae petita.

38. Quae vulgo in Opticis de luce et vmbra tradi solent, plerumque ad casum maxime specialem sunt restricta, quo tam corpori lucido quam opaco a quo vmbra proiicitur, figura sphaerica tribuitur, vnde vmbra oritur vel cylindrica vel conica siue conuergens siue diuergens, prout corpus opacum vel aequale, vel minus vel maius fuerit quam corpus lucidum. Quando autem vel corporis lucidi vel opaci vel

adeo

adeo vtriusque figura a sphaerica recedit; vix quicquam in libris, qui de hac re prodierunt reperimus in quo acquiescere queamus; quin etiam si hoc argumentum in genere pertractare velimus, vtrique corpori lucido et opaco figuras quascunque tribuentes, quaestio exoritur maxime ardua atque adeo in eam partem Analyticos infinitorum circa functiones binarum, pluriumue variabilium, quae non ita pridem demum excoli est coepta, referenda.

39. Quod autem imprimis circa hanc Theoriam ad praefens nostrum institutum pertinet, est, quod semper figurae umbrarum ita sint comparatae, ut earum superficiem in planum explicare liceat, ex quo vicissim intelligitur, si pro figura quacunque tam corporis lucidi, quam opaci formam umbrae determinare poterimus, tum simul quoque problema nostrum perfecte fore solutum.

40. Quod autem semper figura umbrae nostro problemati subiiciatur, hoc modo facile ostendi potest. Quoniam umbra ab extremis corporis lucidi radiis, qui simul corpus opacum stringunt terminatur, primo patet in superficie umbrae cuiusque infinitas dari lineas rectas, quandoquidem singuli radii secundum lineas rectas progrediuntur, praeterea vero etiam omnes hi radii vtrumque corpus tam lucidum quam opacum tangent, uare si planum quodcunque concipiatur, quod haec duo corpora simul contingat ac punctum contactu euidem corpore lucido notetur littera M, in opaco vero littera m,

D 2

perspi-

perspicuum est, lineam rectam Mm productam radium lucis exhibere, quo umbra terminatur, quod etiam intelligendum est de aliis radiis proximis, qui ex puncto M super eodem plano tangente educuntur, quippe qui itidem ut tangentes corporis opaci spectari possunt, ex quo ipsa palmaria proprietas nostri problematis exsurgit, quod quacuis binæ rectae proximae in superficie ducendae simul, in eodem plano reperiantur.

41. Verum haec Theoria lucis et umbrae nimis late patet, quam ut eam hic pro dignitate pertractare locus permittat; tantum igitur inde depromamus, quantum ad praesens institutum expediendum sufficit. Seposita autem tam corporis lucidi quam opaci figura, hic tantum formam quasi coni umbroso spectemus, quem in finem duas eius sectiones inter se parallelas ac dato intervallo distantes contemplemur, quibus quum figuras quascunque tribuere liceat, manifestum est, hanc considerationem omnes prorsus umbrarum figuras in se complecti.

Tab. I. 42. Sint igitur duae hae Sectiones normales
Fig. 6. in planum tabulae rectaeque Aa perpendiculariter insistentes, ac prior quidem sit curva BUU' cuius natura aequatione quacunque inter coordinatas $AT = T$ et $TU = U$ exprimatur; simili modo sit buu' altera curva a priori utcunque diuersa pro qua data sit aequatio inter coordinatas $at = t$, $tu = u$, intervallum autem harum sectionum ponatur $Aa = a$, hic quidem alteram Sectionem BUU' tamquam discum

discum planum lucidum spectare licebit, et dum altera buu' discum planum opacum refert, a radiis lucidis ille ipse conus umbrosus orietur, quem contemplamur.

43. Puncta autem U et u ita sint sumpta, vt recta Uu producta referat radium ymbrae terminantem, quae cum in plano vtrumque discum tangente, sita esse debeat, necesse est vt ambo elementa, Uu' et uu' cum recta Uu in eodem plano sint sita ex quo perspicuum est haec duo elementa inter se parallela esse debere, ex quo sequitur inter differentialia eandem rationem subsistere debere, ita vt sit $dT : dU :: dt : du$, quare si ponatur $dU = \Phi dT$ erit etiam $du = \Phi dt$.

44. Spectetur igitur haec quantitas Φ , vt variabilis quantitas principalis, per quam reliquae omnes determinentur sequenti modo. Pro priore curua BU , sit T functio quaecunque ipsius Φ , cuius quippe natura, indoles curuae BUu' definitur tum vero erit $dU = \Phi dT$ et $U = \int \Phi dT$, euidens autem est hoc modo curuam quamcunque per variabilem Φ exprimi posse. Simili autem modo pro altera curua buu' , abscissa t certe aequabitur functioni ipsius Φ , ac tum itidem habebitur $du = \Phi dt$ ac $u = \int \Phi dt$, vnde quum ambae curuae penitus arbitrio nostro relinquantur, pro litteris T et t functiones quascunque ipsius Φ assumere licet, quibus constitutis simul ambae applicatae U et u determinantur.

45. Sumatur nunc in recta Uu punctum quodcunque Z , quod quum situm sit in superficie quam inuestigamus, inde ad planum tabulae demittamus perpendicularum ZY in rectam Tt incidens et ex Y ad axem nostrum Aa agatur normalis YX , vt pro puncto indefinito Z ternas obtineamus coordinatas, quas vocemus:

$$AX = x, XY = y, \text{ et } YZ = z$$

atque nunc facile erit aequationem inter has ternas coordinatas, qua natura superficiei quaesitae exprimitur eruere.

46. Principia scilicet Geometriae statim nobis suppeditant has analogias:

$$T-t : a :: T-y : x; \text{ seu } Tx - tx = aT - ay$$

$$U-u : a :: U-z : x; \text{ siue } Ux - ux = aU - az,$$

unde per ambas variables Φ et x , ambas coordinatas y et z definire licebit, siquidem habebimus:

$$y = T - \frac{x(T-t)}{a} \text{ et } z = U - \frac{x(U-u)}{a};$$

quodsi enim ex his duabus aequationibus variabilis Φ cum quantitativis inde pendentibus T, t et U, u eliminentur, resultabit aequatio naturam nostrae superficiei exprimens.

47. Tali autem eliminatione neutiquam indigemus, quum natura superficiei multo clarius ex binis aequationibus inuentis perspicui possit, quae per se iam ita sunt simplices, vt solutionem commodiorem desiderare nefas foret, interim tamen formas harum

harum aequationum aliquantillum immutare haud inutile erit. Generaliori autem modo, valores pro y et z ita repraesentemus $y = P + Qx$ et $z = R + Sx$, ubi iam litterae P, Q, R, S significant functiones alterius varibialis ϕ , atque nunc quaestio in hoc versabitur, cuiusmodi hae functiones esse debeant, ut binae aequationes exhibitae superficiem in planum explicabilem definiant.

48. Comparemus ergo has formas assumtas cum iis quas ante inuenimus, ac primo quidem habebimus:

$$P = T \text{ et } R = U, Q = \frac{t-T}{a}, S = \frac{u-U}{a}$$

ubi quum T et t sint functiones arbitrariae ipsius ϕ , euidens est functiones P et Q etiam pro lubitu accipi posse, at quoniam U et u certo modo a T et t pendent, etiam functiones R et S certo modo a binis prioribus P et Q pendere debebunt. Quum autem sit

$$T = P, t = P + aQ, U = R \text{ et } u = R + aS$$

hos valores substituamus in formulis fundamentalibus

$$dU = \phi dT \text{ et } du = \phi dt$$

et obtinebimus

$$dR = \phi dP \text{ et } dR + a dS = \phi dP + a \phi dQ \\ \text{seu } dS = \phi dQ.$$

49. Nunc igitur quoque ipsam quantitatem ϕ ex calculo exturbare poterimus, quum sit vel

$$\phi =$$

$\Phi = \frac{dR}{dP}$ vel $\Phi = \frac{dS}{dQ}$ ita ut eius loco altera litterarum R vel S arbitrio nostro permittatur, quare si P, Q et R fuerint functiones quaecunque eiusdem cuiusdam variabilis, tum S talis functio eiusdem variabilis esse debet, ut sit $dS = \frac{dQ dR}{dP}$ siue $\frac{dS}{dR} = \frac{dQ}{dP}$; quin etiam adhuc commodius haec solutio ita adornari poterit, ut dicamus pro litteris P, Q, R S eiusmodi functiones cuiuspiam variabilis assumi debere, ut fiat $\frac{dS}{dR} = \frac{dQ}{dP}$ vel etiam $\frac{dS}{dQ} = \frac{dR}{dP}$, quod si fuerit praestitum haec duae aequationes

$$y = P + Qx \text{ et } z = R + Sx$$

naturam solidi quaesiti expriment.

50. Perinde est quaecunque littera illa variabilis cuius functiones sunt P, Q, R et S indetur, quin etiam pro ea una harum quatuor P, Q, R, S assumi poterit, cuius deinde tres reliquae functiones sunt intelligendae. Hinc quamdiu una earum valorem constantem retinet, reliquae etiam manebunt constantes, ac tum ex variabilitate ipsius x oriuntur omnes lineae rectae, quas in superficie ducere licet.

51. Conditioni autem praescriptae $\frac{dS}{dQ} = \frac{dR}{dP}$, manifesto satisfiet sumendo quantitates P et R constantes; unde solutio particularis problematis nostri sequitur. Ponamus enim esse $P = A$ et $R = B$, ita ut nunc S spectanda sit, ut functio quaecunque ipsius Q. At semper coordinatas ita variare licet ut fiat $A = 0$ et $B = 0$, quo facto ob $Q = z$ erit $\frac{dS}{dz} = S$ functio homogenea nullius dimensionis
 ipsa

Ipsarum x et y , siue z aequabitur functioni homogeneae vnius dimensionis ipsarum x et y , quod est criterium superficiesum conicardum.

§ 2. Conditioni etiam satisfiat sumendo $Q = 0$ et $S = 0$, ita vt R maneat functio quaecunque ipsius P , quo casu pro z prodibit functio quaecunque ipsius y , quae quum duas tantum variables involuat y et z erit pro solido cylindrico. Idem vsu venit, si statuamus vel $P = 0$ et $Q = 0$ vel $R = 0$ et $S = 0$, priore enim casu habetur $y = 0$ posteriore vero $z = 0$, utroque casu aequatio est pro plano.

§ 3. Verum vt etiam alias species huiusmodi solidorum cognoscamus pro simplicioribus accipiamus :

$$P = a \phi^{\alpha}, \quad Q = b \phi^{\beta}, \quad R = c \phi^{\gamma}, \quad S = d \phi^{\delta}$$

atque vt conditioni praescriptae satisfiat necesse est sit $\frac{b\beta}{a\alpha} \phi^{\beta-\alpha} = \frac{d\delta}{c\gamma} \phi^{\delta-\gamma}$, vnde duplex determinatio oritur, prima scilicet exponentium $\beta - \alpha = \delta - \gamma$ altera vero coefficientium: $\frac{b\beta}{a\alpha} = \frac{d\delta}{c\gamma}$, cui utrique satisfiat sumendo vt sequitur

$$a = \frac{fg}{x+\lambda}; \quad b = \frac{f\delta}{x+\mu}; \quad c = \frac{gk}{\lambda+\nu}; \quad d = \frac{bk}{\mu+\nu},$$

$$\alpha = x + \lambda; \quad \beta = x + \mu; \quad \gamma = \lambda + \nu; \quad \delta = \mu + \nu,$$

tum vero aequationes erunt :

$$y = a \phi^{\alpha} + b \phi^{\beta} x; \quad z = c \phi^{\gamma} + d \phi^{\delta} x.$$

34 DE SOL. QVOR. SVPERF. IN PLAN. etc.

54. In numeris ergo determinatis considerare-
mus hunc casum :

$$y = 2\Phi + 3\Phi^2x \text{ et } z = \Phi^3 + 2\Phi^2x$$

unde facta eliminatione litterae Φ sequens elicitur
aequatio :

$$4y^3x + 72y^2xxz - yy - 18yxxz + 27xxzz + 2z = 0$$

quae ergo est pro solido, cuius superficiem in pla-
num explicare licet.

METHODVS NOVA ET FACILIS CALCVLVM VARIATIONVM TRACTANDI.

Auctore

L. EVLERO.

I.

Si detur aequatio quaecunque inter binas variables x et y seu quod eodem redit, si y fuerit functio quaecunque ipsius x , tum omnes expressiones quomodocunque ex his duabus quantitatibus x et y formatae et compositae tamquam functiones vnius variabilis x , spectari poterunt, ita vt pro quouis valore determinato ipsius x , determinatos quoque valores fortiantur.

2. Huiusmodi autem expressionum ex quantitatibus x et y formarum, tria genera constitui conuenit; ad quorum primum referimus omnes illas expressiones in quibus tantum ipsae quantitates x et y occurrunt et per operationes quascunque siue algebraicas siue etiam transcendentes inter se sunt complicatae, cuiusmodi sunt $\alpha x^2 + \beta xy + \gamma y^2$, item e^{xz} Arc. sin. y , in qua posteriore operationes transcendentes cernuntur. Secundum autem genus eas complectitur expressiones in quibus praeter ipsas

E 2

quan-

quantitates x et y etiam ratio differentialium occurrunt, quam rationem adeo ad differentialia cuiusque gradus extendimus, cuiusmodi expressionum indolem quo clarius perspiciamus, ponatur more solito

$$dy = p dx; dp = q dx; dq = r dx \text{ etc.}$$

ac tales expressiones erunt functiones quantitatum x, y, p, q, r etc. Tertium denique genus eiusmodi expressiones continet in quibus praeterea formulae integrales inuoluuntur, quorum pertinent expressiones illae in calculo variationum imprimis consideratae, quae hac forma sunt repraesentatae $\int V dx$, ubi V est functio quaecunque non solum ipsarum x et y ; sed etiam quantitatum p, q, r etc., quin etiam ea alias insuper formulas integrales inuolucere potest.

3. His circa terna huiusmodi expressionum genera constitutis, facilius indolem calculi variationum explicare poterimus. Totum enim negotium huc redit, ut si proposita fuerit relatio quaecunque inter x et y eaque aliquantillum varietur, seu eius loco alia quaecpiam relatio inter x et y ab illa infimite parum quomodocunque discrepans adhibeatur, inuestigari oporteat, quantam mutationem omnes illae expressiones, tam primi, quam secundi et tertii generis sint subiturae ad quod inueniendum in calculo variationum prouti equidem cum olim tractavi, praeter differentiale dy , quo quantitas y augetur dum x in $x + dx$ abit, ipsi quantitati y aliud incrementum δy tribuitur penitus ab arbitrio nostro pendens neque per x determinatum, cui incremento varia-

variationis nomen indideram atque methodum exposueram variationes inde in singula expressionum genera redundantes inveniendi.

4. Videbatur igitur calculus variationum omnino singulare calculi genus constitucere, verum postquam eius indolem accuratius essem perscrutatus, vniuersum hunc calculum perspexi leui facta immutatione ad secundam partem calculi integralis cuius elementa in tertio volumine operis mei de hoc argumento exposui, reduci posse. Pertractaui autem in ista secunda parte eas integrationes, quae circa functiones duarum variabilium versantur in quo calculi genere etiam nunc vix ultra prima elementa progredi licuit.

5. Illius scilicet incrementi loco, quod variationem appellauimus, ipsam quantitatem y non amplius tamquam functionem solius variabilis x considero, sed eam tamquam functionem binarum variabilium x et t in calculum introduco, sic enim dum $dx(\frac{dy}{dx})$ significat verum differentiale ipsius y haec formula $dt(\frac{dy}{dt})$ idem significare poterit, quod antea signo δy indicauimus. Quo haec reddantur clariora concipiamus y vt applicatam cuiuspiam curuae abscissae x respondentem atque in calculo variationum, alia relatio requiritur, quae omnes alias curuas huic saltem proximas complectatur, omnes autem huiusmodi curuas, si X denotet illam functionem cui y aequatur tali aequatione contineri posse: $y = X + tV$ manifestum est; denotante V functionem quacunque

38 METHODVM NOVA CALCVLVM

que ipsius x . Sumta enim t infinite parua haec aequatio omnes omnino lineas curuas propositae proximas in se comprehendet atque adeo hanc formam multo generaliore reddere licet, ita vt pro y functio quaecunque binarum variabilium x et t vsurpari possit, dummodo ea ita fuerit comparata, vt posito $t = 0$, prodeat ipsa functio proposita $y = X$.

7. Pro variatione igitur inuenienda, quantitas x vt constans spectari ipsius vero y differentiale tantum ex variabilitate ipsius t desumi debet; vnde si expressio proposita fuerit primi generis functio scilicet ipsarum x et y tantum, quam littera Z designemus; ponamus differentiatione consueta prodire $M dx + N dy$ atque nunc pro variatione inuenienda fiat $dx = 0$, at loco dy scribatur $dt(\frac{dy}{dt})$, quippe quod est incrementum ex sola variabilitate t oriundum. Quo facto variatio quaesita huius expressionis Z erit $= N dt(\frac{dy}{dt})$. Quare si ipsa variatio simili modo per $dt(\frac{dz}{dt})$ indicetur, habebimus $(\frac{dz}{dt}) = N(\frac{dy}{dt})$.

7. Nunc ad expressiones secundi generis progrediamur, in quibus quum praeter x et y occurrant quantitates p, q, r etc. harum variationes quatenus y etiam a variabili t pender, per legem generalem his formulis exprimentur

$$dt(\frac{dp}{dt}); dt(\frac{dq}{dt}); dt(\frac{dr}{dt}) \text{ etc.}$$

Quum autem pro sola variabili x , sit

$$p = (\frac{dy}{dx}); q = (\frac{dp}{dx}) = (\frac{d^2y}{dx^2}); \text{ et } r = (\frac{dq}{dx}) = (\frac{d^3y}{dx^3}) = (\frac{d^3y}{dx^3}) \text{ etc.}$$

crit

erit per regulas generales differentiandi functiones duarum variabilium

$$\left(\frac{d^2 p}{dt^2}\right) = \left(\frac{d}{dx} \frac{d^2 y}{dt^2}\right); \left(\frac{d^2 q}{dt^2}\right) = \left(\frac{d^2 y}{dx^2 dt}\right); \left(\frac{dr}{dt}\right) = \left(\frac{d^2 y}{dx^2 dt}\right) \text{ etc.}$$

vbi meminisse iuuabit formulam verbi gratia $\left(\frac{d^2 y}{dx^2 dt}\right)$ prodire, si functio y ter differentiatur et duabus vicibus sola x , vna vice autem sola t variabilis sumatur tum vero qualibet differentiatione differentialia simplicia dx vel dt abiiciantur.

8. His expeditis sit iam Z functio quaecunque ipsarum x, y, p, q, r etc., hic quidem nullo adhuc respectu habito ad variabilem t , quippe quae tantum in subsidium variationis introducit, atque differentiatione more solito facta prodeat

$$dZ = Mdx + Ndy + Pdp + Qdq + Rdr \text{ etc.}$$

nunc igitur pro variatione seu $\dot{d}t \left(\frac{dZ}{dt}\right)$ inuenienda scribi debet vt sequitur:

$$dx = 0; dy = dt \left(\frac{dy}{dt}\right), dp = dt \left(\frac{dp}{dt}\right) = dt \left(\frac{d}{dx} \frac{dy}{dt}\right),$$

$$dq = dt \left(\frac{d^2 y}{dx^2 dt}\right), dr = dt \left(\frac{d^2 y}{dx^2 dt}\right) \text{ etc.}$$

atque variatio quaesita erit

$$dt \left(\frac{dZ}{dt}\right) = Ndt \left(\frac{dy}{dt}\right) + Pdt \left(\frac{d}{dx} \frac{dy}{dt}\right) + Qdt \left(\frac{d^2 y}{dx^2 dt}\right) + Rdt \left(\frac{d^2 y}{dx^2 dt}\right) \text{ etc.}$$

vnde sequitur diuisione per dt facta fore:

$$\left(\frac{dZ}{dt}\right) = N \left(\frac{dy}{dt}\right) + P \left(\frac{d}{dx} \frac{dy}{dt}\right) + Q \left(\frac{d^2 y}{dx^2 dt}\right) + R \left(\frac{d^2 y}{dx^2 dt}\right) \text{ etc.}$$

9. Sit nunc etiam expressio quaecunque tertii generis proposita $\int Z dx$, vbi Z sit functio quaecunque

cunque ipsarum x, y, p, q, r etc. ita vt per differentiationem ordinariam habeatur :

$$dZ = Mdx + Ndy + Pdp + Qdq + Rdr,$$

vbi quidem haecenus nulla ratio nouae variabilis t est habita atque integratio formulae propositae $\int Z dx$ per solam variabilem x est expedienda, quo observato, quaestio huc redit, vt si iam y vt functio binarum variabilium x et t consideretur, et vbique quantitas y elemento $dt(\frac{dy}{dt})$ augeatur, augmentum quod ipsa formula integralis $\int Z dx$ inde capiet definiatur, hoc enim augmentum ipsa erit variatio formulae integralis propositae.

10 Quare ad hanc variationem inueniendam in functione illa Z vbique loco y scribatur eius valor auctus $y + dt(\frac{dy}{dt})$, sicque vt ante vidimus, ipsa functio Z augmentum capiet $dt(\frac{dZ}{dt})$ ex quo ipsa formula integralis augmentum capiet hoc: $\int dt(\frac{dZ}{dt})dx$, quod erit ipsa variatio quaesita. Quoniam vero in hac integratione sola x pro variabili habetur, elementum dt ante signum poni poterit ita vt iam variatio futura sit $= dt \int dx (\frac{dZ}{dt})$.

11. Quoniam igitur in § 8 valor ipsius $(\frac{dZ}{dt})$ iam euolutus habetur si ille hic substituatur formulae $\int Z dx$ variatio prodibit ita expressa :

$$dt \int dx (N(\frac{dy}{dt}) + P(\frac{d^2y}{dx dt}) + Q(\frac{d^2y}{dx^2 dt}) + R(\frac{d^3y}{dx^3 dt}) \text{ etc.})$$

quam

quam etiam fequenti modo per partes repraeſentaffe iuuabit

$$dt/N dx \left(\frac{dy}{dt} \right) + dt/P dx \left(\frac{d}{dx} \frac{dy}{dt} \right) + dt/Q dx \left(\frac{d^2 y}{dx^2 dt} \right) + dt/R dx \left(\frac{d^3 y}{dx^3 dt} \right) \text{ etc.}$$

qua expreſſione contenti eſſe poſſemus, ſi quaefſtio circa caſum aliquem determinatum inſtitueretur, vbi y non ſolum functioni cuiſpiam datae ipſius x aequaretur, ſed etiam noua variabilis t modo determinato introduceretur; tum enim omnes iſtas formulas $\left(\frac{dy}{dt} \right)$; $\left(\frac{d}{dx} \frac{dy}{dt} \right)$; $\left(\frac{d^2 y}{dx^2 dt} \right)$ etc. actu euoluere liceret, ita vt tum elementum dx per ſolam functionem ipſius x afficeretur, ſiquidem vti initio innuimus euolutione facta, iterum poni debet $t = 0$.

12. At vero tales quaefſtiones determinatae nunquam occurrere ſolent; ſed potius relatio inter y et x ſemper incognita eſſe ſolet, inde demum determinanda, quod variatio in nihilum abire debeat, quippe in quo Methodus maximorum et minimorum verſatur. Huiusmodi quaefſtiones ergo ita enunciari conuenit, qualis relatio inter quantitates x et y intercedere debeat, vt formulae integralis propoſitae $\int Z dx$ variatio in nihilum abeat, quomodocunque etiam noua variabilis t in calculum introducatur? Quodſi autem quaefſtio hac ratione inſtituatur, perſpicuum eſt formulis $\left(\frac{dy}{dt} \right)$; $\left(\frac{d}{dx} \frac{dy}{dt} \right)$; $\left(\frac{d^2 y}{dx^2 dt} \right)$ etc. nullos certos valores tribui poſſe.

13. Verum hic prorsus ſingulare artificium in ſubſidium vocari poteſt, cuius ope formulas integrales poſteriores in § 11 ad formam prioris re-

42 METHODVS NOVA CALCVLVM

ducere licet, ita vt in omnibus eadem formula ($\frac{d^2 y}{dx^2}$) occurrat. Quum enim $dx(\frac{d^2 y}{dx^2})$ sit differentiale formulae ($\frac{d^2 y}{dx^2}$) sumta sola x variabili, erit per consuetam integralium reductionem:

$$\int P dx (\frac{d^2 y}{dx^2}) = P (\frac{d^2 y}{dx^2}) - \int dx (\frac{dP}{dx}) (\frac{d^2 y}{dx^2}),$$

simili modo quia $dx(\frac{d^3 y}{dx^3})$ est differentiale formulae ($\frac{d^3 y}{dx^3}$) habebimus statim hanc reductionem

$$\int Q dx (\frac{d^3 y}{dx^3}) = Q (\frac{d^3 y}{dx^3}) - \int dx (\frac{dQ}{dx}) (\frac{d^3 y}{dx^3}),$$

nunc vero per praecedentem reductionem fit

$$\int dx (\frac{dQ}{dx}) (\frac{d^2 y}{dx^2}) = (\frac{dQ}{dx}) (\frac{d^2 y}{dx^2}) - \int dx (\frac{d^2 Q}{dx^2}) (\frac{d^2 y}{dx^2})$$

sicque omnino habebimus

$$\int Q dx (\frac{d^3 y}{dx^3}) = Q (\frac{d^3 y}{dx^3}) - (\frac{dQ}{dx}) (\frac{d^2 y}{dx^2}) + \int dx (\frac{d^2 Q}{dx^2}) (\frac{d^2 y}{dx^2})$$

atque nunc satis perspicuum est, sequentem formulam integralem ita reductum iri:

$$\int R dx (\frac{d^4 y}{dx^4}) = R (\frac{d^4 y}{dx^4}) - (\frac{dR}{dx}) (\frac{d^3 y}{dx^3}) + (\frac{d^2 R}{dx^2}) (\frac{d^2 y}{dx^2}) - \int dx (\frac{d^3 R}{dx^3}) (\frac{d^2 y}{dx^2})$$

ac si insuper talis formula adesset, foret:

$$\int S dx (\frac{d^5 y}{dx^5}) = S (\frac{d^5 y}{dx^5}) - (\frac{dS}{dx}) (\frac{d^4 y}{dx^4}) + (\frac{d^2 S}{dx^2}) (\frac{d^3 y}{dx^3}) - (\frac{d^3 S}{dx^3}) (\frac{d^2 y}{dx^2}) + \int dx (\frac{d^4 S}{dx^4}) (\frac{d^2 y}{dx^2}).$$

14. Quodsi nunc has formulas reductas substituamus in expressionem variationis quaesitae, formulae $\int Z dx$, tum haec variatio non solum formulis constabit integralibus, sed etiam continebit partes absolu-

solutas, quarum aliae formulam $(\frac{dZ}{dt})$, aliae hanc $(\frac{d^2y}{dx^2 dt})$; aliae vero hanc $(\frac{d^2y}{dx^2 dt})$ etc. continebunt; dum contra omnes integrales eandem formulam $(\frac{dZ}{dt})$ inuoluunt, quocirca variatio quaesita formula propositae $\int Z dx$, sequenti modo habebitur expressa;

$$\begin{aligned}
 & dt \int dx (\frac{dZ}{dt}) (N - (\frac{dP}{dx}) + (\frac{d^2Q}{dx^2}) - (\frac{d^3R}{dx^3}) + (\frac{d^4S}{dx^4}) \text{ etc.}) \\
 & + dP (\frac{dZ}{dt}) (P - (\frac{dQ}{dx}) + (\frac{d^2R}{dx^2}) - (\frac{d^3S}{dx^3}) \text{ etc.}) \\
 & + dQ (\frac{d^2Z}{dx^2 dt}) (Q - (\frac{dR}{dx}) + (\frac{d^2S}{dx^2}) - \text{etc.}) \\
 & + dR (\frac{d^3Z}{dx^3 dt}) (R - (\frac{dS}{dx}) \text{ etc.}) \\
 & + dS (\frac{d^4Z}{dx^4 dt}) (S - \text{etc.}) \\
 & + \text{etc.}
 \end{aligned}$$

15. Quamquam hic meum institutum non est methodum maximorum et minimorum pertractare, quoniam hoc alibi iam satis copiose est factum; tamen hic praetermittere non possum, quin observem, si variatio formulae $\int Z dx$ euanescere debeat, quomodocunque etiam noua variabilis t in calculum ingrediatur; id nullo modo fieri posse, nisi tota pars prima integralis seorsim euanescat, ex quo necesse est, inter x et y hanc aequationem constitui

$$0 = N - (\frac{dP}{dx}) + (\frac{d^2Q}{dx^2}) - (\frac{d^3R}{dx^3}) + (\frac{d^4S}{dx^4}) \text{ etc.}$$

et quia nunc variabilis t nulla amplius ratio habetur, sicque tantum vnica adhuc variabilis x superest, clausulis omissis hanc habebimus aequationem:

$$0 = N - \frac{dP}{dx} + \frac{d^2Q}{dx^2} - \frac{d^3R}{dx^3} + \frac{d^4S}{dx^4} \text{ etc.}$$

F 2

qua

qua desiderata relatio inter x et y exprimitur. Partes autem absolutae, tantum ad terminos extremos referuntur, circa quas ea obseruari debent, quae iam alibi fusius sunt praecepta.

16. Hic etiam non immoror iis casibus quibus quantitas Z ipsa insuper formulas integrales involuit, quoniam etiam hoc argumentum alibi satis est pertractatum, verum hic opus multo magis arduum molior, dum eandem hanc methodum ad functiones adeo duarum variabilium extendere conabor, quod equidem in dissertatione illa, quam olim de calculo variationum conscripseram, tunc temporis praestare non potui, multitudine tot quantitatum diversi generis deterritus.

Applicatio Methodi praecedentis ad functiones duarum variabilium.

17. Si habeatur aequatio quaecunque inter ternas variables x , y et z ea naturam cuiuspiam superficies exprimi censemus, ubi quidem binas coordinatas x et y in plano horizontali constitui intelligamus, tertiam vero z verticalem, sicque hanc tertiam z , ut functio spectari potest binarum x et y ; unde more solito duplicia incrementa consideranda occurrunt, quatenus scilicet a variabilitate ipsius x , vel ipsius y nascuntur. Illud nempe incrementum ipsius z quod ex variatione ipsius x oritur hac formula:

$$dx \left(\frac{dz}{dx} \right)$$

hoc

hoc vero ex variatione ipsius y oriundum ista:

$$dy \left(\frac{dz}{dy} \right)$$

indicari solet.

18. Quodsi iam haec superficies aequatione inter x , y et z expressa, cum aliis quibuscunque 'superficiebus' ipsi proximis comparari debeat, id commodissime fiet nouam variabilem t introducendo, ita ut iam z spectanda sit ut functio trium variabilium, x , y et t , quae quidem sumto $t = 0$, in functionem superiorem abeant, at dum ipsi t valores infinite parui tribuuntur, omnes superficies proximae complectatur, quo posito perspicuum est, quoniam variables x et y a noua t , neutiquam pendent earum differentialia dx et dy nullo modo cum dt permisceri, sola vero coördinata z triplicis generis incrementa capere potest, praeter bina enim iam ante commemorata, quae vel ab x vel ab y profiscuntur, accipere poterit incrementum a variabilitate ipsius t oriundum, quod tali formula $dt \left(\frac{dz}{dt} \right)$ est repraesentandum.

19. Ponamus nunc V esse expressionem utcumque ex ipsis coordinatis x , y et z compositam, siue per meras operationes algebraicas, siue etiam transcendentes formatas, quae more solito differentiatu praebeat:

$$dV = L dx + M dy + N dz,$$

atque si eiusdem incrementum desideretur a noua variabili t sola oriundum manifestum est, statui de-

46 METHODVS NOVA CALCVLVM

bere $dx = 0$ et $dy = 0$, at loco dz scribi debere $dt (\frac{dz}{dt})$, sicque hoc signandi modo usurpato habebimus

$$dt (\frac{dz}{dt}) = N dt (\frac{dz}{dt}) \text{ ideoque } (\frac{dz}{dt}) = N (\frac{dz}{dt}).$$

Tales autem expressiones vt ante primum genus constituunt.

20. Progrediamur ergo ad secundum genus, quo expressio v praeter ipsas coordinatas x, y, z etiam rationes differentialium earum inuoluat; atque hic quidem ante omnia, formam huiusmodi expressionum accuratius perpendi oportet. Quoniam autem hic statim quantitas z duplicia incrementa capere potest (hic enim nondum ad nouam variabilem t respicimus) ponamus breuitatis gratia

$$(\frac{dz}{dx}) = p \text{ et } (\frac{dz}{dy}) = p',$$

quae duae litterae differentialia primi gradus comprehendunt, deinde pro differentialibus secundi gradus ponamus:

$$(\frac{d^2z}{dx^2}) = q; (\frac{d^2z}{dx dy}) = q'; (\frac{d^2z}{dy^2}) = q''$$

vnde sequentes relationes inter has litteras et praecedentes notasse iuuabit:

$$(\frac{d^3p}{dx^2}) = q; (\frac{d^3p}{dx dy}) = (\frac{d^3p'}{dx^2}) = q'; (\frac{d^3p'}{dy^2}) = q''$$

simili modo differentialia tertii gradus his formulis complectamur:

$$(\frac{d^4z}{dx^3}) = r; (\frac{d^4z}{dx^2 dy}) = r'; (\frac{d^4z}{dx dy^2}) = r''; (\frac{d^4z}{dy^3}) = r'''$$

vbi

ubi hae relationes sunt notandae :

$$r = \left(\frac{d}{dx}\right); \quad r' = \left(\frac{d}{dy}\right) = \left(\frac{d}{dx}\right); \quad r'' = \left(\frac{d}{dy}\right) = \left(\frac{d}{dx}\right); \quad r''' = \left(\frac{d}{dy}\right)$$

quarta autem differentialia has formulas praebent:

$$s = \left(\frac{d^2}{dx^2}\right); \quad s' = \left(\frac{d^2}{dx^2 dy}\right); \quad s'' = \left(\frac{d^2}{dx^2 dy^2}\right); \quad s''' = \left(\frac{d^2}{dx^2 dy^3}\right);$$

$$s'''' = \left(\frac{d^2}{dx^2 dy^4}\right)$$

et sic ultra quousque libuerit.

21. His explicatis expressiones secundi generis, praeter ipsas coordinatas x, y et z etiam quantitates $p, p', q, q', q'', r, r', r'', r'''$ etc. utcumque inuoluere possunt, ex quo si V denotet quaecunque huiusmodi expressionem eius differentiale more solito sumtum sequenti forma exhibeamus:

$$\begin{aligned} dV = & Ldx + Mdy + Ndz + Pdp + Qdq + Rdr \\ & + P'dp' + Q'dq' + R'dr' \\ & + Q''dq'' + R''dr'' \text{ etc.} \\ & + R''''dr'''' \end{aligned}$$

quam formam animo imprimi conueniet, ne opus sit eam saepius repetere.

22. Quodsi iam huiusmodi expressionum variatio, seu id incrementum inueniri debeat, quod resultat ex variatione nouae variabilis t , quam in valorem coordinatae z introducimus, iam vidimus sumi debere $dx = 0$ et $dy = 0$, tum vero fieri $dz = dt \left(\frac{dz}{dt}\right)$, ob eandem vero rationem sequentia differentialia simili modo erunt exprimenda, quae cum

48 METHODVS NOVA CALCVLVM

cum suis transformationibus per se satis claris ita se habebunt :

$$\begin{aligned} dp &= dt \left(\frac{d^2 v}{dt^2} \right) = dt \left(\frac{d^2 z}{dx^2 dt} \right); \quad dp' = dt \left(\frac{d^2 v'}{dt^2} \right) = dt \left(\frac{d^2 z}{dy^2 dt} \right) \\ dq &= dt \left(\frac{d^2 q}{dt^2} \right) = dt \left(\frac{d^2 z}{dx^2 dt} \right); \quad dq' = dt \left(\frac{d^2 q'}{dt^2} \right) = dt \left(\frac{d^2 z}{dx^2 dy dt} \right); \\ dq'' &= dt \left(\frac{d^2 q''}{dt^2} \right) = dt \left(\frac{d^2 z}{dy^2 dt} \right) \\ dr &= dt \left(\frac{d^2 r}{dt^2} \right) = dt \left(\frac{d^2 z}{dx^2 dt} \right); \quad dr' = dt \left(\frac{d^2 r'}{dt^2} \right) = dt \left(\frac{d^2 z}{dx^2 dy dt} \right) \\ dr'' &= dt \left(\frac{d^2 r''}{dt^2} \right) = dt \left(\frac{d^2 z}{dx^2 dy^2 dt} \right); \quad dr''' = dt \left(\frac{d^2 r'''}{dt^2} \right) \\ &= dt \left(\frac{d^2 z}{dy^2 dt} \right) \text{ etc.} \end{aligned}$$

23. Totum ergo negotium huc redit, ut in formula illa differentiali pro dV data loco singulorum differentialium isti valores substituantur, hoc que modo prodibit variatio expressionis V ex sola variabilitate ipsius t oriunda, seu valor huius formulae $dt \left(\frac{d^2 v}{dt^2} \right)$, quoniam autem singula membra elemento dt erunt affecta, eo omisso adipiscimur sequentem formam :

$$\begin{aligned} \left(\frac{d^2 v}{dt^2} \right) &= N \left(\frac{d^2 z}{dt^2} \right) + P \left(\frac{d^2 z}{dx^2 dt} \right) + Q \left(\frac{d^2 z}{dx^2 dy dt} \right) + R \left(\frac{d^2 z}{dy^2 dt} \right) \\ &\quad + P' \left(\frac{d^2 z}{dy^2 dt} \right) + Q' \left(\frac{d^2 z}{dx^2 dy dt} \right) + R' \left(\frac{d^2 z}{dx^2 dy^2 dt} \right) \\ &\quad + Q'' \left(\frac{d^2 z}{dy^2 dt} \right) + R'' \left(\frac{d^2 z}{dx^2 dy^2 dt} \right) \\ &\quad + R''' \left(\frac{d^2 z}{dy^2 dt} \right) \end{aligned}$$

quae ad variationes quarumcunque expressionum secundi generis inueniendas sufficit.

24. Nunc expressiones tertii generis adgredi poterimus formulas integrales inuoluentes in quibus potissi-

potissimum vis huius methodi cernitur. Quando enim quaestio circa maxima vel minima quae in superficiebus occurrere possunt, versatur; formula illa, quae maximum vel minimum reddi debet necessario est formula integralis atque adeo formula integralis duplicata, cuius indolem hic paucis explicari convenit. Quemadmodum enim in praecedente parte, formulae integrales simplices sunt consideratae, quae ad datam abscissam x sunt relatae, ita hic in superficiebus, quaestiones semper non ad solam abscissam x , sed ad totum quoddam spatium in plano horizontali tanquam basem sunt referendae cui portio superficiei quae maximi minimue quadam proprietate gaudere debet, immineat. Quare quum talis basis duplicem habeat dimensionem alteram ab x , alteram vero ab y pendentem, huiusmodi formulae integrales erunt duplicatae, hoc modo exprimi solitae $\iint V dx dy$, eae scilicet duplicem integrationem postulant, atque in priore sola coordinata x vel sola y pro variabili habetur, et integratio usque ad terminos basis propositae extenditur, tum vero demum etiam altera variabilis assumitur atque altera integratio absoluitur. Et quoniam perinde est utra prius pro variabili habetur, sine discrimine geminam illam integrationem signo duplicato \iint indicamus; neque vero hic loci est, omnia quae circa huiusmodi integrationes duplicatas sunt observanda, fusius exponere, quippe quod argumentum in Tomo XIV. horum Commentariorum iam satis accurate est pertractatum.

25. Quodsi ergo huiusmodi formulae integrales $\iint V dx dy$ variatio quaeri debeat, ubi V denotat expressionem quamcunque vel primi vel secundi generis, ex superioribus satis liquet hanc variationem ita expressum iri:

$$dt \iint \left(\frac{dV}{dt} \right) dx dy$$

quae forma iterum est integralis duplicata et prouti vel x vel y priore integratione ut constans spectatur, ea formula vel hoc modo

$$dt \int dx f \left(\frac{dV}{dt} \right) dy,$$

vel hoc modo

$$dt \int dy f \left(\frac{dV}{dt} \right) dx$$

exhiberi potest.

26. Sit nunc V talis expressio qualem supra § 19 descripsimus et cuius variationem seu valorem $\left(\frac{dV}{dt} \right)$ in § 23 euoluimus, tantum opus erit, singula membra ibi exposita heic loco $\left(\frac{dV}{dt} \right)$ substituere; unde sequens congeries formularum integralium nascetur, quibus iunctim sumtis variatio quaesita $dt \iint \left(\frac{dV}{dt} \right) dx dy$ exprimitur:

$$\begin{aligned} dt \iint N \left(\frac{dz}{dt} \right) dx dy + dt \iint P \left(\frac{d}{dx} \frac{dz}{dt} \right) dx dy + dt \iint Q \left(\frac{d^2 z}{dx^2 dt} \right) dx dy + dt \iint R \left(\frac{d^3 z}{dx^3 dt} \right) dx dy \\ + dt \iint P^I \left(\frac{d}{dy} \frac{dz}{dt} \right) dx dy + dt \iint Q^I \left(\frac{d^2 z}{dx dy dt} \right) dx dy + dt \iint R^I \left(\frac{d^3 z}{dx^2 dy dt} \right) dx dy \\ + dt \iint Q^{II} \left(\frac{d^2 z}{dy^2 dt} \right) dx dy + dt \iint R^{II} \left(\frac{d^3 z}{dx dy^2 dt} \right) dx dy \\ + dt \iint R^{III} \left(\frac{d^4 z}{dy^3 dt} \right) dx dy \\ \text{etc.} \end{aligned}$$

27. Nunc singula hæc membra post primum peculiariæ reductiones admittunt, quas probe notasse iuvabit. Pro secundo membro sumamus primo x tantum variabile erique :

$$\int P \left(\frac{d}{dx} \frac{dz}{dt} \right) dx = P \left(\frac{dz}{dt} \right) - f \left(\frac{dz}{dt} \right) dx \left(\frac{dP}{dx} \right),$$

unde etiam alteram integrationem adiiciendo erit :

$$\iint P \left(\frac{d}{dx} \frac{dz}{dt} \right) dx dy = \int P \left(\frac{dz}{dt} \right) dy - \iint \left(\frac{dz}{dt} \right) \left(\frac{dP}{dx} \right) dx dy.$$

Pro tertio membro sumatur primo sola y variabilis erique :

$$\int P' \left(\frac{d}{dy} \frac{dz}{dt} \right) dy = P' \left(\frac{dz}{dt} \right) - f \left(\frac{dz}{dt} \right) dy \left(\frac{dP'}{dy} \right)$$

unde ipsum tertium membrum transibit in

$$\iint P' \left(\frac{d}{dy} \frac{dz}{dt} \right) dx dy = \int P' \left(\frac{dz}{dt} \right) dx - \iint \left(\frac{dz}{dt} \right) \left(\frac{dP'}{dy} \right) dx dy.$$

28. Pro sequentibus membris hæc ipsæ reductiones sequentes dabunt transformationes, pro quarto scilicet habebimus ex secundo

$$\iint Q \left(\frac{d^2 z}{dx^2 dt} \right) dx = \int Q \left(\frac{d}{dx} \frac{dz}{dt} \right) dy - \iint \left(\frac{d}{dx} \frac{dz}{dt} \right) \left(\frac{dQ}{dx} \right) dx dy$$

at vero hoc membrum posterius ad similitudinem secundi reducitur hoc modo, ubi tantum loco P scribi debet $\left(\frac{dQ}{dx} \right)$:

$$\int \left(\frac{d}{dx} \frac{dz}{dt} \right) \left(\frac{dQ}{dx} \right) dy - \iint \left(\frac{d}{dx} \frac{dz}{dt} \right) \left(\frac{d}{dx} \frac{dQ}{dx} \right) dx dy$$

ita ut nunc quartum membrum præbeat hanc formam :

$$\int Q \left(\frac{d}{dx} \frac{dz}{dt} \right) dy - \int \left(\frac{dz}{dt} \right) \left(\frac{dQ}{dx} \right) dy + \iint \left(\frac{dz}{dt} \right) \left(\frac{d}{dx} \frac{dQ}{dx} \right) dx dy.$$

Simili modo quintum membrum ope secundi reducitur ubi loco P scribitur Q' et loco $(\frac{d^2 z}{dx dy dt})$, $(\frac{d^2 z}{dx dy dt})$, siue loco $(\frac{d^2 z}{dt})$ scribendo $(\frac{d^2 z}{dy dt})$ sicque habebitur

$$\iint Q'(\frac{d^2 z}{dx dy dt}) dx dy = \iint Q'(\frac{d^2 z}{dy dt}) dy - \iint (\frac{d^2 z}{dy dt})(\frac{d Q'}{dx}) dx dy$$
 quod posterius membrum cum tertio conferatur, ubi loco tantum P' scribi debet $(\frac{d Q'}{dx})$, quo pacto totum membrum induet hanc formam :

$$\iint Q'(\frac{d^2 z}{dy dt}) dy - \iint (\frac{d^2 z}{dt})(\frac{d Q'}{dx}) dx + \iint (\frac{d^2 z}{dt})(\frac{d^2 Q'}{dx dy}) dx dy,$$
 sextum vero membrum bis cum secundo collatum reducitur ad hanc formam :

$$\iint Q''(\frac{d^2 z}{dy dt}) dx - \iint (\frac{d^2 z}{dt})(\frac{d Q''}{dy}) dy + \iint (\frac{d^2 z}{dt})(\frac{d^2 Q''}{dy^2}) dy dx$$

28. Si hoc modo ulterius progrediamur ad sequentia membra, septimum membrum in sequentes partes resoluitur :

$$\iint R(\frac{d^2 z}{dx^2 dy dt}) dy - \iint (\frac{d^2 z}{dx dy dt})(\frac{d R}{dx}) dx + \iint (\frac{d^2 z}{dt})(\frac{d^2 R}{dx^2}) dx dy - \iint (\frac{d^2 z}{dt})(\frac{d^2 R}{dx^2}) dx dy$$

deinde octauum membrum

$$\iint R'(\frac{d^2 z}{dx dy dt}) dy - \iint (\frac{d^2 z}{dx dy dt})(\frac{d R'}{dx}) dx + \iint (\frac{d^2 z}{dt})(\frac{d^2 R'}{dx dy}) dx dy - \iint (\frac{d^2 z}{dt})(\frac{d^2 R'}{dx^2 dy}) dx dy$$

tum nonum membrum fiet

$$\iint R''(\frac{d^2 z}{dx^2 dy dt}) dx - \iint (\frac{d^2 z}{dy dt})(\frac{d R''}{dy}) dy + \iint (\frac{d^2 z}{dt})(\frac{d^2 R''}{dx dy}) dx dy - \iint (\frac{d^2 z}{dt})(\frac{d^2 R''}{dx dy^2}) dx dy$$

et decimum

$$\iint R'''(\frac{d^2 z}{dy^2 dt}) dy - \iint (\frac{d^2 z}{dy dt})(\frac{d R'''}{dy}) dy + \iint (\frac{d^2 z}{dt})(\frac{d^2 R'''}{dy^2}) dy dx - \iint (\frac{d^2 z}{dt})(\frac{d^2 R'''}{dy^2}) dx dy$$

43. Non igitur pigebit in talem expressionem Z inquisiuisse, ac primo quidem patet eam praeter coordinatas x et y etiam quantitatem p inuolucere debere. Sumamus autem praeterea in Z non ingredi litteras q , r etc. ita ut sit $Q = 0$, $R = 0$, ac nostra aequatio resoluenda erit:

$$pZ = (1 + pp)P,$$

ubi notandum est esse

$$dZ = M dx + N dy + P dp,$$

quare si ambae coordinatae x et y tanquam constantes tractentur crit

$$dZ = P dp \quad \text{ideoque} \quad P = \frac{dZ}{dp},$$

quo valore ibi introducto haec prodibit aequatio

$$\frac{dZ}{Z} = \frac{p dp}{1 + pp}$$

quae integrata dat

$$L. Z = L. \sqrt{1 + pp} + L. C$$

quae constans functio quaecunque ipsarum x et y esse potest, talis functio sit V atque habebimus

$$Z = V \sqrt{1 + pp},$$

ideoque formula integralis

$$= \int V dx \sqrt{1 + pp}.$$

Huius formulae significatum satis eleganter per tempus, quo corpus quodpiam per curuam AM promouetur exprimi potest. Si enim celeritas in puncto M , fuerit $= \frac{1}{2}$, hoc est si celeritas in singulis punctis

casus nonnulli particulares omni studio et diligentia fuerint euoluti, quin etiam ipsa pars prior, quae tantum circa functiones vnius variabilis versatur neutiquam adhuc satis clare et distincte est enucleata, ita vt perspicue intelligeremus veram indolem atque naturam singularum partium, quibus variationem contineri inuenimus, quem in finem dilucidationes sequentes hic adiungere visum est.

Dilucidationes super Theoria variationum ad functiones saltem vnius variabilis accommodata.

31. Quaestiones quae hic occurrunt ad hoc problema generale reuocare licet:

Explicatio
ipsius Pro-
blematis.

Si y fuerit functio quaecunque ipsius x , indeque definiatur valor cuiuspiam formulae integralis datae $\int Z dx$, denotante Z expressionem ex ipsis quantitatibus x et y earumque differentialium rationibus utcunque compositam, quaestio est, si loco ibius functionis y alia quaecunque illi proxima seu infinite parum tantum ab ea discrepans adhibeatur, quanto maiorem minoremve valorem, tum eadem formula integralis $\int Z dx$ fit consecutura.

32. At quia hoc modo ista quaestio enunciata nimis videri posset abstracta, eam more solito ad Geometriam reuocemus. Sit igitur super axe
Tab. II. A P, proposita curua quaecunque A M aequatione
Fig. 1. inter abscissam $AP = x$ et applicatam $PM = y$ expressa, pro qua definiri oporteat valorem formulae
cuius-

cuiuspiam integralis $\int Z dx$, qui sit $= W$, quo posito consideretur alia curua quaecunque $\alpha \mu$ infinite parum a data discrepans, ac si pro hac curua itidem definiatur valor formulae $\int Z dx$, quaeritur, quantum iste valor a praecedente sit discrepaturus, evidens enim est, hoc discrimen praebere ipsam variationem quantitatis W , quam supra ope calculi variationum exhibuimus.

33. Quo haec adhuc clariora euadant, exemplum quodpiam proferamus, quo proposita curua $A M$ eiusque axe $A P$ tamquam verticali considerato, quaeritur tempus quo corpus ex puncto A super hac curua AM descendens vsque ad punctum M pertingit. Iam quia celeritas corporis in M , est vt $\sqrt{AP} = \sqrt{x}$ et ipsum curvae elementum $= dx \sqrt{1 + pp}$, posito scilicet $dy = p dx$ vti in solutione generali est praeceptum; erit tempus per elementum $M m = dx \frac{\sqrt{1 + pp}}{\sqrt{x}}$ vnde formula integralis $\int Z dx$ pro hoc casu abit in $\int dx \frac{\sqrt{1 + pp}}{\sqrt{x}}$, ita vt habeatur $Z = \frac{\sqrt{1 + pp}}{\sqrt{x}}$, quare nunc tempus erit definiendum, quo corpus super curua quacunque proxima $\alpha \mu$ descendens ab a vsque ad μ perueniet, vbi discrimen dabit ipsam variationem formulae $\int dx \frac{\sqrt{1 + pp}}{\sqrt{x}}$ huic casui convenientem.

34. Quoniam hic formula integralis consideranda venit, ante omnia dispiciendum est, quomodo eam determinari oporteat. In exemplo quidem illato, manifestum est formulae $\int \frac{dx \sqrt{1 + pp}}{\sqrt{x}}$ integrale

grale ita capi debere, vt euanescat posito $x = 0$, vnde etiam in genere intelligitur, semper pro integratione formulae $\int Z dx$, certum aliquem terminum veluti punctum A, tamquam principium integrationis statui atque integrale $\int Z dx$ euanescere debere posito $x = 0$, vel si forte circumstantiae aliter fuerint comparatae, tribuendo ipsi x valorem quempiam datum, deinde vero initio constituto, valor formulae $\int Z dx = W$ abscissae $AP = x$ respondebit.

35. His circa formulam integram $\int Z dx$ obseruatis, videamus, quamnam ideam nobis de curvis illis proximis $\alpha \mu$ formare debeamus. Ac primo quidem patet, has curuas continuo quodam tractu ductas esse debere, ita vt in iis nusquam anguli aliue saltus deprehendantur; hoc solo notato, perinde est siue istae curuae lege quapiam continuitatis vel aequatione quapiam contineantur, siue sint adeo discontinuae, quasi libero manus motu ductae.

36. Huiusmodi lineae curuae commodissime sequenti modo formatae menti repraesentari possunt. Ducatur scilicet pro lubitu linea curua quaecunque BN eidem abscissae AP imminens, ac ductis ad singula axis puncta X applicatis XYV singula intervalla YV in ratione finiti ad infinite paruum secentur in v , ita vt Yv sit quasi pars infinitesima intervalli YV. Hoc enim modo curua $\alpha \nu \mu$ obtinebitur a curua proposita AM in omnibus punctis infinite parum dissita, qualem ad institutum nostrum requi-

requirimus. Praeterea tamen notandum est, in curva illa arbitraria BN nusquam tangentem ad axem AP normalem esse debere; quia hoc modo divisio illorum intervallorum turbaretur. Atque nunc evidens est, non solum intervalla $Y\varphi$ esse infinite parva, sed etiam tangentes in punctis Y et φ infinite parum a parallelismo deficere.

37 His circa ipsam quaestionis propositionem Explicatio partis primae in variatione. annotatis, contemplemur nunc accuratius quoque solutionem supra inuentam, eiusque singulas partes, ut quid quaelibet earum innuat et ad quemnam usum sit transferenda perspicue intelligamus; solutionem autem in §. 14. datam hic contemplabimur. Statim igitur consideremus primam variationis ibi inuentae partem, quae hac formula integrali continetur.

$$dt \int dx \left(\frac{dy}{dx} \right) \left(N - \left(\frac{dP}{dx} \right) + \left(\frac{d^2 Q}{dx^2} \right) - \left(\frac{d^3 R}{dx^3} \right) + \left(\frac{d^4 S}{dx^4} \right) - \text{etc.} \right)$$
 cuius integratio ita capi debet, ut in ipso termino initiali A evanescat, qua conditione constans arbitraria determinatur, quod si ergo in singulis punctis X Y haec formula applicata intelligatur, aggregatum omnium istarum formularum elementarium ab initio A usque ad terminum M extensum praebebit primam partem variationis quaesitae, atque hic quidem in Figura perspicuum est, spatium $Y\varphi$ exprimere incrementum applicatae y a sola variabili t oriundum ita ut sit $Y\varphi = dt \left(\frac{dy}{dx} \right)$.

38. Haec igitur prima pars variationis inuoluit omnia spatiola $Y \psi$ intra terminos A et M contenta, quae quum in infinitum variari possint, atque adeo a positiuis ad negatiua transire queant, maximae variationes hic locum habere possunt. Verum tamen vnicus casus hinc debet excipi, quo curva AM ita est comparata, vt sit

$$0 = N - \frac{dP}{dx} + \frac{d^2Q}{dx^2} - \frac{d^3R}{dx^3} + \frac{d^4S}{dx^4} \text{ etc.}$$

tum enim vtcunque curuae proximae fuerint comparatae, ista pars prima variationis, semper in nihilum abit. Neque deuiatio curuarum proximarum $\alpha \mu$ a principali AM intra terminos A et M quicquam ad variationem confert; ex quo haec curva respectu formulae integralis $\int Z dx$ inprimis est memorabilis, quandoquidem in ea haec formula integralis vel maximum vel minimum obtinet valorem.

Explicatio
partis se-
cundae in
variatione.

39. Progrediamur nunc ad secundam partem variationis supra inuentae, quae est

$$dt \left(\frac{dy}{dt} \right) \left(P - \frac{dQ}{dx} + \frac{d^2R}{dx^2} - \frac{d^3S}{dx^3} + \text{etc.} \right)$$

circa quam primum obseruo, quoniam ea ad terminum M refertur per integrationem rite institutam, insuper adiici debere, similem expressionem ad terminum priorem A relatum, at vero signo contrario affectam, id quod ideo est necessarium vt facto $x = 0$, etiam haec expressio penitus tollatur. Refertur autem ista pars

$$dt \left(\frac{dy}{dt} \right) \left(P - \frac{dQ}{dx} + \frac{d^2R}{dx^2} - \text{etc.} \right)$$

vnice

voice ad ultimum terminum M , ubi $dt (\frac{dx}{dt})$ ipsum spatium $M\mu$ exprimit, similique modo in alteram partem pro initio A spatium Aa ingreditur. Hinc patet si omnes curvae proximae $a\mu$ per ipsos ambos terminos A et M ducantur tum variationem secundae partis in nihilum abire.

40. Consideremus autem casum, quo curva proxima $a\mu$ per primum quidem terminum A transit non vero quoque per alterum M , sed sit punctum μ eius terminus, atque variatio ex secunda parte uata erit

$$= M\mu \left(P - \frac{dQ}{dx} + \frac{dR}{dx^2} \text{ etc.} \right).$$

Atque hinc etiam definire poterimus variationem ex eodem fonte oriundam, si curva proxima $A\mu$, non in ipso puncto μ sed alio quocunque ω terminetur, existente semper intervallo $\mu\omega$ infinite paruo. Ducta enim applicata ωmp , variatio modo inuenta insuper augeri debet particula formulae $\int Z dx$, quae elemento $Pp = dx$ respondet, quae particula quum sit $= Z \cdot Pp$, pro arcu curvae proximae $A\omega$ erit variatio ex secunda parte oriunda

$$= M\mu \left(P - \frac{dQ}{dx} + \frac{dR}{dx^2} \text{ etc.} \right) + Z \cdot Pp.$$

41. Ducatur recta $M\omega$ et quacramus angulum ωMm , quem haec recta $M\omega$ cum curua principali constituit, ponatur iste angulus $\omega Mm = \omega$ et ducta MO ipsi Pp parallela, quia est proxime $m\omega = M\mu$ et anguli mMo tangens $= p$ ideoque

H 2

om

60 METHODVS NOVA CALCVLVM

$om = p \cdot Pp$; habebitur $O\omega = M\mu + p \cdot Pp$ unde fit:

$$\text{tang. } \omega \cdot M\mu = \frac{N\mu}{Pp} + p,$$

atque hinc colligitur

$$\omega \cdot Mm = \text{tang. } \omega = \frac{N\mu}{Pp(1+pP) + N\mu \cdot p}.$$

Seruemus nunc in calculo hunc ipsum angulum ω atque hinc habebimus spatium:

$$M\mu = \frac{Pp(1+pP)\text{tang. } \omega}{1 - p\text{tang. } \omega}$$

quo valore substituto variatio pro arcu $A\omega$ erit:

$$Pp(Z + \frac{(1+pP)\text{tang. } \omega}{1 - p\text{tang. } \omega} (P - \frac{dQ}{dx} + \frac{d^2R}{dx^2} \text{ etc.})).$$

42. Nunc operae pretium erit cum angulum ω definire, ut ista variatio in nihilum abeat, id quod eueniet, si capiatur

$$\text{tang. } \omega = \frac{Z}{pZ - (1+pP)(P - \frac{dQ}{dx} + \frac{d^2R}{dx^2} \text{ etc.})}$$

quare hoc angulo ita constituto pro omnibus lineis proximis vbicunque in recta $M\omega$ terminatis variatio ex secunda parte oriunda euanciscet. Hic casus prae cacteris omnino notatu dignus considerari meretur, quo recta $M\omega$ fit ad curuam principalem in puncto M normalis, quod euenit, si fuerit

$$pZ - (1+pP)(P - \frac{dQ}{dx} + \frac{d^2R}{dx^2} \text{ etc.}) = 0,$$

qua aequatione certa conditio ipsius formulae integralis $\int Z dx$ siue indolis expressionis Z definitur.

43. Non igitur pigebit in talem expressionem Z inquisiuisse, ac primo quidem patet eam præter coordinatas x et y etiam quantitatem p inuolueri debere. Sumamus autem præterea in Z non ingredi litteras q, r etc. ita ut sit $Q = 0, R = 0$, ac nostra æquatio resoluenda erit:

$$pZ = (1 + pp)P,$$

vbi notandum est esse

$$dZ = M dx + N dy + P dp,$$

quare si ambæ coordinatæ x et y tanquam constantes tractentur crit

$$dZ = P dp \text{ ideoque } P = \frac{dZ}{dp},$$

quo valore ibi introducto hæc prodibit æquatio

$$\frac{dZ}{Z} = \frac{p dp}{1 + pp}$$

quæ integrata dat

$$L. Z = L. V (1 + pp) + L. C$$

quæ constans functio quæcunque ipsarum x et y esse potest, talis functio sit V atque habebimus

$$Z = V V (1 + pp),$$

ideoque formula integralis

$$= \int V dx V (1 + pp).$$

Huius formulæ significatum satis eleganter per tempus, quo corpus quodpiam per curuam AM promouetur exprimi potest. Si enim celeritas in puncto M , fuerit $= \frac{1}{2}$, hoc est si celeritas in singulis

62 METHODVS NOVA CALCVLVM

punctis proportionalis fuerit, functioni cuicunque binarum variabilium x et y , tum

$$V dx \sqrt{(1 + p p)}$$

exprimit elementum temporis ideoque formula

$$\int V dx \sqrt{(1 + p p)},$$

totum tempus quo corpus ab A ad M peruenit.

Explicatio
partis ter-
tiae in va-
riatione.

44. Quod ad tertiam partem variationis attinet scilicet

$$dt \left(\frac{d dy}{dx dt} \right) \left(Q - \frac{d R}{dx} + \frac{d ds}{dx^2} \text{ etc.} \right)$$

ea locum non habet, nisi expressio Z etiam differentialia secundi gradus inuoluat, quod quidem rarissime vsu venire solet. Hic autem obseruandum est, quoniam $M \mu = dt \left(\frac{d y}{dx dt} \right)$ fore pro sequenti elemento

$$m \omega = dt \left(\frac{d y}{dx dt} \right) + dt dx \left(\frac{d dy}{dx dx dt} \right)$$

vnde colligitur

$$dt \left(\frac{d dy}{dx dx dt} \right) = \frac{m \omega - M \mu}{dx} = \frac{M \omega - m \mu}{p p},$$

hac autem formula exprimitur declinatio directionis $\mu \omega$ a directione $M m$, quae quidem, vt iam ante obseruauimus semper est quam minima.

45. Quodsi ergo Tangens in μ perfecte fuerit parallela tangenti in M , quod euenit, si etiam in curua generatrice BN , tangens ad N huic fuerit parallela, tum variatio ex tertia parte oriunda prorsus evanescit, quod etiam de termino initiali A est intelligendum, si tangentes in A et B inter se fuerint

suerint parallelae, atque hinc iam perspicitur, vt variationes ex quarta parte oriundae euanescent, necesse esse, vt praeterea etiam radii osculi in punctis M et μ fiant aequales.

46. Atque ex his iam satis perspicuum est, variationes ex secunda parte oriundas euanescere, si omnes curuae proximae $\alpha\mu$ per vtrumque terminum M et A ducantur. Deinde vero insuper etiam variationes tertiae partis, si omnes curuae proximae simul in vtroque termino A et M cum curua principali AM communes habeat tangentes. Praeterea vero quoque variationes quartae partis in nihilum abire, si omnes curuae proximae in terminis A et M insuper ratione curuaturae cum curua principali conueniant. Hic autem probe meminisse iuuabit, variationes tertiae partis per se euanescere, si modo quantitas Z non differentialia secundi gradus involuat; quartae vero partis semper euanescere nisi differentialia tertii gradus in quantitatem Z ingrediantur, et ita porro. Vnde quum initio ostenderimus, quomodo variatio primae partis ad nihilum sit redigenda, nunc euidentissime intelligimus sub quibusnam conditionibus, omnes variationis partes simul euanescent.

Dilucidationes circa curuas maximi, minimiue proprietate praeditas.

47. Si formula integralis $\int Z dx$ in curua quaesita debeat esse vel maximum vel minimum, iam supra ostendimus, posito

$$dZ$$

$dZ = Mdx + Ndy + Pdp + Qdq + Rdr + \text{etc.}$
 naturam huius curuae, hac exprimi aequatione: \dots
 $0 = N - \frac{dP}{dx} + \frac{dQ}{dx^2} - \frac{d^2R}{dx^3} \text{ etc.}$
 quae aequatio nisi quantitates P, Q, R evanescant,
 vel sint constantes, semper est differentialis vel se-
 cundi, vel quarti, vel sexti, aliusue gradus paris.
 Hic ergo statim memoratu dignum occurrit quod
 ista aequatio nunquam vel simpliciter differentialis,
 vel tertii, vel quinti, aliusue gradus imparis euadat,
 id. quod mox clarius exponemus.

48. Quaestiones ergo huc pertinentes, sponte
 in varias diuiduntur pro gradu differentialium, ad
 quem aequationes exsurgunt, quandoquidem ab hoc
 gradu natura solutionis maxime pendet, propterea
 quod ea semper totidem constantes arbitrarías in-
 voluit. Ad primam ergo classem referimus eos casus
 quibus aequatio pro maximo vel minimo inuenta
 prorsus est finita. Ad secundam autem classem eos,
 quibus haec aequatio fit differentialis secundi gradus,
 ad tertiam eos, quibus aequatio ad quartum gra-
 dum ascendit et ita porro, quas singulas classes or-
 dine describamus.

1. Classis. Ad solutionem ergo primae classis formula
 $\int Z dx$ statim perducit quando expressio Z tantum
 per coordinatas x et y exclusis omnium differentia-
 lium rationibus determinatur, quia enim hoc casu,
 simpliciter fit

$$dZ = M dx + N dy$$

aequatio pro curua maximi vel minimi erit $N = 0$,
 quae ergo aequatio omnino est determinata, atque
 adeo

adeo curua satisfaciens vnica in suo genere. Veluti si quaeratur linea in qua valor formulae $\int dx(2xy - yy)$ fiat maximus vel minimus, ob $Z = 2xy - yy$, ideoque $N = 2(x - y)$, aequatio quaesita erit $x - y = 0$, seu linea quaesita erit recta ad axem angulo semirecto inclinata, pro qua ergo valor formulae propositae integralis est $\frac{x^2}{2}$, qui vtique minor est, quam si vlla alia linea curua sumeretur pro eadem scilicet abscissa.

49. His autem casibus prima classis nondum exhauritur, sed dantur adhuc alii perinde ad aequationes finitas ducentes, ad quod ostendendum, sit \mathcal{B} functio quaecunque ipsarum x et y atque $d\mathcal{B} = \mathfrak{M}dx + \mathfrak{N}dy$, iamque ponatur $Z = \mathcal{B}p$ eritque $M = \mathfrak{M}p$; $N = \mathfrak{N}p$; $P = \mathcal{B}$, quare vt formula $\int Z dx$ fiat maximum vel minimum aequatio reperitur:

$$0 = \mathfrak{N}p - \frac{d\mathcal{B}}{dx} = \mathfrak{N}p - \mathfrak{M} - \frac{\mathfrak{N}dy}{dx} = -\mathfrak{M}$$

quae itidem est aequatio finita. Quod quidem etiam statim praevidere licuisset, quum enim sit $pdx = dy$, haec formula integralis $\int \mathcal{B} dy$ a praecedente $\int Z dx$ aliter non differt, nisi quod coordinatae x et y sint permutatae, vnde quod de priore erat affirmatum, etiam de posteriore valer.

Hinc natura primae classis adhuc generalius ita describi potest; vt ea complectatur omnes formulas integrales huiusmodi $\int (Z + \mathcal{B}p) dx$, vbi litterae Z et \mathcal{B} denotant functiones quascunque ipsarum

rum x et y , tum enim aequatio pro curua maximi vel minimi erit:

$$0 = N - M,$$

quae est aequatio omnino determinata.

II. Classis.

50. Ad classẽm secundam referimus eas formulas integrales $\int Z dx$, quae deducunt ad aequationem differentialem secundi gradus, huc ergo primo pertinent casus, quibus Z tantum ex litteris x , y et p componitur, ita vt sit

$$d'Z = M dx + N dy + P dp$$

vnde quidem casum posteriorem primae classis excipere oportet, quippe quod euenit, si P fuerit functio tantum ipsarum x et y , ita vt pro praesenti casu quantitas P praeter x et y etiam litteram p complecti debeat. Tum autem aequatio pro curua quaesita erit $0 = N - \frac{dP}{dx}$, vbi quum P inuoluat p , ideoque $d.(\frac{dx}{dy})$ formula $\frac{dP}{dx}$ continebit differentialia secundi gradus, haec ergo aequatio neutiquam est determinata, quum duas adeo constantes arbitrarias recipiat, quibus effici potest, vt curua per data duo puncta transeat, atque adeo quaestiones huius classis ita accuratius sunt definiendae, vt curuae inuestigentur, quae non inter omnes plane curuas, sed inter eas tantum, quae per eadem duo puncta ducuntur, praescripta maximi minimive proprietate gaudeant; semper autem quaestiones huius classis ita sunt comparatae, vt per naturam suam hanc restrictionem postulent.

§ 1. Praeterea vero etiam ad secundam classera referri oportet casus, quibus $Z = \mathfrak{Z}q$ existente \mathfrak{Z} functione quacunque ipsarum x, y et p , si enim fuerit

$$d\mathfrak{Z} = \mathfrak{M}dx + \mathfrak{N}dy + \mathfrak{P}dp$$

habebimus

$$M = \mathfrak{M}q; N = \mathfrak{N}q; P = \mathfrak{P}q, \text{ et } Q = \mathfrak{Z}$$

quare quum aequatio pro curua sit

$$0 = N - \frac{dP}{dx} + \frac{dQ}{dx}, \text{ siue } 0 = N - \frac{d}{dx} (P - \frac{dQ}{dx});$$

formula haec $P - \frac{dQ}{dx}$ abit in

$$\mathfrak{P}q - \frac{d\mathfrak{Z}}{dx} = \mathfrak{P}q - \mathfrak{M} - \mathfrak{N}p - \mathfrak{P}q = -\mathfrak{M} - \mathfrak{N}p$$

unde aequatio nostra euadet

$$0 = N + \frac{d}{dx} (\mathfrak{M} + \mathfrak{N}p) = 2\mathfrak{N}q + \frac{d\mathfrak{M}}{dx} + p \frac{d\mathfrak{N}}{dx},$$

quae manifesto tantum differentialia secundi gradus continet. Generalius ergo adhuc si formula integralis proposita fuerit $\int (Z + \mathfrak{Z}q) dx$, ubi Z et \mathfrak{Z} quomodocunque ex quantitibus x, y et p sint compositae, aequatio pro curua quaesita erit

$$0 = N - \frac{dP}{dx} + 2\mathfrak{N}q + \frac{d\mathfrak{M}}{dx} + p \frac{d\mathfrak{N}}{dx}$$

siue etiam

$$0 = Ndx - dP + 2\mathfrak{N}dp + d\mathfrak{M} + p d\mathfrak{N}$$

quae manifesto tantum est differentialis secundi gradus.

§ 2. At si quantitas Z ita ex litteris x, y, p , et q III. Classis fuerit composita ut posito

$$dZ = Mdx + Ndy + Pdp + Qdq$$

1 2

etiam

etiam quantitas Q inuoluat litteram q , tum huiusmodi casus ad tertiam classem erunt referendi et quum aequatio pro curua quaesita reperiatur

$$0 = N - \frac{dP}{dx} + \frac{d^2Q}{dx^2}$$

cuidens est terminum $\frac{d^2Q}{dx^2}$ inuoluere differentialia quarti gradus, vnde aequatio finita pro curua implicabit quatuor constantes arbitrarías, quibus ergo effici potest, vt curua desiderata non solum per datos duos terminos transeat, sed etiam eius tangentes in vtroque termino datam obtineant positionem, in qua quadruplici determinatione natura quaestionum ad hanc classem pertinentium continetur et accuratissime perspicitur.

53. Reliquis casibus ad hanc classem pertinentibus non immoror, verum potius illustrationis causa insigne adferam exemplum, quo curuae elasticae investigari solent. Scilicet si littera q denotet, radium osculi curuae quaesitae in puncto M , omnes hae curuae hac gaudent proprietate, vt in iis haec formula $\int \frac{dx \sqrt{(1+pp)}}{q}$ sit minimum, ideoque habeatur

$$Z = \frac{\sqrt{(1+pp)}}{q}, \text{ quum vero sit } q = \frac{(1+pp)^{1/2}}{q}$$

$$\text{habebimus } Z = \frac{q}{(1+pp)^{1/2}} \text{ vnde fit}$$

$$M=0, N=0, P = \frac{-5ppq}{(1+pp)^{3/2}} \text{ et } Q = \frac{+2q}{(1+pp)^{1/2}}$$

quare quum ob $N=0$, aequatio pro curuis quaesitis sit:

$$0 = -\frac{dP}{dx} + \frac{d^2Q}{dx^2},$$

cuius

Tab. II.
Fig. I.

cuius integrale statim praebet.

$$P - \frac{dQ}{dx} = A,$$

quae adhuc est differentialis tertii gradus.

54. Verum haec aequatio adhuc in genere integrari potest, multiplicetur enim per $q dx = dp$, ut habeatur haec aequatio

$Pdp - qdQ = Adq$, quum vero sit $dZ = Pdp + Qdq$ erit $Pdp = dZ - Qdq$, quo valore substituto aequatio resultat haec: $dZ - Qdq - qdQ = Adp$, cuius integrale manifesto est $Z - Qq = Ap + B$, nunc igitur pro Z et Q valores supra dati substituantur atque nanciscemur sequentem aequationem:

$$\frac{-q q}{(1+pp)^{3/2}} = Ap + B$$

mutatis igitur signis constantium colligemus

$$qq = (Ap + B)(1+pp)^{3/2} \text{ ideoque}$$

$$q = (1+pp)^{3/2} \sqrt{Ap + B} = \frac{d p}{d x},$$

sicque concludimus

$$dx = \frac{dp}{(1+pp)^{3/2} \sqrt{Ap + B}},$$

hincque porro

$$dy = \frac{p dp}{(1+pp)^{3/2} \sqrt{Ap + B}}$$

quibus duabus aequationibus constructio curvae absoluitur.

55. Cum olim haec Methodus maximorum et minimorum tractari est coepta, non solum eiusmodi curvae sunt inuestigatae in quibus formula quaecpiam integralis $\int Z dx$ esset vel maximum vel minimum; sed etiam eiusmodi quaestiones proponebantur, vt non inter omnes plane curuas, sed inter eas tantum, quae habeant eandem longitudinem ea quaeratur, in qua illa formula fiat maxima vel minima, ex quo ipso casu nomen Problematis Isoperimetrici est natum hoc autem nomen non in pediu, quo minus eiusmodi quaestiones generaliores proponerentur, vt inter omnes eas curuas quibus val r certae cuiuspiam formulae integralis $\int V dx$ aequae conveniat, ea definiatur in qua formula $\int Z dx$ maximum minimumve sortiatur valorem, quin etiam conditiones adhuc fuerunt multiplicatae in hunc modum, vt tantum inter omnes eas curuas, quibus non solum formula $\int V dx$, sed etiam hae quotcunque $\int V' dx$, $\int V'' dx$ etc. aequaliter competant, ea definiatur in qua $\int Z dx$ sit maximum vel minimum, cuiusmodi problemata tum temporis summopere ardua sunt visa. Postquam vero in tractatu meo de hoc argumento ostendissem huiusmodi problemata semper reduci posse ad hoc problema simplex, quo inter omnes plane lineas, ea inuestigetur, in qua haec formula integralis

$$\int dx (Z + \alpha V + \beta V' + \gamma V'' \text{ etc.})$$

fiat maximum vel minimum, huius generis problemata nullam amplius habent difficultatem.

DE

DE
S V M M A T I O N I B V S
SERIERVM QVARVNDAM INCONGRVE VE-
RIS EARVMQVE INTERPRETATIONE
ATQVE VSV.

Auctore

DANIELE BERNOVLLI.

§. I.

Seriebus potissimum recurrentibus hoc commune est, vt in infinitum continuatæ aliquando summam indicent manifeste falsam *in concreto*, nec tamen absurdam *in abstracto*: sola quippe summa, quam analysis docet, sufficiente quadam ratione suffultra est, quæ efficit, vt sic nec aliter determinetur, hæc ratio sufficiens, cum in vera quæstionis natura posita sit, non finit solutionem esse falsam in abstracto; hinc fit vt si diuerfos solutionis modos adhibeamus, in eundem vsque valorem constantissime incidamus: imo si solutione paradoxa utamur ceu termino medio ad alias quantitates inde determinandas, nulli amphiboliæ subiectas, determinatio obtinetur manifeste vera non secus ac quantitates reales deducuntur ex quantitatibus imaginariis.

§ 2. Proponatur, exempli gratia, simplicissima series iam olim agitata $1 - 1 + 1 - 1 + 1 -$ etc.
cuius

72 DE SUMMATIONIBVS SERIERVM

cuius summa dicitur $= \frac{1}{2}$. Vera atque sufficiens huius determinationis ratio in hoc posita est, quod summa sit vel $= 1$ vel $= 0$ prouti numerus terminorum fuerit siue impar siue par: sed quia series nusquam finitur, vtraque summa aequali vtique iure gaudet; nulla militat ratio pro numero terminorum pari potius quam impari; ergo summa statuenda est, quae aequaliter distat ab 1 et ab nihilo, id est, $= \frac{1}{2}$. Iam vero hanc summam, ex primo artis coniectandi lemmate deductam, aliis modis confirmemus.

Si quantitas $\frac{1}{1+x}$ in seriem conuertatur per diuisionem infinitam, fiet

$$1 - x + x^2 - x^3 + x^4 - \text{etc.} = \frac{1}{1+x}.$$

Sumatur $x = 1$ et habebitur iterum

$$1 - 1 + 1 - 1 + \text{etc.} = \frac{1}{2}.$$

Eandem nos docet summam theorema illud, quo demonstratur pro quouis angulo x , quod sit

$$\cos. x + \cos. 2x + \cos. 3x + \cos. 4x + \cos. 5x + \text{etc.} = -\frac{1}{2};$$

si enim sumatur angulus x aequalis duobus rectis, orietur

$$-1 + 1 - 1 + 1 - 1 + \text{etc.} = -\frac{1}{2}$$

atque proinde

$$1 - 1 + 1 - 1 + 1 - \text{etc.} = \frac{1}{2}.$$

Insuper ponatur

$$1 - 1 + 1 - 1 + 1 - \text{etc.} = S;$$

subtra-

subtrahatur primus terminus et erit

$$-1 + 1 - 1 + 1 - \text{etc.} = S - 1$$

sive conuersis signis

$$1 - 1 + 1 - 1 + \text{etc.} = -S + 1:$$

quia vero haec vltima series eadem est cum ea quae proposita est, habebitur $-S + 1 = S$ vnde $S = \frac{1}{2}$. Hic equidem opponi potest, seriem emerſam non eandem esse cum proposita, quandoquidem vi constructionis altera alteram vno termino ſuperat; ſed quia terminus in ſerie emerſa deficiens aequo iure eſt vel $+1$ vel -1 , adhibendus eſt medius inter vtrumque adeoque ſtatuendus $= 0$; Ergo differentia inter vtramque ſeriem $= 0$ ſicque omne oppoſitionis momentum euertitur.

Denique notetur quod pro quouis terminorum numero n ſit ſumma ſeriei propositae $= \frac{1}{2} - \frac{1}{2}(-1)^n$ et quod, ob rationem modo dictam, pro caſu $n = \infty$, ſit $-\frac{1}{2}(-1)^n$ vel $= \frac{1}{2}$ vel $= -\frac{1}{2}$, inter quos ambos valores, cum medius iterum euaneſcit, ſumma ſeriei propositae ſimpliciter ſtatuenda erit $= \frac{1}{2}$.

§ 3. Apparet ergo, quod omnes et ſinguli modi, quibus ad ſummam quaeritam peruenitur, eodem conſtantiffime recidunt ſimulque intelligimus omnem alium valorem, praeter ſummam inuentam, contradictionem inuoluere ideo, quod ſi ſumma dicatur $\frac{1}{2} + a$, eadem ſit ratio vt ſtatuatur $= \frac{1}{2} - a$: igitur, vt contradictio euitetur, oportet vt ſit $a = 0$ atque adeo ſumma ſeriei propositae $= \frac{1}{2}$. Attamen

74 DE SUMMATIONIBVS SERIERVM

series nullo modo ad hanc summam conuergit, nec vnquam fieri potest, vt cum illa congruat. Summa *proprie* nec vera est nec falsa; prius per se manifestum, posterius liquet ex eo, quod ex falso verum nunquam legitime deduci possit; id vero fieri posse videbimus in sequentibus.

§. 4. Sed et series diuergentes, quarum termini alternant in signis, similem agnoscunt legem: proponatur, exempli gratia, series $1 - 2 + 3 - 4 + 5 - \text{etc.}$ dico summam eius esse $\frac{1}{2}$: hoc autem assertum pluribus iterum modis demonstratur, qui omnes egregie inter se conspirant, vtcunque proprio sensu falsum sit.

Primo. Consideretur series tanquam recurrens secundi ordinis, cuius scilicet indices sunt -2 et -1 , ita vt quiuis terminus compositus sit ex duplo praecedenti negatiue sumto et ex antepaecedente pariter negatiue sumto; huius seriei, si termini cuiusvis index dicatur n , terminus generalis est $-n(-1)^n$. Sequitur etiam ex theoria serierum recurrentium, pro quouis terminorum numero n , esse summam omnium terminorum generaliter $= -\frac{1}{2}n(-1)^n - \frac{1}{2}(-1)^n + \frac{1}{2}$; iam vero, cum numerus terminorum est infinitus, aequum ius competit in numerum parem et imparem: in priori casu fit summa $= -\frac{1}{2}n$, in posteriori $= \frac{1}{2}n + \frac{1}{2}$: ergo valor medius inter vtramque summam $= \frac{1}{2}$, cui utique summa seriei propositae infinitae, secundum regulam fundamentalem probabilitatum, censenda est aequalis. Haec ad mentem inter-

interpretationis nostrae: videamus an idem valor ex alijs principiis oriatur.

Secundo. Consideretur series proposita sub forma generaliori $1 - 2x + 3xx - 4x^3 + 5x^4 - \text{etc.}$ notum autem est summam huius seriei infinitae esse $= \frac{1}{(1+x)^2}$, quicumque fuerit valor x : ponatur nunc $x = 1$ et habebitur series proposita $1 - 2 + 3 - 4 + 5 - \text{etc.} = \frac{1}{4}$.

Tertio. Ponatur $1 - 2 + 3 - 4 + 5 - \text{etc.} = S$; subtrahatur aequatio $1 - 1 + 1 - 1 + 1 - \text{etc.} = \frac{1}{2}$ paragrapho secundo demonstrata et habebitur $0 - 1 + 2 - 3 + 4 - \text{etc.} = S - \frac{1}{2}$. Conuersis signis neglectoque primo termino, nihilo aequali, fit $1 - 2 + 3 - 4 + \text{etc.} = -S + \frac{1}{2}$; haec vltima vero series nihil differt a serie proposita, cuius summam ponimus $= S$; erit itaque $S = -S + \frac{1}{2}$ siue $S = \frac{1}{4}$. Alias huiuscemodi siue solutiones siue demonstrationes quisque sibi haud difficulter formabit. Dico autem non posse non esse concordantes cum nostris etiamsi assertum in *concreto* manifeste falsum fuerit. Scio interim quid vbique oblici possit, imo obiectionibus assentior: at hoc ipsum est, quo tendo. Verane sunt allata an falsa? vtrumque aequo affirmabitur iure: secabo nodum subsidiario vocabulo vtrunque hybrido *incongruenter vera*. Caeterum me non monente per se patet formari posse huiuscemodi series innumeras altiorum generum quas signorum alternatio summabiles reddat. Sufficient autem allata exempla simpliciora pro instituto nostro.

§. 5. In praecedente paragrapho, articulo secundo, consideraui sub forma generaliore aequationem $1 - 2x + 3x^2 - 4x^3 + 5x^4 - \text{etc.} = \frac{1}{(1+x)^2}$ pro quocunque numero x . In quemcunque nunc censum referatur haec aequatio, pro casu $x = 1$, certum est legitimo iade modo deduci posse valores, ab omni dubio liberos; scilicet multiplicetur aequatio per dx , considerando x tanquam quantitatem variabilem, posteaque integretur aequatio cum additione debita constantis: hoc modo peruenitur ad hanc aliam aequationem $x - xx + x^2 - x^3 + x^4 - \text{etc.} = \frac{x}{1+x}$, quae cum nondum clara sit in casu $x = 1$, poterit ulterius deprimi, si multiplicetur per $\frac{dx}{x}$, quo facto obtinebitur $dx - xdx + xx dx - x^2 dx + x^3 dx - \text{etc.} = \frac{dx}{1+x}$, cuius integralis dat $x - \frac{1}{2}xx + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{5}x^5 - \text{etc.} = \log. 1 + x$. Iam vero ista aequatio nulli porro controuersiae subiecta est cum sumitur $x = 1$: ergo etiam antecedentes aequationes, ex quibus legitime deducta fuit postrema, peculiari suo iure veris erunt annumerandae.

§. 6. In prima nostra serie simplicissima (A) $1 - 1 + 1 - 1 + 1 - \text{etc.}$ quacuis periodus ex duobus saltem terminis constat, post quos series eadem refurgit; consideremus iam series periodicas trium terminorum, atque constanter tales ut summa terminorum pro quauis periodo sit $= 0$, ad quam classem pertinent series sinuum aut cosinuum, quorum anguli formant progressionem arithmeticam. Sit, verbi gratia, series infinita (B) $1 - 1 + 0 + 1 - 1 + 0 + 1 - \text{etc.}$ cuius

cuius scilicet quaevis periodus constat ex tribus terminis 1, -1 et 0; haec series recurrens formatur si summa duorum quorumvis terminorum, se inuicem subsequentium sumatur sub signo contrario pro termino proxime sequente habetque, pro quocunque indice n , terminum generalem $\frac{1}{\sqrt{-1}} \left(\frac{-1 + \sqrt{-1}}{2} \right)^n - \frac{1}{\sqrt{-1}} \left(\frac{-1 - \sqrt{-1}}{2} \right)^n$. Pertinet quoque haec series ad seriem sinuum: sumatur nempe $\sin. 120^\circ + \sin. 2 \cdot 120^\circ + \sin. 3 \cdot 120^\circ + \sin. 4 \cdot 120^\circ + \text{etc.}$ atque singuli termini multiplicentur per $\frac{1}{\sqrt{-1}}$ atque sic formabitur rursus series proposita (B). Quaeritur nunc summa huius seriei (B): an summa eadem erit quae in serie (A), ideo quod singuli termini superabundantes in serie (B) sint nihilo aequales? minime erit eadem: vera enim aestimatio sic est formanda.

Cum numerus periodorum nihil ad summam faciat, omne quaestionis momentum in hoc consistet an series in eadem periodo abrumpatur vel a primo, vel a secundo vel a tertio periodi termino: in primo casu fit summa seriei (B) = 1: in duobus posterioribus fit = 0: quoniam autem singuli casus, si series infinita censetur, aequo inter se gaudent iure, ponenda erit summa = $\frac{1}{3}$ ad normam regulae fundamentalis in aestimanda forte, mutato autem solo ordine trium terminorum cuiusvis periodi, alia oritur summa; sic si, verbi gratia, formetur series (C) $1 + 0 - 1 + 1 + 0 - 1 + 1 + 0 - \text{etc.}$ habebimus duos casus pro summa 1 et vnum casum pro 0; vnde nunc summa facienda est = $\frac{1}{3}$.

78 DE SUMMATIONIBVS SERIERVM

§. 7. Vndecunque principium nostrum contemplerur, mirificum manifestat consensum. Addantur series (A) cuius summam inuenimus $= \frac{1}{2}$ et series (B) $= \frac{1}{2}$, oportet vt summa ab additione oriatur $= \frac{1}{2}$. Nempe oritur:

$$\begin{array}{r} \text{(A)} \quad 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - \text{etc.} = \frac{1}{2} \\ \text{(B)} \quad 1 - 1 + 0 + 1 - 1 + 0 + 1 - 1 + 0 + \text{etc.} = \frac{1}{2} \\ \hline \text{(A)} + \text{(B)} \quad 2 - 2 + 1 + 0 + 0 - 1 + 2 - 2 + 1 + \text{etc.} = \frac{1}{2} \end{array}$$

Notetur nunc aggregatum ex vtraque serie novam formare seriem recurrentem, in qua quaevis periodus constat ex sex terminis, post quos constanter eadem refurgit. Iam vero si series in primo periodi termino terminari censeatur, erit summa $= 2$; si in secundo fit summa $= 0$; si in tertio, erit summa $= 1$ eademque erit summa si in quarto vel in quinto termino series terminetur atque tandem summa erit $= 0$, si in ultimo periodi termino series abrupta putetur; sunt igitur duo casus, quibus summa fit $= 0$; dein tres casus, quibus fit $= 1$ et vnus casus, qui summam facit $= 2$; hinc docemur, ex lege probabilitatum, summam seriei $2 - 2 + 1 + 0 + 0 - 1 + 2 - 2 + 1 + \text{etc.}$ statuendam esse $= \frac{1}{2}$ plane vt providebatur.

Simili modo, si series (B) ab serie A subtrahatur, series noua sexti ordinis oritur, cuius singulae periodi constant ex terminis $0 - 0 + 1 - 2 + 2 - 1$ et cuius summa prouidetur $= \frac{1}{2}$. Reuera summa est vel 0 vel 0 vel 1 vel -1 vel 0, prouti series vel

vel in primo, vel in secundo, tertio, quarto, quinto vel sexto periodi termino abrumpi censeatur: igitur in tribus casibus fit summa seriei $= 0$, in duobus fit summa $= 1$ et in vnico casu $= -1$: ergo valor summae *in abstracto* statuendus $= \frac{1}{2}$.

Si lubeat insuper combinationem instituire inter series (A), (B) et (C), qualiscunque illa fuerit, noua inde proueniens series summam habebit principio nostro exacte conformem. Id quidem principium iam ante hos quadraginta annos, cum in contemplandis seriebus recurrentibus me occuparem, perspexeram, nunc autem in lucem ponere volui, vt inde genuina huiusmodi summationum interpretatio pateret, sine qua facile nubes pro Iunone accipi posset. Si concipiamus punctum aliquod fixum in linea recta et singulas summas possibiles repraesentemus per distantiam puncti a praefato puncto fixo, principium nostrum exhibet distantiam centri grauitatis, quae omnibus istis distantis conuenit. Quotcunque interim termini sibi inuicem addantur, summae reales nunquam conuergunt versus determinatum centrum grauitatis, sed potius circa illud a puncto ad punctum transiliunt: igitur huiusmodi series hoc nomine inutiles fiunt ad problemata physico-mechanica appropinquatione soluenda, nisi summa vnus cuiusuis periodi diminuatur, id quod mediante ipsa serie primitiua infinita, etiam si *incongruenti vera*, saepe fieri potest, vti in antecessum monui §. 5; vbi dixi quod posito $x = 1$ aequatio

$$1 - 2x + 3xx - 4x^3 + 5x^4 - \text{etc.} = \frac{1}{(1+x)^2}$$

equidem

equidem sit incongrue vera, sed quod tamen legitimo modo inde deducatur aequatio nulli dubio subiecta,

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \frac{1}{16} - \text{etc.} = \log 2.$$

Mihi quidem principium, de quo sermo est, antequam vllum vltius examen de illo instituerem fuit per se clarum, simul autem intelligo alios aliter sentire posse: quoniam autem demonstrationem directam principii non video, multiplici inductione argumentum stabiliendum esse censeo.

§. 8. Quod ad vnā quamvis seriei periodum attinet, potest illa ex quocunque imo innumeris composita esse terminis; fuerit primus periodi terminus a , summa ex duobus primis terminis b , summa ex tribus primis terminis c et sic porro donec periodus integra fuerit exhausta, sitque n numerus terminorum quamvis periodum formantium, principium nostrum dabit summam seriei recurrentis infinitae $= \frac{a + b + c + \text{etc.}}{n}$, si modo summa cuiusvis periodi integrae ponatur $= 0$ et quacunque methodo alia, series summata fuerit, nunquam summa ab isto valore differet, etiamsi summa non aliter quam incongrue vera sit nec vllam admittat series approximationem quantuscunque terminorum numerus aggregetur: Haec ideo notari merentur, quod omnes series sinuum atque consinuum, quorum anguli arithmeticam formant progressionem, perfecte pertineant ad series recurrentes de quibus hic sermonem facio: etsi enim in serie generaliter expressa nulla appareat periodus, apparebit tamen in quouis casu pecu-

peculiari; imo simplicissima series sinuum aut cosinum, omnes ordines in se comprehendit pro ratione, quam primus angulus habet ad quatuor rectos, siue semel siue quotiescunque sumtos.

§. 9. Si sumatur in circulo, unitatem pro radio habente arcus qualiscunque x , animaduertit Illust. de la Grange, quod sit series infinita

$$\cos. x + \cos. 2x + \cos. 3x + \cos. 4x + \cos. 5x + \text{etc.} = -\frac{1}{2}$$

siue aequalis $\cos. 60^\circ$. negative sumto. Hoc theorema inter incongrue vera pono, nec aliter interpretandum est, quam quod valor seriei medius sit inter omnes cuiusvis periodi valores reales possibiles. Iam vero apparet solam hanc seriem in se comprehendere omnes ordines serierum recurrentium: nam si quadrans circuli siue angulus rectus dicatur q et ponatur successive

$$x = 2q; x = \frac{1}{2}q; x = q; x = \frac{3}{2}q \text{ etc.}$$

obtinemus series recurrentes, quae sequuntur pro ordine secundo, tertio, quarto, sexto

$$-1 + 1) - 1 + 1 - 1 + 1 + \text{etc.}$$

$$-\frac{1}{2} - \frac{1}{2} + 1) - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} + 1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} + 1 - \text{etc.}$$

$$0 - 1 - 0 + 1) + 0 - 1 - 0 + 1 + 0 - 1 - \text{etc.}$$

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{2} - 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + 1) + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} - 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + 1 - \text{etc.}$$

Summa singularum harum serierum, pro regula §. 8. semper dabit valorem $-\frac{1}{2}$ plane ut indicat
Tom. XVI. Nou. Comm. L dicat

dicat ipsum theorema generale. Sic ultima series
pro sexto ordine summam habet

$$\frac{\frac{1}{3} + 0 - 1 - \frac{2}{3} - 1 + 0}{6} = -\frac{1}{2} :$$

vnde intelligimus, quemadmodum huiusmodi theore-
mata sint interpretanda et qualis inde vltus in soluen-
dis problematis sperari possit; nihil vnquam statuen-
dum, quod cum vera infiniti idea consistere nequeat.

§. 10. Si ex duabus pluribusue seriebus recurrentibus, additione terminorum analogorum, noua formetur series haec quoque recurrens erit, vt vidimus §. 7. Index autem ordinis pro noua serie semper erit minimus communis diuiduus omnium indicum, qui conueniunt ordinibus serierum ex quibus noua formata fuit. Sic aggregatum quatuor serierum numericarum in praecedente paragrapho expositarum et ad ordinem secundum, tertium, quartum et sextum pertinentium, seriem formabit recurrentem de ordine duodecimo, cuius summa, si in infinitum continuetur, necessario erit $= -2$ Id vero sequens confirmabit schema

$$-I+I)-I+I-I+I-I+I-I+I-I+I-I+I-I+I+\text{etc.}=-I$$

$$-\frac{1}{2}-\frac{1}{2}+1)-\frac{1}{2}-\frac{1}{2}+1-\frac{1}{2}-\frac{1}{2}+1-\frac{1}{2}-\frac{1}{2}+1-\frac{1}{2}-\frac{1}{2}+1-\text{etc.}=-\frac{1}{2}$$

$$0 - 1 - 0 + 1) + 0 - 1 - 0 + 1 + 0 - 1 - 0 + 1 + 0 - 1 - 0 + \text{etc.} = -\frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{2} - 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} - 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} - 1 - \text{etc.} = -\frac{1}{2}$$

$$\text{summa } (-1-1-1+1-1+2-1+1-1-1-1+4) - 1-1-1+\text{etc} = -2$$

Quae-

theorema, quod calculus vniuersaliter verum indicat, in aliquibus casibus falsum esse poterit? imo poterit, si casus isti eius sint indolis ac hic sunt. Paradoxum sic explico.

Notetur quod, si ponatur $x = 4nq + a$, theorema totam suam vim retineat, vtcunque parua fuerit quantitas a , sola enim nullitas eius absoluta excludenda est, quia scilicet in theoremate series consideratur non *relatiue* sed *absolute* infinita; Dico igitur non dari arcum a , qui vllam falsitatis suspicionem mouere possit; quicquid existit, si absolute infinities replicari ponatur, in infinitum transire potest. Ergo in arcu x non excluduntur arculi; excluduntur saltem puncta vere mathematica, quorum existentiam et positionem analysis abstracta indicare nequit. Sic methodus tangentium indicare non potest puncta regressuum (points de rebroussement) si quae sint in curua proposita, nec tamen propterea methodus tangentium infringitur aut vllius falsitatis argui potest. Sic igitur theorema, de quo agimus, valet de omni magnitudine arcus assumti x , a nihilo vsque ad finem integrae primae reuolutionis, ab initio secundae reuolutionis vsque ad finem, et sic de reuolutione quauis quoties liberit repetita; excipiuntur saltem puncta vere mathematica cuiusuis transitionis vna cum ipso puncto initiali.

§. 12. Praemissam vrgere explicationem volui, quia series infinitae sinuum atque cosinuum egregie illustrant abstrusissimum aequae ac vtilissimum argumentum de

de minimis chordarum vibrationibus. Disputatum diu est inter primos huius saeculi mathematicos, an singula chordae puncta ad quamcunque ab axe distantiam minimam deduci possint, ut vibrationes suas formient regulares, mihi autem nunc videtur id affirmari non posse, nisi per vibrationes minimas intelligantur vibrationes vere nullae; equidem et tunc ratio qualiscunque inter singulas applicatas concipi potest; reuera autem curvatura qualiscunque quaeritur in linea perfecte recta et motus vibratorius in quiete absoluta. Verum haec discussio nimis adhuc a proposito nostro remota est, quam ut illi in praesentia rerum insistam. Notetur autem dari progressionem sinuum atque cosinum innumeras, si diuersae coefficientes terminis seriei praefigantur, quarum aliae praefato incommodo subiectae sint aliae non sint. Caeterum theoremati, quod de progressionem cosinum infinita allegatum fuit, mutatis mutandis simile inquiram de progressionem sinuum, ideo quod maxime ad praesens institutum nostrum pertinet nec meminerim an ab aliis iam expositum fuerit, imo fortasse a me ipsomet.

§. 13. Proponatur ergo indaganda series infinita $\sin. x + \sin. 2x + \sin. 3x + \sin. 4x + \text{etc.}$ Dico summam huius seriei statuendam esse $= \frac{\frac{1}{2} \sin. x}{\sin. \text{vers. } x}$.
En demonstrationis summarium.

Pertinet series proposita ad series recurrentes secundi ordinis, cuius ambo indices sunt $2 \cos. x \text{ et } -1$,
L 3 sic

fic vt quiuus terminus sit aequalis termino praecedenti multiplicato per $2 \cos. x$ demto termino antepaecedente. Igitur, secundum theoriā serierum recurrentium, formanda est aequatio secundi ordinis

$$s s = 2 s \cos. x - 1,$$

cuius ambae radices sunt

$$s = \cos. x + \sqrt{(\cos. x - 1)} \text{ et } s = \cos. x - \sqrt{(\cos. x - 1)}$$

siue paullo contractius

$$s = \cos. x + \sin. x \sqrt{-1} \text{ et } s = \cos. x - \sin. x \sqrt{-1}.$$

Sic nunc, posito indice termini $= n$, in antecessum innotescit fore terminum generalem in serie proposita $= a(\cos. x + \sin. x \sqrt{-1})^n + b(\cos. x - \sin. x \sqrt{-1})^n$, vbi coefficientes a et b ex cognitis duobus primis seriei propositae terminis sunt determinandae vel compendiosius ex primo et ex eo qui primum praecederet quique foret $= 0$: hoc modo inuenitur $a = \frac{1}{2} \sqrt{-1}$ et $b = -\frac{1}{2} \sqrt{-1}$, ipseque tandem terminus

$$\text{generalis } \frac{(\cos. x + \sin. x \sqrt{-1})^n - (\cos. x - \sin. x \sqrt{-1})^n}{2 \sqrt{-1}}.$$

Hoc modo intelligitur, seriem propositam aggregatam esse ex duabus seriebus geometricis, quae summationem admittunt. Notetur autem hanc ipsam summationem pertinere ad theorematā incongruenter *vtā*. Sit igitur n numerus absolute infinitus, erit summa seriei geometricae, termino generali $(\cos. x + \sin. x \sqrt{-1})^n$ expressae, $= \frac{(\cos. x + \sin. x \sqrt{-1})^n}{1 - (\cos. x + \sin. x \sqrt{-1})}$, pariterque summa seriei geometricae, termino generali $(\cos. x - \sin. x \sqrt{-1})^n$ expressae, $= \frac{(\cos. x - \sin. x \sqrt{-1})^n}{1 - (\cos. x - \sin. x \sqrt{-1})}$. Exinde

inde sequitur, esse summam quaesitam seriei, proportionis infinitae $= \left[\frac{(\cos. x + \sin. x \sqrt{-1})}{1 - (\cos. x + \sin. x \sqrt{-1})} - \frac{(\cos. x - \sin. x \sqrt{-1})}{1 - (\cos. x - \sin. x \sqrt{-1})} \right]$
 $2 \sqrt{-1}$, quae, si recte reducta fuerit, abit in simplicem formulam $\frac{\sin. x}{2 - 2 \cos. x}$ siue $\frac{\frac{1}{2} \sin. x}{\sin. vers. x}$. Q.
 E. I.

§. 14. Patet ex praemissa solutione, series sinuum atque cosinum proprie pertinere ad secundum ordinem recurrentium, quia quivis terminus ex duobus praecedentibus formatur. Sed quod iam monui, numerus terminorum, post quos series numerica eadem recurrit, vnicè pendet a ratione quae intercedit inter arcum assumptum x et peripheriam circuli quod si ista ratio sit incommensurabilis, infiniti requiruntur termini pro vnica formanda periodo, simulque infinitae periodi supponi debent, ut valor seriei, quem modo determinauimus, locum habere possit. Licebit autem ordinem cuiusvis seriei numericae etiam determinare ex numero terminorum vnamquamvis periodum componentium. Ex istis notationibus facile erit mente concipere solutionem casus singularis, qui contradictionem manifestam atque maxime absurdam inuoluere prima fronte videtur.

§. 15. Ponamus $x = 0$; sic erit $\sin. x + \sin. 2x + \sin. 3x + \sin. 4x + \sin. 5x + \text{etc.} = 0$, quia quivis terminus est $= 0$: valor autem seriei, quem inuenimus §. 13. $\frac{\frac{1}{2} \sin. x}{\sin. vers. x}$ est infinitus. An quid absurdius

furdus, dicent aliqui, excogitari potest, quam ut eadem res simul sit nihilo aequalis simulque omni quantitate positiva assignabili maior? similem casum iam supra exposui. §. 11. Responsio iterum in eo consistit, ut distinguamus inter vere nihilum idemque absolutum et inter primum quantitatis nascentis elementum; In theoria nostra nihilum absolutum excluditur, quia non possunt tunc statui periodi infinitae numero, cum nec prima periodus vsquam terminari possit; ne quidem cogitatione; aliter vero se res habet, quamprimum nascens aliquod quantitatis elementum, etiamsi omni quantitate assignabili minus, arcu x inesse putamus, sic enim subito valor seriei a vero nihilo ad vere infinitum transilit. Dein crescente x statim enormiter decrescit series sinuum haecque plane evanescit cum sumitur $x = 2q$: tum vero crescente adhucdum arcu x , fit summa seriei negativa, tandemque, facto $x = 4q$, summa seriei prodit negative infinita. Superato hoc puncto series ab infinito negativo ad infinitum affirmativum transilit variationesque eadem perfecte recurrunt ac repetuntur in infinitum haec omnia ulteriori commentatione non indigna forent; dabitur fortasse occasio ut argumentum resumam. Nunc quidem non aliud constitui, quam ut veram summationum omnino insolitarum atque incongruarum interpretationem darem una cum usu quem permittunt simulque ostenderem perpetuum consensum inter summam, analytice pro serie infinita determinatam et inter summam mediam vicinioris periodi diuisam per numerum

merum terminorum quamvis periodum formantium
(conf. §. 8.) Igitur superest vt consensum etiam
ostendam aliquibus exemplis in serie sinuum §. 13.
generaliter summata.

§. 16. Inuenimus nempe generaliter

$$\sin. x + \sin. 2x + \sin. 3x + \sin. 4x + \sin. 5x + \text{etc.} = \frac{\frac{1}{2} \sin. x}{\sin. \text{vers} x}$$

ponatur $x = \frac{1}{2} q$ siue 120° . prodit series

$$\frac{1}{2} \sqrt{3} - \frac{1}{2} \sqrt{3} + 0 + \frac{1}{2} \sqrt{3} - \frac{1}{2} \sqrt{3} + \text{etc.} = \frac{1}{2} \sqrt{3}:$$

hic periodus quaeuis constat ex tribus terminis

$$\frac{1}{2} \sqrt{3} - \frac{1}{2} \sqrt{3} + 0$$

atque regula nostra paragraphi octauis indicat eandem
summam

$$= \frac{\frac{1}{2} \sqrt{3} + 0 + 0}{3} = \frac{1}{6} \sqrt{3}.$$

Sumatur porro $x = \frac{1}{2} q$ siue 45° . atque obti-
nebitur series

$$\sqrt{\frac{1}{2}} + 1 + \sqrt{\frac{1}{2}} + 0 - \sqrt{\frac{1}{2}} - 1 - \sqrt{\frac{1}{2}} - 0 + \sqrt{\frac{1}{2}} + 1 + \text{etc.} = \frac{\frac{1}{2} \sqrt{\frac{1}{2}}}{1 - \sqrt{\frac{1}{2}}}$$

Hic quaeuis periodus constat ex octo prioribus ter-
minis, quae ad legem nostram §. 8. facit summam
seriei

$$= \frac{\sqrt{\frac{1}{2}} + (1 + \sqrt{\frac{1}{2}}) + (1 + 2\sqrt{\frac{1}{2}}) + (1 + 2\sqrt{\frac{1}{2}}) + (1 + \sqrt{\frac{1}{2}}) + \sqrt{\frac{1}{2}} + 0 + 0}{8}$$

$$= \frac{8\sqrt{\frac{1}{2}} + 4}{8} = \sqrt{\frac{1}{2}} + \frac{1}{2} = \frac{\frac{1}{2} \sqrt{\frac{1}{2}}}{1 - \sqrt{\frac{1}{2}}}.$$

96 DE SVMM. SERIER. INCONGRVE VERIS.

Quando minus concinna est expressio finuum in quavis periodo occurrentium, in vsum vocare licebit tabulas finuum, quam operationem vnico illustrabo exemplo. Fuerit $x = \frac{1}{2}q$ siue $= 40^\circ$. Erit, ad legem §. 13, summa serici siue

$$\frac{\frac{1}{2} \sin. x}{\sin. vers. x} = \frac{0.3213938}{0.2339556} = 1.37373.$$

Iste vero idem valor obtinebitur vi regulæ paragrapho octauo expositæ, si ex tabulis finuum excerpantur successiue sinus 40° . 80° . 120° . 160° . 200° . 240° . 280° . 320° . et 360° . qui nempe sinus efformant terminos vniuscuiusvis periodi; quod si deinde successiue sumatur sinus primus, summa ex duobus sinubus primis, summa ex tribus sinubus primis et sic porro donec omnes fuerint exhausti atque hæc omnes summae sibi inuicem addantur idque aggregatum diuidatur per numerum finuum primitiuorum, reperitur

$$\frac{0.64278 + 1.62758 + 2.49160 + 3.23162 + 3.87160 + 4.42758 + 4.91978 + 5.35978}{9} = \frac{32.36154}{9} = 1.37373.$$

qui valor rursus idem est cum præcedente. Mirabilis profecto est iste consensus ideo potissimum, quod ambæ methodi nihil commune inter se habere prima fronte videantur; mihi saltem etiamnum mirabilis est quamuis iam diutissime detecta.

EVOLVTIO FORMVLAE INTEGRALIS

$$\int x^{f-1} dx (1-x)^{\frac{n}{2}}$$

INTEGRATIONE A VALORE $x=0$ AD
 $x=1$ EXTENSA.

Auctore

L. E V L E R O.

Theorema 1.

1.

Si n denotat numerum integrum positium quemcunque et formulae $\int x^{f-1} dx (1-x^2)^n$ integratio a valore $x=0$ vsque ad $x=1$ extendatur, erit eius valor:

$$= \frac{2^n}{f \cdot (f+g) \cdot (f+2g) \cdot (f+3g) \cdot \dots \cdot (f+ng)};$$

Demonstratio.

Notum est in genere integrationem formulae $\int x^{f-1} dx (1-x^2)^n$ reduci posse ad integrationem huius $\int x^{f-1} dx (1-x^2)^{n-1}$ quoniam quantitates constantes A et B ita definire licet, vt fiat

$$\int x^{f-1} dx (1-x^2)^n = A \int x^{f-1} dx (1-x^2)^{n-1} + B x^f (1-x^2)^n$$

M 2 sumtis

sumtis enim differentialibus prodit haec aequatio :

$$x^{f-1} dx (1-x^g)^m = A x^{f-1} dx (1-x^g)^{m-1} + B f x^{f-1} dx (1-x^g)^m \\ - B m g x^{f+g-1} dx (1-x^g)^{m-1}$$

quae per $x^{f-1} dx (1-x^g)^{m-1}$ diuisa dat :

$$1 - x^g = A + B f (1 - x^g) - B m g x^g \text{ seu}$$

$$1 - x^g = A - B m g + B (f + m g) (1 - x^g)$$

quae aequatio vt consistere possit, necesse est sit

$$1 = B (f + m g) \text{ et } A = B m g$$

unde colligimus, $B = \frac{1}{f + m g}$ et $A = \frac{m g}{f + m g}$.

Quocirca habebimus sequentem reductionem generalem :

$$f x^{f-1} dx (1 - x^g)^m = \frac{m g}{f + m g} f x^{f-1} dx (1 - x^g)^{m-1} \\ + \frac{1}{f + m g} x^f (1 - x^g)^m$$

quae cum euanescat posito $x=0$, siquidem sit $f > 0$, constantis additione haud est opus. Quare extenso utroque integrali vsque ad $x=1$, pars integralis postrema sponte euanescit, eritque pro casu $x=1$.

$$f x^{f-1} dx (1 - x^g)^m = \frac{m g}{f + m g} f x^{f-1} dx (1 - x^g)^{m-1}$$

Cum igitur sumto $m=1$ sit $f x^{f-1} dx (1 - x^g)^0 = f x^f$, posito $x=1$, nanciscimur pro eodem casu $x=1$ sequentes valores :

$$f x^{f-1} dx (1 - x^g) = \frac{g}{f} \cdot \frac{1}{f+g}$$

$$f x^{f-1} dx (1 - x^g)^2 = \frac{g^2}{f} \cdot \frac{1}{f+g} \cdot \frac{2}{f+2g}$$

$$f x^{f-1} dx (1 - x^g)^3 = \frac{g^3}{f} \cdot \frac{1}{f+g} \cdot \frac{2}{f+2g} \cdot \frac{3}{f+3g}$$

hinc

hincque pro numero quocunque integro positivo n concludimus fore

$$\int x^{f-1} dx (1-x^g)^n = \frac{g^n}{f} \cdot \frac{1}{f+g} \cdot \frac{2}{f+2g} \cdot \frac{3}{f+3g} \cdots \frac{n}{f+ng}$$

si modo numeri f et g sint positivi.

Coroll. 1.

2. Hinc ergo vicinim valor huiusmodi producti ex quocunque factoribus formati, per formulam integram exprimi potest, ita ut sit

$$\frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n}{(f+g)(f+2g)(f+3g)\cdots(f+ng)} = \frac{f}{g^n} \int x^{f-1} dx (1-x^g)^n$$

integrali hoc a valore $x=0$ usque ad $x=1$ extenso.

Coroll. 2.

3. Quodsi ergo huiusmodi habeatur progressio:

$$\frac{1}{f+g}; \frac{1 \cdot 2}{(f+g)(f+2g)}; \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{(f+g)(f+2g)(f+3g)}; \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4}{(f+g)(f+2g)(f+3g)(f+4g)}; \text{ etc.}$$

eius terminus generalis qui indici indefinito n con-

venit commode hac forma integrali $\frac{f}{g^n} \int x^{f-1} dx (1-x^g)^n$

repraesentatur, cuius ope ea progressio interpolari, eiusque termini indicibus fractis respondentes exhiberi poterunt.

Coroll. 3.

4. Si loco n scribamus $n-1$, habebimus:

M 3

$$\frac{1}{(f+g)}$$

$$\begin{array}{ccccccc} 1. & 2. & 3. & \dots & (n-1) & & f \\ (f+g)(f+2g)(f+3g) \dots (f+(n-1)g) & = & g^{n-1} & \int x^{f-1} dx (1-x^g)^{n-1} \\ & \text{quae per } \frac{1}{f+ng} & \text{multiplicata praebet} & & & & \\ 1. & 2. & 3. & \dots & n & & f \cdot ng \\ (f+g)(f+2g)(f+3g) \dots (f+ng) & = & g^n (f+ng) & \int x^{f-1} dx (1-x^g)^{n-1} \end{array}$$

Scholion I.

5. Hanc posteriorem formam immediate ex praecedente deriuare licuisset, cum modo demonstraverimus esse:

$$\int x^{f-1} dx (1-x^g)^n = \frac{1}{f+ng} \int x^{f-1} dx (1-x^g)^{n-1}$$

liquidem vtrumque integrale a valore $x=0$ vsque ad $x=1$ extendatur; quam integralium determinationem in sequentibus vbique subintelligi oportet. Deinde etiam perpetuo est tenendum, quantitates f et g esse positivas, quippe quam conditionem demonstratio allata absolute postulat. Quod autem ad numerum n attinet, quatenus eo index cuiusque termini progressionis (q. 3.) designatur, nihil impedit, quominus eo numeri quicunque siuepositiui siue negatiui denotentur, quandoquidem eius progressionis omnes termini etiam indicibus negatiuis respondent per formulam integram datam exhiberi censentur. Interim tamen probe tenendum est hanc reductionem

$$\int x^{f-1} dx (1-x^g)^m = \frac{m}{f+mg} \int x^{f-1} dx (1-x^g)^{m-1}$$

non esse veritati consentaneam, nisi sit $m > 0$; quia
alioquin

alioquin pars algebraica $\frac{1}{f+ng} x^f (1-x^g)^n$ non evanesceret: posito $x = 1$.

Scholion 2.

6. Huiusmodi series, quas transcendentes appellare licet, quia termini indicibus fractis respondentes sunt quantitates transcendentes, iam olim in Comment. Petrop. Tomo VI fufius sum profecutus; vnde hoc loco non tam istas progressionem, quam eximias formularum integralium comparationes, quae inde deriuntur, diligentius sum scrutaturus. Cum scilicet ostendissem huius producti indefiniti $1.2.3...n$ valorem hac formula integrali $\int dx (1/x)^n$ ab $x = 0$ ad $x = 1$ extensa exprimi, quae res quoties n est numerus integer positivus per ipsam integrationem est manifesta. eos casus examini subieci, quibus pro n numeri fracti accipiuntur; vbi quidem ex ipsa formula integrali neutiquam patet, ad quodnam genus quantitatum transcendentium hi termini referri debeant. Singulari autem artificio eosdem terminos ad quadraturas magis cognitae reduxi, quod propterea maxime dignum videtur, ut maiori studio perpendatur.

Problema 1.

7. Cum demonstratum sit esse:

$$\frac{1.2.3\dots n}{(f+g)(f+2g)(f+3g)\dots(f+ng)} = \frac{f}{g^n} x^{f-1} dx (1-x^g)^n$$

inte-

integrali ab $x=0$ ad $x=1$ extenſo; eiusdem producti caſu quo $g=0$ valorem, per formulam integram assignare,

Solutio.

Posito $g=0$ in formula integrali membrum $(1-x^5)^n$ euaneſcit, ſimul vero etiam denominator g^n , unde quaestio huc redit ut fractionis $\frac{(1-x^5)^n}{g^n}$ valor definiatur caſu $g=0$, quo tam numerator quam denominator euaneſcit. Hunc in ſinem ſpectetur g vt quantitas infinite parua, et cum ſit $x^5=e^{5lx}$ fiet $x^5=1+g/x$ ideoque $(1-x^5)^n=g^n(-1/x)^n=g^n(h_x)^n$; ex quo pro hoc caſu formula noſtra integralis abit in $\int f x^{f-1} dx (h_x)^n$ ita vt iam habeatur

$$\frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n}{f^n} = \int f x^{f-1} dx (h_x)^n$$

$$\text{ſeu } 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n = f^n + \int f x^{f-1} dx (h_x)^n.$$

Coroll. 1.

8. Quoties n eſt numerus integer poſitiuus, integratio formulae $\int x^{f-1} dx (h_x)^n$ ſuccedit, eaque ab $x=0$ ad $x=1$ extenſa reuera prodit id productum, cui iſtam formulam aequalem inuenimus. Sin autem pro n capiantur numeri fracti eadem formula integralis inferuiet huic progressioni hypergeometricae interpolandae:

1; 1.2; 1.2.3; 1.2.3.4; 1.2.3.4.5; etc.

ſeu 1; 2; 6; 24; 120; 720; 5040; etc.

Coroll.

Coroll. 2.

9. Si expressio modo inventa per principalem diuidatur, oriatur productum, cuius factores in progressionē arithmetica quacunq̃ue progrediuntur:

$$(f+g)(f+2g)(f+3g)\dots(f+ng)=f^n g^n \cdot \frac{\int x^{f-1} dx (l \frac{1}{x})^n}{\int x^{f-1} dx (1-x^g)^n}$$

cuius ergo etiam valores, si n sit numerus fractus hinc assignare licebit,

Coroll. 3.

10. Cum sit

$$\int x^{f-1} dx (1-x^g)^n = \frac{n g^{n-1}}{f+n g} \int x^{f-1} dx (1-x^g)^{n-1}$$

erit etiam simili modo pro casu $g=0$.

$$\int x^{f-1} dx (l \frac{1}{x})^n = \frac{n}{f} \int x^{f-1} dx (l \frac{1}{x})^{n-1}$$

hincque per istas alteras formulas integrales;

$$1. 2. 3. \dots n = n f^n \int x^{f-1} dx (l \frac{1}{x})^{n-1} \text{ et}$$

$$(f+g)(f+2g)\dots(f+ng)=f^{n-1} g^{n-1} (f+ng) \cdot \frac{\int x^{f-1} dx (l \frac{1}{x})^{n-1}}{\int x^{f-1} dx (1-x^g)^{n-1}}$$

Scholion.

11. Cum inuenerimus esse:

$$1. 2. 3. \dots n = f^{n+1} \int x^{f-1} dx (l \frac{1}{x})^n$$

patet hanc formulam integram non a valore quantitatis f pendere, quod etiam facile perspicitur ponendo $x^f = y$, unde fit $f x^{f-1} dx = dy$, et $l \frac{1}{x} =$

Tom. XVI. Nou. Comm.

N

-/x

$-lx = -\frac{1}{2}ly = \frac{1}{2}l\frac{1}{2}$, ideoque $f^n(l\frac{1}{2})^n = (l\frac{1}{2})^n$, ita
vt sit

$$1. \ 2. \ 3. \ \dots \ n = fdy(l\frac{1}{2})^n$$

quae formula ex priori nascitur ponendo $f=1$. Pro interpolatione ergo huiusmodi formarum totum negotium huc reducitur, vt istius formulae integralis $\int dx(l\frac{1}{2})^n$ valores definiantur, quando exponent n est numerus fractus. Veluti si n sit $=\frac{1}{2}$, assignari oportet valorem huius formulae $\int dx \sqrt{l\frac{1}{2}}$, quem olim iam ostendi esse $=\frac{1}{2}\sqrt{\pi}$ denotante π circuli peripheriam cuius diameter $=1$: pro aliis autem numeris fractis eius valorem ad quadraturas curuarum algebraicarum altioris ordinis reuocare docui. Quae reductio cum minimè sit obuia, atque tum solum locum habeat, quando formulae $\int dx(l\frac{1}{2})^n$ integratio a valore $x=0$ ad $x=1$ extenditur, singulari attentione digna videtur. Etsi autem iam olim hoc argumentum tractaui, tamen quia per plures ambages eo sum perductus, idem hic resumere et concinnius euoluere constitui.

Theorema 2.

12. Si formulae integrales a valore $x=0$ vsque ad $x=1$ extendantur et n denotet numerum integrum positium erit:

$$\frac{1. \ 2. \ 3. \ \dots \ n}{(n+1)(n+2)(n+3) \dots 2n} = \int_0^1 g x^{f+n-1} dx (1-x^g)^{n-1} \cdot \frac{\int_0^1 x^{f-1} dx (1-x^g)^{n-1}}{\int_0^1 x^{f-1} dx (1-x^g)^{n-2}}$$

quicunque numeri positiui loco f et g accipiantur.

Demon-

Demonstratio.

Cum supra (§. 4.) ostenderimus esse:

$$\frac{1. \quad 2. \quad 3. \dots n}{(f+g)(f+2g)\dots(f+ng)} = \frac{f \cdot ng}{g^n(f+ng)} \int x^{f-1} dx (1-x^g)^{n-1}$$

habebimus si loco n scribamus $2n$

$$\frac{1. \quad 2. \quad 3. \dots 2n}{(f+g)(f+2g)\dots(f+2ng)} = \frac{f \cdot 2ng}{g^{2n}(f+2ng)} \int x^{f-1} dx (1-x^g)^{2n-1}$$

Dividatur nunc prima aequatio per secundam, ac prodibit ista tertia:

$$\frac{(f+(n+1)g)(f+(n+2)g)\dots(f+2ng)}{(n+1)(n+2)\dots 2n} = \frac{g^n(f+2ng)}{2(f+ng)} \frac{\int x^{f-1} dx (1-x^g)^{n-1}}{\int x^{f-1} dx (1-x^g)^{2n-1}}$$

At si in prima aequatione loco f scribatur $f+ng$, orietur haec aequatio quarta:

$$\frac{1. \quad 2. \quad 3. \dots n}{(f+(n+1)g)(f+(n+2)g)\dots(f+2ng)} = \frac{(f+ng)ng}{g^n(f+2ng)} \int x^{f+ng-1} dx (1-x^g)^{n-1}$$

Multiplicetur haec quarta aequatio per illam tertiam ac reperietur ipsa aequatio demonstranda:

$$\frac{1. \quad 2. \quad 3. \dots n}{(n+1)(n+2)(n+3)\dots 2n} = \frac{1}{n} ng \int x^{f+ng-1} dx (1-x^g)^{n-1} \cdot \frac{\int x^{f-1} dx (1-x^g)^{n-1}}{\int x^{f-1} dx (1-x^g)^{2n-1}}$$

Coroll. I.

13. Si in prima aequatione statuatur $f=n$ et $g=1$ orietur idem productum:

$$\frac{1. \quad 2. \quad 3. \dots n}{(n+1)(n+2)\dots 2n} = \frac{1}{n} n \int x^{n-1} dx (1-x)^{n-1}$$

N a

qua

qua aequatione cum illa collata adipiscimur:

$$\frac{f x^{n-1} d x (1-x^e)^{n-1}}{g f x^{f+g-1} d x (1-x^e)^{n-1}} = \frac{f x^{f-1} d x (1-x^e)^{n-1}}{f x^{f-1} d x (1-x^e)^{n-1}}$$

Coroll. 2.

14. Si in illa aequatione loco x scribamus x^e , fiet

$$\frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots n}{(n+1)(n+2) \dots 2n} = n g f x^{n-1} d x (1-x^e)^{n-1}$$

ita ut iam consequamur istam comparationem inter sequentes formulas integrales:

$$f x^{n-1} d x (1-x^e)^{n-1} = f x^{f+g-1} d x (1-x^e)^{n-1} \cdot \frac{f x^{f-1} d x (1-x^e)^{n-1}}{f x^{f-1} d x (1-x^e)^{n-1}}$$

Coroll. 3.

15. Si in aequatione theorematidis ponamus $g=0$ ob $(1-x^e)^m = g^m (1/x^e)^m$, potestates ipsius g se destruent orieturque haec aequatio:

$$\frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots n}{(n+1)(n+2) \dots 2n} = n f x^{f-1} d x (1/x^e)^{n-1} \cdot \frac{f x^{f-1} d x (1/x^e)^{n-1}}{f x^{f-1} d x (1/x^e)^{n-1}}$$

unde colligimus

$$\frac{(f x^{f-1} d x (1/x^e)^{n-1})^2}{f x^{f-1} d x (1/x^e)^{n-1}} = g f x^{n-1} d x (1-x^e)^{n-1}$$

seu ob

$$f x^{f-1} d x (1/x^e)^{n-1} = \frac{f}{n} f x^{f-1} d x (1/x^e)^n \text{ hanc}$$

$$\frac{2 f \cdot (f x^{f-1} d x (1/x^e)^n)}{n \cdot f x^{f-1} d x (1/x^e)^n} = g f x^{n-1} d x (1-x^e)^{n-1}$$

Coroll.

Coroll. 4.

16. Ponamus hic $f=1$, $g=2$ et $n=\frac{m}{2}$ ut
 m sit numerus integer positivus, et ob $\int dx (1-x)^m$
 $= 1. 2. 3 \dots m$ erit

$$\frac{4}{m} \frac{(f dx (1-x)^{\frac{m}{2}})^2}{1. 2. 3 \dots m} = 2 \int x^{m-1} dx (1-x)^{\frac{m}{2}-1}$$

hincque

$$\int dx (1-x)^{\frac{m}{2}} = \frac{1}{1. 2. 3 \dots m} \int x^{m-1} dx (1-x)^{\frac{m}{2}-1}$$

et sumendo $m=1$ ob $\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{\pi}{2}$ habebitur

$$\int dx \sqrt{1-x^2} = \frac{1}{2} \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{1}{2} \sqrt{\pi}.$$

Scholion.

17. En ergo succinctam demonstrationem theore-
 matis olim a me prolati, quod sit $\int dx \sqrt{1-x^2} = \frac{1}{2} \sqrt{\pi}$,
 eamque, ab interpolationis ratione, qua tum usus
 fueram, libera. Deducta scilicet hic ea ex hoc
 theoremate quo inveni esse:

$$\frac{(f x^{f-1} dx (1-x)^{n-1})^2}{f x^{f-1} dx (1-x)^{n-1}} = g \int x^{g-1} dx (1-x)^{n-1}$$

Principale autem theorema, unde hoc est deductum
 in se habet

$$\frac{\int x^{f-1} dx (1-x^g)^{n-1} \cdot \int x^{f+g-1} dx (1-x^g)^{n-1}}{\int x^{f-1} dx (1-x^g)^{n-1}} = \int x^{g-1} dx (1-x)^{n-1}$$

utrumque enim membrum per integrationem ab $x=0$ ad $x=1$ extensam euoluitur in hoc productum numericum:

$$\frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots (n-1)}{(n+1)(n+2) \dots (2n-1)}$$

Ac si alteri membro speciem latius patentem tribuere velimus, theorema ita proponi poterit ut sit:

$$g \cdot \frac{f x^{f-1} dx (1-x^g)^{n-1} \cdot f x^{f+n g-1} dx (1-x^g)^{n-1}}{f x^{f-1} dx (1-x^g)^{n-1}} = k f x^{n k-1} dx (1-x^k)^{n-1}$$

hicque si capiatur $g=0$, fit

$$\frac{(f x^{f-1} dx (1/x)^{n-1})^2}{f x^{f-1} dx (1/x)^{n-1}} = k f x^{n k-1} dx (1-x^k)^{n-1}.$$

Imprimis igitur notandum est, quod illa aequalitas subsistat, quicumque numeri loco f et g accipiantur: casu quidem $f=g$, ea est manifesta, cum sit

$$f x^{f-1} dx (1-x^g)^{n-1} = \frac{1-(1-x^g)^n}{n g} = \frac{1}{n g}$$

fiet enim

$$g f x^{n g-1} dx (1-x^g)^{n-1} = k f x^{n k-1} dx (1-x^k)^{n-1}$$

et quia

$$f x^{n g-1} dx (1-x^g)^{n-1} = \frac{1}{n} f x^{n g-1} dx (1-x^g)^{n-1},$$

aequalitas est perspicua, quia k pro lubitu accipere licet. Eodem autem modo, quo ad hoc theorema perueni, ad alia similia pertingere licet.

Theo-

Theorema. 3.

18. Si sequentes formulae integrales a valore $x=0$ ad $x=1$ extendantur et n denotet numerum integrum positivum quemcunque, erit

$$\frac{1. \quad 2. \quad 3. \dots n}{(2n+1)(2n+2) \dots 3n} = \frac{1}{n} g \int x^{f+2ng-1} dx (1-x^g)^{n-1}.$$

$$\frac{\int x^{f-1} dx (1-x^g)^{n-1}}{\int x^{f-1} dx (1-x^g)^{n-1}}$$

quicumque numeri positivi pro f et g accipiantur.

Demonstratio.

In praecedente Theoremate iam vidimus esse:

$$\frac{1. \quad 2. \quad 3. \dots 2n}{(f+g)(f+2g) \dots (f+2ng)} = \frac{f \cdot 2ng}{g^{2n}(f+2ng)} \int x^{f-1} dx (1-x^g)^{n-1}$$

simili autem modo, si in forma principali loco n scribamus $3n$ habebimus:

$$\frac{1. \quad 2. \quad 3. \dots 3n}{(f+g)(f+2g) \dots (f+3ng)} = \frac{f \cdot 3ng}{g^{3n}(f+3ng)} \int x^{f-1} dx (1-x^g)^{n-1}$$

ex quo illa aequatio per hanc divisa producit:

$$\frac{(f+(2n+1)g)(f+(2n+2)g) \dots (f+3ng)}{(2n+1)(2n+2) \dots 3n} = \frac{2g^n(f+3ng)}{3(f+2ng)}.$$

$$\frac{\int x^{f-1} dx (1-x^g)^{n-1}}{\int x^{f-1} dx (1-x^g)^{n-1}}$$

Verum si in aequatione principali (§. 4.) loco f scribamus $f+2gn$ adipiscimur hanc aequationem:

$$\frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n}{(f+(2n+1)g)(f+(2n+2)g)\cdots(f+3ng)} = \frac{(f+2ng) \cdot ng}{g^n (f+3ng)} \cdot \frac{f x^{f+2ng-1} dx (1-x^g)^{n-1}}{f x^{f+ng-1} dx (1-x^g)^{n-1}}.$$

Multiplicetur nunc haec aequatio per praecedentem, et orietur ipsa aequatio, quam demonstrari oportet:

$$\frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n}{(2n+1)(2n+2)\cdots 3 \cdot n} = \frac{1}{2} ng \cdot \frac{f x^{f+2ng-1} dx (1-x^g)^{n-1}}{f x^{f+ng-1} dx (1-x^g)^{n-1}}.$$

Coroll. 1.

18. Eundem valorem ex aequatione principali nanciscimur ponendo $f = 2n$ et $g = 1$, ita ut sit:

$$\frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n}{(2n+1)(2n+2)\cdots 3 \cdot n} = \frac{1}{2} n f x^{f+n-1} dx (1-x)^{n-1}$$

quae formula integralis loco x scribendo x^k transformatur in hanc $\frac{1}{2} n k f x^{f+nk-1} dx (1-x^k)^{n-1}$, ita ut sit

$$\frac{f x^{f+2ng-1} dx (1-x^g)^{n-1}}{f x^{f+ng-1} dx (1-x^g)^{n-1}} = \frac{f x^{f-1} dx (1-x^g)^{n-1}}{f x^{f-1} dx (1-x^g)^{n-1}} = k f x^{f+nk-1} dx (1-x^k)^{n-1}.$$

Coroll. 2.

20. Si hic statuamus $g = 0$, ob $1 - x^g = g \frac{h}{x}$ habebimus hanc aequationem:

$$\frac{f x^{f-1} dx (\frac{h}{x})^{n-1}}{f x^{f-1} dx (\frac{h}{x})^{n-1}} = k f x^{f+nk-1} dx (1-x^k)^{n-1}$$

cum

cum

cum igitur ante inuenissemus

$$\frac{f x^j - d x (h_x)^{n-1}}{f x^{j-1} - d x (h_x)^{n-1}} = k f x^{n-k-1} d x (1-x^2)^{n-1}$$

habebimus has aequationes in se multiplicando:

$$\frac{(f x^j - d x (h_x)^{n-1})^2}{f x^{j-1} - d x (h_x)^{n-1}} = k^2 f x^{n-k-1} d x (1-x^2)^{n-1} \cdot f x^{n-k-1} d x (1-x^2)^{n-1}$$

Coroll. 3.

21. Sine ulla restrictione hic ponere licet $f=x$; tum ergo sumto $n=\frac{1}{2}$ et $k=3$ erit

$$\frac{(f d x (h_x)^{-\frac{1}{2}})^2}{f d x (h_x)^{-\frac{1}{2}}} = 9 f d x (1-x^2)^{-\frac{1}{2}} \cdot f x d x (1-x^2)^{-\frac{1}{2}}$$

et ob $f d x (h_x)^{-\frac{1}{2}} = 3 f d x (h_x)^{\frac{1}{2}}$ et $f d x (h_x)^{\frac{1}{2}} = 1$,

$$(f d x (h_x)^{\frac{1}{2}})^2 = f d x (1-x^2)^{-\frac{1}{2}} \cdot f x d x (1-x^2)^{-\frac{1}{2}}$$

tum vero sumto $n=\frac{3}{2}$ et $k=3$ erit

$$\frac{(f d x (h_x)^{-\frac{3}{2}})^2}{f d x (h_x)^{-\frac{3}{2}}} = 9 f x d x (1-x^2)^{-\frac{1}{2}} \cdot f x^3 d x (1-x^2)^{-\frac{1}{2}}$$

$$\text{feu } (f d x (h_x)^{\frac{3}{2}})^2 = 4 f x d x (1-x^2)^{-\frac{1}{2}} \cdot f x^3 d x (1-x^2)^{-\frac{1}{2}}$$

Theorema generale.

22. Si sequentes formulae integrales a valore $x=0$ vsque ad $x=1$ extendantur et n denotet numerum integrum positium quemcunque, erit

$$\frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots n}{(\lambda n + 1)(\lambda n + 2) \dots (\lambda n + n)} = \frac{\lambda}{\lambda + 1} \frac{ng f x^{f+\lambda ng-1} dx (1-x^g)^{n-1}}{\int x^{f-1} dx (1-x^g)^{\lambda n-1}}$$

quicumque numeri positiui pro litteris f et g accipiantur.

Demonstratio.

Cum sit uti supra ostendimus:

$$\frac{1 \cdot 2 \dots n}{(f+g)(f+2g) \dots (f+ng)} = \frac{f \cdot ng}{g^n (f+ng)} \frac{\int x^{f-1} dx (1-x^g)^{n-1}}{\int x^{f-1} dx (1-x^g)^{\lambda n-1}}$$

si hic loco n scribamus primo λn tum vero $(\lambda + 1)n$ nanciscemur has duas aequationes

$$\frac{1 \cdot 2 \dots \lambda n}{(f+g)(f+2g) \dots (f+\lambda ng)} = \frac{f \cdot \lambda ng}{g^{\lambda n} (f+\lambda ng)} \frac{\int x^{f-1} dx (1-x^g)^{\lambda n-1}}{\int x^{f-1} dx (1-x^g)^{(\lambda+1)n-1}}$$

$$\frac{1 \cdot 2 \dots (\lambda + 1)n}{(f+g)(f+2g) \dots (f+(\lambda + 1)ng)} = \frac{f \cdot (\lambda + 1)ng}{g^{(\lambda+1)n} (f+(\lambda + 1)ng)} \frac{\int x^{f-1} dx (1-x^g)^{(\lambda+1)n-1}}{\int x^{f-1} dx (1-x^g)^{(\lambda+1)n-1}}$$

quarum illa per hanc diuisa praebet:

$$\frac{(f+\lambda ng+g)(f+\lambda ng+2g) \dots (f+\lambda ng+ng)}{(\lambda n+1)(\lambda n+2) \dots (\lambda n+n)} = \frac{\lambda (f+\lambda ng+ng)}{(\lambda+1)(f+\lambda ng)} \frac{\int x^{f-1} dx (1-x^g)^{\lambda n-1}}{\int x^{f-1} dx (1-x^g)^{(\lambda+1)n-1}}$$

At si in aequatione prima loco f scribamus $f+\lambda ng$ obtinebimus:

$$\frac{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n}{(f+\lambda ng+g)(f+\lambda ng+2g)\dots(f+\lambda ng+ng)} = \frac{(f+\lambda ng)ng}{g^n(f+\lambda ng+ng)} \\ \int x^{f+\lambda n-1} dx (1-x^g)^{n-1}$$

quae duae aequationes in se ductae producunt ipsam aequalitatem demonstrandam:

$$\frac{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n}{(\lambda n+1)(\lambda n+2)\dots(\lambda n+n)} = \frac{\lambda ng}{\lambda+1} \int x^{f+\lambda ng-1} dx (1-x^g)^{n-1} \\ \frac{\int x^{f-1} dx (1-x^g)^{\lambda n-1}}{\int x^{f-1} dx (1-x^g)^{(\lambda+1)n-1}}$$

Coroll. 1.

23. Si in aequatione principali statuamus $f = \lambda n$ et $g = 1$ reperiemus etiam:

$$\frac{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n}{(\lambda n+1)(\lambda n+2)\dots(\lambda n+n)} = \frac{\lambda n}{\lambda+1} \int x^{\lambda n-1} dx (1-x)^{n-1}$$

quae forma loco x scribendo x^k abit in hanc:

$$\frac{\lambda n k}{\lambda+1} \int x^{\lambda n k-1} dx (1-x^k)^{n-1}$$

ita ut habeamus hoc theorema latissime patens:

$$g \int x^{f+\lambda n-1} dx (1-x^g)^{n-1} \cdot \frac{\int x^{f-1} dx (1-x^g)^{\lambda n-1}}{\int x^{f-1} dx (1-x^g)^{(\lambda+1)n-1}} \\ = k \int x^{\lambda n k-1} dx (1-x^k)^{n-1}.$$

Coroll. 2.

24. Hoc iam theorema locum habet, etiam si non sit numerus integer, quin etiam cum nume-

O 2

rum

rum λ pro lubitu accipere liceat, loco λn scribamus m , et perueniemus ad hoc theorema:

$$\frac{\int x^{f-1} dx (1-x^g)^{m-1}}{\int x^{f-1} dx (1-x^g)^{m+n-1}} = \frac{k \int x^{m-k-1} dx (1-x^g)^{n-1}}{g \int x^{f+mg-1} dx (1-x^g)^{n-1}}$$

Coroll. 3.

25. Si ponamus $g=0$; ob $1-x^g = g \frac{1}{x}$, hoc theorema istam inducit formam:

$$\frac{\int x^{f-1} dx (\frac{1}{x})^{m-1}}{\int x^{f-1} dx (\frac{1}{x})^{m+n-1}} = \frac{k \int x^{m-k-1} dx (1-x^k)^{n-1}}{\int x^{f-1} dx (\frac{1}{x})^{n-1}}$$

quae commodius ita repraesentatur:

$$\frac{\int x^{f-1} dx (\frac{1}{x})^{m-1} \cdot \int x^{f-1} dx (\frac{1}{x})^{n-1}}{\int x^{f-1} dx (\frac{1}{x})^{m+n-1}} = k \int x^{m-k-1} dx (1-x^k)^{n-1}$$

vbi evidens est numeros m et n inter se permutari posse.

Scholion.

26. Duplicem ergo deteximus fontem, unde innumerabiles formularum integralium comparationes haurire licet; alter fons §. 24. patefactus complectitur huiusmodi formulas integrales

$$\int x^{p-1} dx (1-x^q)^{r-1},$$

quas iam ante aliquod tempus petraetaui in observationibus circa integralia formularum

$$\int x^{p-1} dx (1-x^q)^{\frac{q}{p}-1} = 1$$

an. 177

2 (1)

4 V2-

à valore $x=0$ vsque ad $x=1$ extensa, vbi ostendi primo litteras p et q inter se permutari posse, vt sit

$$\int x^{p-1} dx (1-x^q)^{\frac{q}{p}-1} = \int x^{q-1} dx (1-x^p)^{\frac{p}{q}-1}$$

tum vero etiam esse

$$\int \frac{x^{p-1} dx}{(1-x^q)^{\frac{q}{p}}} = \frac{\pi}{n \sin \frac{\pi}{n}}$$

imprimis autem demonstrari esse:

$$\int \frac{x^{p-1} dx}{\sqrt[n]{(1-x^q)^{n-1}}} \cdot \int \frac{x^{p+q-1} dx}{\sqrt[n]{(1-x^q)^{n-1}}} = \int \frac{x^{p-1} dx}{\sqrt[n]{(1-x^q)^{n-1}}} \cdot \int \frac{x^{p+q-1} dx}{\sqrt[n]{(1-x^q)^{n-1}}}$$

in qua aequatione comparatio in §. 24. inuenta iam continetur; ita vt hinc nihil noui, quod non iam euolui, deduci queat. Alterum igitur fontem § 25 indicatum hic potissimum inuestigandum suscipio, vbi cum siue vlla restrictione sumi queat $f=1$, aequatio nostra primaria erit:

$$\frac{\int dx (1-x^q)^{\lambda-1} \cdot \int dx (1-x^q)^{\lambda-1}}{\int dx (1-x^q)^{\lambda-1}} = k \int x^{m-1} dx (1-x^q)^{\lambda-1}$$

cuius beneficio valores formulae integralis $\int dx (1-x^q)^{\lambda}$ quando λ non est numerus integer ad quadraturas curuarum algebraicarum reuocare licebit; quandoquidem quoties λ est numerus integer, integratio habetur absoluta, quoniam est

$$\int dx (1-x^q)^{\lambda} = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot \lambda \cdot \dots \cdot 1$$

Maximi autem momenti quaestio versatur circa eos

casus, quibus λ est numerus fractus, quos ergo pro ratione denominationis hic successiue sum definiturus.

Problema 2.

27. Denotante i numerum integrum posituum definire valorem formulae integralis $\int dx (1 \pm \frac{x}{2})^i$ integration ab $x=0$ vsque ad $x=1$ extenta.

Solutio.

In aequatione nostra generali faciamus $m=n$ eritque

$$\frac{(f dx (1 \pm \frac{x}{2})^{n-1})^2}{f dx (1 \pm \frac{x}{2})^{2n-1}} = k f x^{n-1} dx (1-x^2)^{n-1}$$

Sit iam $n-1 = \frac{i}{2}$, et ob $2n-1 = i+1$ erit

$$f dx (1 \pm \frac{x}{2})^{n-1} = 1. 2. 3 \dots (i+1)$$

sumatur porro $k=2$ vt sit $nk-1 = i+1$, fietque

$$\frac{(f dx \sqrt{(1 \pm \frac{x}{2})^2})^2}{1. 2. 3 \dots (i+1)} = 2 f x^{i+1} dx (1-x^2)^{\frac{i}{2}}$$

ideoque

$$\frac{f dx \sqrt{(1 \pm \frac{x}{2})^2}}{1. 2. 3 \dots (i+1)} = \sqrt{2} f x^{i+1} dx \sqrt{(1-x^2)^{\frac{i}{2}}}$$

vbi euidens est pro i numeros tantum impares sumi conuenire, quoniam pro paribus evolutio per se est manifesta.

Coroll. 1.

28. Omnes autem casus facile reducuntur ad $i=1$, vel adeo ad $i=-1$, dummodo enim $i+1$, non

non sit numerus negativus reductio inuenta locum habet. Pro hoc ergo casu erit :

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \sqrt{2} \int \frac{dx}{\sqrt{1-xx}} = \sqrt{2} \pi \text{ ob } \int \frac{dx}{\sqrt{1-xx}} = \frac{\pi}{2}.$$

Coroll. 2.

29. Hoc autem casu principali expedito ob $\int dx (1-x^2)^n = n \int dx (1-x^2)^{n-1}$ habebimus,

$$\int dx \sqrt{1-x^2} = \frac{1}{2} \sqrt{2} \pi; \int dx (1-x^2)^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \sqrt{2} \pi$$

atque in genere

$$\int dx (1-x^2)^{\frac{n-1}{2}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \dots \cdot \frac{(n-1)}{2} \sqrt{2} \pi.$$

Problema 3.

30. Denotante i numerum integrum positivum definire valorem formulae integralis $\int dx (1-x^2)^{i-1}$ integration ab $x=0$ ad $x=1$ extensa.

Solutio.

Inchoemus ab aequatione praecedentis problematis :

$$\frac{(\int dx (1-x^2)^{n-1})^n}{\int dx (1-x^2)^{n-1}} = k \int x^{2n-1} dx (1-x^2)^{n-1}$$

atque in forma generali statuamus $m=2n$, ut habeatur :

$$\frac{\int dx (1-x^2)^{m-1} \cdot \int dx (1-x^2)^{m-1}}{\int dx (1-x^2)^{m-1}} = k \int x^{m-1} dx (1-x^2)^{m-1}$$

ac

ac multiplicando has duas aequalitates adipiscimur;

$$\frac{(f dx (l_x^{\frac{1}{2}})^{n-1})^2}{f dx (l_x^{\frac{1}{2}})^{n-1}} = k k f x^{nk-1} dx (1-x^k)^{n-1} \cdot f x^{nk-1} dx (1-x^k)^{n-1}.$$

Hic iam ponatur $n = \frac{1}{2}$ vt sit

$$f dx (l_x^{\frac{1}{2}})^{i-1} = 1. 2. 3. \dots (i-1)$$

sumaturque $k = 3$ ac prodibit

$$\frac{(f dx \sqrt{l_x^{\frac{1}{2}}})^{i-1}}{1. 2. 3. \dots (i-1)} = 9 f x^{i-1} dx \sqrt{(1-x^3)^{i-1}} \cdot f x^{i-1} dx \sqrt{(1-x^3)^{i-1}}$$

vnde concludimus

$$\frac{f dx \sqrt{l_x^{\frac{1}{2}}}}{\sqrt{1. 2. 3. \dots (i-1)}} = \sqrt{9} f \frac{x^{i-1} dx}{\sqrt{(1-x^3)^{i-1}}} \cdot \frac{x^{i-1} dx}{\sqrt{(1-x^3)^{i-1}}}.$$

Coroll. I.

31. Bini hic occurrunt casus principales, a quibus reliqui omnes pendent, ponendo scilicet vel $i = 1$ vel $i = 2$, qui sunt:

$$I. f \frac{dx}{\sqrt{l_x^{\frac{1}{2}}}} = \sqrt{9} f \frac{dx}{\sqrt{(1-x^3)^2}} \cdot f \frac{x dx}{\sqrt{(1-x^3)^2}}$$

$$II. f \frac{dx}{\sqrt{l_x^{\frac{1}{2}}}} = \sqrt{9} f \frac{x dx}{\sqrt{(1-x^3)}} \cdot f \frac{x^2 dx}{\sqrt{(1-x^3)}}$$

quae posterior forma ob $f \frac{x^2 dx}{\sqrt{(1-x^3)}} = \frac{1}{3} f \frac{dx}{\sqrt{(1-x^3)}}$

abit

abit in

$$\int \frac{dx}{\sqrt[n]{l^2}} = \sqrt[n]{3} \int \frac{dx}{\sqrt[n]{(1-x^2)}} \cdot \int \frac{x dx}{\sqrt[n]{(1-x^2)}}$$

Coroll. 2.

32. Si uti in observationibus meis ante allegatis breuitatis gratia ponamus $\int \frac{x^{p-1} dx}{\sqrt[n]{(1-x^2)^2}} = (\frac{p}{q})$, atque

ut ibi pro hac classe $(\frac{p}{q}) = \frac{\pi}{3 \sin. \frac{\pi}{3}} = a$, tum vero

$$(\frac{p}{q}) = \int \frac{dx}{\sqrt[n]{(1-x^2)^2}} = A, \text{ erit}$$

$$\text{I. } \int \frac{dx}{\sqrt[n]{(l^2)^2}} = \sqrt[n]{9} (\frac{p}{q}) (\frac{p}{q}) = \sqrt[n]{9} a A$$

$$\text{II. } \int \frac{dx}{\sqrt[n]{(l^2)^4}} = \sqrt[n]{3} (\frac{p}{q}) (\frac{p}{q}) = \sqrt[n]{3} \frac{a A}{A}.$$

Coroll. 3.

33. Pro casu ergo priori habebimus,

$$\int dx \sqrt[n]{(l^2)^{-2}} = \sqrt[n]{9} a A; \int dx \sqrt[n]{l^2} = \sqrt[n]{9} a A \text{ et}$$

$$\int dx \sqrt[n]{(l^2)^{n+1}} = \frac{1}{1} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \dots \frac{n+1}{1} \sqrt[n]{9} a A$$

pro altero vero casu

$$\int dx \sqrt[n]{(l^2)^{-1}} = \sqrt[n]{\frac{a A}{A}}; \int dx \sqrt[n]{(l^2)^2} = \sqrt[n]{\frac{a A}{A}} \text{ et}$$

$$\int dx \sqrt[n]{(l^2)^{n-1}} = \frac{1}{1} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \dots \frac{n-1}{1} \sqrt[n]{\frac{a A}{A}}.$$

Tom. XVI. Nou. Comm.

P

Pro-

Problema 4.

34. Denotante i numerum integrum positium definire valorem formulæ integralis $\int dx (l \frac{1}{x})^{\frac{1}{2}-i}$ integratione ab $x=0$ ad $x=1$ extenta.

Solutio.

In solutione problematis præcedentis perducti sumus ad hanc æquationem

$$\frac{(\int dx (l \frac{1}{x})^{n-1})^2}{\int dx (l \frac{1}{x})^{n-1}} = k k \int \frac{x^{n k-1} dx}{(1-x^k)^{1-n}} \int \frac{x^{n k-1} dx}{(1-x^k)^{1-n}}$$

forma generalis autem sumendo $m=3n$ præbet

$$\frac{\int dx (l \frac{1}{x})^{n-1} \int dx (l \frac{1}{x})^{n-1}}{\int dx (l \frac{1}{x})^{n-1}} = k \int \frac{x^{n k-1} dx}{(1-x^k)^{1-n}}$$

quibus coniungendis adipiscimur,

$$\frac{(\int dx (l \frac{1}{x})^{n-1})^2}{\int dx (l \frac{1}{x})^{n-1}} = k^2 \int \frac{x^{n k-1} dx}{(1-x^k)^{1-n}} \int \frac{x^{n k-1} dx}{(1-x^k)^{1-n}},$$

$$\int \frac{x^{n k-1} dx}{(1-x^k)^{1-n}}$$

Sit nunc $n=\frac{1}{2}$ et fumatur $k=4$ fietque

$$\frac{\int dx (l \frac{1}{x})^{\frac{1}{2}-i}}{\sqrt{1.2.3 \dots (i-1)}} = \sqrt[4]{4}^i \int \frac{x^{i-1} dx}{\sqrt[4]{(1-x^4)^{1-i}}} \int \frac{x^{i-1} dx}{\sqrt[4]{(1-x^4)^{1-i}}}$$

$$\int \frac{x^{i-1} dx}{\sqrt[4]{(1-x^4)^{1-i}}}$$

Coroll.

Coroll 1.

35. Si igitur sit $i = 1$, habebimus

$$\int dx \dot{V} (I \frac{1}{x})^{-1} = \dot{V} 4 \int \frac{dx}{\dot{V}(1-x^2)} \cdot \int \frac{x dx}{\dot{V}(1-x^2)} \cdot \int \frac{xx dx}{\dot{V}(1-x^2)}$$

quae expressio si littera P designetur erit in genere

$$\int dx \dot{V} (I \frac{1}{x})^{n-1} = \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{4} \dots \dots \frac{n-1}{4} \cdot P.$$

Coroll 2.

36. Pro altero casu principali sumamus $i = 3$
critique

$$\int dx \dot{V} (I \frac{1}{x})^{-1} = \dot{V} 2 \cdot 4 \int \frac{x^3 dx}{\dot{V}(1-x^4)} \cdot \int \frac{x^5 dx}{\dot{V}(1-x^4)} \cdot \int \frac{x^7 dx}{\dot{V}(1-x^4)}$$

seu facta reductione ad simpliciores formas

$$\int dx \dot{V} (I \frac{1}{x})^{-1} = \dot{V} 8 \int \frac{xx dx}{\dot{V}(1-x^4)} \cdot \int \frac{x dx}{\dot{V}(1-x^4)} \cdot \int \frac{dx}{\dot{V}(1-x^4)}$$

quae expressio si littera Q designetur erit generatim

$$\int dx \dot{V} (I \frac{1}{x})^{n-1} = \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{4} \cdot \frac{7}{4} \dots \dots \frac{n-1}{4} \cdot Q.$$

Scholion.

37. Si formulam integram $\int \frac{x^{p-1} dx}{\dot{V} (1-x^4)^{-q}}$

hoc signo ($\frac{p}{q}$) indicemus, solutio problematis ita se habebit

$$\int dx \dot{V} (I \frac{1}{x})^{i-1} = \dot{V} 1 \cdot 2 \cdot 3 \dots (i-1) \cdot 4^q (\frac{i}{4}) (\frac{2i}{4}) (\frac{3i}{4})$$

P 2 et

et pro binis casibus euolutis fit

$$P = \sqrt[4]{4^{\frac{1}{2}} \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{2}\right)} \text{ et } Q = \sqrt[4]{8 \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{2}\right)}.$$

Statuamus nunc pro iis. formalis quae a circulo pendunt:

$$\left(\frac{r}{1}\right) = \frac{\pi}{4 \sin. \frac{\pi}{4}} = \alpha \text{ et } \left(\frac{r}{2}\right) = \frac{\pi}{4 \sin. \frac{\pi}{4}} = \mathfrak{C}$$

pro transcendentibus autem altioris ordinis

$$\left(\frac{x}{1}\right) = \int \frac{x dx}{\sqrt[4]{(1-x^4)}} = \int \frac{dx}{\sqrt[4]{(1-x^4)}} = A$$

quippe a qua omnes reliquae pendent ac reperimus,

$$P = \sqrt[4]{4^{\frac{1}{2}} \frac{\pi}{\mathfrak{C}}} \cdot A A \text{ et } Q = \sqrt[4]{4 \cdot \alpha \alpha \mathfrak{C}} \cdot \frac{r}{A A}.$$

vnde patet esse: $PQ = 4 \alpha = \frac{\pi}{\sin. \frac{\pi}{4}}$. Cum autem sit

$$\alpha = \frac{\pi}{4 \sqrt[4]{2}} \text{ et } \mathfrak{C} = \frac{\pi}{4} \text{ erit } P = \sqrt[4]{32 \pi A A} \text{ et } Q = \sqrt[4]{\frac{\pi^2}{A A}}.$$

$$\text{et } \frac{P}{Q} = \frac{4 \sqrt[4]{2}}{\sqrt[4]{\pi}}.$$

Problema 5.

38. Denotante i numerum integrum posituum definire valorem formulae integralis $\int dx \sqrt[4]{(1-x^4)^{i-1}}$ integratione ab $x=0$ ad $x=1$ extensa.

Solutio.

Ex praecedentibus solutionibus iam satis est perspicuum pro hoc casu tandem peruentum iri ad hanc formam.

$$\int dx$$

$$\frac{\int dx \sqrt[5]{(1-x^5)^{-5}}}{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots (i-1)} = \sqrt[5]{5} \int \frac{x^{i-1} dx}{\sqrt[5]{(1-x^5)^{5-i}}} = \sqrt[5]{5} \int \frac{x^{i-1} dx}{\sqrt[5]{(1-x^5)^{5-i}}}$$

$$\int \frac{x^{i-1} dx}{\sqrt[5]{(1-x^5)^{5-i}}} = \int \frac{x^{i-1} dx}{\sqrt[5]{(1-x^5)^{5-i}}}$$

quae formulae integrales ad classem quinquam differentiationis meae supra allegatae sunt referendae. Quare si modo ibi recepto signum $(\frac{2}{5})$ denoter hanc formulam $\int \frac{x^{i-1} dx}{\sqrt[5]{(1-x^5)^{5-i}}}$, valorem quaesitum ita commodius exprimere licebit, ut sit

$$\int dx \sqrt[5]{(1-x^5)^{-5}} = \sqrt[5]{5} \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 \dots (i-1) 5^{\frac{1}{5}} (\frac{1}{5}) (\frac{2}{5}) (\frac{3}{5}) (\frac{4}{5})$$

vbi quidem sufficit ipsi i valores quinario minores tribuisse: quando autem numeratores quinarium superant tenendum est esse:

$$(\frac{5+m}{5}) = \frac{m}{m+5} (\frac{m}{5}) \text{ cum vero porro}$$

$$(\frac{10+m}{5}) = \frac{m}{m+5} \cdot \frac{m+5}{m+10} (\frac{m}{5})$$

$$(\frac{15+m}{5}) = \frac{m}{m+5} \cdot \frac{m+5}{m+10} \cdot \frac{m+10}{m+15} (\frac{m}{5})$$

Deinde vero pro hac classe binae formulae quadraturarum circuli inuoluunt quae sint.

$$(\frac{1}{5}) = \frac{\pi}{5 \sin. \frac{\pi}{5}} = \alpha \text{ et } (\frac{2}{5}) = \frac{\pi}{5 \sin. \frac{2\pi}{5}} = \beta$$

duae autem quadraturae altiores continent quae ponantur:

B 3

(7)

$$(\frac{1}{2}) = \int \frac{x x d x}{\sqrt{(1-x^2)^2}} = \int \frac{d x}{\sqrt{(1-x^2)^2}} = A \text{ et}$$

$$(\frac{1}{2}) = \int \frac{x d x}{\sqrt{(1-x^2)^2}} = B$$

atque ex his valores omnium reliquarum formularum huius classis assignaui scilicet:

$$(\frac{1}{2}) = 1; (\frac{1}{2}) = \frac{1}{2}; (\frac{1}{2}) = \frac{1}{2}; (\frac{1}{2}) = \frac{1}{2}; (\frac{1}{2}) = \frac{1}{2}$$

$$(\frac{1}{2}) = a; (\frac{1}{2}) = \frac{a}{A}; (\frac{1}{2}) = \frac{a}{B}; (\frac{1}{2}) = \frac{a}{A}$$

$$(\frac{1}{2}) = A; (\frac{1}{2}) = B; (\frac{1}{2}) = \frac{A}{B}$$

$$(\frac{1}{2}) = \frac{a}{B}; (\frac{1}{2}) = B;$$

$$(\frac{1}{2}) = \frac{a}{B}.$$

Coroll. 1.

39. Sumto exponente $i = 1$ erit:

$$\int d x \sqrt[n]{(1-x^2)^{-1}} = \sqrt[n]{5^* (\frac{1}{2}) (\frac{1}{2}) (\frac{1}{2}) (\frac{1}{2})} = \sqrt[n]{5^* \frac{a^2}{B^2}} A^* B$$

vnde in genere concludimus fore denotante n numerum integrum quemcunque

$$\int d x \sqrt[n]{(1-x^2)^{-1}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{a}{B} \cdot \frac{1}{2} \cdot \dots \cdot \frac{a^{n-1}}{B^{n-1}} \cdot \sqrt[n]{5^* \frac{a^2}{B^2}} A^* B.$$

Coroll. 2.

40. Sit nunc $i = 2$ et cum prodeat:

$$\int d x \sqrt[n]{(1-x^2)^{-2}} = \sqrt[n]{1 \cdot 5^* (\frac{1}{2}) (\frac{1}{2}) (\frac{1}{2}) (\frac{1}{2})}$$

$$\text{ob } (\frac{1}{2}) = \frac{1}{2} (\frac{1}{2}) = \frac{1}{2} (\frac{1}{2}) \text{ et } (\frac{1}{2}) = \frac{1}{2} (\frac{1}{2})$$

erit

erit haec expressio

$$\sqrt[n]{5^3 \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{2}\right)} = \sqrt[n]{5^3 \cdot \alpha^6 \cdot \frac{B^3}{A^3}} \text{ et in genere}$$

$$\int dx \sqrt[n]{(h_x)^{s^{n-1}}} = \frac{1}{\frac{1}{2}} \cdot \frac{1}{\frac{1}{2}} \cdot \frac{1}{\frac{1}{2}} \dots \frac{s^{n-1}}{\frac{1}{2}} \sqrt[n]{5^3 \cdot \alpha^6 \cdot \frac{B^3}{A^3}}.$$

Coroll 3.

31. Sit $i = 3$ et forma inuenta :

$$\int dx \sqrt[n]{(h_x)^{s^{n-1}}} = \sqrt[n]{2 \cdot 5^4 \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{2}\right)} \text{ ob}$$

$$\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2}\right); \left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2}\right); \left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2}\right)$$

$$\text{abit in } \sqrt[n]{2 \cdot 5^4 \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{2}\right)} = \sqrt[n]{2 \cdot 5^4 \cdot \frac{6^4}{\alpha^4} \cdot \frac{A}{B}}$$

unde in genere colligitur :

$$\int dx \sqrt[n]{(h_x)^{s^{n-1}}} = \frac{1}{\frac{1}{2}} \cdot \frac{1}{\frac{1}{2}} \cdot \frac{1}{\frac{1}{2}} \dots \frac{s^{n-1}}{\frac{1}{2}} \sqrt[n]{2 \cdot 5^4 \cdot \frac{6^4}{\alpha^4} \cdot \frac{A}{B}}.$$

Coroll. 4.

42. Posito denique $i = 4$ forma nostra :

$$\int dx \sqrt[n]{(h_x)^{s^{n-1}}} = \sqrt[n]{6 \cdot 5^4 \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{2}\right)} \text{ ob}$$

$$\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2}\right); \left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2}\right); \left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2}\right)$$

transformabitur in hanc :

$$\sqrt[n]{6 \cdot 5^4 \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{2}\right)} = \sqrt[n]{6 \cdot \frac{\alpha \alpha \alpha \alpha}{A A B}}$$

ita ut sit in genere

$$\int dx \sqrt[n]{(h_x)^{s^{n-1}}} = \frac{1}{\frac{1}{2}} \cdot \frac{1}{\frac{1}{2}} \cdot \frac{1}{\frac{1}{2}} \cdot \frac{1}{\frac{1}{2}} \dots \frac{s^{n-1}}{\frac{1}{2}} \sqrt[n]{6 \cdot \alpha \alpha \alpha \alpha \cdot \frac{1}{A A B}}.$$

Scho-

Scholion.

43. Si valorem formulae integralis $\int dx (P_x)^A$ hoc signo $[\lambda]$ repraesentemus, casus hactenus euoluti praebent:

$$[-i] = \sqrt[5]{s^4 \cdot \frac{a^2}{b^2} \cdot A^2 B}; [+i] = \sqrt[5]{s^4 \cdot \frac{a^2}{b^2} \cdot A^2 B}$$

$$[-i] = \sqrt[5]{s^4 \cdot a^6 \cdot \frac{b^3}{A^3}}; [+i] = \sqrt[5]{s^4 \cdot a^6 \cdot \frac{b^3}{A^3}}$$

$$[-i] = \sqrt[5]{s^4 \cdot \frac{a^2}{b^2} \cdot \frac{A}{B}}; [+i] = \sqrt[5]{s^4 \cdot \frac{a^2}{b^2} \cdot \frac{A}{B}}$$

$$[-i] = \sqrt[5]{s \cdot a^2 b^2 \cdot \frac{1}{AAB}}; [+i] = \sqrt[5]{s \cdot a^2 b^2 \cdot \frac{1}{AAB}}$$

vade binis, quarum indices simul sumti sunt = a coniungendis colligimus.

$$[+i] \cdot [-i] = a = \frac{\pi}{s \sin \frac{\pi}{5}}$$

$$[+i] \cdot [-i] = 2a = \frac{2\pi}{s \sin \frac{2\pi}{5}}$$

$$[+i] \cdot [-i] = 3a = \frac{3\pi}{s \sin \frac{3\pi}{5}}$$

$$[+i] \cdot [-i] = 4a = \frac{4\pi}{s \sin \frac{4\pi}{5}}$$

Ex antecedente autem problemate simili modo deducimus:

$$[-i] = P = \sqrt[4]{4^4 \cdot \frac{a^2}{b^2} \cdot AA}; [+i] = \sqrt[4]{4^4 \cdot \frac{a^2}{b^2} \cdot AA}$$

$$[-i] = Q = \sqrt[4]{4 \cdot aab \cdot \frac{1}{AA}}; [+i] = \sqrt[4]{4 \cdot aab \cdot \frac{1}{AA}}$$

hinc-

hincque

$$[+\frac{1}{2}], [-\frac{1}{2}] = \alpha = \frac{\pi}{4 \sin. \frac{\pi}{4}}$$

$$[+\frac{3}{2}], [-\frac{3}{2}] = 3\alpha = \frac{3\pi}{4 \sin. \frac{3\pi}{4}}$$

vade in genere hoc Theorema adipiscimur quod sit

$$[\lambda], [-\lambda] = \frac{\lambda \pi}{j m \cdot \lambda \pi}$$

cuius ratio ex methodo interpolandi olim exposita ita reddi potest:

$$\text{cum sit } [\lambda] = \frac{1'-\lambda \cdot 2^\lambda}{1+\lambda} \cdot \frac{2'-\lambda \cdot 3^\lambda}{2+\lambda} \cdot \frac{3'-\lambda \cdot 4^\lambda}{3+\lambda} \text{ etc.}$$

$$\text{erit } [-\lambda] = \frac{1'+\lambda \cdot 2^{-\lambda}}{1-\lambda} \cdot \frac{2'+\lambda \cdot 3^{-\lambda}}{2-\lambda} \cdot \frac{3'+\lambda \cdot 4^{-\lambda}}{3-\lambda} \text{ etc.}$$

hincque

$$[\lambda], [-\lambda] = \frac{1 \cdot 1}{1-\lambda \lambda} \cdot \frac{2 \cdot 2}{2-\lambda \lambda} \cdot \frac{3 \cdot 3}{3-\lambda \lambda} \text{ etc.} = \frac{\lambda \pi}{j m \cdot \lambda \pi}$$

vti alibi demonstraui.

Problema 6. generale.

44. Si litterae i et n denotent numeros integros positivos definire valorem formulae integralis $\int dx (\frac{h}{x})^{\frac{i-n}{n}}$ seu $\int dx x^{\frac{n}{n}} (\frac{h}{x})^{\frac{i-n}{n}}$, integratione ab $x=0$ ad $x=1$ extensa.

Solutio.

Methodus hactenus vſitata quaeritum valorem ſequenti modo per quadraturas curvarum algebraicarum expreſſum exhibebit:

$$\frac{\int dx \sqrt[n]{\left(\frac{h}{x}\right)^{i-n}}}{\sqrt[n]{1.2.3 \dots (i-1)}} = \sqrt[n]{n^{n-1}} \int \frac{x^{i-1} dx}{\sqrt[n]{(1-x^n)^{n-1}}} \cdot \int \frac{x^{i-1} dx}{\sqrt[n]{(1-x^n)^{n-1}}} \dots \int \frac{x^{i-(n-1)} dx}{\sqrt[n]{(1-x^n)^{n-1}}}$$

Quod ſi iam breuitatis gratia formulam integram $\int \frac{x^{i-1} dx}{\sqrt[n]{(1-x^n)^{n-1}}}$ hoc charactere $\left(\frac{i}{n}\right)$, formulam vero

$\int dx \sqrt[n]{\left(\frac{h}{x}\right)^n}$ iſthoc $\left[\frac{n}{n}\right]$ designemus, ita vt $\left[\frac{n}{n}\right]$ valorem huius producti indefiniti 1. 2. 3. . . . z denotet exiſtente $z = \frac{n}{n}$, ſuccinctius valor quaeritus hoc modo expreſſus prodibit:

$$\left[\frac{i-n}{n}\right] = \sqrt[n]{1.2.3 \dots (i-1)} n^{n-1} \cdot \left(\frac{i}{n}\right) \left(\frac{i-1}{n}\right) \left(\frac{i-2}{n}\right) \dots \left(\frac{i-(n-1)}{n}\right)$$

vnde etiam colligitur

$$\left[\frac{i}{n}\right] = \frac{i}{n} \sqrt[n]{1.2.3 \dots (i-1)} n^{n-1} \cdot \left(\frac{i}{n}\right) \left(\frac{i-1}{n}\right) \left(\frac{i-2}{n}\right) \dots \left(\frac{i-(n-1)}{n}\right)$$

Hic ſemper numerum i ipſo n minorem accepſiſſe ſufficiet quoniam pro maioribus notum eſt eſſe:

$$\left[\frac{i+n}{n}\right] = \frac{i+n}{n} \left[\frac{i}{n}\right]; \text{ item } \left[\frac{i+n}{n}\right] = \frac{i+n}{n} \cdot \frac{i+n-1}{n} \left[\frac{i}{n}\right] \text{ etc.}$$

hocque modo tota inueſtigatio ad eos tantum caſus reducitur, quibus fractionis $\frac{i}{n}$ numerator i denominatore n eſt minor. Praeterea vero de formulis integra-

tegralibus $\int \frac{x^{p-1} dx}{\sqrt[n]{(1-x^n)^{n-q}}} = \left(\frac{p}{q}\right)$, sequentia notasse iuvabit :

I. Litteras p et q inter se esse permutabiles ut sit $\left(\frac{p}{q}\right) = \left(\frac{q}{p}\right)$.

II. Si alteruter numerorum p vel q ipsi exponenti n aequatur, valorem formulae integralis fore algebraicum scilicet :

$$\left(\frac{n}{p}\right) = \left(\frac{p}{n}\right) = \frac{1}{p} \text{ seu } \left(\frac{n}{q}\right) = \left(\frac{q}{n}\right) = \frac{1}{q}.$$

III. Si summa numerorum $p + q$ ipsi exponenti n aequatur, formulae integralis $\left(\frac{p}{q}\right)$ valorem per circulum exhiberi posse, cum sit :

$$\left(\frac{p}{n-p}\right) = \left(\frac{n-p}{p}\right) = \frac{\pi}{n \sin \frac{p\pi}{n}} \text{ et } \left(\frac{q}{n-q}\right) = \left(\frac{n-q}{q}\right) = \frac{\pi}{n \sin \frac{q\pi}{n}}.$$

IV. Si alteruter numerorum p vel q maior sit exponente n , formulam integralem $\left(\frac{p}{q}\right)$ ad aliam revocari posse, cuius termini sint ipso n minores, quod fit ope huius reductionis

$$\left(\frac{p+q}{q}\right) = \frac{p}{p+q} \left(\frac{p}{q}\right).$$

V. Inter plures huiusmodi formulas integrales talem relationem intercedere ut sit :

$$\left(\frac{p}{q}\right) \left(\frac{p+q}{r}\right) = \left(\frac{p}{r}\right) \left(\frac{p+q}{q}\right) = \left(\frac{p}{r}\right) \left(\frac{q+r}{p}\right) = \dots$$

cuius ope omnes reductiones reperiuntur quas in observationibus circa has formulas exposui.

Q 2

Coroll.

Coroll. 1.

45. Si hoc modo ope reductionis n°. IV. indicatae formam inuentam ad singulos casus accomodemus, eos sequenti ratione simplicissime exhibere poterimus. Ac primo quidem pro casu $n = 2$, quo nulla opus est reductione habebimus:

$$[\frac{1}{2}] = \frac{1}{2} \sqrt[2]{2 (\frac{1}{2})} = \frac{1}{2} \sqrt[2]{\frac{\pi}{\sin \frac{\pi}{2}}} = \frac{1}{2} \sqrt{\pi}.$$

Coroll. 2.

46. Pro casu $n = 3$ habebimus has reductiones:

$$[\frac{1}{3}] = \frac{1}{3} \sqrt[3]{3^2 (\frac{1}{3}) (\frac{1}{3})}$$

$$[\frac{1}{3}] = \frac{1}{3} \sqrt[3]{3 \cdot 1 (\frac{1}{3}) (\frac{1}{3})}$$

Coroll. 3.

47. Pro casu $n = 4$ hae tres reductiones obtinentur:

$$[\frac{1}{4}] = \frac{1}{4} \sqrt[4]{4^3 (\frac{1}{4}) (\frac{1}{4}) (\frac{1}{4})}$$

$$[\frac{1}{4}] = \frac{1}{4} \sqrt[4]{4^2 \cdot 2 (\frac{1}{2})^2 (\frac{1}{4})} = \frac{1}{4} \sqrt[4]{4 (\frac{1}{2})} \text{ ob } (\frac{1}{2}) = \frac{1}{2}$$

$$[\frac{1}{4}] = \frac{1}{4} \sqrt[4]{4 \cdot 1 \cdot 2 (\frac{1}{4}) (\frac{1}{4}) (\frac{1}{4})}$$

cum in media sit $(\frac{1}{4}) = (\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}) = \frac{1}{4}$ erit utique ut ante

$$[\frac{1}{4}] = [\frac{1}{4}] = \frac{1}{4} \sqrt{\pi}.$$

Coroll.

Coroll. 4.

48. Sit nunc $n=5$, et prodeunt hae quatuor reductiones:

$$[1] = \frac{1}{2} \sqrt[5]{5^4 \cdot (1)(1)(1)(1)}$$

$$[2] = \frac{1}{2} \sqrt[5]{5^3 \cdot 1 \cdot (1)(1)(1)(1)}$$

$$[3] = \frac{1}{2} \sqrt[5]{5^2 \cdot 1 \cdot 2 \cdot (1)(1)(1)(1)}$$

$$[4] = \frac{1}{2} \sqrt[5]{5 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot (1)(1)(1)(1)}.$$

Coroll. 5.

49. Sit $n=6$, et habebimus has reductiones:

$$[1] = \frac{1}{2} \sqrt[6]{6^5 \cdot (1)(1)(1)(1)(1)}$$

$$[2] = \frac{1}{2} \sqrt[6]{6^4 \cdot 2 \cdot (1)^2 \cdot (1)^2 \cdot (1)} = \frac{1}{2} \sqrt[6]{6^4 \cdot (1)(1)}$$

$$[3] = \frac{1}{2} \sqrt[6]{6^3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot (1)^2 \cdot (1)^2} = \frac{1}{2} \sqrt[6]{6^3 \cdot (1)}$$

$$[4] = \frac{1}{2} \sqrt[6]{6^2 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 2 \cdot (1)^2 \cdot (1)^2} = \frac{1}{2} \sqrt[6]{6^2 \cdot 2 \cdot (1)(1)}$$

$$[5] = \frac{1}{2} \sqrt[6]{6 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot (1)(1)(1)(1)(1)}.$$

Coroll. 6.

50. Posito $n=7$ sequentes sex prodeunt aequationes:

$$[1] = \frac{1}{2} \sqrt[7]{7^6 \cdot (1)(1)(1)(1)(1)(1)}$$

$$[2] = \frac{1}{2} \sqrt[7]{7^5 \cdot 1 \cdot (1)(1)(1)(1)(1)}$$

Q 3

[3]=

$$[\frac{1}{2}] = \frac{1}{2} \sqrt[7]{7^4 \cdot 1 \cdot 2 (\frac{1}{2}) (\frac{1}{2}) (\frac{1}{2}) (\frac{1}{2}) (\frac{1}{2})}$$

$$[\frac{1}{3}] = \frac{1}{3} \sqrt[7]{7^3 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 (\frac{1}{3}) (\frac{1}{3}) (\frac{1}{3}) (\frac{1}{3}) (\frac{1}{3})}$$

$$[\frac{1}{4}] = \frac{1}{4} \sqrt[7]{7^2 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 (\frac{1}{4}) (\frac{1}{4}) (\frac{1}{4}) (\frac{1}{4}) (\frac{1}{4})}$$

$$[\frac{1}{5}] = \frac{1}{5} \sqrt[7]{7 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 (\frac{1}{5}) (\frac{1}{5}) (\frac{1}{5}) (\frac{1}{5}) (\frac{1}{5})}$$

Coroll. 7.

51. Sit $n=8$, et septem hae reductiones impetrabuntur.

$$[\frac{1}{8}] = \frac{1}{8} \sqrt[8]{8^7 (\frac{1}{8}) (\frac{1}{8}) (\frac{1}{8}) (\frac{1}{8}) (\frac{1}{8}) (\frac{1}{8}) (\frac{1}{8})}$$

$$[\frac{1}{4}] = \frac{1}{4} \sqrt[8]{8^6 \cdot 2 (\frac{1}{4})^2 (\frac{1}{4})^2 (\frac{1}{4})^2 (\frac{1}{4})^2} = \frac{1}{4} \sqrt[8]{8^3 (\frac{1}{2}) (\frac{1}{2}) (\frac{1}{2})}$$

$$[\frac{1}{2}] = \frac{1}{2} \sqrt[8]{8^4 \cdot 1 \cdot 2 (\frac{1}{2}) (\frac{1}{2}) (\frac{1}{2}) (\frac{1}{2}) (\frac{1}{2}) (\frac{1}{2})}$$

$$[\frac{1}{4}] = \frac{1}{4} \sqrt[8]{8^4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4 (\frac{1}{4})^3 (\frac{1}{4})^3} = \frac{1}{4} \sqrt[8]{8 (\frac{1}{2})}$$

$$[\frac{1}{8}] = \frac{1}{8} \sqrt[8]{8^3 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 (\frac{1}{8}) (\frac{1}{8}) (\frac{1}{8}) (\frac{1}{8}) (\frac{1}{8}) (\frac{1}{8}) (\frac{1}{8})}$$

$$[\frac{1}{4}] = \frac{1}{4} \sqrt[8]{8^3 \cdot 4 \cdot 2 \cdot 6 \cdot 4 \cdot 2 (\frac{1}{4})^2 (\frac{1}{4})^2 (\frac{1}{4})^2 (\frac{1}{4})^2} = \frac{1}{4} \sqrt[8]{8 \cdot 2 \cdot 4 (\frac{1}{2}) (\frac{1}{2}) (\frac{1}{2})}$$

$$[\frac{1}{8}] = \frac{1}{8} \sqrt[8]{8 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 (\frac{1}{8}) (\frac{1}{8}) (\frac{1}{8}) (\frac{1}{8}) (\frac{1}{8}) (\frac{1}{8}) (\frac{1}{8})}$$

Scholion.

52. Superfluum foret hos casus ulterius euolvere cum ex allatis ordo istarum formularum satis perspiciatur. Si enim in formula proposita $[\frac{m}{n}]$ numeri m et n sint inter se primi lex est manifeste, cum fiat

$$[\frac{m}{n}] = \frac{m}{n} \sqrt[n]{n^{n-m} \cdot 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot (n-1) \cdot (\frac{1}{n}) (\frac{2}{n}) (\frac{3}{n}) \dots (\frac{n-1}{n})}$$

fin

sin autem hi numeri m et n communem habeant
 diuisorem expediet quidem fractionem $\frac{m}{n}$ ad mini-
 mam formam reduci et ex casibus praecedentibus
 quaesitum valorem peti, interim tamen etiam opera-
 tio hoc modo institui poterit. Cum expressio quae-
 sita certe hanc habeat formam

$$[\frac{m}{n}] = \frac{m}{n} \sqrt[n]{n^{n-m} P. Q}$$

vbi Q est productum ex $n-1$ formulis integralibus
 P vero productum ex aliquot numeris absolutis,
 primum pro illo producto Q inueniendo, continue-
 tur haec formularum series $(\frac{m}{n})(\frac{a-m}{n})(\frac{a-m}{n})$ donec nu-
 merator superet exponentem n , eiusque loco excessus
 supra n scribatur, qui si ponatur $=a$, vt iam
 formula nostra sit $(\frac{a}{n})$, hic ipse numerator a dabit
 factorem producti P tum hinc formularum series
 porro statuatur $(\frac{a}{n})(\frac{a+m}{n})(\frac{a+m}{n})$ etc. donec iterum
 ad numeratorem exponente n maiorem perueniatur,
 formulaque prodeat $(\frac{a+m}{n})$ cuius loco scribi oportet
 $(\frac{a}{n})$, simulque hinc factor a in productum P in-
 feratur, sicque progredi conueniet, donec pro Q pro-
 dierint $n-1$ formulae. Quae operationes quo faci-
 lius intelligantur, casum formulae $[\frac{9}{12}] = \frac{9}{12} \sqrt[12]{12^3 P. Q}$
 hoc modo euoluamus, vbi inuestigatio litterarum Q
 et P ita instituetur.

Pro $Q \dots (\frac{9}{12})(\frac{3}{12})(\frac{13}{12})(\frac{5}{12})(\frac{17}{12})(\frac{11}{12})(\frac{23}{12})(\frac{7}{12})(\frac{29}{12})(\frac{19}{12})(\frac{35}{12})(\frac{13}{12})$

Pro $P \dots 6. 3 \quad 9. 6. 3 \quad 9. 6. 3$

sicque

sicque reperitur:

$$Q = \left(\frac{2}{3}\right)^2 \left(\frac{6}{9}\right)^2 \left(\frac{3}{9}\right)^2 \left(\frac{7}{9}\right)^2 \quad \text{et}$$

$$P = 6^2 \cdot 3^2 \cdot 9^2.$$

Cum igitur sit $\left(\frac{12}{9}\right) = \frac{4}{3}$ sit $PQ = 6^2 \cdot 3^2 \left(\frac{2}{3}\right) \left(\frac{6}{9}\right)^2 \left(\frac{3}{9}\right)^2$ ideoque

$$\{A\} = \frac{1}{2} \sqrt{12 \cdot 6 \cdot 3 \cdot \left(\frac{2}{3}\right) \left(\frac{6}{9}\right) \left(\frac{3}{9}\right)}.$$

Theorema.

53. Quicumque numeri integri positiui litteris m et n indicentur, erit semper signandi modo ante exposito:

$$\left[\frac{m}{n}\right] = \frac{m}{n} \sqrt[n]{n^{n-m} \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 \dots (m-1) \left(\frac{1}{m}\right) \left(\frac{2}{m}\right) \left(\frac{3}{m}\right) \dots \left(\frac{n-1}{m}\right)}.$$

Demonstratio.

Pro casu, quo m et n sunt numeri inter se primi, veritas theorematis in antecedentibus est euicta, quod autem etiam locum habeat, si illi numeri m et n commune diuisore gaudeant, inde quidem non liquet: verum ex hoc ipso, quod pro casibus, quibus m et n sunt numeri primi, veritas constat, tuto concludere licet, theorema in genere esse verum. Minime quidem diffiteor hoc concludendi genus prorsus esse singulare, ac plerisque suspectum videri debere. Quare quo nullum dubium relinquatur quoniam pro casibus, quibus numeri m et n inter se sunt compositi, geminam expressionem sumus nacti, vtriusque consensum pro casibus ante euolutis ostendisse iuuabit. Insigne autem iam sup-

pedirat

peditat firmamentum casus $m=n$, quo forma nostra manifeste unitatem producit.

Coroll. 1.

54. Primus casus consensus demonstrationem postulans est quo $m=2$ et $n=4$, pro quo supra §. 47. inuenimus

$$[\frac{1}{2}] = \frac{1}{2} \sqrt[4]{4^2} \cdot (\frac{1}{2})^2 \text{ nunc autem vi theorematidis est}$$

$$[\frac{1}{2}] = \frac{1}{2} \sqrt[4]{4^2} \cdot 1 (\frac{1}{2}) (\frac{1}{2}) (\frac{1}{2}) (\frac{1}{2})$$

vnde comparatione instituta fit $(\frac{1}{2}) = (\frac{1}{2}) (\frac{1}{2})$ cuius veritas in Observationibus supra allegatis est confirmata.

Coroll. 2.

55. Si $m=2$ et $n=6$, ex superioribus (49) est

$$[\frac{1}{2}] = \frac{1}{2} \sqrt[6]{6^2} \cdot (\frac{1}{2})^2 (\frac{1}{2})^2 \text{ nunc vero per theorema}$$

$$[\frac{1}{2}] = \frac{1}{2} \sqrt[6]{6^2} \cdot 1 (\frac{1}{2}) (\frac{1}{2}) (\frac{1}{2}) (\frac{1}{2}) (\frac{1}{2}) (\frac{1}{2})$$

ideoque necesse est sit

$$(\frac{1}{2}) (\frac{1}{2}) = (\frac{1}{2}) (\frac{1}{2}) (\frac{1}{2}) (\frac{1}{2})$$

cuius veritas indidem patet.

Coroll. 3.

56. Si $m=3$ et $n=6$, peruenitur ad hanc aequationem :

$$(\frac{1}{3})^2 = 1 \cdot 2 (\frac{1}{3}) (\frac{1}{3}) (\frac{1}{3}) (\frac{1}{3})$$

at si $m = 4$ et $n = 6$ fit simili modo:

$$2^3 \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{2}\right) = 1. 2. 3 \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{2}\right)$$

$$\text{feu } \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{2} \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{2}\right)$$

quod etiam verumprehenditur.

Coroll. 4.

57. Casus $m = 2$ et $n = 8$ praebet hanc aequalitatem:

$$\left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{6}{2}\right) = \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{5}{2}\right) \left(\frac{7}{2}\right)$$

at casus $m = 4$ et $n = 8$ hanc:

$$\left(\frac{1}{2}\right)^2 = 1. 2. 3 \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{3}{2}\right) \left(\frac{5}{2}\right) \left(\frac{7}{2}\right)$$

casus denique $m = 6$ et $n = 8$ istam

$$2. 4 \left(\frac{6}{2}\right) \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{2}\right) = 1. 3. 5 \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{3}{2}\right) \left(\frac{5}{2}\right) \left(\frac{7}{2}\right)$$

quae etiam veritati sunt consentaneae.

Scholion.

58. In genere autem si numeri m et n communem habeant factorem 2, et formula proposita sit $\left[\frac{1}{2} \frac{m}{n}\right] = \left[\frac{m}{n}\right]$ quia est;

$$\left[\frac{m}{n}\right] = \frac{m}{n} \sqrt[n]{n^{n-m}}. 1. 2. 3 \dots (m-1) \left(\frac{1}{2} \frac{m}{n}\right) \left(\frac{2}{2} \frac{m}{n}\right) \left(\frac{3}{2} \frac{m}{n}\right) \dots \left(\frac{n-1}{2} \frac{m}{n}\right)$$

erit eadem ad exponentem 2 n reducta:

$$\frac{m}{n} \sqrt[n]{2^{n^{2n-1m}}} . 2^2 . 4^2 . 6^2 \dots (2m-2)^2 \left(\frac{1}{2} \frac{m}{n}\right)^2 \left(\frac{2}{2} \frac{m}{n}\right)^2 \left(\frac{3}{2} \frac{m}{n}\right)^2 \dots \left(\frac{2n-2}{2} \frac{m}{n}\right)^2$$

Per theorema vero eadem expressio fit

$$\frac{m}{n} \sqrt[n]{2^{n^{2n-1m}}} . 1. 2. 3 \dots (2m-1) \left(\frac{1}{2} \frac{m}{n}\right) \left(\frac{2}{2} \frac{m}{n}\right) \left(\frac{3}{2} \frac{m}{n}\right) \dots \left(\frac{2n-1}{2} \frac{m}{n}\right)$$

vnde

vnde pro exponente $2n$ erit

$$2. 4. 6. \dots (2m-2) \left(\frac{2}{2m}\right) \left(\frac{4}{2m}\right) \left(\frac{6}{2m}\right) \dots \left(\frac{2m-2}{2m}\right) =$$

$$1. 3. 5. \dots (2m-1) \left(\frac{1}{2m}\right) \left(\frac{3}{2m}\right) \left(\frac{5}{2m}\right) \dots \left(\frac{2m-1}{2m}\right)$$

Simili modo si communis diuifor fit 3 pro exponente $3n$ reperietur

$$2^3. 6^3. 10^3. \dots (3m-3)^3 \left(\frac{2}{3m}\right)^3 \left(\frac{6}{3m}\right)^3 \left(\frac{10}{3m}\right)^3 \dots \left(\frac{3m-3}{3m}\right)^3 =$$

$$1. 2. 4. 5. \dots (3m-2)(3m-1) \left(\frac{1}{3m}\right) \left(\frac{2}{3m}\right) \left(\frac{4}{3m}\right) \left(\frac{5}{3m}\right) \dots \left(\frac{3m-2}{3m}\right) \left(\frac{3m-1}{3m}\right)$$

quae aequatio concinnius ita exhiberi potest:

$$\frac{1. 2. 4. 5. 7. 8. 10. \dots (3m-2)(3m-1)}{3^4. 6^4. 9^4. \dots (3m-3)^4} = \frac{\left(\frac{2}{3m}\right)^3 \left(\frac{6}{3m}\right)^3 \dots \left(\frac{3m-3}{3m}\right)^3}{\left(\frac{1}{3m}\right) \left(\frac{2}{3m}\right) \left(\frac{4}{3m}\right) \left(\frac{5}{3m}\right) \left(\frac{7}{3m}\right) \dots \left(\frac{3m-2}{3m}\right) \left(\frac{3m-1}{3m}\right)}$$

In genere autem si communis diuifor fit d et exponens dn habebitur.

$$[d. 2d. 3d. \dots (dm-d) \left(\frac{d}{dm}\right) \left(\frac{2d}{dm}\right) \left(\frac{3d}{dm}\right) \dots \left(\frac{dm-d}{dm}\right)]^d =$$

$$1. 2. 3. 4. \dots (dm-1) \left(\frac{1}{dm}\right) \left(\frac{2}{dm}\right) \left(\frac{3}{dm}\right) \dots \left(\frac{dm-1}{dm}\right)$$

quae aequatio facile ad quosuis casus accommodari potest vnde sequens Theorema notari meretur.

Theorema.

59. Si a fuerit diuifor communis numerorum m et n haecque formula $\left(\frac{a}{m}\right)$ denotet valorem inte-

R 2

gralis

gralis $\int \frac{x^{n-1} d x}{\sqrt[n]{(1-x^n)^{n-a}}}$ ab $x=0$ vsque ad $x=1$ exacti, erit

$$[a, 2a, 3a, \dots, (m-a) \left(\frac{a}{m}\right) \left(\frac{2a}{m}\right) \left(\frac{3a}{m}\right) \dots \left(\frac{n-a}{m}\right)]^a =$$

$$1. 2. 3. \dots (m-1) \left(\frac{1}{m}\right) \left(\frac{2}{m}\right) \left(\frac{3}{m}\right) \dots \left(\frac{n-1}{m}\right).$$

Demonstratio.

Ex praecedente scholio veritas huius theorematis perspicitur, cum enim ibi diuisor communis esset $= d$, binique numeri propositi d/m et d/n horum loco hic scripsi m et n loco diuisoris eorum. autem d litteram a quam diuisoris rationem aequalitas enunciata ita complectitur, vt in progressionem arithmetica $a, 2a, 3a$, etc. continuata occurrere assumantur ipsi numeri m et n ideoque etiam $m-a$ et $n-a$. Ceterum fateri cogor hanc demonstrationem utpote inductioni potissimum innixam, neutiquam pro rigoroſa haberi posse: cum autem nihilominus de eius veritate sumus conuicti, hoc theorema eo maiori attentione dignum videtur, interim tamen nullum est dubium, quin vberior huiusmodi formularum integralium euolutio tandem perfectam demonstrationem sit largitura quod autem iam ante nobis hanc veritatem perspicere licuerit, insignis hinc specimen analyticae inuestigationis elucet.

Corolli.

Coroll. 1.

69. Si loco signorum adhibitorum ipsas formulas integrales substituamus, theorema nostrum ita se habebit ut sit:

$$\begin{aligned} & \alpha. 2\alpha. 3\alpha \dots (m-\alpha) \int \frac{x^{\alpha-1} dx}{\sqrt[n]{(1-x^n)^{n-m}}} \cdot \int \frac{x^{2\alpha-1} dx}{\sqrt[n]{(1-x^n)^{n-m}}} \dots \int \frac{x^{n-\alpha-1} dx}{\sqrt[n]{(1-x^n)^{n-m}}} = \\ & \sqrt[n]{1. 2. 3 \dots (m-1)} \int \frac{dx}{\sqrt[n]{(1-x^n)^{n-m}}} \cdot \int \frac{x dx}{\sqrt[n]{(1-x^n)^{n-m}}} \dots \int \frac{x^{n-2} dx}{\sqrt[n]{(1-x^n)^{n-m}}} \end{aligned}$$

Coroll. 2.

61. Vel si ad abbreviandum statuamus $\sqrt[n]{(1-x^n)^{n-m}} = X$ erit

$$\begin{aligned} & \alpha. 2\alpha. 3\alpha \dots (m-\alpha) \int \frac{x^{\alpha-1} dx}{X} \cdot \int \frac{x^{2\alpha-1} dx}{X} \dots \int \frac{x^{n-\alpha-1} dx}{X} = \\ & \sqrt[n]{1. 2. 3 \dots (m-1)} \int \frac{dx}{X} \cdot \int \frac{x dx}{X} \cdot \int \frac{x^2 dx}{X} \dots \int \frac{x^{n-2} dx}{X} \end{aligned}$$

Theorema generale.

62. Si binorum numerorum m et n diuifores communes sint α , β , γ etc. formulaque $(\frac{p}{q})$ denotet valorem integralis $\int \frac{x^{p-1} dx}{\sqrt[n]{(1-x^n)^{n-q}}}$ ab $x=0$ ad

$x=1$ extenfi fequentes expreffiones ex huiusmodi formulis integralibus formatae inter fe erunt aequales:

R. 3

[$\alpha. 2\alpha$

$$\begin{aligned}
& [\alpha. 2\alpha. 3\alpha \dots (m-\alpha) \left(\frac{\alpha}{m}\right) \left(\frac{1\alpha}{m}\right) \left(\frac{1^2\alpha}{m^2}\right) \dots \left(\frac{1^{m-\alpha}\alpha}{m^{m-\alpha}}\right)]^\alpha = \\
& [\beta. 2\beta. 3\beta \dots (m-\beta) \left(\frac{\beta}{m}\right) \left(\frac{1\beta}{m}\right) \left(\frac{1^2\beta}{m^2}\right) \dots \left(\frac{1^{m-\beta}\beta}{m^{m-\beta}}\right)]^\beta = \\
& [\gamma. 2\gamma. 3\gamma \dots (m-\gamma) \left(\frac{\gamma}{m}\right) \left(\frac{1\gamma}{m}\right) \left(\frac{1^2\gamma}{m^2}\right) \dots \left(\frac{1^{m-\gamma}\gamma}{m^{m-\gamma}}\right)]^\gamma \text{ etc.}
\end{aligned}$$

Demonstratio.

Ex praecedente Theoremate huius veritas manifeste sequitur cum quaelibet harum expressionum seorsim aequetur huic:

$$1. 2. 3 \dots (m-1) \left(\frac{1}{m}\right) \left(\frac{1}{m}\right) \dots \left(\frac{1^{m-1}}{m^{m-1}}\right)$$

quae unitati utpote minimo communi diuisori numerorum m et n conuenit. Tot igitur huiusmodi expressiones inter se aequales exhiberi possunt, quot fuerint diuisores communes binorum numerorum m et n .

Coroll. 1.

63. Cum sit haec formula $\left(\frac{n}{m}\right) = \frac{1}{m}$, ideoque: $m \left(\frac{n}{m}\right) = 1$; expressiones nostrae aequales succinctius hoc modo repraesentari possunt:

$$\begin{aligned}
& [\alpha. 2\alpha. 3\alpha \dots m \left(\frac{\alpha}{m}\right) \left(\frac{1\alpha}{m}\right) \left(\frac{1^2\alpha}{m^2}\right) \dots \left(\frac{1^{m-\alpha}\alpha}{m^{m-\alpha}}\right)]^\alpha = \\
& [\beta. 2\beta. 3\beta \dots m \left(\frac{\beta}{m}\right) \left(\frac{1\beta}{m}\right) \left(\frac{1^2\beta}{m^2}\right) \dots \left(\frac{1^{m-\beta}\beta}{m^{m-\beta}}\right)]^\beta = \\
& [\gamma. 2\gamma. 3\gamma \dots m \left(\frac{\gamma}{m}\right) \left(\frac{1\gamma}{m}\right) \left(\frac{1^2\gamma}{m^2}\right) \dots \left(\frac{1^{m-\gamma}\gamma}{m^{m-\gamma}}\right)]^\gamma.
\end{aligned}$$

Et si enim hic factorum numerus est auctus, tamen ratio compositionis facilius in oculos incurrit.

Coroll.

Coroll. 2.

64. Si ergo sit $m = 6$ et $n = 12$ ob horum numerorum diuisores communes 6, 3, 2, 1 quatuor sequentes formae inter se aequales habebuntur :

$$[6 \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{3}\right)]^6 = [3 \cdot 6 \left(\frac{1}{3}\right) \left(\frac{2}{3}\right) \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{3}\right)]^2 =$$

$$[2 \cdot 4 \cdot 6 \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{3}\right) \left(\frac{2}{3}\right) \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{3}\right) \left(\frac{1}{2}\right)]^2 =$$

$$1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{3}\right) \left(\frac{2}{3}\right) \dots \left(\frac{1}{2}\right).$$

Coroll. 3.

65. Si vltima cum penultima combinetur, nascetur haec aequatio :

$$\frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6} = \frac{\left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{3}\right) \left(\frac{2}{3}\right) \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{3}\right) \left(\frac{1}{2}\right)}{\left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{3}\right) \left(\frac{2}{3}\right) \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{3}\right) \left(\frac{1}{2}\right)}$$

vltima autem cum antepenultima comparata praebet :

$$\frac{1 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 5}{3 \cdot 3 \cdot 6 \cdot 6} = \frac{\left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{3}\right) \left(\frac{2}{3}\right) \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{3}\right) \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{3}\right)}{\left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{3}\right) \left(\frac{2}{3}\right) \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{3}\right) \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{3}\right)}$$

Scholion.

66. Infinitae igitur hinc consequuntur relationes inter formulas integrales formae :

$$\int \frac{x^{p-1} dx}{\sqrt[p]{(1-x^a)^{n-a}}} = \left(\frac{p}{a}\right)$$

quae eo magis sunt notatu dignae, quod singulari prorsus methodo ad eas hic sumus perducti. Ac si quis de earum veritate adhuc dubitet, obseruationes meas circa has formulas integrales consulat, indeque pro

pro quouis casu oblato de veritate facile conuincetur. Et si autem illa tractatio huic confirmandae inseruit, tamen relationes hic erutae eo maioris sunt momenti, quod in iis certus ordo cernitur, eaeque per omnes classes, quantumuis exponentem n accipere lubeat, facili negotio continuentur, in priori vero tractatione calculus pro classibus altioribus continuo fiat operosior et intricatior.

SVPPLEMENTVM

continens demonstrationem

Theorematis §. 53. propositi.

Demonstrationem hanc altius peti conuenit; sumatur scilicet aequatio §. 25. data, quae posito $f = x$ et mutatis litteris est;

$$\frac{\int dx \left(\frac{h}{x}\right)^{\nu-1} \cdot \int dx \left(\frac{h}{x}\right)^{\mu-1}}{\int dx \left(\frac{h}{x}\right)^{\mu+\nu-1}} = \kappa \int \frac{x^{\kappa\mu-1} dx}{(1-x^{\kappa})^{\nu-1}}$$

eaeque per reductiones notas hac forma repraesentetur:

$$\frac{\int dx \left(\frac{h}{x}\right)^{\nu} \cdot \int dx \left(\frac{h}{x}\right)^{\mu}}{\int dx \left(\frac{h}{x}\right)^{\mu+\nu}} = \frac{\kappa \mu \nu}{\mu + \nu} \int \frac{x^{\kappa\mu-1} dx}{(1-x^{\kappa})^{\nu-1}}$$

Statuatur nunc $\nu = \frac{m}{n}$ et $\mu = \frac{\lambda}{n}$ tum vero $\kappa = s$ ut habeamus:

$$\frac{\int dx \left(\frac{h}{x}\right)^{\frac{m}{n}} \cdot \int dx \left(\frac{h}{x}\right)^{\frac{\lambda}{n}}}{\int dx \left(\frac{h}{x}\right)^{\frac{\lambda+m}{n}}} = \frac{\lambda m}{\lambda + m} \int \frac{x^{\lambda-1} dx}{V^{\frac{1}{s}}(1-x^s)^{n-m}}$$

qua

quae breuitatis gratia, more supra vſitato, ita continne referatur:

$$\left[\frac{m}{n} \right] \cdot \left[\frac{\lambda}{n} \right] = \frac{\lambda m}{\lambda + m} \cdot \left(\frac{\lambda}{m} \right)$$

Iam loco λ ſucceſſive ſcribantur numeri 1, 2, 3, 4, ..., n omnesque hae aequationes, quarum numerus eſt $= n$ in ſe inuicem ducantur, et aequatio reſultans erit:

$$\left[\frac{m}{n} \right] \cdot \frac{\left[\frac{1}{n} \right] \left[\frac{2}{n} \right] \left[\frac{3}{n} \right] \dots \dots \dots \left[\frac{n}{n} \right]}{\left[\frac{n+1}{n} \right] \left[\frac{n+2}{n} \right] \left[\frac{n+3}{n} \right] \dots \left[\frac{n+n}{n} \right]} =$$

$$m^n \cdot \frac{1}{m+1} \cdot \frac{2}{m+2} \cdot \frac{3}{m+3} \dots \dots \dots \frac{n}{m+n} \left(\frac{1}{m} \right) \left(\frac{2}{m} \right) \left(\frac{3}{m} \right) \dots \left(\frac{n}{m} \right) =$$

$$m^n \cdot \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots \dots \dots m}{(n+1)(n+2)(n+3) \dots (n+m)} \left(\frac{1}{m} \right) \left(\frac{2}{m} \right) \left(\frac{3}{m} \right) \dots \left(\frac{n}{m} \right).$$

Simili autem modo pars prior transformetur vt ſit

$$\left[\frac{m}{n} \right] \cdot \frac{\left[\frac{1}{n} \right] \left[\frac{2}{n} \right] \left[\frac{3}{n} \right] \dots \dots \dots \left[\frac{m}{n} \right]}{\left[\frac{n+1}{n} \right] \left[\frac{n+2}{n} \right] \left[\frac{n+3}{n} \right] \dots \dots \left[\frac{n+n}{n} \right]}$$

cuius conuenientia cum forma praecedente multiplicando per crucem, vt aiunt, ſponte ſe prodit. Cum vero ex natura harum formularum ſit

$$\left[\frac{n+1}{n} \right] = \frac{n+1}{n} \left[\frac{1}{n} \right]; \left[\frac{n+2}{n} \right] = \frac{n+2}{n} \left[\frac{2}{n} \right]; \left[\frac{n+3}{n} \right] = \frac{n+3}{n} \left[\frac{3}{n} \right] \text{ etc.}$$

ob harum formularum numerum $= m$, euadet haec prior pars:

$$\left[\frac{m}{n} \right] \cdot \frac{n^n}{(n+1)(n+2)(n+3) \dots (n+m)}$$

quae cum aequalis ſit parti alteri ante exhibitae:

$$m^n \cdot \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots \dots \dots m}{(n+1)(n+2)(n+3) \dots (n+m)} \left(\frac{1}{m} \right) \left(\frac{2}{m} \right) \left(\frac{3}{m} \right) \dots \left(\frac{n}{m} \right)$$

adipiscimur hanc æquationem :

$$\left[\frac{m}{n}\right] = \frac{m^n}{n^m} \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 \dots m \left(\frac{1}{m}\right) \left(\frac{1}{m}\right) \left(\frac{1}{m}\right) \dots \left(\frac{1}{m}\right)$$

ita vt fit

$$\left[\frac{m}{n}\right] = m \sqrt[n]{\frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots m}{n^m} \left(\frac{1}{m}\right) \left(\frac{1}{m}\right) \left(\frac{1}{m}\right) \dots \left(\frac{1}{m}\right)}$$

quæ cum proposita in §. 53. ob $\left(\frac{n}{m}\right) = \frac{1}{m}$ omnino congruit, ex quo eius veritas nunc quidem ex principijs certissimis est euicta.

Demonstratio Theorematis

§. 59. propositi.

Etiam hoc Theorema firmiori demonstratione indiget, quam ex æqualitate ante stabilita :

$$\frac{\left[\frac{m}{n}\right] \cdot \left[\frac{\lambda}{n}\right]}{\left[\frac{\lambda+m}{n}\right]} = \frac{\lambda \cdot m}{\lambda+m} \left(\frac{\lambda}{m}\right)$$

ita adorno. Existente α communi diuifore numerorum m et n , loco λ successiue scribantur numeri $\alpha, 2\alpha, 3\alpha$ etc. vsque ad n , quorum multitudo est $= \frac{n}{\alpha}$ atque omnes æqualitates hoc modo resultantes in se inuicem ducantur, vt prodeat hæc æquatio

$$\left[\frac{m}{n}\right]^{\frac{n}{\alpha}} \cdot \frac{\left[\frac{\alpha}{n}\right] \left[\frac{2\alpha}{n}\right] \left[\frac{3\alpha}{n}\right] \dots \left[\frac{n}{n}\right]}{\left[\frac{m+\alpha}{n}\right] \left[\frac{m+2\alpha}{n}\right] \left[\frac{m+3\alpha}{n}\right] \dots \left[\frac{m+n}{n}\right]} =$$

$$m^{\frac{n}{\alpha}} \cdot \frac{\alpha}{m+\alpha} \cdot \frac{2\alpha}{m+2\alpha} \cdot \frac{3\alpha}{m+3\alpha} \dots \frac{n}{m+n} \left(\frac{\alpha}{m}\right) \left(\frac{2\alpha}{m}\right) \left(\frac{3\alpha}{m}\right) \dots \left(\frac{n}{m}\right).$$

Iam

Iam prior pars in hanc formam ipsi aequalem transmutetur :

$$\left[\frac{m}{n}\right]^{\frac{n}{\alpha}} \cdot \frac{\left[\frac{\alpha}{n}\right] \left[\frac{1}{n}\right] \left[\frac{1}{n}\right] \dots \dots \dots \left[\frac{m}{n}\right]}{\left[\frac{n+\alpha}{n}\right] \left[\frac{n+2\alpha}{n}\right] \left[\frac{n+3\alpha}{n}\right] \dots \dots \left[\frac{n+m}{n}\right]}$$

quae ob $\left[\frac{n+\alpha}{n}\right] = \frac{n+\alpha}{n} \left[\frac{\alpha}{n}\right]$ sicque de ceteris reducitur ad hanc :

$$\left[\frac{m}{n}\right]^{\frac{n}{\alpha}} \cdot \frac{n}{n+\alpha} \cdot \frac{n}{n+2\alpha} \cdot \frac{n}{n+3\alpha} \dots \dots \dots \frac{n}{n+m}.$$

Posterior vero aequationis pars simili modo transformatur in :

$$m^{\frac{n}{\alpha}} \cdot \frac{\alpha}{n+\alpha} \cdot \frac{1}{n+2\alpha} \cdot \frac{1}{n+3\alpha} \dots \dots \frac{m}{n+m} \left(\frac{\alpha}{m}\right) \left(\frac{1}{m}\right) \left(\frac{1}{m}\right) \dots \left(\frac{\alpha}{m}\right)$$

unde enascitur haec aequatio :

$$\left[\frac{m}{n}\right]^{\frac{n}{\alpha}} n^{\frac{n}{\alpha}} = m^{\frac{n}{\alpha}} \cdot \alpha \cdot 2\alpha \cdot 3\alpha \dots m \left(\frac{\alpha}{m}\right) \left(\frac{1}{m}\right) \left(\frac{1}{m}\right) \dots \left(\frac{\alpha}{m}\right)$$

hincque

$$\left[\frac{m}{n}\right] = m \sqrt[\frac{n}{\alpha}]{\alpha \cdot 2\alpha \cdot 3\alpha \dots m \left(\frac{\alpha}{m}\right) \left(\frac{1}{m}\right) \left(\frac{1}{m}\right) \dots \left(\frac{\alpha}{m}\right)}$$

quae expressio cum praecedente comparata praebet hanc aequationem :

$$(\alpha \cdot 2\alpha \cdot 3\alpha \dots m \left(\frac{\alpha}{m}\right) \left(\frac{1}{m}\right) \left(\frac{1}{m}\right) \dots \left(\frac{\alpha}{m}\right))^{\frac{n}{\alpha}} =$$

$$1 \cdot 2 \cdot 3 \dots m \left(\frac{1}{m}\right) \left(\frac{1}{m}\right) \left(\frac{1}{m}\right) \dots \left(\frac{1}{m}\right)$$

quod de omnibus diuisoribus communibus binorum numerorum m et n est intelligendum.

PROBLEMATIS
CVIVSDAM GEOMETRICI
PRORSVS SINGVLARIS EVOLVTIO.

Auctore

L. EVLERO.

I.

Quaestionem hic geometricam ad examen sum revocaturus quae cum ad genus adhuc nondum tractatum pertineat eo maiore attentione digna videtur, quod solutio quam *Analyfis* suppeditat, ita sit comparata, ut ex ea vix intelligi queat, utrum illi vnica satisfaciatur linea curva an plures ac fortasse innumerabiles. Neque vero memini alia huiusmodi problemata a Geometris esse considerata quae tali incertitudini sint obnoxia, ut inuenta adeo solutione analytica ancipites haereamus, utrum ad genus determinatarum quaestionum, an indeterminatarum sint referenda. Quare non dubito, quin evolutio quaestionis, quam hic sum instituturus, occasionem sit praebitura fines cognitionis nostrae analyticae haud mediocriter proferendi.

2. Notissima autem circuli proprietas, quae recta angulum a binis tangentibus formatum bisecans circulum normaliter traiecit, quaestionem hic tractandam suppeditavit.

Pre-

*Propofita fcilicet recta pofitione data AB eius-
modi quaeritur curua A m M, et ducta ad eius pun-
ctum quodcunque M tangente MT rectae illi AB in
T occurrente recta TC angulum ATM bifecans ean-
dem curuam in m normaliter traiciat.*

Tab II.
Fig. 2.

Manifestum igitur est huic quaestioni fatisfacere circulum quemcunque rectam pofitione datam AB alicubi tangentem; et cum tam locus contactus quam magnitudo circuli arbitrio nostro relinquatur, solutiones quidem innumerabiles inde nascuntur, quae tamen omnes, quoniam eadem specie continentur, unam quasi solutionem constituere sunt censendae. Ex quo praecipuum huius quaestionis momentum in hoc versatur, num praeter circulos aliae dentur lineae curuae, in quas eadem proprietas competat.

3. Mentem ergo a circulo abstrahentes quaestionem propositam ita aggrediamur, ut analytice generatim in eas lineas curuas inquiramus, quae proprietate memorata sint praeditae. Methodus autem hoc problema resoluendi ideo haud parum videtur recondita, quod bina puncta M et m, quorum nexus non satis definitur, ad eandem curuam sint referenda, dum pro altero M recta tangens pro altero vero m normalis ad curuam considerari debent quas binas rectas MT et mT ita in recta data AB concurrere necesse est, ut ista mT angulum ATM bifariam secet. Neque vero haec binorum punctorum M et m relatio est reciproca, uti in plerisque aliis huiusmodi quaestionibus usu venit, ubi ex

certa quadam binorum punctorum relatione naturam curvae inuestigari oportet.

4. Quo igitur indolem binorum punctorum m et M ad similitudinem perducamus, ad m quoque tangentem concipiamus mt rectae datae AB in t occurrentem, ac iam manifestum est relationem inter lineas At et tm eadem aequatione exprimi oportere, ac relationem inter rectas AT et TM , ubi ergo videndum est, quomodo hae binae relationes inter se connectantur. Hunc in finem consideretur angulus Btm , qui vocetur $=\omega$, et ob Tmt rectum habebimus angulum $ATm = 90^\circ - \omega$, cui cum per conditionem problematis aequalis esse debeat angulus MTm , erit angulus $MTB = 2\omega$, unde solutio eo reuocatur, ut curvae punctum M eodem modo ex angulo 2ω determinetur, quo punctum m ex angulo ω determinatur.

5. Cum igitur posito angulo $Btm = \omega$ sit angulus $BTM = 2\omega$, vocemus rectas tangentes $mt = t$ et $MT = T$, ac nunc perspicuum est, qualis fuerit functio quantitas t ipsius ω , talem functionem esse debere quantitatem T ipsius 2ω ; haecque est conditio ob legem continuitatis requisita quae efficitur ut bina puncta m et M ad eandem lineam curuam continuam referantur. Simili vero modo cum etiam recta At tanquam functio anguli $Btm = \omega$ spectari possit, necesse est ut recta AT similis omnino sit functio anguli dupli $BTM = 2\omega$. Harum autem rectarum At et AT differentia Tt , quia

quia ob triangulum smT rectangulum esse debet
 $Ts = \frac{t}{\cos. \omega}$, ex hac ipsa conditione solutio proble-
 matis erit deducenda. Ceterum hic notari conueniet
 angulum $Bsm = \omega$ designare amplitudinem arcus
 Am , ita vt arcus AM amplitudo illius sit dupla.

6. Ad quaestionem itaque resoluendam dispi- Tab. II.
Fig. 3.
 ciamus, quomodo per angulum $Bsm = \omega$ et tan-
 gentem $sm = s$ interuallum As in recta positione
 data AB determinetur, vbi quidem perinde est vbi
 punctum fixum A accipiat. Ducta igitur curuae
 tangente proxima $\mu\tau$, vt sit angulus $B\tau\mu = \omega + d\omega$,
 ideoque angulus $s\mu\tau = d\omega$, vnde centro m vel
 μ descripto arcu elementari $s\theta$ radio $\mu\tau$ pro-
 ducto in θ occurrente, erit $s\theta = s d\omega$, hinc ob
 $\theta s\tau = 90^\circ - \omega$ fit $s\tau = \frac{s d\omega}{\sin. \omega}$, quod est incremen-
 tum interualli As ita vt hinc concludamus $As = \int \frac{s d\omega}{\sin. \omega}$.
 Qua expressione ad priorem figuram translata, si
 pro s scribamus T et loco anguli ω eius duplum
 2ω , lex continuitatis praebet

$$AT = \int \frac{T d\omega}{\sin. 2\omega} = \int \frac{T d\omega}{\sin. \omega \cos. \omega},$$

vnde elicitur interuallum

$$Ts = \int \frac{T d\omega}{\sin. \omega \cos. \omega} - \int \frac{s d\omega}{\sin. \omega}$$

quantitati $\frac{t}{\cos. \omega}$ aequandum.

7. Sumtis ergo differentialibus hanc adipisci-
 mur aequationem:

$$\frac{T d\omega}{\sin. \omega \cos. \omega} - \frac{s d\omega}{\sin. \omega} = \frac{d s}{\cos. \omega} + \frac{s d\omega \sin. \omega}{\cos. \omega^2}$$

quae

quae reducitur ad hanc

$$\frac{T d \omega}{\int \sin. \omega \cos. \omega} = \frac{d T}{\cos. \omega} + \frac{T d \omega}{\int \sin. \omega \cos. \omega}$$

indeque ad istam :

$$T \cos. \omega = T + \frac{d T}{d \omega} \sin. \omega \cos. \omega.$$

Quocirca quaestio iam huc est perducta, ut pro T eiusmodi functio ipsius ω sit inuestiganda ut si pro T similis functio ipsius 2ω scribatur, aequationi modo inuentae satisfiat. Quemadmodum autem eiusmodi conditiones sint adimplendae, methodus certa adhuc desideratur, imprimis si solutiones generales postulentur. Quamobrem haud inutile erit aequationem inuentam in plurimas alias formas transfundere, ex quibus quae fuerit simplicissima, facillime quoque poterit tractari.

8. Angulum quidem ω perpetuo in calculo conseruari oportet quia per eum quantitates ad binz puncta m et M referendae commodissime definiuntur. Ponamus igitur ipsa intervalla $At = x$ et $AT = X$, ita ut iam simili modo X talis debeat esse functio ipsius 2ω , qualis x fuerit ipsius ω . Quia ergo habemus $\int \frac{T d \omega}{\int \sin. \omega \cos. \omega} = X$ et $\int \frac{T d \omega}{\int \sin. \omega} = x$, hinc fit $T = \frac{d x \sin. \omega}{d \omega}$ et nunc solutio problematis perducitur ad hanc aequationem :

$$X - x = \frac{d x}{d \omega} \tan. \omega \sec$$

$$X \cos. \omega = \frac{d x}{d \omega} \sin. \omega + x \cos. \omega.$$

Quodsi

Quodsi porro ponamus $x \sin. \omega = y$ similique modo $X \sin. 2 \omega = Y$ vt sit $X \cos. \omega = \frac{Y}{2 \sin. \omega}$, haec aequatio prodit simplicior:

$$\frac{Y}{2 \sin. \omega} = \frac{d y}{d \omega} \text{ seu } Y = \frac{2 d y}{d \omega} \sin. \omega$$

cui aequationi ita satisfieri oportet, vt qualis y fuerit functio ipsius ω , talis Y sit functio ipsius 2ω .

9. Possumus quoque pro puncto m ipsam normalem $m T$ in calculum introducere, posita enim $m T = p$, et normali puncto M conueniente $= P$, quia est $p = t \tan. \omega$, erit simili modo $P = T \tan. 2 \omega$ et ob $t = \frac{p \cos. \omega}{\sin. \omega}$ et $T = \frac{P \cos. 2 \omega}{\sin. 2 \omega}$ aequatio solutionem continens abit in hanc formam:

$$\int \frac{2 P d \omega \cos. 2 \omega}{(\sin. 2 \omega)^2} - \int \frac{p d \omega \cos. \omega}{(\sin. \omega)^2} = \int \frac{p}{\sin. \omega}$$

quae differentiata dat:

$$\frac{2 P d \omega \cos. 2 \omega}{(\sin. 2 \omega)^2} - \frac{p d \omega \cos. \omega}{(\sin. \omega)^2} = \frac{d p}{\sin. \omega} - \frac{p d \omega \cos. \omega}{(\sin. \omega)^2}$$

$$\text{seu } P d \omega \cos. 2 \omega = 2 d p \sin. \omega \cos. \omega = d p \cos. \omega \sin. 2 \omega$$

$$\text{ita vt sit } P = \frac{d p}{d \omega} \cos. \omega \tan. 2 \omega.$$

10. In computum etiam duci potest ipse arcus Tab. II. curuae $A m$, qui ponatur $= s$, ita vt relatio inter Fig. 3. hunc arcum $A m = s$ et amplitudinem eius ω sit definienda. Ex figura autem 2, hoc facillime praestabitur, cum enim posita tangente $m t = t$ sit $\mu \tau = t + d t$ et $m \mu = d s$, ob $t \theta = t d \omega$ hincque $\tau \theta = \frac{d \omega \cos. \omega}{\sin. \omega}$ erit $\mu \theta = t + d t + \frac{t d \omega \cos. \omega}{\sin. \omega}$,

Tom. XVI. Nou. Comm.

T

quae

quae linea ipsi $\mu t = t + ds$ aequalis statui debet
unde colligitur :

$$ds = dt + \frac{d\omega \cos \omega}{\sin \omega} = \frac{ds + \frac{d\omega \cos \omega}{\sin \omega}}{\sin \omega}$$

Tab. II. ideoque $t = \frac{1}{\sin \omega} \int ds \sin \omega$. Quare si simili modo
Fig. 2. ponatur arcus $AM = S$ tangente existente $MT = T$,
habebimus

$$T = \frac{1}{\sin \omega} \int ds \sin \omega = \frac{1}{\sin \omega \cos \omega} \int dS \sin \omega \cos \omega ,$$

quos valores in aequatione supra inuenta $T \cos \omega$
 $= t + \frac{d\omega}{d\omega} \sin \omega \cos \omega$ substitui oportet , ex quo
conficitur

$$\frac{1}{\sin \omega} \int dS \sin \omega \cos \omega = \frac{1}{\sin \omega} \int ds \sin \omega + \frac{\frac{d\omega}{d\omega} \sin \omega \cos \omega}{\sin \omega} \int ds \sin \omega$$

$$\text{feu } \int dS \sin \omega \cos \omega = \sin \omega \int ds \sin \omega + \frac{d\omega}{d\omega} \sin \omega^2 \cos \omega ,$$

1 r. Hac aequatione differentiatia prodit

$$dS \sin \omega \cos \omega = 2 d\omega \sin \omega \cos \omega \int ds \sin \omega + ds \sin \omega^2$$

$$+ \frac{dd\omega}{d\omega} \sin \omega^2 \cos \omega + 2 ds \sin \omega \cos \omega^2 - d\omega \sin \omega^2$$

ac facta divisione per $\sin \omega \cos \omega$ fit

$$dS = 2 d\omega \int ds \sin \omega + 2 ds \cos \omega + \frac{dd\omega}{d\omega} \sin \omega$$

Denuo ergo differentiatione instituta nanciscimur :

$$ddS = 2 d\omega ds \sin \omega + 2 dd\omega \cos \omega - 2 d\omega ds \sin \omega + \frac{d^2\omega}{d\omega} \sin \omega$$

$$+ dd\omega \cos \omega$$

$$\text{ideoque } ddS = 3 dd\omega \cos \omega + \frac{d^2\omega}{d\omega} \sin \omega$$

vbi quidem differentiale $d\omega$ pro constanti est sumtum.
Huic aequationi satisfieri statim liquet , sumendo
 $\frac{dd\omega}{d\omega} = 0$ quia tum quoque fit $\frac{ddS}{d\omega} = 0$; hinc autem
colli-

colligitur $s = a + b \omega$ ita ut arcus $Am = s$ sit amplitudini proportionalis, quæ est notissima circuli proprietas.

12. Quodsi porro radius osculi curvæ in m statnatur $= r$, in M vero $= R$, quoniam tum fit $ds = r d\omega$ et $dS = 2 R d\omega$, æquationem modo inventam facile ad radios curvaturæ traducimus, unde resultat

$$2 dR = 3 dr \cos. \omega + \frac{d}{d\omega} r \sin. \omega$$

vbi multo magis perspicuum est circulos satisfacere, cum sumto radio osculi constante conditio istius æquationis impleatur. Vltcrius vero curvæ AmM euoluta induci potest, cuius radius osculi pro puncto ex m nato si ponatur $= r'$, pro puncto autem ab M deriuato $= R'$, quia constat esse $dr = r' d\omega$ et $dR = 2 R' d\omega$ prodit hæc æquatio:

$$4 R' = 3 r' \cos. \omega + \frac{d}{d\omega} r' \sin. \omega.$$

Quæstio igitur nostra iam huc est perducta ut iudicetur, num huic æquationi per alios valores præter $r' = 0$ et $R' = 0$ satisfieri queat.

13. Cum sit $ds = d\tau + \frac{r d\omega \cos. \omega}{\sin. \omega}$, erit radius osculi curvæ in m quem posuimus

$$r = \frac{ds}{d\omega} = \frac{d\tau}{d\omega} + \frac{r \cos. \omega}{\sin. \omega},$$

et radius osculi in M

$$R = \frac{d\tau}{2 d\omega} + \frac{\tau \cos. \omega}{2 \sin. \omega},$$

T 2

quibus

quibuscum normales ad curuam in m et M ductas et in C concurrentes comparemus. Quia vero est angulus $MTC = ATC = 90^\circ - \omega$, ob $MT = T$ erit

$$MC = \frac{T \cos. \omega}{\sin. \omega} = \frac{t}{\sin. \omega} + \frac{d t}{d \omega} \cos. \omega$$

in subsidium vocando relationem inter tangentes $m t = t$ et $MT = T$ supra inuentam. Tum vero hinc porro habetur :

$$CT = \frac{T}{\sin. \omega} = \frac{t}{\sin. \omega \cos. \omega} + \frac{d t}{d \omega} :$$

vnde auferatur interuallum

$$Tm = t \text{ tang. } \omega = \frac{t \sin. \omega}{\cos. \omega}, \text{ vt remaneat}$$

$$mC = \frac{t \cos. \omega}{\sin. \omega} + \frac{d t}{d \omega},$$

ex quo perspicuum est hanc rectam mC ipsi radio osculi in m aequari, ideoque punctum C reperiri in euoluta curuae quaesitae.

14. Cum normalis mC utpote radius osculi euolutam curuae quaesitae in C tangat, normalis vero MC per idem punctum transeat, ea hic euolutam secabit, nisi euoluta in vnicum punctum concentretur, vti euenit in circulo. Quare si praeter circulum aliae curuae nostrae quaestioni satisfaciant, earum euolutas ita comparatas esse oportet, vt si normalis mC euolutam tangat in C , normalis MC eandem hic secet producta vero alibi tangat, sicque necesse est, omnes euolutae tangentes eandem simul alicubi interfecare, quod quomodo in omnibus tangentibus contingere possit, haud perspicitur, nisi forte

forte spirales lineae miris spiris contortae, sint adhibendae. Summa autem difficultas huiusmodi mirabiles figuras concipiendi earum impossibilitatem minime arguit, neque hinc concludere licet praeter circulos nullas alias lineas curvas quaestioni satisfacere posse.

15. Quanquam autem vix vlla patet via aequationes inuentas resoluendi, tamen ea, quae videntur simplicissima $Y = \frac{d}{d\omega} \frac{d}{d\omega} \sin.\omega$, pro qua est $x = \frac{\gamma}{\sin.\omega}$ et

$$m \cdot t = t = \frac{d x \sin.\omega}{d \omega} = \frac{d \gamma}{d \omega} - \frac{\gamma \cos.\omega}{\sin.\omega}$$

vnde fit $d s = \frac{d}{d \omega} \frac{d \gamma}{d \omega} + \gamma d \omega$ haud leue suppeditat argumentum, quo praeter circulos omnes aliae figurae excludi videntur. Si enim solutionem generalem quaerentes statuamus:

$$\gamma = A - B\omega^2 + C\omega^4 - D\omega^6 + E\omega^8 - \text{etc.}$$

$$+ 2A\omega - 2B\omega^3 + 2C\omega^5 - 2D\omega^7 + 2E\omega^9 - \text{etc.}$$

vt fit ob principium continuitatis:

$$Y = A - 2'B\omega^2 + 2'C\omega^4 - 2'D\omega^6 + 2'E\omega^8 + \text{etc.}$$

$$+ 2A\omega - 2'B\omega^3 + 2'C\omega^5 - 2'D\omega^7 + 2'E\omega^9 - \text{etc.}$$

euidens est, tam potestates pares, quam impares seorsim definiri posse.

16. Ponamus breuitatis gratia

$$\sin.\omega = \omega - \alpha\omega^3 + \beta\omega^5 - \gamma\omega^7 + \delta\omega^9 - \text{etc. vt fit}$$

$$\alpha = \frac{1}{1.2.3}; \beta = \frac{1}{2.3.4}; \gamma = \frac{1}{6.7}; \delta = \frac{1}{1.9}; \text{etc.}$$

et pro potestatibus paribus, ob

$$\frac{d \gamma}{d \omega} = -2B\omega + 4C\omega^3 - 6D\omega^5 + 8E\omega^7 - \text{etc.}$$

T 3

aequa-

aequatio $\frac{d}{d\omega} y \sin. \omega - Y = 0$ praebet hanc aequationem

$$0 = -4B\omega^3 + 8C\omega^2 - 12D\omega^6 + 16E\omega^5 - 20F\omega^{10} \\ + 4\alpha B - 8\alpha C + 12\alpha D - 16\alpha E \\ - 4\epsilon B + 8\epsilon C - 12\epsilon D \\ + 4\gamma B - 8\gamma C \\ - 4\delta B$$

$$-A + 2^{\circ} B - 2^{\circ} C + 2^{\circ} D - 2^{\circ} E + 2^{10} F \text{ etc.}$$

vnde colligitur $A = 0$, tum vero per 4 diuidendo prodeunt hae aequalitates:

$$(2^{\circ} - 2) C = \alpha B$$

$$(2^{\circ} - 3) D = 2\alpha C + \epsilon B$$

$$(2^{\circ} - 4) E = 3\alpha D + 2\epsilon C + \gamma B$$

$$(2^{\circ} - 5) F = 4\alpha E + 3\epsilon D + 2\gamma C + \delta B \\ \text{etc.}$$

17. Et si hinc vix vllam legem progressionis concinnam sperare licet, tamen praeter expectationem euenit, vt sumto $B = \frac{a}{1,2}$ sequentes eliciantur valores:

$$B = \frac{a}{1,2}; C = \frac{a}{1,2,3,4}; D = \frac{a}{1,2,3,4,5,6}; E = \frac{a}{1,2,3,4,5,6,7} \text{ etc.}$$

similique modo pro potestatibus imparibus reperitur:

$$A = b; B = \frac{b}{1,2,3}; C = \frac{b}{1,2,3,4,5}; D = \frac{b}{1,2,3,4,5,6,7} \text{ etc.}$$

quae series cum per sinus et cosinus sint summabiles, colligitur fore $y = a \cos. \omega - a + b \sin. \omega$; vnde concluditur

$$t = \frac{a(1 - \cos. \omega)}{\sin. \omega} = -a \tan. \frac{1}{2} \omega \text{ et } \frac{dt}{d\omega} = r = -a,$$

ita vt curuae quacitae radius osculi vbique sit eiusdem magnitudinis ideoque curua circulus.

18. Cum autem haec lex progressionis ex calculo perquam operoso et molesto per inductionem sit conclusa, ne huic concludendi generi saepenumero fallaci nimium confidere videar, idem alio adhuc modo facilius euinci potest. Statuatur enim

$$y = A + B \cos. \omega + C \cos. 3 \omega + D \cos. 5 \omega + E \cos. 7 \omega + \text{etc.}$$

ubi quidem multipla paria omitto, ut quantitas $\frac{d^2 y}{d \omega^2} \sin. \omega$ tantum multipla similia anguli ω complectatur, qualia valor:

$$Y = A + B \cos. 2 \omega + C \cos. 6 \omega + D \cos. 10 \omega + E \cos. 14 \omega \text{ etc.}$$

continet. Cum igitur sit

$$\frac{d^2 y}{d \omega^2} = -B \sin. \omega - 3 C \sin. 3 \omega - 5 D \sin. 5 \omega - 7 E \sin. 7 \omega - \text{etc.}$$

per $-2 \sin. \omega$ multiplicando abit $Y - \frac{d^2 y}{d \omega^2} \sin. \omega = 0$ in

$$\begin{array}{ccccccccc} B - B \cos. 2 \omega - 3 C \cos. 4 \omega - 5 D \cos. 6 \omega - 7 E \cos. 8 \omega - 9 F \cos. 10 \omega \text{ etc.} & = & 0 \\ + 3 C & + 5 D & + 7 E & + 9 F & + 11 G & & & & \\ + A + B & & + C & & + D & & & & \end{array}$$

vnde primo patet esse $B = -A$, tum vero $C = 0$, $D = 0$, $E = 0$, sequentesque litteras omnes euanescere; ita ut sit

$$y = A (1 - \cos. \omega).$$

19. Simili modo si statuamus:

$$y = A + B \sin. \omega + C \sin. 3 \omega + D \sin. 5 \omega + E \sin. 7 \omega + F \sin. 9 \omega \text{ etc.}$$

hincque

$$\frac{d^2 y}{d \omega^2} = B \cos. \omega + 3 C \cos. 3 \omega + 5 D \cos. 5 \omega + 7 E \cos. 7 \omega \text{ etc.}$$

aequatio nostra induet hanc formam:

$$0 = B$$

$$\begin{array}{rcccccc}
 0 = B \sin. \omega + 3C \sin. 4\omega + 5D \sin. 6\omega + 7E \sin. 8\omega + 9F \sin. 10\omega + \text{etc.} \\
 -3C \quad -5D \quad -7E \quad -9F \quad -11G \\
 -A-B \quad \quad \quad -C \quad \quad \quad -D
 \end{array}$$

vbi fit $A = 0$, tum vero vt ante $C = 0$, $D = 0$, $E = 0$, $F = 0$ etc. ita vt his valoribus coniunctis habeatur

$$y = a(1 - \cos. \omega) + b \sin. \omega$$

quae est ipsa solutio iam ante inuenta.

20. Haec autem solutio merito non satis generalis videtur, cum ex valoribus ipsius y multipla paria anguli ω praeter necessitatem reiecerimus; iis enim admissis si statuamus:

$$y = A + B \cos. \omega + C \cos. 2\omega + D \cos. 3\omega + E \cos. 4\omega + F \cos. 5\omega \text{ etc.}$$

vt fit

$$\frac{dy}{d\omega} = -B \sin. \omega - 2C \sin. 2\omega - 3D \sin. 3\omega - 4E \sin. 4\omega - 5F \sin. 5\omega - \text{etc.}$$

sequens resultat aequatio:

$$\begin{array}{rcccccc}
 0 = B + 2C \cos. \omega - B \cos. 2\omega - 2C \cos. 3\omega - 3D \cos. 4\omega - 4E \cos. 5\omega - 5F \cos. 6\omega \\
 + 3D \quad + 4E \quad + 5F \quad + 6G \quad + 7H \\
 + A \quad + B \quad + C \quad + D
 \end{array}$$

vbi iterum est

$$B = -A; C = 0, D = 0, E = 0, F = 0, G = 0 \text{ etc.}$$

ita vt nunc quidem certum videatur, solutionem praecedentem latissime patere, neque praeter circulos vllas alias curuas quaestioni satisfacere posse. Quod enim hic de cosinibus est ostensum, idem simili modo de sinibus demonstratur.

21. Cum igitur superior inductio sit penitus confirmata, illae determinationes eo magis sunt notatu dignae quae huc redeunt, ut si fuerit:

$$2^1 C = 2C + \frac{B}{1, 2, 2}$$

$$2^2 D = 3D + \frac{2C}{1, 2, 2} + \frac{B}{1, \dots, 2}$$

$$2^3 E = 4E + \frac{3D}{1, 2, 2} + \frac{2C}{1, \dots, 2} + \frac{B}{1, \dots, 2}$$

$$2^4 F = 5F + \frac{4E}{1, 2, 2} + \frac{3D}{1, \dots, 2} + \frac{2C}{1, \dots, 2} + \frac{B}{1, \dots, 2}$$

etc.

tum istae quantitates ita determinantur, ut sit

$$B = \frac{a}{1, 2}; C = \frac{a}{1, \dots, 2}; D = \frac{a}{1, \dots, 2}; E = \frac{a}{1, \dots, 2} \text{ etc.}$$

qui valores, quemadmodum ex illis relationibus commode deriuentur, omnino accuratiorem disquisitionem mereri videntur.

22. Simili vero modo si ibi §. 15. statuatur:

$$y = \mathcal{A}\omega - \mathcal{B}\omega' + \mathcal{C}\omega'' - \mathcal{D}\omega''' + \mathcal{E}\omega'''' - \text{etc. ut sit}$$

$$\frac{y}{2} = \mathcal{A} - 3\mathcal{B}\omega' + 5\mathcal{C}\omega'' - 7\mathcal{D}\omega''' + 9\mathcal{E}\omega'''' - \text{etc.}$$

obtinetur ista aequatio

$$0 = 2\mathcal{A}\omega - 6\mathcal{B}\omega' + 10\mathcal{C}\omega'' - 14\mathcal{D}\omega''' + 18\mathcal{E}\omega'''' - \text{etc.}$$

$$- 2\alpha\mathcal{A} + 6\alpha\mathcal{B} - 10\alpha\mathcal{C} + 14\alpha\mathcal{D}$$

$$+ 2\beta\mathcal{A} - 6\beta\mathcal{B} + 10\beta\mathcal{C}$$

$$- 2\gamma\mathcal{A} + 6\gamma\mathcal{B}$$

$$+ 2\delta\mathcal{A}$$

$$- 2\mathcal{A} + 2'\mathcal{B} - 2''\mathcal{C} + 2'''\mathcal{D} - 2'''\mathcal{E} \text{ etc.}$$

vnde nascuntur hae determinationes :

$$2^1 \mathfrak{B} = 3 \mathfrak{B} + \frac{\mathfrak{A}}{1.2.3}$$

$$2^4 \mathfrak{C} = 5 \mathfrak{C} + \frac{2 \mathfrak{B}}{1.2.3} + \frac{\mathfrak{A}}{1.4.5.6}$$

$$2^6 \mathfrak{D} = 7 \mathfrak{D} + \frac{5 \mathfrak{C}}{1.2.3} + \frac{2 \mathfrak{B}}{1.4.5.6} + \frac{\mathfrak{A}}{1.6.7.8}$$

$$2^8 \mathfrak{E} = 9 \mathfrak{E} + \frac{7 \mathfrak{D}}{1.2.3} + \frac{5 \mathfrak{C}}{1.4.5.6} + \frac{2 \mathfrak{B}}{1.6.7.8} + \frac{\mathfrak{A}}{1.8.9.10}$$

etc.

quae evolutae sequentes suppeditant valores :

$$\mathfrak{A} = b; \mathfrak{B} = \frac{b}{1.2.3}; \mathfrak{C} = \frac{b}{1.4.5.6}; \mathfrak{D} = \frac{b}{1.6.7.8} \text{ etc.}$$

quae simplex progressionis lex nonnisi per multas ambages ex illis formulis deducitur, ideoque distinctior evolutio maxime desideratur.

23. Neque vero hoc argumentum satis validum videtur ad euincendum praeter circulum nullas alias lineas curvas quaestioni nostrae satisfacere. Cum enim aequationem $Y = \frac{d^2 y}{d\omega^2} \sin \omega$ ita resolui oporteat, ut Y fiat talis functio ipsius 2ω , qualis y est ipsius ω , resolutio hic adhibita naturam istius aequationis minime exhaurire videtur, propterea quod pro y eiusmodi seriem assumimus, in qua nonnisi potestates ipsius ω , quarum exponentes sunt numeri integri positivi, occurrunt; dum fortasse etiam exponentes vel fracti vel negativi, vel etiam irrationales atque adeo imaginarii locum habere possent; imaginariis scilicet se mutuo destruentibus. Quod num fieri possit statuamus :

$$y = A \omega^a + B \omega^b + C \omega^c \text{ etc.}$$

quorum

quorum exponentium primus α sit minimus. Erit ergo

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \alpha A \omega^{\alpha-1} + \epsilon B \omega^{\epsilon-1} \text{ etc.}$$

quae series per

$$2 \sin. \omega = 2 \omega - \frac{2}{1.2.3} \omega^3 + \frac{2}{1.2.3.4.5} \omega^5 - \text{etc.}$$

multiplicata praebet hanc formam

$$\begin{aligned} 2 \alpha A \omega^{\alpha} + 2 \epsilon B \omega^{\epsilon} \text{ etc.} \\ - \frac{2 \alpha A}{1.2.3} \omega^{\alpha+2} - \frac{2 \epsilon B}{1.2.3} \omega^{\epsilon+2} - \text{etc.} \\ + \frac{2 \alpha A}{1.2.3.4.5} \omega^{\alpha+4} + \text{etc.} \end{aligned}$$

ipsi $Y = 2^{\alpha} A \omega^{\alpha} + 2^{\epsilon} B \omega^{\epsilon} + 2^{\gamma} C \omega^{\gamma} \text{ etc.}$ aequandam. Neceffe ergo est, vt infimae potestates vtriusque sint aequales, vnde fit $2^{\alpha} = 2 \alpha$, quod realiter duobus tantum modis fieri potest sumendo vel $\alpha = 1$ vel $\alpha = 2$, ex quo series supra assumtae totum negotium conficere videntur.

24. Cum autem nullum sit dubium, quin aequatio $2^{\alpha} = 2 \alpha$ praeter has duas radices innumeras alias imaginarias complectatur, merito nascitur suspicio, ex iis quoque solutiones vtilis nasci posse. Neque igitur abs re fore arbitror methodum indicasse, qua etiam radices imaginarias huius aequationis proxime saltem definire liceat. Cum ergo α sit numerus imaginarius, eius forma certo est huiusmodi

$$\alpha = \mu + \nu \sqrt{-1},$$

vnde fit

$$\begin{aligned} 2^{\alpha} = 2^{\mu} \cdot 2^{\nu \sqrt{-1}} = 2^{\mu} (\cos. (\nu/2) + \sqrt{-1} \sin. (\nu/2)), \text{ cui} \\ 2 \alpha = 2 \mu + 2 \nu \sqrt{-1} \\ \text{V 2} \qquad \qquad \qquad \text{ita} \end{aligned}$$

ita aequale statui debet ut partes reales et imaginariae seorsim aequentur: hinc ergo fit

$$2\mu = 2^k \cos(\nu/2) \text{ et } 2\nu = 2^k \sin(\nu/2)$$

ideoque

$$4(\mu\mu - \frac{1}{2}\nu\nu) = 2^{2k} \text{ et } \nu = \sqrt{2^{2k} - \mu\mu}.$$

Ponamus $\frac{\mu}{2^{k-1}} = \cos\Phi$, et oritur $\nu = 2^{k-1} \sin\Phi = \mu \tan\Phi$.

Cum igitur sit $\cos(\nu/2) = \frac{\mu}{2^{k-1}} = \cos\Phi$, sequitur fore $\nu/2 = 2n\pi \pm \Phi$, denotante $2n\pi$ multiplicum quodcumque totius circumferentiae. Quare habetur $\mu/2$, tang. $\Phi = 2n\pi \pm \Phi$ et $\mu = \frac{2^{2n\pi \pm \Phi}}{1 \pm \tan\Phi}$, qui valor cum illo ex formula $\mu = 2^{k-1} \cos\Phi$ oriundo convenire debet. Hoc autem ob n numerum arbitrium dummodo integrum infinitis modis obtineri posse evidens est. Scilicet sumendo $n = 1$ et ponendo $\mu = \frac{2^{2\pi - \Phi}}{1 \pm \tan\Phi}$, approximationibus aliquot institutis colligitur angulus $\Phi = 61^\circ, 24', 24''$, hincque

$$\mu = 4,6980836 \text{ et } \nu = 7,51850, \text{ ita ut sit}$$

$$a = \mu \pm \nu V - 1 = 4,0980836 \pm 7,51850.V - 1.$$

25. Invenitis ergo huiusmodi valoribus imaginariis pro a , ut sit $2^a = 2a$, talis forma pro y fingi debet

$$y = A\omega^a - B\omega^{a+1} + C\omega^{a+2} - D\omega^{a+3} + \text{etc.}$$

unde fit

$$Y = 2^a A\omega^a - 2^a a B\omega^{a+1} + 2^a a C\omega^{a+2} - 2^a a D\omega^{a+3} + \text{etc.}$$

quae

quae series ipsi

$$\frac{d^2 y}{d\omega^2} \sin. \omega = \frac{d^2 y}{d\omega^2} (2\omega - \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3} \omega^3 + \frac{1}{1 \cdot 3 \cdot 5} \omega^5 - \text{etc.})$$

aequalis est statuenda, scilicet huic expressioni

$$2\alpha A\omega^2 - 2(\alpha+2)B\omega^{4+2} + 2(\alpha+4)C\omega^{6+4} - \text{etc.}$$

$$= \frac{2\alpha A}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \frac{2(\alpha+2)B}{1 \cdot 2 \cdot 5}$$

$$+ \frac{2\alpha A}{1 \cdot 3 \cdot 5}$$

unde sequentes determinationes colliguntur:

$$2^2 \alpha B = (\alpha+2)B + \frac{\alpha A}{1 \cdot 2 \cdot 3}$$

$$2^2 \alpha C = (\alpha+4)C + \frac{(\alpha+2)B}{1 \cdot 2 \cdot 5} + \frac{\alpha A}{1 \cdot 3 \cdot 5}$$

$$2^2 \alpha D = (\alpha+6)D + \frac{(\alpha+4)C}{1 \cdot 2 \cdot 7} + \frac{(\alpha+2)B}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7} + \frac{\alpha A}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7}$$

etc.

26. Hinc ergo sine dubio coefficientes B, C, D etc. definire licet, at ne vllum dubium supersit, an hoc modo pro y valores reales obtineri queant, notandum est binos valores idoneos pro y inuentos semper inter se coniungi posse. Hoc obseruato ponamus ex valore $\alpha = \mu + \nu V - 1$ prodiiſſe $y = P$, ex valore autem $\alpha = \mu - \nu V - 1$ fieri $y = Q$, quae bime expressiones vtcunque fuerint imaginariae certum est ex iis realem huiusmodi $y = mP + nQ$ constari posse, idque duplici modo. Atque ex forma assumpta quidem $\alpha = \mu + \nu V - 1$ series pro y ita erunt comparatae:

$$y = \omega^2 \cos. (\nu/\omega). (A + B\omega^2 + C\omega^4 + D\omega^6 + \text{etc.}) \text{ vel}$$

$$y = \omega^2 \sin. (\nu/\omega). (A + B\omega^2 + C\omega^4 + D\omega^6 + \text{etc.})$$

V 3

quarum

quarum summa vel differentia itidem praebet valorem satisfaciensem pro y . Evidens autem est hos valores minime in series secundum potestates simplices ipsius ω progredientes converti posse. Huiusmodi autem formae statim ab initio pro y fingi possunt; vbi cum in Y contineatur $\cos.(\nu/2\omega)$ notandum est esse:

$$\cos.(\nu/2\omega) = \cos.(\nu/\omega) \cdot \cos.(\nu/2) - \sin.(\nu/\omega) \cdot \sin.(\nu/2).$$

27. Ne autem hunc calculum nimis molestum quo infinitae aliae problematis solutiones declarari videntur suscipiam idem ex relatione inter radios osculi evolutae curvae quaesitae facilius ostendi posse videtur. Cum enim §. 12. inuenerimus

$$4R' = 3r' \cos.\omega + \frac{d.r'}{d\omega} \sin.\omega, \text{ si fingamus:}$$

$$r' = A\omega^n + B\omega^{n+2} + C\omega^{n+4} + \text{etc. ut sit}$$

$$R' = 2^n A \omega^n + 2^{n+2} B \omega^{n+2} + 2^{n+4} C \omega^{n+4} + \text{etc.}$$

pro potestate infima ω^n debet esse

$$4 \cdot 2^n A = 3A + nA \text{ seu } 4 \cdot 2^n = 3 + n = 2^{n+2}$$

cui conditioni duplici modo satisfit, altero $n = -2$, altero $n = -4$. Statuamus ergo

$$r' = \frac{A}{\omega} + B\omega + C\omega^3 + D\omega^5 + \text{etc. erit}$$

$$\frac{d.r'}{d\omega} = -\frac{A}{\omega^2} + B + 3C\omega^2 + 5D\omega^4 + \text{etc.}$$

$$1) R' = \frac{A}{4\omega} + 2B\omega + 8C\omega^3 + 32D\omega^5 + \text{etc.}$$

vnde

vnde colligitur esse debere :

$$\frac{1}{\omega} + 8B\omega + 32C\omega^2 + 128D\omega^3 + \text{etc.} =$$

$$\begin{array}{rcl} 3A + 3B & + & 3C & + & 3D \\ -\frac{1}{2} \frac{A}{\omega} & - & \frac{1}{2} \frac{B}{\omega} & - & \frac{1}{2} \frac{C}{\omega} \\ & + & \frac{1}{10000} \frac{A}{\omega} & + & \frac{1}{10000} \frac{B}{\omega} \\ & & & - & \frac{1}{10000} \frac{A}{\omega} \\ -A + B & - & 3C & + & 5D \\ + \frac{A}{10000} & - & \frac{B}{10000} & - & \frac{C}{10000} \\ & - & \frac{A}{10000} & + & \frac{B}{10000} \\ & & & + & \frac{A}{10000} \end{array}$$

hincque eiusmodi eruuntur valores, qui vtique solutionem realem praebeere videntur. Interim tamen desideratur adhuc methodus hoc problema perfectius resoluendi

CONSI-

CONSIDERATIONES CYCLOMETRICAE.

Auctore

L. EULERO.

Lunularum quadrabilium constructio ab inventione binorum angulorem pendet, qui inter se rationem duplicatam sinuum teneant, binos scilicet eiusmodi angulos m et n inuestigari oportet, ut sit

$$m:n = \sin. m' : \sin. n' \text{ seu } \frac{m}{\sin. m'} = \frac{n}{\sin. n'}$$

quam aequalitatem hic accuratius perpendere constitui.

2. Dato autem angulo quocunque m valorem expressionis inde natae $\frac{m}{\sin. m'}$ haud difficulter assignare licet, idque duplici modo vel in gradibus, si angulus m ita detur, vel in partibus radii $= 1$, si arcus angulum metiens in partibus radii exprimat, facile autem altera expressio ad alteram reducitur.

3. De hac autem expressione $\frac{m}{\sin. m'}$ obseruo, eam primo, si angulus m euanescat, euadere infinitam, tum vero diminui ad certum usque terminum, quo superato denuo augetur siquidem angulo m ad duos rectos aucto ob $\sin. m = 0$, iterum fit infinita. Quod quo clarius appareat, sit r nota anguli recti, et quia

$$\sin. \frac{1}{2}r = \frac{1}{2}; \sin. \frac{1}{3}r = \frac{1}{\sqrt{3}}; \sin. \frac{1}{4}r = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ et } \sin. r = 1$$

si fue-

si fuerit

$$m = 0r; \frac{1}{3}r; \frac{1}{2}r; \frac{2}{3}r; r; \frac{4}{3}r; \frac{5}{3}r; \frac{2}{3}r; 2r$$

erit

$$\frac{m}{\sin m} = \infty r; \frac{1}{3}r; r; \frac{2}{3}r; r; \frac{16}{9}r; 3r; \frac{10}{3}r; \infty r.$$

4. Antequam igitur angulus m nonaginta gradus attingit formula $\frac{m}{\sin m}$ fit minima; colligitur autem hoc euenire vbi fit $m = \frac{1}{2} \text{ tang. } m$, seu arcus angulum metiens aequalis semissi tangentis. Hunc angulum nonnisi proxime assignare licet, qui calculo instituto reperitur $= 66^{\circ}, 46', 54''$ vnde prodit valor omnium minimus $\frac{m}{\sin m} = 79,07102$ grad.

5. Hunc angulum tam insigni proprietate praeditum littera a denotabo, ita vt fit $a = 66^{\circ}, 46', 54''$ in gradibus, in partibus radii autem $a = 1,165561$, vbi obseruare licet hunc angulum neque ad peripheriam neque ad radium rationem commensurabilem tenere, sed vtriusque respectu pro transcendente esse habendum.

6. Interim tamē inuabit praecipuas affectiones huius anguli perpendisse reperitur autem:

$\sin. a = 0,9190096$; $\cos. a = 0,3942360$; $\tan. a = 2,33122$
tum vero

$\sin. 2a = 0,7246132$ et $\cos. 2a = 1,380050$
duplum angulum ideo confidero, quia ob $a = \frac{1}{2} \text{ tang. } a$, fit formula nostra $\frac{a}{\sin a} = \frac{1}{\sin. 2a} = \cos. 2a$, ita vt $1,380050$ fit valor minimus quem formula $\frac{m}{\sin m}$ affe-

Tom. XVI. Nou. Comm.

X

affe-

assequi potest. Idem autem in gradibus expressus dat vt ante $79^{\circ}, 07102$.

7. Vt ergo bini anguli m et n rationem teneant duplicatam sinuum, seu vt sit $\frac{m}{\sin. m} = \frac{n}{\sin. n}$, necesse est alterum eorum m infra a , alterum vero n supra a existere, et quo magis angulus m infra a deprimitur, eo magis alter n superabit, neque tamen simili ratione, cum sumto $m = 0$, fiat $n = 180^{\circ}$, neque vero angulus a in horum terminorum medium incidit.

8. Si igitur angulus m sit minimus, ponatur $m = \mu$ in partibus radii, et denotante π semicircumferentiam seu mensuram duorum rectorum, angulus n quam minime a π deficiet, statuatur ergo $n = \pi - \nu$, eritque

$$\mu \sin. \nu = (\pi - \nu) \sin. \mu \text{ seu } \mu(1 - \cos. 2\nu) = (\pi - \nu)(1 - \cos. 2\mu)$$

Iam vero est

$$1 - \cos. \phi = \frac{1}{2} \phi^2 - \frac{1}{24} \phi^4 + \frac{1}{720} \phi^6 - \text{etc.}$$

Ergo

$$\mu(2\nu\nu - \frac{2}{3}\nu^3 + \frac{1}{45}\nu^5) = (\pi - \nu)(2\mu\mu - \frac{2}{3}\mu^3 + \frac{1}{45}\mu^5)$$

vnde colligitur proxime

$$\nu = \sqrt{\pi\mu - \frac{1}{2}\mu} + \frac{1}{24\sqrt{\pi}} \frac{\pi}{\pi} \mu \mu.$$

9 Sin autem angulus m fit parumper minor angulo a , alter n parumper erit maior. Statuatur ergo $m = a - \mu$ et $n = a + \nu$; atque formula $\frac{m}{\sin. m}$ abit in

$$\frac{2(a - \mu)}{1 - \cos. 2(a - \mu)} = \frac{2(a - \mu)}{1 - \cos. 2a \cos. 2\mu - \sin. 2a \sin. 2\mu}$$

quae

quae ob angulum μ minimum in talem seriem euolvatur :

$$A - B\mu + C\mu^2 - D\mu^3 + E\mu^4 - \text{etc.}$$

vbi litterae A, B, C, D etc. hoc modo definiuntur

$$A \sin. a^2 - a = 0 \text{ hinc } A = \frac{a}{\sin. a^2} = \frac{1}{\sin. 2a}$$

$$B \sin. a^2 + A \sin. 2a - 1 = 0 \text{ hinc } B = 0 \text{ ob } A = \frac{1}{\sin. 2a}$$

$$C \sin. a^2 + B \sin. 2a + A \cos. 2a = 0$$

$$D \sin. a^2 + C \sin. 2a + B \cos. 2a - \frac{1}{2} A \sin. 2a = 0$$

$$E \sin. a^2 + D \sin. 2a + C \cos. 2a - \frac{1}{2} B \sin. 2a - \frac{1}{4} A \cos. 2a = 0$$

$$F \sin. a^2 + E \sin. 2a + D \cos. 2a - \frac{1}{2} C \sin. 2a - \frac{1}{4} B \cos. 2a + \frac{1}{12} A \sin. 2a = 0$$

etc.

vbi coefficientes numerici continuo per fractiones $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{4}{5}$ etc. multiplicantur.

10. His litteris determinatis, erit

$$\frac{m}{\sin. m^2} = A - B\mu + C\mu^2 - D\mu^3 + E\mu^4 - F\mu^5 \text{ etc. et}$$

$$\frac{n}{\sin. n^2} = A + B\nu + C\nu^2 + D\nu^3 + E\nu^4 + F\nu^5 \text{ etc.}$$

quae series cum inter se aequari debeant, ex dato angulo μ ; alter ν ita definitur, ut quia $B = 0$ posito

$$\nu = \mu + P\mu^2 + Q\mu^3 + R\mu^4 + S\mu^5 \text{ etc.}$$

fit

$$P = -\frac{D}{C}; Q = \frac{D^2}{C^2}; R = -\frac{2D^3}{C^3} + \frac{2DE}{C^2} - \frac{F}{C}$$

et

$$S = \frac{4D^4}{C^4} - \frac{6DDE}{C^3} + \frac{2D^2F}{C^2}$$

X 2

Calculo

Calculo autem subducto reperitur

$$A=1,380050; C=1,126090; P=0,265937 \\ B=0, \quad D=-0,299469; Q=0,070722.$$

11. At sumto utcumque angulo m , alter angulus n per cognitam appropinquandi methodum proxime saltem definiri potest; veluti si sumatur $m=60^\circ$, reperitur $n=73^\circ, 41', 32'' \frac{13}{100}$ ac posito $m=30^\circ$, prodit $n=108^\circ, 14', 30'' \frac{11}{100}$ tum vero si $n=135^\circ$ fit $m=12^\circ, 20', 54'' \frac{9}{100}$ sin autem angulus m ita accipiat, ut sit $\text{tang. } m = \sqrt{2}$, ideoque $m=54^\circ, 44', 8'' \frac{1}{2}$, inuenitur $n=79^\circ, 14', 23'' \frac{16}{100}$ nullo autem horum casuum angulum alterum geometricè assignare licet.

12. Talis autem inuestigatio ad lunularum quadrabilium constructionem nihil iuuat, cum necesse sit, ut vterque angulus m et n geometricè assignari possit, quod euenit, si vtriusque sinum vel tangentem geometricè exhibere licuerit. Magna ergo hinc exoritur quaestio, quomodo binos eiusmodi angulos m et n geometricè assignabiles inuestigari oporteat ut fiat

$$\frac{m}{\sin m} = \frac{n}{\sin n} \text{ seu } m(1 - \cos. 2n) = n(1 - \cos. 2m).$$

13. Ad hoc problema soluendum vulgo assumi solet, binos angulos m et n inter se commensurabiles esse debere; nondum autem est demonstratum nullo alio casu solutionem obtineri non posse. Sinus certe horum angulorum rationem algebraicam tenere oportet, quia alioquin anguli geometricè assignari
non

nōn possent, ex quo etiam ipsa angulorum ratio algebraice assignabilis esse debet; neque vero hinc conficitur, hanc rationem numeris integris contineri debere.

14. Infinitis certe modis anguli geometricæ assignari possunt, qui inter se non sint commensurabiles, veluti anguli quorum sinus sunt $\frac{1}{2}$ et $\frac{1}{3}$; num autem huiusmodi anguli non rationem quandam irrationalem tenere possint, neutiquam adhuc satis constat? Eximium autem foret inuentum si huiusmodi anguli quorum ratio esset exempli gratia ut $1 : \sqrt{2}$ geometricæ exhiberi possent.

15. Quodsi inter angulos m et n ratio statuatur $= 1 : \sqrt{2}$ resolutio æquationis $\frac{m}{\sin. m} = \frac{n}{\sin. n}$ præbet hos valores.

$$m = 55^{\circ}, 28', 18'' \text{ et } n = 78^{\circ}, 27', 0''$$

qui autem anguli geometricæ assignabiles non videntur. Cum autem hinc nihil concludi possit, methodum adhuc deesse cogimus fateri, cuius beneficio hoc problema per angulos etiam non commensurabiles resolui queat.

16. Videamus autem quot modis hos angulos inter se commensurabiles statuendo ista quæstio per circulum et normam resolui possit, ita ut problema pro plano haberi possit: Statuatur ergo $m = \frac{1}{2} \mu \omega$ et $n = \frac{1}{2} \nu \omega$, ut sit $m : n = \mu : \nu$, fierique debet

$$\mu (1 - \cos. \nu \omega) = \nu (1 - \cos. \mu \omega).$$

X 3

Sit

Sit $\cos. \omega = z$, ac notetur esse:

$$\cos. 2 \omega = 2 z z - 1$$

$$\cos. 3 \omega = 4 z^3 - 3 z$$

$$\cos. 4 \omega = 8 z^4 - 8 z z + 1$$

$$\cos. 5 \omega = 16 z^5 - 20 z^3 + 5 z$$

$$\cos. 6 \omega = 32 z^6 - 48 z^4 + 18 z z - 1$$

etc.

17. Hinc percurramus casus praecipuos aequationis inuentae

$$\nu - \mu = \nu \cos. \mu \omega - \mu \cos. \nu \omega$$

I. $\mu = 1$ et $\nu = 2$ hinc $m = \frac{1}{2} \omega$ et $n = \omega$ erit

$$1 = 2z - 2zz + 1, \text{ seu } zz - z = 0,$$

vnde per $z - 1$ diuidendo, id quod semper succedit, fit $z = 0$; ideoque $\omega = 90^\circ$, et $m = 45^\circ$ et $n = 90^\circ$, qui est casus lunulae Hippocratis

II. $\mu = 1$, et $\nu = 3$, hinc $m = \frac{1}{3} \omega$ et $n = \frac{2}{3} \omega$

Erit ergo $2 = 3z - 4z^3 + 3z$ seu

$$1 - 3z + 2z^3 = 0,$$

quae aequatio per $1 - z$ diuisa dat

$$1 - 2z - 2zz = 0, \text{ hincque}$$

$$z = \frac{-1 + \sqrt{3}}{2} = \cos. \omega \text{ et } \cos. 2 \omega = 1 - \sqrt{3};$$

problema planum.

III.

III. Sit $\mu=2$ et $\nu=3$ hinc $m=\omega$ et $n=\frac{2}{3}\omega$.

Erit ergo $1=6zz-3-8z^3+6z$ feu $4-6z-6zz+8z^3=0$
 quae aequatio per $2(1-z)$ diuifa dat $2-z-4zz=0$
 vnde colligitur $z=-\frac{1+\sqrt{13}}{4}=\text{cof.}\omega$ et $\text{cof. } 2\omega=\frac{1-\sqrt{13}}{4}$:
 problema planum.

IV. Sit $\mu=1$ et $\nu=4$ hinc $m=\frac{1}{2}\omega$ et $n=2\omega$.

Erit ergo $3=4z-8z^3+8zz-1$ feu $1-z-2zz+2z^3=0$
 quae aequatio per $1-z$ diuifa dat

$$1-2zz-2z^3=0 \text{ problema solidum.}$$

V. Sit $\mu=3$ et $\nu=4$ hinc $m=\frac{2}{3}\omega$ et $n=2\omega$.

Erit ergo $1=16z^3-12z-24z^3+24zz-3$ feu

$$1+3z-6zz-4z^3+6z^5=0$$

quae per $1-z$ diuifa dat.

$$1+4z-2zz-6z^3=0 \text{ problema solidum.}$$

VI. Sit $\mu=1$ et $\nu=5$ hinc $m=\frac{1}{2}\omega$ et $n=\frac{3}{2}\omega$.

Erit ergo $4=5z-16z^5+20z^3-5z$ feu

$$1-5z^3+4z^5=0$$

quae per $1-z$ diuifa praebet

$$1+z+zz-4z^3-4z^5=0$$

et in hanc formam transfunditur :

$$(2zz+z-1)^2=\frac{3}{4} \text{ feu } 2zz+z-1=\frac{\sqrt{3}}{2}$$

hinc $z=-\frac{1+\sqrt{13}+\sqrt{13}}{4}=\text{cof.}\omega$ et $\text{cof. } 2\omega=\frac{1-\sqrt{13}-\sqrt{13}}{4}$

ita vt hic prodeat problema planum.

VII.

VII. Sit $\mu = 2$ et $\nu = 5$ hinc $m = \omega$ et $n = \frac{5}{2}\omega$.
 Erit ergo $3 = 10zz - 5 - 32z^2 + 40z^3 - 10z$ seu
 $4 + 5z - 5zz - 20z^2 + 16z^3 = 0$ et per $1-z$ diuidendo
 $4 + 9z + 4zz - 16z^2 - 16z^3 = 0$ problema solidum

VIII. Sit $\mu = 3$ et $\nu = 5$ hinc $m = \frac{5}{2}\omega$ et $n = \frac{5}{2}\omega$.
 Ergo $2 = 20z^2 - 15z - 48z^3 + 60z^4 - 15z$ seu
 $1 + 15z - 40z^2 + 24z^3 = 0$ et per $1-z$ diuidendo
 $1 + 16z + 16zz - 24z^2 - 24z^3 = 0$

quae reducitur ad hanc formam

$$(1 + 8z + 6zz)^2 = 60(z + zz)^2$$

unde fit, $zz\sqrt{60} + z\sqrt{60} = 6zz + 8z + 1$ ideoque

$$z = \frac{1 - \sqrt{15} + \sqrt{(15-6)\sqrt{15}}}{2\sqrt{15}-6} \text{ seu } \frac{1}{z} = -4 + \sqrt{15} + \sqrt{(25-6)\sqrt{15}}$$

$$\text{vel } z = \frac{\sqrt{15}-1+\sqrt{(60+5)\sqrt{15}}}{12} = \cos. \omega \text{ et } \cos. 2\omega = \frac{1+\sqrt{(25-6)\sqrt{15}}}{6}$$

sicque etiam hoc casu problema est planum.

IX. Sit $\mu = 4$ et $\nu = 5$ hinc $m = 2\omega$ et $n = \frac{5}{2}\omega$.
 Ergo $1 = 40z^2 - 40zz + 5 - 64z^3 + 80z^4 - 20z$ seu
 $1 - 5z - 10zz + 20z^2 + 10z^3 - 16z^4 = 0$ et per $1-z$
 diuidendo

$$1 - 4z - 14zz + 6z^2 + 16z^3 = 0$$

at haec aequatio nonnisi constructionem solidam admittit.

18. Quinque ergo casus sumus adepti, quibus ope circuli et normae lunulas quadrabiles exhibere, vel hanc aequationem $\frac{m}{\sin. m} = \frac{n}{\sin. n}$ construere licet:

I.

I. Casus $m=45^\circ$ et $n=90^\circ$

II. Casus $m=\frac{1}{2}\omega$ et $n=\frac{1}{2}\omega$ existente

$$\cos. \omega = \frac{\sqrt{2}-1}{2} \text{ vel } \cos. 2\omega = 1 - \sqrt{2}$$

III. Casus $m=\omega$ et $n=\frac{1}{2}\omega$ existente

$$\cos. \omega = \frac{\sqrt{2}-1}{2} \text{ vel } \cos. 2\omega = \frac{1-\sqrt{2}}{2}$$

IV. Casus $m=\frac{1}{2}\omega$ et $n=\frac{2}{3}\omega$ existente

$$\cos. \omega = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{2}-1}{4}$$

V. Casus $m=\frac{1}{2}\omega$ et $n=\frac{2}{3}\omega$ existente

$$\cos. \omega = \frac{\sqrt{2}-1 + \sqrt{60+6\sqrt{2}}}{12} \text{ vel } \cos. 2\omega = \frac{1 + \sqrt{65-6\sqrt{2}}}{6}$$

19. Pro aliis rationibus inter arcus m et n assumptis constructio lunularum ad altiores locos geometricos affurgit, neque vero minus pro geometrica est habenda. Vtrum autem praeter hos casus nullae aliae lunulae geometricae assignari queant, nec ne? in dubio relinquendum videtur. Neque contra valeret argumentum afferri vulgo solitum, quod inde circuli quadratura consequeretur, etiamsi et id, nisi quadratura indefinita spectetur, parum roboris habere videatur. Et si enim satis constet rationem peripheriae ad diametrum per numeros rationales exprimi non posse, minus tamen adhuc perspicitur, numeros etiam irracionales ad hunc scopum esse ineptos. Verum etiamsi esset evictum, hanc rationem ne surdis quidem numeris villo modo exhiberi posse, tamen inde vix quicquam pro arcubus ad totam circumferentiam incommensurabilibus concludere liceret. Veluti si quis arcum circuli sinu ver-

Tom. XVI. Nou. Comm.

Y

bi

bi gratia $= \frac{1}{2} = 0,666666$ determinatum geometricè assignare docuerit, inde minime adhuc quantitas peripheriae colligi posset; ex quo huiusmodi rectificatio impossibilitati quadraturae circuli aduersari haud videatur; nisi forte ad ipsam methodum, qua quis ad valorem arcus, cuius sinus est $= \frac{1}{2}$ peruenit, respiciamus, cum enim eidem sinui innumerari arcus conueniant, ob legem continuitatis methodus simul omnes istos arcus complecti deberet, ideoque algebraica expressione contineri non posset; præterquam quod differentia vel summa horum arcuum etiam integram peripheriam esset ostensura. Hac igitur ratione demum confirmata pronunciare licebit, nullius prorsus arcus circularis, geometricè assignabilis, quantitatem geometricè definiri posse.

DE
CRITERIIS INTEGRABILITATIS
FORMVLARVM DIFFERENTIALIVM,
DISSERTATIO SECVNDA.

Auctore

AND. IOH. LEXELL.

I.

In iis quae criteriis integrabilitatis, Tomo praecedenti horum Commentariorum perscripsi, haud immerito desiderari videtur, quod doctrina a me tunc exposita, exemplis quibusdam illustretur, quorum scilicet vsus huiusmodi in re insignis esse solet, ad ipsum argumentum non modo illustrandum, verum etiam confirmandum et stabiliendum. Et tunc temporis quidem, quamvis in animo habetern aliqua huiusmodi proponere exempla, a proposito tamen desistere coactus fui, ne in nimiam excresceret molem dissertatio supra commemorata; hac igitur occasione, quod tum intermissum fuit, doctrinam scilicet traditam selectis quibusdam exemplis illustrare, leuiter adumbrare constitui, vbi tamen quaedam praemittere e re esse iudicavi, quibus ea, quae antea a me exposita sunt magis plana et perspicua reddi poterunt.

503

Y 2

2. Quod

2. Quod itaque *primum* demonstrationem insignis *Theorematis Euleriani* § 7. et seqq. differt. prioris allatam attinet, ingenue fateor eam adeo mihi non satisfecisse, ne aliqui adhuc in animo remanerent dubitationis scrupuli. Quum autem postmodum viam detexerim, qua hanc demonstrationem ad summum certitudinis et evidentiae rigorem perducere mihi licuit, nonnulla ea de re monuisse haud pigebit.

Ex iis quae antea demonstrata sunt, sequitur esse:
 $\mu = \int M dx$; $\nu = \int N dx$; $\pi = \int P dx - \int^{(1)} N dx$; $\kappa = \int Q dx$;
 $-\int^{(1)} P dx + \int^{(1)} N dx$ etc.

unde deducitur

$$d\mu = M dx = dx \left(\frac{d\mu}{dx} \right) + dy \left(\frac{d\mu}{dy} \right) + dp \left(\frac{d\mu}{dp} \right) + dq \left(\frac{d\mu}{dq} \right) \dots + dt \left(\frac{d\mu}{dt} \right)$$

hincque

$$M = \left(\frac{d\mu}{dx} \right) + p \left(\frac{d\mu}{dy} \right) + q \left(\frac{d\mu}{dp} \right) + r \left(\frac{d\mu}{dq} \right) \dots + u \left(\frac{d\mu}{dt} \right).$$

Simili ratione ostenditur fore

$$N = \left(\frac{d\nu}{dx} \right) + p \left(\frac{d\nu}{dy} \right) + q \left(\frac{d\nu}{dp} \right) + r \left(\frac{d\nu}{dq} \right) \dots + u \left(\frac{d\nu}{dt} \right)$$

$$P = \left(\frac{d\pi}{dx} \right) + p \left(\frac{d\pi}{dy} \right) + q \left(\frac{d\pi}{dp} \right) + r \left(\frac{d\pi}{dq} \right) \dots + u \left(\frac{d\pi}{dt} \right) + \nu$$

$$Q = \left(\frac{d\kappa}{dx} \right) + p \left(\frac{d\kappa}{dy} \right) + q \left(\frac{d\kappa}{dp} \right) + r \left(\frac{d\kappa}{dq} \right) \dots + u \left(\frac{d\kappa}{dt} \right) + \pi$$

etc.

Atqui §. 7. Differt. 1. inuenimus

$$M = \left(\frac{d\mu}{dx} \right) + p \left(\frac{d\mu}{dy} \right) + q \left(\frac{d\mu}{dp} \right) + r \left(\frac{d\mu}{dq} \right) \dots + u \left(\frac{d\mu}{dt} \right).$$

$$N = \left(\frac{d\nu}{dx} \right) + p \left(\frac{d\nu}{dy} \right) + q \left(\frac{d\nu}{dp} \right) + r \left(\frac{d\nu}{dq} \right) \dots + u \left(\frac{d\nu}{dt} \right)$$

etc.

Si

Si igitur hi valores ipforum M, N, P etc. ita inter fe comparentur, vt finguli termini fingulis aequentur, inde fequentes facile deducuntur aequalitates:

$$\left(\frac{d\mu}{dy}\right) = \left(\frac{d\nu}{dx}\right); \left(\frac{d\mu}{dp}\right) = \left(\frac{d\pi}{dx}\right); \left(\frac{d\mu}{dq}\right) = \left(\frac{d\kappa}{dx}\right) \dots \left(\frac{d\mu}{di}\right) = \left(\frac{d\tau}{dx}\right)$$

$$\left(\frac{d\nu}{dp}\right) = \left(\frac{d\pi}{dy}\right); \left(\frac{d\nu}{dq}\right) = \left(\frac{d\kappa}{dy}\right) \dots \left(\frac{d\nu}{di}\right) = \left(\frac{d\tau}{dy}\right)$$

$$\left(\frac{d\pi}{dq}\right) = \left(\frac{d\kappa}{dp}\right) \dots \left(\frac{d\pi}{di}\right) = \left(\frac{d\tau}{dp}\right) \text{ etc. ,}$$

in quibus ipfum criterium integrabilitatis refidere antea obferuatum eft. Verum quum excipere liceret ex aequalitate binorum valorum ex: gr. ipfius M non ftatim fequi in vtraque expreffione fingulos terminos, qui iisdem litteris p, q, r etc. afficiuntur, inter fe effe aequandos, iam aliam adiiciamus demonftrandi rationem huic obiectioni non obnoxiam.

3. Quum enim fit:

$$\left(\frac{dM}{dy}\right) = \left(\frac{d}{dx} \frac{d\mu}{dy}\right) + p \left(\frac{d}{dy} \frac{d\mu}{dy}\right) + q \left(\frac{d}{dy} \frac{d\mu}{dp}\right) + r \left(\frac{d}{dy} \frac{d\mu}{dq}\right) \dots + u \left(\frac{d}{dy} \frac{d\mu}{di}\right)$$

$$\left(\frac{dM}{dp}\right) = \left(\frac{d}{dx} \frac{d\mu}{dp}\right) + p \left(\frac{d}{dy} \frac{d\mu}{dp}\right) + q \left(\frac{d}{dp} \frac{d\mu}{dp}\right) + r \left(\frac{d}{dp} \frac{d\mu}{dq}\right) \dots + u \left(\frac{d}{dp} \frac{d\mu}{di}\right) + \left(\frac{d\mu}{dy}\right)$$

$$\left(\frac{dM}{dq}\right) = \left(\frac{d}{dx} \frac{d\mu}{dq}\right) + p \left(\frac{d}{dy} \frac{d\mu}{dq}\right) + q \left(\frac{d}{dp} \frac{d\mu}{dq}\right) + r \left(\frac{d}{dq} \frac{d\mu}{dq}\right) \dots + u \left(\frac{d}{dq} \frac{d\mu}{di}\right) + \left(\frac{d\mu}{dp}\right) \text{ etc.}$$

tum vero

$$\left(\frac{dN}{dx}\right) = \left(\frac{d}{dx} \frac{d\nu}{dx}\right) + p \left(\frac{d}{dx} \frac{d\nu}{dy}\right) + q \left(\frac{d}{dx} \frac{d\nu}{dp}\right) + r \left(\frac{d}{dx} \frac{d\nu}{dq}\right) \dots + u \left(\frac{d}{dx} \frac{d\nu}{di}\right)$$

$$\left(\frac{dN}{dp}\right) = \left(\frac{d}{dx} \frac{d\nu}{dp}\right) + p \left(\frac{d}{dy} \frac{d\nu}{dp}\right) + q \left(\frac{d}{dp} \frac{d\nu}{dp}\right) + r \left(\frac{d}{dp} \frac{d\nu}{dq}\right) \dots + u \left(\frac{d}{dp} \frac{d\nu}{di}\right) + \left(\frac{d\nu}{dy}\right)$$

$$\left(\frac{dN}{dq}\right) = \left(\frac{d}{dx} \frac{d\nu}{dq}\right) + p \left(\frac{d}{dy} \frac{d\nu}{dq}\right) + q \left(\frac{d}{dp} \frac{d\nu}{dq}\right) + r \left(\frac{d}{dq} \frac{d\nu}{dq}\right) \dots + u \left(\frac{d}{dq} \frac{d\nu}{di}\right) + \left(\frac{d\nu}{dp}\right) \text{ etc.}$$

$$\left(\frac{dP}{dx}\right) = \left(\frac{d}{dx} \frac{d\pi}{dx}\right) + p \left(\frac{d}{dx} \frac{d\pi}{dy}\right) + q \left(\frac{d}{dx} \frac{d\pi}{dp}\right) + r \left(\frac{d}{dx} \frac{d\pi}{dq}\right) \dots + u \left(\frac{d}{dx} \frac{d\pi}{di}\right) + \left(\frac{d\pi}{dy}\right)$$

$$\left(\frac{dP}{dp}\right) = \left(\frac{d}{dx} \frac{d\pi}{dp}\right) + p \left(\frac{d}{dy} \frac{d\pi}{dp}\right) + q \left(\frac{d}{dp} \frac{d\pi}{dp}\right) + r \left(\frac{d}{dp} \frac{d\pi}{dq}\right) \dots + u \left(\frac{d}{dp} \frac{d\pi}{di}\right) + \left(\frac{d\pi}{dy}\right)$$

$$\left(\frac{dP}{dq}\right) = \left(\frac{d}{dx} \frac{d\pi}{dq}\right) + p \left(\frac{d}{dy} \frac{d\pi}{dq}\right) + q \left(\frac{d}{dp} \frac{d\pi}{dq}\right) + r \left(\frac{d}{dq} \frac{d\pi}{dq}\right) \dots + u \left(\frac{d}{dq} \frac{d\pi}{di}\right) + \left(\frac{d\pi}{dp}\right) + \left(\frac{d\pi}{dy}\right)$$

etc. etc.

Y 3

prac-

practerea autem habeatur

$$\begin{aligned} d.\left(\frac{d\mu}{dy}\right) &= dx\left(\frac{d}{dx}\frac{d\mu}{dy}\right) + dy\left(\frac{d}{dy}\frac{d\mu}{dy}\right) + dp\left(\frac{d}{dy}dp\right) \dots + dt\left(\frac{d}{dy}dt\right) \\ d.\left(\frac{d\mu}{dp}\right) &= dx\left(\frac{d}{dx}\frac{d\mu}{dp}\right) + dy\left(\frac{d}{dy}\frac{d\mu}{dp}\right) + dp\left(\frac{d}{dp}\frac{d\mu}{dp}\right) \dots + dt\left(\frac{d}{dp}dt\right) \\ d.\left(\frac{d\mu}{dq}\right) &= dx\left(\frac{d}{dx}\frac{d\mu}{dq}\right) + dy\left(\frac{d}{dy}\frac{d\mu}{dq}\right) + dp\left(\frac{d}{dp}\frac{d\mu}{dq}\right) \dots + dt\left(\frac{d}{dq}dt\right) \text{ etc.} \end{aligned}$$

fiet necessum est

$$\begin{aligned} d.\left(\frac{d\mu}{dy}\right) &= dx\left(\frac{d\mu}{dy}\right), \text{ seu } \left(\frac{d\mu}{dy}\right) = f dx\left(\frac{d\mu}{dy}\right) \\ d.\left(\frac{d\mu}{dp}\right) &= dx\left(\frac{d\mu}{dp}\right) - dx\left(\frac{d\mu}{dy}\right), \text{ unde } \left(\frac{d\mu}{dp}\right) = f dx\left(\frac{d\mu}{dp}\right) - f dx\left(\frac{d\mu}{dy}\right) \\ d.\left(\frac{d\mu}{dq}\right) &= dx\left(\frac{d\mu}{dq}\right) - dx\left(\frac{d\mu}{dp}\right), \text{ hinc } \left(\frac{d\mu}{dq}\right) = f dx\left(\frac{d\mu}{dq}\right) - f dx\left(\frac{d\mu}{dp}\right). \end{aligned}$$

Porro ex valoribus ipsorum

$$\left(\frac{dN}{dx}\right); \left(\frac{dN}{dy}\right) \text{ etc. } \left(\frac{dP}{dx}\right); \left(\frac{dP}{dy}\right) \text{ etc.}$$

supra allatis, sequentes deducere licet aequationes:

$$\begin{aligned} \left(\frac{dV}{dx}\right) &= f dx\left(\frac{dN}{dx}\right) \\ \left(\frac{dV}{dp}\right) &= f dx\left(\frac{dN}{dp}\right) - f dx\left(\frac{dV}{dy}\right) \\ \left(\frac{dV}{dq}\right) &= f dx\left(\frac{dN}{dq}\right) - f dx\left(\frac{dV}{dp}\right) \text{ etc.} \\ \left(\frac{d\pi}{dx}\right) &= f dx\left(\frac{dP}{dx}\right) - f dx\left(\frac{dV}{dx}\right) \\ \left(\frac{d\pi}{dy}\right) &= f dx\left(\frac{dP}{dy}\right) - f dx\left(\frac{dV}{dy}\right) \\ \left(\frac{d\pi}{dq}\right) &= f dx\left(\frac{dP}{dq}\right) - f dx\left(\frac{dV}{dq}\right) - f dx\left(\frac{d\pi}{dp}\right) \text{ etc.} \\ \left(\frac{d\kappa}{dx}\right) &= f dx\left(\frac{dQ}{dx}\right) - f dx\left(\frac{d\pi}{dx}\right) \\ \left(\frac{d\kappa}{dy}\right) &= f dx\left(\frac{dQ}{dy}\right) - f dx\left(\frac{d\pi}{dy}\right) \\ \left(\frac{d\kappa}{dp}\right) &= f dx\left(\frac{dQ}{dp}\right) - f dx\left(\frac{d\pi}{dp}\right) - f dx\left(\frac{d\kappa}{dy}\right) \text{ etc.} \end{aligned}$$

4. Ob

4. Ob integrabilitatem vero formulae :

$dV = Mdx + Ndy + Pdp + Qdq \dots + Udu$
 quum esse debeat

$$\left(\frac{dM}{dy}\right) = \left(\frac{dN}{dx}\right); \left(\frac{dM}{dp}\right) = \left(\frac{dP}{dx}\right) \text{ etc.};$$

$$\left(\frac{dN}{dp}\right) = \left(\frac{dP}{dy}\right); \left(\frac{dN}{dq}\right) = \left(\frac{dQ}{dy}\right) \text{ etc. etc.}$$

liquet omnino esse

$$fdx \left(\frac{dM}{dy}\right) = fdx \left(\frac{dN}{dx}\right), \text{ ideoque } \left(\frac{dM}{dy}\right) = \left(\frac{dN}{dx}\right).$$

Simili modo ob

$$fdx \left(\frac{dM}{dp}\right) = fdx \left(\frac{dP}{dx}\right), \text{ nec non } fdx \left(\frac{dM}{dy}\right) = fdx \left(\frac{dN}{dx}\right), \text{ erit}$$

$$\left(\frac{dM}{dp}\right) = \left(\frac{dP}{dx}\right), \text{ tum vero ob } fdx \left(\frac{dM}{dp}\right) = fdx \left(\frac{dN}{dx}\right),$$

$$\text{ fiet } \left(\frac{dM}{dq}\right) = \left(\frac{dN}{dx}\right) \text{ etc.}$$

Porro quoniam est

$$\left(\frac{dN}{dp}\right) = \left(\frac{dP}{dy}\right); \left(\frac{dN}{dq}\right) = \left(\frac{dQ}{dy}\right) \text{ etc. habebitur}$$

$$\left(\frac{dN}{dp}\right) = fdx \left(\frac{dN}{dp}\right) - fdx \left(\frac{dN}{dp}\right) = fdx \left(\frac{dP}{dy}\right) - fdx \left(\frac{dN}{dy}\right) = \left(\frac{dN}{dy}\right)$$

$$\left(\frac{dN}{dq}\right) = fdx \left(\frac{dN}{dq}\right) - fdx \left(\frac{dN}{dq}\right) = fdx \left(\frac{dQ}{dy}\right) - fdx \left(\frac{dN}{dy}\right) = \left(\frac{dN}{dy}\right) \text{ etc.}$$

$$\text{Denique ob } \left(\frac{dP}{dp}\right) = \left(\frac{dQ}{dp}\right) \text{ etc.}$$

$$\left(\frac{dN}{dq}\right) = fdx \left(\frac{dP}{dq}\right) - fdx \left(\frac{dN}{dq}\right) - fdx \left(\frac{dP}{dp}\right) = fdx \left(\frac{dQ}{dp}\right) - fdx \left(\frac{dN}{dy}\right)$$

$$- fdx \left(\frac{dN}{dp}\right) = \left(\frac{dN}{dp}\right) \text{ etc.}$$

Ex his igitur iam evidenter patet id, quod nobis
 demonstrandum proposuimus, esse nimirum

$$\left(\frac{dM}{dy}\right) = \left(\frac{dN}{dx}\right); \left(\frac{dM}{dp}\right) = \left(\frac{dP}{dx}\right) \dots \left(\frac{dM}{dt}\right) = \left(\frac{dP}{dx}\right)$$

$$\left(\frac{dN}{dp}\right) = \left(\frac{dP}{dy}\right); \left(\frac{dN}{dq}\right) = \left(\frac{dQ}{dy}\right) \dots \left(\frac{dN}{dt}\right) = \left(\frac{dQ}{dy}\right)$$

$$\left(\frac{dP}{dq}\right) = \left(\frac{dQ}{dp}\right); \dots \left(\frac{dP}{dt}\right) = \left(\frac{dQ}{dp}\right) \text{ etc. etc.}$$

Perſpi-

Perfpicuum autem eft, dum de aequalitate formularum

$$\left(\frac{d\mu}{dy}\right), \left(\frac{d\mu}{dx}\right) \text{ vel } \left(\frac{d\mu}{dp}\right), \left(\frac{d\tau}{x}\right) \text{ etc.}$$

fermo fit, intelligendum effe has formulas fieri non folum aequales, fed plane identicas, ex quo omnino quoque fequitur formulas

$$\int dx \left(\frac{d\mu}{dy}\right), \int dx \left(\frac{d\mu}{dx}\right)$$

effe debere identicas, ideoque nec opus fore, vt vlla conftans poft integrationem introducatur. Quod vero valores ipforum

$$\left(\frac{d\mu}{dy}\right), \left(\frac{d\mu}{dp}\right) \text{ etc.}, \left(\frac{d\tau}{x}\right), \left(\frac{d\tau}{p}\right) \text{ etc.}$$

§. 8. Differt. I. allatos attinet, ex iis quae iam monuimus, euidenter comprobari poteft eos rite fe habere. Hoc cum pro fingulis feorfim demonftrare superfluum foret, vno alteroue exemplo oftendiffe fufficiat. Quum igitur fit

$$\left(\frac{d\mu}{dy}\right) = \int dx \left(\frac{d\mu}{dy}\right) \text{ et } \left(\frac{d\mu}{dx}\right) = \left(\frac{d}{dx} \frac{d\mu}{dy}\right) + p \left(\frac{d}{dx} \frac{d\tau}{dy}\right) + q \left(\frac{d}{dx} \frac{d\pi}{dy}\right) \\ + r \left(\frac{d}{dx} \frac{d\kappa}{dy}\right) \dots + u \left(\frac{d}{dx} \frac{d\tau}{dy}\right)$$

conf: §. 7. Differt: I., erit

$$\left(\frac{d\mu}{dy}\right) = \int dx \left(\frac{d}{dx} \frac{d\mu}{dy}\right) + \int dy \left(\frac{d}{dx} \frac{d\tau}{dy}\right) + \int dp \left(\frac{d}{dx} \frac{d\pi}{dy}\right) + \int dq \left(\frac{d}{dx} \frac{d\kappa}{dy}\right) \dots \\ + \int d\tau \left(\frac{d}{dx} \frac{d\tau}{dy}\right)$$

Eodem modo ob

$$\left(\frac{d\mu}{dp}\right) = \int dx \left(\frac{d\mu}{dp}\right) - \int dx \left(\frac{d\mu}{dy}\right)$$

atque

$$\left(\frac{d\mu}{dp}\right) = \left(\frac{d}{dx} \frac{d\mu}{dp}\right) + p \left(\frac{d}{dx} \frac{d\tau}{dp}\right) + q \left(\frac{d}{dx} \frac{d\pi}{dp}\right) + r \left(\frac{d}{dx} \frac{d\kappa}{dp}\right) \dots \dots \dots \\ + u \left(\frac{d}{dx} \frac{d\tau}{dp}\right) + \left(\frac{d\tau}{dx}\right)$$

fit

fit

$$\left(\frac{d\mu}{dp}\right) = f dx \left(\frac{d\mu}{dx dp}\right) + f dy \left(\frac{d\mu}{dx dy dp}\right) + f dp \left(\frac{d\mu}{dx dy dp}\right) + f dq \left(\frac{d\mu}{dx dy dp}\right) \dots$$

$$+ f dt \left(\frac{d\mu}{dx dy dp}\right) + f dx \left(\frac{d\mu}{dx dy}\right) - f dx \left(\frac{d\mu}{dx dy}\right)$$

quum igitur bini ultimi termini ob $\left(\frac{d\mu}{dx}\right) = \left(\frac{d\mu}{dy}\right)$ se
inuicem destruant, prodibit valor ipsius $\left(\frac{d\mu}{dp}\right)$ talis,
qualem antea §. 8. exhibuimus.

5. Valorum ipsius

$$\left(\frac{d\mu}{dx}\right), \left(\frac{d\mu}{dy}\right) \text{ etc. } \left(\frac{d\mu}{dx}\right), \left(\frac{d\mu}{dy}\right) \text{ etc.}$$

supra inuentorum egregiae transformationes atque
omnino notatu dignae hinc eliciuntur sequentes:

$$\left(\frac{d\mu}{dx}\right) = f dx \left(\frac{d\mu}{dx}\right); \left(\frac{d\mu}{dy}\right) = f dx \left(\frac{d\mu}{dy}\right)$$

$$\left(\frac{d\mu}{dp}\right) = f dx \left(\frac{d\mu}{dp}\right) - f^{(1)} dx \left(\frac{d\mu}{dy}\right)$$

$$\left(\frac{d\mu}{dq}\right) = f dx \left(\frac{d\mu}{dq}\right) - f^{(1)} dx \left(\frac{d\mu}{dp}\right) + f^{(2)} dx \left(\frac{d\mu}{dy}\right) \text{ etc.}$$

$$\left(\frac{d\mu}{dx}\right) = f dx \left(\frac{d\mu}{dx}\right); \left(\frac{d\mu}{dy}\right) = f dx \left(\frac{d\mu}{dy}\right)$$

$$\left(\frac{d\mu}{dp}\right) = f dx \left(\frac{d\mu}{dp}\right) - f^{(1)} dx \left(\frac{d\mu}{dy}\right)$$

$$\left(\frac{d\mu}{dq}\right) = f dx \left(\frac{d\mu}{dq}\right) - f^{(1)} dx \left(\frac{d\mu}{dp}\right) + f^{(2)} dx \left(\frac{d\mu}{dy}\right) \text{ etc.}$$

$$\left(\frac{d\mu}{dx}\right) = f dx \left(\frac{d\mu}{dx}\right) - f^{(1)} dx \left(\frac{d\mu}{dy}\right)$$

$$\left(\frac{d\mu}{dy}\right) = f dx \left(\frac{d\mu}{dy}\right) - f^{(1)} dx \left(\frac{d\mu}{dy}\right)$$

$$\left(\frac{d\mu}{dp}\right) = f dx \left(\frac{d\mu}{dp}\right) - f^{(1)} dx \left(\frac{d\mu}{dy}\right)$$

$$- f^{(1)} dx \left(\frac{d\mu}{dp}\right) + 2 f^{(1)} dx \left(\frac{d\mu}{dy}\right)$$

$$\left(\frac{d\mu}{dq}\right) = f dx \left(\frac{d\mu}{dq}\right) - f^{(1)} dx \left(\frac{d\mu}{dp}\right) + f^{(1)} dx \left(\frac{d\mu}{dy}\right)$$

$$- f^{(1)} dx \left(\frac{d\mu}{dq}\right) + 2 f^{(1)} dx \left(\frac{d\mu}{dp}\right) - 3 f^{(1)} dx \left(\frac{d\mu}{dy}\right) \text{ etc.}$$

Tom. XVI. Nou. Comm.

Z

$\left(\frac{d\mu}{dx}\right)$

$$\begin{aligned}
 \left(\frac{dx}{dx}\right) &= f dx \left(\frac{dQ}{dx}\right) - f^{(1)} dx \left(\frac{dP}{dx}\right) + f^{(2)} dx \left(\frac{dN}{dx}\right) \\
 \left(\frac{dx}{dy}\right) &= f dx \left(\frac{dQ}{dy}\right) - f^{(1)} dx \left(\frac{dP}{dy}\right) + f^{(2)} dx \left(\frac{dN}{dy}\right) \\
 \left(\frac{dx}{dp}\right) &= f dx \left(\frac{dQ}{dp}\right) - f^{(1)} dx \left(\frac{dQ}{dp}\right) \\
 &\quad - f^{(1)} dx \left(\frac{dP}{dp}\right) + 2 f^{(1)} dx \left(\frac{dP}{dy}\right) \\
 &\quad + f^{(2)} dx \left(\frac{dN}{dp}\right) - 3 f^{(2)} dx \left(\frac{dN}{dy}\right) \\
 \left(\frac{dx}{dq}\right) &= f dx \left(\frac{dQ}{q}\right) - f^{(1)} dx \left(\frac{dQ}{q}\right) + f^{(1)} dx \left(\frac{dQ}{y}\right) \\
 &\quad - f^{(1)} dx \left(\frac{dP}{q}\right) + 2 f^{(1)} dx \left(\frac{dP}{p}\right) - 3 f^{(1)} dx \left(\frac{dP}{y}\right) \\
 &\quad + f^{(2)} dx \left(\frac{dN}{q}\right) - 3 f^{(2)} dx \left(\frac{dN}{p}\right) + 6 f^{(2)} dx \left(\frac{dN}{y}\right) \\
 &\quad \text{etc. etc.}
 \end{aligned}$$

vbi quoniam progressionis lex iam fit manifesta, plures terminos accumulare inutile ducimus.

6. Quemadmodum § 10 prioris dissertationis ostendi, ad integrabilitatem formulae $V dx$, posito

$$dV = M dx + N dy + P dp \dots \dots + U du$$

requiri, vt sequentes formulae integrationem admittant

$$dx(Nx + P)$$

$$dx(Nx^2 + 2Px + 2Q)$$

$$dx(Nx^3 + 3Px^2 + 3 \cdot 2(Qx + R))$$

$$\begin{aligned}
 dx(Nx^{m-1} + (m-1)Px^{m-2} + (m-1)(m-2)Qx^{m-3} \dots \\
 + ((m-1)(m-2) \dots 1)(Sx + T))
 \end{aligned}$$

ita nunc formulae quoque exhiberi possunt, ad quarum integrabilitatem reduci censenda est integrabilitas formu-

formulae $dx fV dx$, pro qua valor ipsius dV idem est, quem modo attulimus. Primum enim quia $dx fV dx$ integrationem admittere non possit, nisi Vdx sit integrabile, perspicuum est omnium primo requiri, ut formulae modo allatae integrabiles sint, iis tamen requisitis non omnia expleri quae pro integranda formula $dx fV dx$ requiruntur. At vero quum § 11. Dissert. I. demonstratum sit, posterius criterium, ex quo de integrabilitate formulae nostrae iudicium peti debet, hac aequatione contineri

$$P - \frac{2dQ}{dx} + \frac{3ddR}{dx^2} - \frac{4d^2S}{dx^3} \dots \dots + \frac{m.d^{m-1}U}{dx^{m-1}} = 0$$

nunc quidem plures hinc deriuare licet formulas, quas integrabiles esse oportet. Praeterquam enim quod iam evidens sit, ipsam formulam Pdx per se esse integrabilem, nec non $dx(Px + 2Q)$ integrationem admittere, omnino quoque patet his formulis:

$$dx(3R - 2fQdx + f^{(2)}Pdx)$$

$$dx(4S - 3fRdx + 2f^{(2)}Qdx - f^{(3)}Pdx) \text{ etc.}$$

certa competere integralia. Si vero nunc valores integrales euoluantur, quemadmodum § 10 Dissert. I. docuimus, inde has obtinebimus formulas:

$$dx(Px + 2Q)$$

$$dx(Px^2 + 2.2.Qx + 3.2.R)$$

$$dx(Px^3 + 2.3.Qx^2 + 3.3.2.Rx + 4.3.2.S)$$

$$dx(Px^{m-2} + 2(m-2)Qx^{m-3} + 3(m-2)(m-3)Rx^{m-4} + 4(m-2)(m-3)(m-4)Sx^{m-5} + \text{etc.})$$

Z 2

quibus

quibus omnibus, suā assignari poterunt integralia. Si lam ulterius progrediendo similes formulas exquirere velimus pro integrabilitate ipsius $dx / V dx$, sequentes adipiscemur

$$\begin{aligned} dx(Qx + 3R) \\ dx(Qx^2 + 3.2Rx + 6.2S) \\ dx(Qx^3 + 3.3Rx^2 + 6.3.2Sx + 10.3.2T) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} dx(Qx^{m-1} + 3(m-3)Rx^{m-2} + 6(m-3)(m-4)Sx^{m-3} \\ + 10(m-3)(m-4)(m-5)Tx^{m-4} + \text{etc.}) \end{aligned}$$

quae nunc quoque integrationem admittere debent. Neque obscurum est, quomodo longius progredi liceat, si hoc negotium ulterius persequi placuerit.

7. Quae de integrabilitate huiusmodi formularum $dx / V dx$, $dx / V dx$ etc. in medium a nobis allata sunt, imprimis tum vsui esse possunt, quando integralia inuestiganda sunt formularum, de quibus suspicari licet, quod per integrationem ad quantitates finitas perducī possint, hoc est ad expressiones quae solas x et y inuoluunt. Sic si formula integranda proponitur, ubi V praeter x et y sequentes per differentiationem inuectas p , q , r continet, hinc iudicari potest ipsi expressionem respondere solas x et y inuoluentem, ex qua per differentiationem originem ducere concipienda est, si modo sequentibus conditionibus fuerit satisfactum:

$$\begin{aligned} N - \frac{dP}{dx} + \frac{dQ}{dx^2} - \frac{dR}{dx^3} = 0; \\ P - \frac{2dQ}{dx} + \frac{3dR}{dx^2} = 0; Q - \frac{dR}{dx} = 0. \end{aligned}$$

Gene-

Generaliter vero si proposita fuerit formula differentialis $V dx$, in qua functio V praeter x et y etiam quantitates ex differentiatione ortas p, q, r, \dots involuat; certum est hanc formulam ad expressionem solas x et y continentem deducere, si sequentes impletae fuerint conditiones:

$$N - \frac{dP}{dx} + \frac{d dQ}{dx^2} - \frac{d^2 R}{dx^3} \dots + \frac{d^m U}{dx^m} = 0$$

$$P - \frac{2dQ}{dx} + \frac{3ddR}{dx^2} - \frac{4d^2 S}{dx^3} \dots + \frac{md^{m-1}U}{dx^{m-1}} = 0$$

$$Q - \frac{3dR}{dx} + \frac{6ddS}{dx^2} \dots + \frac{m(m-1)}{1 \cdot 2} \frac{d^{m-2}U}{dx^{m-2}} = 0$$

$$T - \frac{mdU}{dx}.$$

Neque tamen hinc vicissim inferri debet, si istis aequationibus satisfacere non liceat, formulam propositam $V dx$ nullo modo ad absolutum integrale solas x et y complectens perducı posse, quum id per idoneos multiplicatores, in quos formulae integrales vti $\int V dx$, $\int^{(1)} V dx$ etc. ducendae sunt, saepe numero praestare licet, de quo pluribus differendi infra dabitur locus.

8. In priori dissertatione exhibuimus quidem aequationes, quibus criteria integrabilitatis pro formulis differentialibus duplicatis continentur, quas sub hac forma $V dx dy$ repraesentari diximus, designante scilicet V functionem quamcunque variabilium x, y, z et differentialium inde ortorum. Quamvis autem

ea quae tum a nobis allata fuere, generaliter locum habeant, qualiscunque quantitas V concipiatur esse functio ipsorum x, y, z et differentialium inde pendens, tamen quum potissimum ad eos casus pertinere videantur, quibus V est functio algebraica, nullam scilicet formulam integram ipsa inuoluens, hoc loco haud iniucundum fore arbitrati sumus fusius exponere, quae criteria integrabilitatis locum habere debeant pro casu formulae differentialis duplicatae $V' dx dy$, vbi V' statuitur $= \int V dx dy$, imprimis quum aequationes, quibus haec criteria continentur mirabili quadam concinnitate et praestantia se commendare videantur. Statuamus igitur vti antea § 21. Dissert. I.

$$\begin{aligned} dV = & L dx + N dz + P dp + Q dq + R dr + \text{etc.} \\ & + M dy + F' dp' + Q' dq' + R' dr' \\ & + Q'' dq'' + R'' dr'' \\ & + R''' dr''' \end{aligned}$$

et tum quidem quia euidens est $V' dx dy$ integrale admittere non posse, nisi formula quoque $V dx dy$ sit integrabilis, facile intelligitur ante omnia requiri, vt aequationibus §. 33. Dissert. I. satisfiat. Vt vero conditiones quoque inueniantur, quae pro integrabilitate formulae $V' dx dy$ speciatim praescribendae sunt, ponamus:

$$\begin{aligned} dV' = & \lambda dx + \nu dz + \pi dp + \kappa dq + \rho dr + \text{etc.} \\ & + \mu dy + \pi' dp' + \kappa' dq' + \rho' dr' \\ & + \kappa'' dq'' + \rho'' dr'' \\ & + \rho''' dr''' \end{aligned}$$

tum

tum vero posito $\int V^I dx dy = Z$

$$\begin{aligned} dZ = & Ldx + Nd p + Pdp + Qdq \text{ etc.} \\ & + Mdy + P'dp' + Q'dq' \\ & + Q''dq''. \end{aligned}$$

Ne autem nimia multitudine formularum obruamur, ponamus in valore differentialis dZ vltimos terminos esse $P'dp'$ et $P'dp'$ ex natura enim aequationum vltimarum ad quas calculus perducet, facile apparebit enodationem specialis huius exempli, vim demonstrationis generalis habere. Rationibus autem subductis vti §. 28. Dissert. I. factum est, inueniemus criteria integrabilitatis formulae $V^I dx dy$ sequentibus septem contineri aequationibus:

$$Q=0; Q'=0; Q''=0; R=0; R'=0; R''=0; R'''=0.$$

Eadem criteria igitur sequentibus quoque aequationibus expressa esse, intelligi debet:

$$0 = \left(\frac{d^6 Q}{dx^3 dy^3} \right) = \left(\frac{d^4 u}{dx^3 dy} \right) - \left(\frac{d^3 \pi}{dx^2 dy^2} \right) + \left(\frac{d^2 v}{dx dy^2} \right)$$

$$\begin{aligned} 0 = \left(\frac{d^6 Q'}{dx^3 dy^2} \right) = & \left(\frac{d^4 u'}{dx^3 dy} \right) - \left(\frac{d^3 \pi'}{dx^2 dy^2} \right) + \left(\frac{d^2 v'}{dx dy^2} \right) \\ & - \left(\frac{d^3 \pi''}{dx^2 dy^2} \right) \end{aligned}$$

$$0 = \left(\frac{d^6 Q''}{dx^3 dy} \right) = \left(\frac{d^4 u''}{dx^3 dy} \right) - \left(\frac{d^3 \pi''}{dx^2 dy^2} \right) + \left(\frac{d^2 v''}{dx dy^2} \right)$$

$$0 = \left(\frac{d^7 R}{dx^4 dy^2} \right) = \left(\frac{d^5 u}{dx^4 dy} \right) - \left(\frac{d^4 \pi}{dx^3 dy^2} \right) + \left(\frac{d^3 \pi'}{dx^2 dy^2} \right) - \left(\frac{d^2 v}{dx dy^2} \right)$$

$$\begin{aligned} 0 = \left(\frac{d^7 R'}{dx^4 dy} \right) = & \left(\frac{d^5 u'}{dx^4 dy} \right) - \left(\frac{d^4 \pi'}{dx^3 dy^2} \right) + \left(\frac{d^3 \pi''}{dx^2 dy^2} \right) - \left(\frac{d^2 v'}{dx dy^2} \right) \\ & - \left(\frac{d^4 u''}{dx^3 dy^2} \right) + \left(\frac{d^3 \pi'''}{dx^2 dy^2} \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 0 = \left(\frac{d^7 R''}{dx^4 dy} \right) = & \left(\frac{d^5 u''}{dx^4 dy} \right) - \left(\frac{d^4 \pi''}{dx^3 dy^2} \right) + \left(\frac{d^3 \pi'''}{dx^2 dy^2} \right) - \left(\frac{d^2 v''}{dx dy^2} \right) \\ & - \left(\frac{d^4 u'''}{dx^3 dy^2} \right) + \left(\frac{d^3 \pi''''}{dx^2 dy^2} \right) \end{aligned}$$

$$0 = \left(\frac{d^8 R'''}{dx^5 dy} \right) = \left(\frac{d^6 u'''}{dx^5 dy} \right) - \left(\frac{d^5 \pi'''}{dx^4 dy^2} \right) + \left(\frac{d^4 \pi''''}{dx^3 dy^2} \right) - \left(\frac{d^3 v'''}{dx dy^2} \right)$$

quarum

quarum aequationum ratio ex differtatione superiori perspicua redditur.

9. In formulis differentialibus litteras Graecas inuoluentibus, earum valores §. 29. Differt. I. allatos introducamus, quo facto has septem obtinebimus aequalitates, criteria integrabilitatis propositae formulae $V' dx dy$ complectentes:

$$\text{I. } 3N - 2 \left(\frac{dP}{dx} \right) + \left(\frac{d^2 Q}{dx^2} \right) = 0$$

$$\text{II. } 4N - 2 \left(\frac{dP}{dx} \right) + \left(\frac{d^2 Q'}{dx dy} \right) = 0 \\ - 2 \left(\frac{dP'}{dy} \right)$$

$$\text{III. } 3N - 2 \left(\frac{dP'}{dy} \right) + \left(\frac{d^2 Q''}{dy^2} \right) = 0$$

$$\text{IV. } 4N - 3 \left(\frac{dP}{dx} \right) + 2 \left(\frac{d^2 Q}{dx^2} \right) - \left(\frac{d^3 R}{dx^3} \right) = 0$$

$$\text{V. } 6N - 4 \left(\frac{dP}{dx} \right) + 2 \left(\frac{d^2 Q}{dx^2} \right) - \left(\frac{d^3 R'}{dx^2 dy} \right) = 0 \\ - 3 \left(\frac{dP'}{dy} \right) + 2 \left(\frac{d^2 Q'}{dx dy} \right)$$

$$\text{VI. } 6N - 3 \left(\frac{dP}{dx} \right) + 2 \left(\frac{d^2 Q'}{dx dy} \right) - \left(\frac{d^3 R''}{dx dy^2} \right) = 0 \\ - 4 \left(\frac{dP'}{dy} \right) + 2 \left(\frac{d^2 Q''}{dy^2} \right)$$

$$\text{VII. } 4N - 3 \left(\frac{dP'}{dy} \right) + 2 \left(\frac{d^2 Q''}{dy^2} \right) - \left(\frac{d^3 R'''}{dy^3} \right) = 0.$$

Si vero sequentes iam instituantur combinationes $V-2. I$ et $VI-2. III$ consequemur:

$$3 \left(\frac{dP'}{dy} \right) - 2 \left(\frac{d^2 Q'}{dx dy} \right) + \left(\frac{d^3 R'}{dx^2 dy} \right) = 0$$

$$\text{et } 3 \left(\frac{dP}{dx} \right) - 2 \left(\frac{d^2 Q'}{dx dy} \right) + \left(\frac{d^3 R''}{dx dy^2} \right) = 0.$$

Uterius sumendo (III) + VI - V + I - II atque (III) + V - VI + III - II (vbi (III) significat aequationem tertiam § 29. Differt: I.) prodibit:

$$3 \left(\frac{d^3 Q''}{d^2 y^2} \right) - 2 \left(\frac{d^3 R''}{d^2 x^2 dy} \right) + \left(\frac{d^4 S''}{d^2 x^2 dy^2} \right) = 0 \text{ et}$$

$$3 \left(\frac{d^3 Q}{dx^3} \right) - 2 \left(\frac{d^3 R'}{d^2 x^2 dy} \right) + \left(\frac{d^4 S''}{d^2 x^2 dy^2} \right) = 0.$$

Denique capiendo (IV-IX)+VII et (II-VIII)+IV obtinebimus:

$$6N - 2 \left(\frac{d^3 P}{dx^3} \right) + \left(\frac{d^4 Q}{dx^2 dy} \right) - \left(\frac{d^3 R'}{d^2 x^2 dy} \right) + \left(\frac{d^4 S''}{d^2 x^2 dy^2} \right) - \left(\frac{d^5 T'''}{d^2 x^2 dy^2} \right) = 0$$

$$- 5 \left(\frac{d^3 P'}{dx^2 dy} \right) + 2 \left(\frac{d^4 Q'}{dx^2 dy} \right) - 2 \left(\frac{d^3 R''}{d^2 x^2 dy^2} \right) + 2 \left(\frac{d^4 S'''}{d^2 x^2 dy^2} \right)$$

$$+ 4 \left(\frac{d^4 Q''}{d^2 y^2} \right) - 3 \left(\frac{d^3 R'''}{d^2 y^2} \right)$$

in qua aequatione si deleantur termini, qui propter aequationes modo allatas nihilo aequantur, tandem fiet:

$$3 \left(\frac{d^3 R'''}{d^2 y^2} \right) - 2 \left(\frac{d^4 S'''}{d^2 x^2 dy^2} \right) + \left(\frac{d^5 T'''}{d^2 x^2 dy^2} \right) = 0.$$

Simili vero prorsus modo demonstrabitur esse

$$3 \left(\frac{d^3 R}{dx^3} \right) - \left(\frac{d^4 S'}{dy^2 dx^2} \right) + \left(\frac{d^5 T''}{dy^2 dx^2} \right) = 0.$$

Porro et hoc obseruari meretur, esse tam $\left(\frac{d^4 S}{dx^4} \right)$, quam $\left(\frac{d^4 S'''}{d^2 y^2} \right) = 0$, quod facile patet, si IV - I subtrahatur a (I) atque VII - III a (V). Aequationes vero modo inuentae ita comparatae sunt, vt facillime combinari queant, cum iis quas §. 32. Differt. I. in medium attulimus, nihil autem attinet, de modo quo hae combinationes instituendae vberius disferere, quia ex formulis inde deductis, facile patefecit qua ratione formandae sint. Ista formulae

Tom. XVI. Nou. Comm.

A a

autem

256 DE CRITERIIS INTEGRABILIT.

autem per combinationem elicita, unica omnia
hac formula comprehendi possunt:

$$\begin{aligned} 6N - 5 \left(\frac{d^2 P}{dx^2} \right) + 4 \left(\frac{d^2 Q}{dx dy} \right) - 3 \left(\frac{d^2 R}{dy^2} \right) + 2 \left(\frac{d^2 S}{dx^2 dy} \right) - \left(\frac{d^2 T}{dx dy^2} \right) \\ - 5 \left(\frac{d^2 P'}{dx^2} \right) + 4 \left(\frac{d^2 Q'}{dx dy} \right) - 3 \left(\frac{d^2 R'}{dy^2} \right) + 2 \left(\frac{d^2 S'}{dx^2 dy} \right) - \left(\frac{d^2 T'}{dx dy^2} \right) \\ + 4 \left(\frac{d^2 Q''}{dx dy} \right) - 3 \left(\frac{d^2 R''}{dy^2} \right) + 2 \left(\frac{d^2 S''}{dx^2 dy} \right) - \left(\frac{d^2 T''}{dx dy^2} \right) = 0 \\ - 3 \left(\frac{d^2 R'''}{dy^2} \right) + 2 \left(\frac{d^2 S'''}{dx^2 dy} \right) - \left(\frac{d^2 T'''}{dx dy^2} \right) \\ + 2 \left(\frac{d^2 S''''}{dx^2 dy} \right) - \left(\frac{d^2 T''''}{dx dy^2} \right) \\ - \left(\frac{d^2 T'''''}{dx dy^2} \right). \end{aligned}$$

de qua certe observari meretur, omnia membra in
iisdem lineis siue horizontalibus, siue diagonalibus
collocata, formulas praebere evanescentes.

10. Ex combinatione huius formulae cum illa
§. 33. Differt. 1. allata, sequentes demum binae
eruentur aequationes, pro criteriis integrabilitatis
formulae $V^1 dx dy$,

$$\begin{aligned} \text{I. } P - 2 \left(\frac{d^2 Q}{dx^2} \right) + 3 \left(\frac{d^2 R}{dx dy} \right) - 4 \left(\frac{d^2 S}{dy^2} \right) + 5 \left(\frac{d^2 T}{dx^2 dy} \right) \\ - 2 \left(\frac{d^2 Q'}{dx^2} \right) + 3 \left(\frac{d^2 R'}{dx dy} \right) - 4 \left(\frac{d^2 S'}{dy^2} \right) + 5 \left(\frac{d^2 T'}{dx^2 dy} \right) \\ + 3 \left(\frac{d^2 Q''}{dx dy} \right) - 4 \left(\frac{d^2 R''}{dx^2 dy} \right) + 5 \left(\frac{d^2 S''}{dy^2} \right) = 0 \\ - 4 \left(\frac{d^2 S'''}{dy^2} \right) + 5 \left(\frac{d^2 T'''}{dx^2 dy} \right) \\ + 5 \left(\frac{d^2 T''''}{dx^2 dy} \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{II. } P &= 2\left(\frac{dQ''}{dy}\right) + 3\left(\frac{d d R'''}{d x^2}\right) - 4\left(\frac{d^2 S''''}{d y^2}\right) + 5\left(\frac{d^4 T''''}{d y^4}\right) \\
 &- 2\left(\frac{dQ'}{dx}\right) + 3\left(\frac{d d R''}{d x dy}\right) - 4\left(\frac{d^2 S'''}{d x d y^2}\right) + 5\left(\frac{d^4 T''''}{d x d y^3}\right) \\
 &+ 3\left(\frac{d d R'}{d x^2}\right) - 4\left(\frac{d^2 S''}{d x^2 d y}\right) + 5\left(\frac{d^4 T''}{d x^2 d y^2}\right) = 0 \\
 &- 4\left(\frac{d^2 S'}{d x^2}\right) + 5\left(\frac{d^4 T''}{d x^2 d y^2}\right) \\
 &+ 5\left(\frac{d^4 T'}{d y^4}\right).
 \end{aligned}$$

Pro ambabus autem his aequationibus tenendum est, membra iisdem lineis horizontalibus et diagonalibus expressa formulas praebere evanescentes. Ex ipsa autem rei natura perspicitur quantitates $S, S''', T, T', T''', T''''$ evanescere debere, de quo ea quae §. 34. Dissert. I. occurrunt, consuli poterunt.

11. Nunc vero et facili coniectura assequi possumus, qualia proditura forent criteria integrabilitatis pro huiusmodi formula $V'' dx dy$ ubi $V'' = \iint Q' dx dy$ et $V' = \iint V dx dy$, posito ut ante

$$\begin{aligned}
 dV &= Ldx + Ndz + Pdp + Qdq + \text{etc.} \\
 &+ Mdy \quad + P'dp' + Q'dq' \\
 &\quad + Q''dq''.
 \end{aligned}$$

Evidens scilicet est eadem huiusmodi aequationibus exprimi:

$$\begin{aligned}
 Q &= 3\left(\frac{dR}{dx}\right) + 6\left(\frac{d d S}{d x^2}\right) - 10\left(\frac{d^2 T}{d x^2}\right) + \text{etc.} \\
 &- 3\left(\frac{dR'}{dy}\right) + 6\left(\frac{d d S'}{d x dy}\right) - 10\left(\frac{d^2 T'}{d x d y^2}\right) \\
 &+ 6\left(\frac{d d S''}{d y^2}\right) - 10\left(\frac{d^2 T''}{d x d y^3}\right) \\
 &- 10\left(\frac{d^2 T'''}{d y^3}\right) \\
 &\text{A a a} \quad Q' - 3
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
Q' - 3 \left(\frac{d R'}{d x} \right) + 6 \left(\frac{d d S'}{d x^2} \right) - 10 \left(\frac{d^3 T'}{d x^3} \right) + \text{etc.} \\
- 3 \left(\frac{d R''}{d y} \right) + 6 \left(\frac{d d S''}{d x d y} \right) - 10 \left(\frac{d^3 T''}{d x^2 d y} \right) = 0 \\
+ 6 \left(\frac{d d S''' }{d y^2} \right) - 10 \left(\frac{d^3 T''' }{d x d y^2} \right) \\
- 10 \left(\frac{d^3 T'''' }{d y^3} \right)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
Q'' - 3 \left(\frac{d R''}{d x} \right) + 6 \left(\frac{d d S''}{d x^2} \right) - 10 \left(\frac{d^3 T''}{d x^3} \right) + \text{etc.} \\
- 3 \left(\frac{d R'''}{d y} \right) + 6 \left(\frac{d d S'''}{d x d y} \right) - 10 \left(\frac{d^3 T'''}{d x^2 d y} \right) = 0 \\
+ 6 \left(\frac{d d S'''' }{d y^2} \right) - 10 \left(\frac{d^3 T'''' }{d x d y^2} \right) \\
- 10 \left(\frac{d^3 T''''' }{d y^3} \right)
\end{aligned}$$

Inutile autem ducimus in demonstrationem harum aequalitatum ulterius inquirere, praesertim quia facile praevidere licet; calculum eo perducantem, nimis euadere prolixum, nobis autem modum quandam tenendum esse iudicavimus, ne maiori prolixitate lectorum defatigemus attentionem. Quod quum ita sit, etiam ea quae de formulis differentialibus triplicatis vel altiorum ordinum, simili ratione ac de duplicatis demonstrari possent, plane praetermittenda esse censuimus.

12. Cum autem nunc doctrinam antea expositam exemplis quibusdam illustrare nobis proponimus, in genere praemonendum est, exempla ista a nobis adducenda duplicis esse generis, prius enim eas complectetur formulas differentiales, quae per se integrationem admittunt, dum posterius ad eiusmodi pertinet formulas, quae non quidem per se integrabiles sunt

sunt, idoneo tamen multiplicatore adhibito in quem duci debent, reddi possunt integrabiles. In eo etenim praecipuus vsus doctrinae de criteriis integrabilitatis consistit, quod ansam praebet huiusmodi multiplicatores inveniendi; nam iis formulis differentialibus, quas per se integrabiles esse constat, ipsorum integralia assignare, minimum quidem hac in re facessit negotium. Praeterea et eam ordinis regulam observandam nobis praescripsimus, quam supra quoque secuti sumus, ut formulas primum differentiales simplices tractemus, tum vero ad duplicatas et aliorum generum progrediamur.

§ 3. Sit igitur nunc proposita haec aequatio

$$V = \frac{x^2 + p}{y} - \frac{p^2}{2y} + \frac{xy + pq}{p} - \frac{q^2}{2p}$$

de qua ad praescriptum regularum antea traditarum, inquiri debet, an formula $V dx$ sit integrabilis nec ne? Differentiali autem sumto habemus:

$$dV = dx \left(\frac{2x}{y} - \frac{p}{2y} \right) + dy \left(-\frac{p+xq}{2y^2} + \frac{xy+pq}{y^2} + \frac{r}{p} - \frac{q}{p^2} \right) \\ + dp \left(\frac{1}{y} - \frac{p}{2y} - \frac{r}{p} + \frac{xy+pq}{p^2} \right) + dq \left(\frac{x}{2} + 1 - \frac{xy}{p} \right) + \frac{2dr}{p}$$

unde pro M, N, P etc. sequentes obtinemus valores:

$$M = \frac{2x}{y} - \frac{p}{2y}; \quad N = -\frac{p+xq}{2y^2} + \frac{xy+pq}{y^2} + \frac{r}{p} - \frac{q}{p^2}$$

$$P = \frac{1}{y} - \frac{p}{2y} - \frac{r}{p} + \frac{xy+pq}{p^2}; \quad Q = \frac{x}{2} + 1 - \frac{xy}{p}; \quad R = \frac{2}{p}$$

Quam itaque esse debeat

$$N - \frac{dP}{dx} + \frac{dQ}{dy} - \frac{dR}{dp} = 0$$

$$A \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \text{primum}$$

primum inuenimus

$$Q - \frac{dR}{dx} = \frac{x}{y} - \frac{yq}{p^2}, \text{ porro } P - \frac{dQ}{dx} + \frac{d^2R}{dx^2} = -\frac{px}{y^2} + \frac{q}{p}$$

et denique

$$N - \frac{dP}{dx} + \frac{d^2Q}{dx^2} - \frac{d^3R}{dx^3} = -\frac{(p+q)}{y^2} + \frac{pxp}{y^3} + \frac{r}{p} - \frac{q}{p^2} - \frac{1}{dx} d. \left(\frac{q}{p} - \frac{px}{y} \right) = 0.$$

Quam igitur condicio integrabilitatis impleatur, certi esse possumus, formulam propositam integrabilem esse, et liquet omnino eius integrale esse $\frac{x^2}{2y} + \frac{2q}{p}$.

Videamus vero et nunc utrum reliquae illae formulae integrabiles sint, ad quarum integrabilitatem ista formulae nostrae propositae quasi reducatur vid § 6 huius dissertationis. Necessarium igitur est, ut sequentes formulae integrari queant:

$$Mdx, Ndx, dx(Nx+P); dx(Nx^2+2Px+2Q).$$

Liquet autem esse

$$\int Mdx = \frac{p}{y}; \int Ndx = \frac{q}{p} + \frac{p}{y^2}, \text{ vltcrius}$$

$$\begin{aligned} dx(Nx+P) &= dx \left(-\frac{(x^2q+px)}{2y} + \frac{x^2pp}{y^2} + \frac{rx}{p} - \frac{qpx}{y} + \frac{r}{y} - \frac{px}{y^2} - \frac{2r}{pp} + \frac{2qg}{p^2} \right) \\ &= -\frac{x^2dp - xpdz}{y^2} + \frac{x^2pdy}{y^2} + \frac{xqg}{p} - \frac{xqdp}{pp} + \frac{dx}{y} - \frac{xqdy}{y^2} - \frac{ydg}{pp} + \frac{2ydp}{p^2} \end{aligned}$$

vnde integrando fit

$$\int dx(Nx+P) = \frac{x}{y} - \frac{x^2p}{y^2} - \frac{yq}{p^2}$$

Porro habetur

$$\begin{aligned} dx(Nx^2+2Px+2Q) &= dx \left(-\frac{x^2q - x^2p}{y^2} + \frac{x^2pp}{y^2} + \frac{xrx}{p} - \frac{pxqg}{pp} + \frac{x}{y} - \frac{x^2q}{y^2} \right) \\ &\quad + dx \left(-\frac{x^2yr}{p^2} + \frac{x^2yq}{p^2} + 2 - \frac{2yq}{pp} \right) \\ &= -\frac{x^2dp - x^2pdx}{y^2} + \frac{x^2pdy}{y^2} + \frac{x^2dx}{y} - \frac{x^2dy}{y^2} + x \left(\frac{dq}{p} - \frac{qdp}{pp} \right) + \frac{xqdx}{p} \\ &\quad - \frac{x^2qdy}{pp} - \frac{x^2ydg}{pp} + \frac{x^2yqdp}{p^2} - \frac{2yqdx}{pp} + 2 \frac{(pdy - ydp)}{p^2} \end{aligned}$$

cuius

cuius integrale manifesto est

$$\int dx (N x^2 + 2 P x + 2 Q) = -\frac{x^2 P}{2} + \frac{x^2 Q}{2} + \frac{x^2 R}{2} - \frac{x^2 P^2}{2} + \frac{x^2 Q^2}{2}.$$

§4. Proposita nunc esto formula

$$dx \left(\frac{x^2 + 1}{x^2} - \frac{6 x p q - 1 p p}{x^2} + \frac{6 x p^2}{x^2} \right) = V dx$$

quam examinemus an his sit integrabilis, hoc est an non solum $\int V dx$, verum etiam $\int dx / V dx$ verum constituat integrale? Differentiali autem sumto prodit

$$dV = \frac{2dx + 2dx + 2dq}{x^2} - \frac{2dx + 2dq}{x^2} - \frac{(6pdx + 6xqdp + 6xpdq)}{x^2} - \frac{6pdp + 16xpq + 1ppdy}{x^2} + \frac{6p^2dx + 16xpd^2p - 16xpd^2q}{x^2}$$

unde sequentes consequimur valores:

$$M = \frac{2}{x^2} - \frac{6pq}{x^2} + \frac{6p^2}{x^2}$$

$$N = -\frac{2x^2 - 1}{x^2} + \frac{16xpq + 1pp}{x^2} - \frac{16x^2 p^2}{x^2}$$

$$P = -\frac{6xq - 1p}{x^2} + \frac{16x^2 p^2}{x^2}$$

$$Q = \frac{2}{x^2} - \frac{6x^2}{x^2} \text{ et } R = \frac{x}{x^2}.$$

Videndum igitur est, utrum his duabus satisfiat sequentiis:

$$N - \frac{dP}{dx} + \frac{dQ}{dx} - \frac{d^2R}{dx^2} = 0 \text{ et}$$

$$P - \frac{dQ}{dx} + \frac{d^2R}{dx^2} = 0$$

quod si euenierit, nullum est dubium, quin formula proposita sit integrabilis. Quam autem habeatur

$$Q - \frac{dR}{dx} = \frac{2}{x^2} - \frac{6x^2}{x^2} \text{ et}$$

$$P - \frac{dQ}{dx} + \frac{d^2R}{dx^2} = -\frac{6xq - 1p}{x^2} + \frac{16x^2 p^2}{x^2}$$

certe

certe adipiscimur

$$N - \frac{dP}{dx} + \frac{dQ}{dy} - \frac{dR}{dz} = 0.$$

Pro posteriori criterio habemus

$$2Q - 3\frac{dR}{dx} = \frac{1}{y^2} - \frac{6xz}{y^3}, \text{ ideoque } P - \frac{1}{y}\frac{dQ}{dx} + \frac{1}{y}\frac{dR}{dz} = 0.$$

De reliquis formulis, quas integrabiles esse oportet, periculum nunc quoque facere lubet, habebimus autem:

$$\int M dx = \int \left(\frac{1}{y^2} - \frac{1}{y^3} \frac{dy}{dx} - \frac{1}{y^3} \frac{dz}{dx} + \frac{1}{y^3} \frac{d^2z}{dx^2} \right) = \frac{1}{y^2} - \frac{1}{y^3} \frac{dz}{dx},$$

$$\int dx \int M dx = \int \left(\frac{1}{y^2} - \frac{1}{y^3} \frac{dz}{dx} \right) = \frac{1}{y^2},$$

$$\begin{aligned} \int N dx &= \int \left(-\frac{1}{y^3} \frac{dx}{dy} + \frac{1}{y^3} \frac{d^2y}{dx^2} - \frac{1}{y^3} \frac{dz}{dy} + \frac{1}{y^3} \frac{d^2z}{dy^2} + \frac{1}{y^3} \frac{d^2x}{dz^2} - \frac{1}{y^3} \frac{d^2y}{dz^2} \right) dy \\ &= -\frac{1}{y^3} \frac{dx}{dy} + \frac{1}{y^3} \frac{d^2y}{dx^2} + \frac{1}{y^3} \frac{d^2x}{dz^2} \end{aligned}$$

$$\int dx \int N dx = \int \left(-\frac{1}{y^3} \frac{dx}{dy} + \frac{1}{y^3} \frac{d^2y}{dx^2} \right) = -\frac{1}{y^3} \frac{dx}{dy}.$$

Porro

$$\int P dx = \int \left(-\frac{1}{y^3} \frac{dx}{dy} + \frac{1}{y^3} \frac{d^2y}{dx^2} - \frac{1}{y^3} \frac{dz}{dy} \right) = -\frac{1}{y^3} \frac{dx}{dy} + \frac{1}{y^3} \frac{d^2y}{dx^2}$$

ideoque

$$\int^{(1)} N dx - \int^{(1)} P dx + \int Q dx = \int \left(\frac{1}{y^2} - \frac{1}{y^3} \frac{dz}{dx} \right) = \frac{1}{y^2} \text{ et}$$

$$\int^{(1)} N dx - \int^{(1)} P dx + \int^{(1)} Q dx - \int R dx = 0.$$

Uterius erit

$$\int^{(1)} P dx - 2 \int Q dx = \int \left(-\frac{1}{y^3} \frac{dx}{dy} + \frac{1}{y^3} \frac{d^2y}{dx^2} \right) = -\frac{1}{y^3} \frac{dx}{dy} \text{ et denique}$$

$$\int^{(1)} P dx - 2 \int^{(1)} Q dx + 3 \int R dx = 0.$$

15. Dum exempla iam proposituri erimus formularum differentialium, quae per se integrabiles

non

non sunt, at in certos multiplicatores ductae ad integrabilitatem perducantur, haud praeter rem erit, de indole horum multiplicatorum pauca praefari. Primum igitur licet concedendum sit, vnamquamque formulam differentialem eius esse indolis, vt in certum multiplicatorem ducta integrabilis reddatur, minime tamen inde sequitur huiusmodi multiplicatorem pro idoneo esse habendum, si differentialia altiorum ordinum inuoluat, quam quae in ipsa formula differentiali proposita reperiuntur. Quum enim integratio in eo consistat, vt formula differentialis proposita, ad aliam gradus proxime inferioris deprimatur, facile liquet ineptum habendum esse multiplicatorem, qui differentialia superioris gradus involueret, quam quae in ipsa formula ad integrandum proposita occurrunt. Sic si quaeratur integrale formulae ψdx per se non integrabilis, in qua ψ quamcunque designat functionem ipsorum x, y, p, q , quiuis facile iudicare potest, multiplicatorem hunc in finem adhibendum non inuoluere debere valores differentiales ultra p assurgentes, quoniam ipsum integrale, quodcunque demum sit, vt functio ipsorum x, y, p considerari debet. Deinde et id notari meretur quod si multiplicator aliquis idoneus formulae ψdx fuerit inuentus, quem littera Φ indigitemus, tum ex hoc infinitos alios elici posse, quorum ope eadem formula ψdx reddatur integrabilis. Si enim ponamus $\int \Phi \psi dx = z$, facile intelligitur huiusmodi formulam $dz : \Gamma = z$ (designante $\Gamma : z$ quamcunque functionem ipsius z) pro inte-

Tom. XVI. Nou. Comm.

B b

grabi-

grabili esse habendam; siquidem huius formulae integratio referenda est ad primam calculi integralis partem, quae de integratione formularum differentialium unicam variabilem inuoluentium agit, cuius omnes operationes hoc in negotio pro concessis haberi debent. Liquet igitur multiplicatores idoneos formulae propositae ψdx , generaliter hac expressione contineri $\Phi \Gamma : x$ seu $\Phi \Gamma : (\int \Phi \psi dx)$ hincque ex unico multiplicatore Φ inuento, infinitam multitudinem deduci posse. In inuestigando autem multiplicatore Φ , haec praescribenda videtur regula, ut semper simplicissimus qui fieri possit exquiratur; hoc est talis, qui minimum numerum variabilium x, y, p etc. inuoluit, sic si proposita fuerit formula ψdx in qua ψ functio habetur ipsorum x, y, p, q , simplicissimus erit multiplicator Φ , si ita comparatus sit, ut unicam tantum variabilem x inuoluat. Quodsi autem talem inuenire non liceat, proxime inquirendum est, utrum detur functio quaedam vel solius y vel ipsorum x et y per quam ψdx multiplicata reddatur integrabilis, cum autem neque hoc succedat, tum inquirendum erit, an pro Φ accipere liceat functionem quandam ipsorum x, y, p ?

16. Proposita iam esto formula differentialis :

$$dy + yv dx + z dx$$

vbi v et z quascunque functiones ipsius x designant, quum autem haec formula per se non sit integrabilis, quod examine instituto facile deprehendetur, quaeramus iam quantitatem per quam multiplicata, ad

ad integrabilitatem perducatur. Sit igitur quantitas Φ , talis multiplicator, quem nunc supponamus esse tantum functionem ipsius x , quo supposito, evidens fit formulam $\Phi(dy + yvdx)$ integrationem admittere debere, siquidem $\Phi z dx$ iam per se intelligitur esse integrabilis. Habemus vero tunc pro formula nostra

$V = \Phi(p + yv)$; $dV = d\Phi(p + yv) + \Phi(dp + vdy + ydv)$
unde deducitur

$M = \frac{d\Phi}{dx}(p + yv) + \Phi y \frac{dv}{dx}$; $N = \Phi v$ et $P = \Phi$,
itaque quum esse debeat $N - \frac{dP}{dx} = 0$, fiet $\Phi v - \frac{d\Phi}{dx} = 0$,
ideoque $\frac{d\Phi}{\Phi} = v dx$, seu $\Phi = e^{\int v dx}$. Integrale autem ipsum iam erit $y e^{\int v dx}$, ideoque totius formulae propositae:

$$y e^{\int v dx} + \int e^{\int v dx} z dx.$$

Enimuero operae pretium iam quoque erit inuestigare multiplicatorem generaliore, qui functio sit utriusque x et y , et de quo ex antea monitis quidem constat, cum huiusmodi exprimi forma:

$$e^{\int v dx} \Gamma; (y e^{\int v dx} + \int e^{\int v dx} z dx).$$

Statuamus autem ut antea hunc multiplicatorem Φ , et quum nunc sit

$V = \Phi(p + yv + z)$, nec non $dV = d\Phi(p + yv + z)$
 $+ \Phi(dp + ydv + vdy + dz)$

erit

$$M = \left(\frac{d\Phi}{dx}\right)(p + yv + z) + \Phi\left(y\frac{dv}{dx} + \frac{dz}{dx}\right);$$

$$N = \left(\frac{d\Phi}{dy}\right)(p + yv + z) + \Phi v;$$

B b 2

$P = \Phi,$

$P = \Phi$, hinc autem ista iam deducitur aequatio:

$$\left(\frac{d\Phi}{dy}\right)(y + yv + z) + \Phi v - \left(\frac{d\Phi}{dx}\right) - p\left(\frac{d\Phi}{dy}\right) = 0, \text{ seu} \\ \left(\frac{d\Phi}{dy}\right)(yv + z) - \left(\frac{d\Phi}{dx}\right) + \Phi v = 0.$$

Ponamus nunc $\Phi = \Phi' \psi$, ubi Φ' denotat functionem solam x involuentem, ψ autem talem quae utramque x et y continet, atque ob

$$\left(\frac{d\Phi}{dx}\right) = \psi \frac{d\Phi'}{dx} + \Phi' \left(\frac{d\psi}{dx}\right); \left(\frac{d\Phi}{dy}\right) = \Phi' \left(\frac{d\psi}{dy}\right),$$

his valoribus in aequatione superiori substitutis consequimur:

$$\Phi' \left(\frac{d\psi}{dy}\right)(yv + z) - \psi \frac{d\Phi'}{dx} - \Phi' \left(\frac{d\psi}{dx}\right) + \Phi' \psi v = 0.$$

Nunc facile quidem apparet, hanc aequationem in duas disseci posse partes, quarum utraque evanescere debet, erit scilicet

I. $\Phi' v - \frac{d\Phi'}{dx} = 0$ et II. $\left(\frac{d\psi}{dy}\right)(yv + z) - \left(\frac{d\psi}{dx}\right) = 0$,
ex priori statim deducitur $\Phi' = e^{\int v dx}$, quod autem posteriorem attinet, facile liquet ψ habere debere huiusmodi formam $\Gamma : (yS + T)$, designantibus S et T functiones quasdam solum variabilis x . Fiet vero inde

$$\left(\frac{d\psi}{dy}\right) = S\Gamma' : (yS + T) \text{ et } \left(\frac{d\psi}{dx}\right) = \left(y \frac{dS}{dx} + \frac{dT}{dx}\right) \Gamma' : (yS + T)$$

hinc ergo prodibit

$$S(yv + z) - y \frac{dS}{dx} - \frac{dT}{dx} = 0,$$

$$\text{ideoque } Sv - \frac{dS}{dx} = 0 \text{ et } Sz - \frac{dT}{dx} = 0,$$

unde deducitur

$$S = e^{\int v dx} \text{ et } T = \int Sz dx = \int e^{\int v dx} z dx,$$

multi-

multiplicator quaesitus igitur erit

$$e^{\int v dx} \Gamma : (y e^{\int v dx} + \int e^{\int v dx} . z dx)$$

prorsus uti supra docuimus.

17. Pro formula differentiali:

$$axdy + \beta y dx + x^m y^n (\gamma x dy + \delta y dx)$$

quaeramus nunc multiplicatorem, quo integrabilis reddatur, posito igitur hoc multiplicatore $= \Phi$, habebimus

$$V = \Phi(axp + \beta y + x^m y^n (\gamma xp + \delta y))$$

ideoque differentiatione instituta, sequentes prodibunt valores:

$$M = \left(\frac{d\Phi}{dx}\right)(axp + \beta y + x^m y^n (\gamma xp + \delta y)) \\ + \Phi(ap + x^{m-1} y^n ((m+1)\gamma xp + m\delta y))$$

$$N = \left(\frac{d\Phi}{dy}\right)(axp + \beta y + x^m y^n (\gamma xp + \delta y)) \\ + \Phi(\beta + x^m y^{n-1} (n\gamma xp + (n+1)\delta y))$$

$$P = \Phi(ax + \gamma x^{m+1} y^n).$$

Quum igitur esse debeat $N - \frac{dP}{dx} = 0$, hinc deducetur:

$$\left(\frac{d\Phi}{dy}\right)(axp + \beta y + x^m y^n (\gamma xp + \delta y)) - \frac{d\Phi}{dx}(ax + \gamma x^{m+1} y^n) \\ + \Phi(\beta + x^m y^{n-1} (n\gamma xp + (n+1)\delta y)) \\ - \Phi(a + (m+1)\gamma x^m y^n + n\gamma x^{m+1} y^{n-1}) = 0$$

Et quia

$$\frac{d\Phi}{dx} = \left(\frac{d\Phi}{dx}\right) + p\left(\frac{d\Phi}{dy}\right), \text{ erit}$$

B b 3

$\Phi(\beta$

$$\Phi(\beta - \alpha + x^m y^n((n+1)\delta - (m+1)\gamma)) + \left(\frac{d\Phi}{dy}\right)(\beta y + \delta x^m y^{n+1}) - \left(\frac{d\Phi}{dx}\right)(\alpha x + \gamma x^{m+1} y^n) = 0.$$

Nunc vero evidens est, huic aequationi satisfieri, si statuatur $\Phi = x^\kappa y^\lambda$, quo facto erit

$$\left(\frac{d\Phi}{dx}\right) = \kappa x^{\kappa-1} y^\lambda \text{ et } \left(\frac{d\Phi}{dy}\right) = \lambda x^\kappa y^{\lambda-1}$$

hisque valoribus introductis et tota aequatione per $x^\kappa y^\lambda$ diuisa, fiet

$$\beta - \alpha + x^m y^n((n+1)\delta - (m+1)\gamma) + \lambda\beta - \kappa\alpha + x^m y^n(\lambda\delta - \kappa\gamma) = 0.$$

Hinc autem obtinemus

I° $\beta - \alpha = \kappa\alpha - \lambda\beta$; II° $(n+1)\delta - (m+1)\gamma = \kappa\gamma - \lambda\delta$
ex priori fit $\beta(1+\lambda) = \alpha(1+\kappa)$, ex posteriore vero

$$\begin{aligned} (\delta(1+n+\lambda) &= \gamma(1+m+\kappa)), \text{ siue} \\ \frac{\kappa\delta}{\gamma}(1+n+\lambda) &= \alpha m + \alpha(1+\kappa) = \alpha m + \beta(1+\lambda), \end{aligned}$$

erit igitur

$$\alpha(\delta n - \gamma m) = (\beta\gamma - \alpha\delta)(1+\lambda), \text{ vnde } 1+\lambda = \frac{\alpha(\delta n - \gamma m)}{\beta\gamma - \alpha\delta}$$

similique modo $1+\kappa = \frac{\beta(\delta n - \gamma m)}{\beta\gamma - \alpha\delta}$.

Integrale autem aequationis propositae nunc inuenietur

$$\frac{\beta}{1+\kappa} x^{1+\kappa} + \frac{\delta}{1+m+\kappa} x^{m+1} y^{n+1} + \frac{\lambda}{1+\lambda} y^{1+\lambda} = \text{const.}$$

Præterea autem erit

$$\begin{aligned} \int M dx &= \int \kappa x^{\kappa-1} y^\lambda (\alpha x dy) + \beta y dx + x^m y^n (\gamma x dy + \delta y dx) \\ &\quad + \int x^\kappa y^\lambda (\alpha d\gamma + x^{m-1} y^n ((m+1)\gamma \alpha dy + m\delta y)) \\ &= \beta x^\kappa y^{\lambda+1} + \delta x^{\kappa+m} y^{\lambda+n+1} \text{ et} \end{aligned}$$

Ex

et

$\int N dx$

$$\begin{aligned} fNdx &= f\lambda x^m \gamma^{\lambda-1} (\alpha x dy + \beta y dx + x^m \gamma^n (\gamma x dy + \delta y dx)) \\ &\quad + f x^m \gamma^{\lambda} (\beta dx + x^m \gamma^{n-1} (n \gamma x dy + (n+1) \delta y dx)) \\ &= \alpha x^{m+1} \gamma^{\lambda} + \gamma x^{m+m+1} \gamma^{\lambda+n}. \end{aligned}$$

18. Proposita æquatione differentiali homogenea $R dx + S dy$, pro qua R et S sunt functiones homogeneae ipsarum x et y , inuestigemus multiplicatorem, qui eam integrabilem reddat. Si igitur statuatur hic multiplicator Φ , habebimus

$V = \Phi (R + Sp)$, hinc

$$M = \left(\frac{d\Phi}{dx}\right)(R + Sp) + \Phi \left(\left(\frac{dR}{dx}\right) + p \left(\frac{dS}{dx}\right)\right)$$

$$N = \left(\frac{d\Phi}{dy}\right)(R + Sp) + \Phi \left(\left(\frac{dR}{dy}\right) + p \left(\frac{dS}{dy}\right)\right)$$

et $P = \Phi S$, tum vero erit

$$N - \frac{dP}{dy} = R \left(\frac{d\Phi}{dy}\right) - S \left(\frac{d\Phi}{dx}\right) + \Phi \left(\left(\frac{dR}{dy}\right) - \left(\frac{dS}{dx}\right)\right) = 0.$$

Dum igitur ex hac æquatione valor litterae Φ erui debet, primum obseruasse iuuat, pro Φ assumi posse functionem homogeneam ipsarum x et y . Ponamus autem Φ esse functionem homogeneam m dimensionis et per ea quae in Tom. I. Calculi Different. Illustris. *Euleri* §. 222. demonstrantur, habebimus

$$m \Phi = x \left(\frac{d\Phi}{dx}\right) + y \left(\frac{d\Phi}{dy}\right), \text{ hincque}$$

$$R y \left(\frac{d\Phi}{dy}\right) = m R \Phi - R x \left(\frac{d\Phi}{dx}\right)$$

hoc igitur valore in æquatione superiori introducto, fiet

$$m R \Phi - (R x + S y) \left(\frac{d\Phi}{dx}\right) = \Phi \left(y \left(\frac{dS}{dx}\right) - y \left(\frac{dR}{dy}\right)\right)$$

pro-

proinde

$$dx \left(\frac{d\Phi}{dx} \right) = \frac{\Phi}{Rx + Sy} (mR dx + y dx \left(\frac{dR}{dy} \right) - y dx \left(\frac{dS}{dx} \right)).$$

Simili ratione probatur esse

$$Sx \left(\frac{d\Phi}{dy} \right) = mS\Phi - Sy \left(\frac{d\Phi}{dy} \right), \text{ unde}$$

$$(Rx + Sy) \left(\frac{d\Phi}{dy} \right) - mS\Phi = \Phi \left(x \left(\frac{dS}{dx} \right) - x \left(\frac{dR}{dy} \right) \right)$$

hincque

$$dy \left(\frac{d\Phi}{dy} \right) = \frac{\Phi}{Rx + Sy} (mS dy + x dy \left(\frac{dS}{dx} \right) - x dy \left(\frac{dR}{dy} \right)).$$

Consequenter nunc erit

$$\begin{aligned} d\Phi &= dx \left(\frac{d\Phi}{dx} \right) + dy \left(\frac{d\Phi}{dy} \right) = \\ &= \frac{\Phi}{Rx + Sy} (mR dx + mS dy + (y dx - x dy) \left(\left(\frac{dR}{dy} \right) - \left(\frac{dS}{dx} \right) \right)). \end{aligned}$$

At ob R et S functiones homogeneas, est

$$y dx \left(\frac{dR}{dy} \right) = nR dx - x dx \left(\frac{dR}{dx} \right)$$

$$x dy \left(\frac{dS}{dx} \right) = nS dy - y dy \left(\frac{dS}{dy} \right)$$

consequenter

$$\begin{aligned} \frac{d\Phi}{\Phi} &= \frac{1}{Rx + Sy} \left((m+n)(R dx + S dy) - x dx \left(\frac{dR}{dx} \right) - x dy \left(\frac{dR}{dy} \right) \right. \\ &\quad \left. - y dx \left(\frac{dS}{dx} \right) - y dy \left(\frac{dS}{dy} \right) \right) \\ &= \frac{1}{Rx + Sy} ((m+n)(R dx + S dy) - x dR - y dS). \end{aligned}$$

Patet itaque si statuatur $m + n = -1$, fore

$$\frac{d\Phi}{\Phi} = - \frac{d(Rx + Sy)}{Rx + Sy} \text{ et } \Phi = \frac{1}{Rx + Sy}$$

Hoc loco autem praetereundum non est, demonstrationem modo allatam, locum habere non posse pro iis casibus, vbi R et S sunt functiones vel nullius

nullius dimensionis, vel -1 dimensionis ipsarum x et y , quum pro priori casu ob $n=0$, sit $m=-1$, quo casu fieri nequit, vt istae aequalitates

$$nR = x\left(\frac{dR}{dx}\right) + y\left(\frac{dR}{dy}\right) \text{ et } nS = x\left(\frac{dS}{dx}\right) + y\left(\frac{dS}{dy}\right)$$

locum habeant, tum autem posteriori casu ob $m=0$, ista aequalitas

$$m\Phi = x\left(\frac{d\Phi}{dx}\right) + y\left(\frac{d\Phi}{dy}\right) \text{ plane corruat.}$$

Videndum igitur est, quomodo demonstratio ad hos quoque casus accommodari possit. Atqui quum nullum dubium sit, nostram demonstrationem locum habere, si fuerint R et S functiones vnius dimensionis, examinemus an inde duorum casuum, quibus $n=0$ vel $n=-1$, ratio reddi queat? Sit itaque proposita aequatio $R'dx + S'dy$, vbi R' et S' functiones sunt nullius dimensionis ipsarum x et y , posito autem $R'x = R$ et $S'x = S$, quaeramus multiplicatorem formulae differentialis $Rdx + Sdy$, qui vti antea demonstrauius erit $\frac{1}{Rx + Sy}$, hinc ergo fiet formula

$$\frac{Rdx + Sdy}{Rx + Sy} = \frac{R'xdx + S'xdy}{R'x^2 + S'xy} = \frac{R'dx + S'dy}{R'x + S'y}$$

integrabilis, ex quo nullum est dubium, quin $R'dx + S'dy$ reddatur integrabilis diuidendo eam per $R'x + S'y$. Si R' et S' fuerint functiones -1 dimensionis, multiplicetur vtraque per xy et statuatur $R'xy = R$ et $S'xy = S$, sicque multiplicator formulae differentialis $Rdx + Sdy$, habebitur $\frac{1}{Rx + Sy}$, integrabilis igitur erit formula

$$\frac{R'xydx + S'xydy}{R'x^2y + S'xy^2} = \frac{R'dx + S'dy}{R'x + S'y}.$$

Tom. XVI. Nou. Comm.

C c

Per

Per se autem patet esse

$$\int M dx = \Phi R \text{ et } \int N dy = \Phi S.$$

19. Nunc autem facile perspicitur, quomodo inuestigatio idonei multiplicatoris pro formula $R dx + S dy$ facilius institui possit. Si enim is multiplicator, ut antea supponatur $= \Phi$, tum vero ponatur $R\Phi = T$ et $S\Phi = U$, ex iis quae supra monuimus facile intelligitur, T et U pro functionibus homogeneis eiusdem dimensionis ipsarum x et y haberi posse. Erit igitur

$$mT = x \left(\frac{dT}{dx} \right) + y \left(\frac{dT}{dy} \right), \text{ nec non } mU = x \left(\frac{dU}{dx} \right) + y \left(\frac{dU}{dy} \right)$$

proinde

$$mT dx + mU dy = x dT + y dU + (y dx - x dy) \left(\left(\frac{dT}{dy} \right) - \left(\frac{dU}{dx} \right) \right)$$

et quandoquidem ob formulam $T dx + U dy$ integrabilem, sit $\left(\frac{dT}{dy} \right) = \left(\frac{dU}{dx} \right)$, erit nunc

$$mT dx + mU dy = x dT + y dU.$$

Introducitis autem pro T et U eorum valoribus, consequemur

$$m\Phi(R dx + S dy) = \Phi(x dR + y dS) + d\Phi(Rx + Sy)$$

ex quo fit

$$\frac{d\Phi}{\Phi} = \frac{mR dx - x dR + mS dy - y dS}{Rx + Sy},$$

si ergo statuatur $m = -1$, fiet

$$\frac{d\Phi}{\Phi} = - \frac{d(Rx + Sy)}{Rx + Sy}$$

$$\text{ideoque } \Phi = \frac{1}{Rx + Sy}$$

Patet

Patet autem eodem negotio multiplicatorem latius quoque patentem inueniri, quia enim est

$$\frac{d\Phi}{\Phi} + \frac{d(Rx + Sy)}{Rx + Sy} = (m+1) \frac{(Rdx + Sdy)}{Rx + Sy}, \text{ erit}$$

$$I. \Phi(Rx + Sy) = (m+1) \int \frac{Rdx + Sdy}{Rx + Sy}$$

ideoque si ponatur $\frac{Rdx + Sdy}{Rx + Sy} = \frac{dz}{z}$, multiplicator idoneus formulae propositae, nunc quoque erit

$$\Phi = \frac{Z^{m+1}}{Rx + Sy}, \text{ ipsum autem integrale inde oriundum est } \frac{1}{m+1} Z^{m+1}.$$

20. Consideremus iam formulam differentialem:

$$dx(a + \beta x + \gamma y) + dy(\delta + \epsilon x + \zeta y)$$

cuius factorem per quem multiplicata integrabilis fiat, inuestigari oportet. Primum igitur liquet, si statuatur

$$a + \beta x + \gamma y = z \text{ et } \delta + \epsilon x + \zeta y = u$$

inde fieri

$$\beta dx + \gamma dy = dz, \epsilon dx + \zeta dy = du$$

hincque

$$dx = \frac{\zeta dz - \gamma du}{\beta \zeta - \epsilon \gamma}; dy = \frac{\beta du - \epsilon dz}{\beta \zeta - \epsilon \gamma},$$

quibus valoribus substitutis nostra formula in hanc transformatur

$$(\zeta z - \epsilon u) dz + (\beta u - \gamma z) du$$

ubi quum iam quantitates, in quas dz et du ducuntur, sint functiones homogeneae ipsarum z et u ,

C c 2 per

per § antecedentem, multiplicator hanc formulam integrabilem reddens erit

$$\frac{(\zeta x - \gamma u)z + (\beta u - \varepsilon z)u}{(\beta x + \gamma y)z + (\varepsilon x + \zeta y)y},$$

sive haec formula fiet integrabilis diuisa per

$$\begin{aligned} & (\alpha + \beta x + \gamma y)((\beta \zeta - \gamma \varepsilon)x + \alpha \zeta - \delta \gamma) \\ & + (\delta + \varepsilon x + \gamma y)((\beta \zeta - \gamma \varepsilon)y + \beta \delta - \alpha \varepsilon). \end{aligned}$$

Videamus vero nunc an et alio modo, hunc multiplicatorem detegere liceat, statuamus igitur cum $= \Phi$, quumque sit

$$V = \Phi(\alpha + \delta p + \beta x + \varepsilon xp + \gamma y + \zeta yp) \text{ erit}$$

$$M = \left(\frac{d\Phi}{dx}\right)(\alpha + \delta p + \beta x + \varepsilon xp + \gamma y + \zeta yp) + \Phi(\beta + \varepsilon p)$$

$$N = \left(\frac{d\Phi}{dy}\right)(\alpha + \delta p + \beta x + \varepsilon xp + \gamma y + \zeta yp) + \Phi(\gamma + \zeta p)$$

$$P = \Phi(\delta + \varepsilon x + \zeta y).$$

Hinc ob $N - \frac{dP}{dx} = 0$, fiet

$$\Phi(\gamma - \varepsilon) + \left(\frac{d\Phi}{dy}\right)(\alpha + \beta x + \gamma y) - \left(\frac{d\Phi}{dx}\right)(\delta + \varepsilon x + \zeta y) = 0$$

ex qua aequatione valorem ipsius Φ quaerere oportet. Verum enimvero quia infiniti valores pro Φ sine dubio dantur, qui huic aequationi satisfaciant, congruum erit pro Φ aliquem valorem assumere, eumque examinare, an conditioni nostrae satisfaciat. Quandoquidem vero casu $\alpha = 0$ et $\delta = 0$, multiplicator esse debeat

$$\frac{(\beta x + \gamma y)x + (\varepsilon x + \zeta y)y}{(\beta x + \gamma y)x + (\varepsilon x + \zeta y)y},$$

inde rationem adipiscimur pro nostro casu supponendi

$$\Phi = \frac{(\beta x + \gamma y)x + (\varepsilon x + \zeta y)y}{(\alpha + \beta x + \gamma y)(x + m) + (\delta + \varepsilon x + \zeta y)(y + n)}$$

Hinc

Hinc vero fit

$$\left(\frac{d\Phi}{dx}\right) = (-\beta(x+m) - (\alpha + \beta x + \gamma y) - \delta(x+n))\Phi$$

$$\left(\frac{d\Phi}{dy}\right) = (-\gamma(x+m) - (\delta + \epsilon x + \zeta y) - \zeta(y+n))\Phi$$

vnde

$$\left(\frac{d\Phi}{dy}\right)(\alpha + \beta x + \gamma y) - \left(\frac{d\Phi}{dx}\right)(\delta + \epsilon x + \zeta y) = \Phi(\epsilon - \gamma) =$$

$$\Phi'(\epsilon(y+n)(\delta + \epsilon x + \zeta y) + \beta(x+m)(\delta + \epsilon x + \zeta y) - \gamma(x+m)(\alpha + \beta x + \gamma y) - \zeta(y+n)(\alpha + \beta x + \gamma y))$$

fieri igitur debet

$$-(\alpha + \beta x + \gamma y)(\epsilon(x+m) + \zeta(y+n)) + (\delta + \epsilon x + \zeta y)(\gamma(y+n) + \beta(x+m)) = 0.$$

seu

$$(\delta + \epsilon x + \zeta y)(\beta m + \gamma n + \beta x + \gamma y) - (\alpha + \beta x + \gamma y)(\epsilon m + \zeta n + \epsilon x + \zeta y) = 0.$$

Quae conditio manifeste impletur, statuendo

$$\beta m + \gamma n = \alpha \text{ et } \epsilon m + \zeta n = \delta,$$

vnde obtinemus

$$m = \frac{\alpha \zeta - \delta \gamma}{\beta \zeta - \epsilon \gamma} \text{ et } n = \frac{\beta \delta - \alpha \epsilon}{\beta \zeta - \epsilon \gamma}.$$

Per se autem evidens est, hunc multiplicatorem cum prius inuento prorsus coincidere. Vterius vero ob

$$\begin{aligned} fMdx &= fdx \left(\frac{d\Phi}{dx}\right)(\alpha + \beta x + \gamma y) + fdy \left(\frac{d\Phi}{dy}\right)(\delta + \epsilon x + \zeta y) + \Phi(\beta dx + \zeta dy) \\ &= f(dx \left(\frac{d\Phi}{dx}\right) + dy \left(\frac{d\Phi}{dy}\right))(\alpha + \beta x + \gamma y) + \Phi(\beta dx + \gamma dy), \end{aligned}$$

erit

$$fMdx = \Phi(\alpha + \beta x + \gamma y),$$

simili vero modo probatur esse

$$\int N dx = \Phi(\delta + \epsilon x + \zeta y).$$

21. Si proposita fuerit sequens aequatio differentialis:

$$X = Ay + \frac{Bdy}{dx} + \frac{Cddy}{dx^2} + \frac{Dd^2y}{dx^3} + \dots + \frac{Ld^ny}{dx^n}$$

cuius integrale quaerendum sit, quum ista aequatio per se non sit integrabilis, inuestigandus est multiplicator eam integrabilem reddens. Hunc in finem, ante omnia obseruare licet, si detur aliquis eiusmodi multiplicator, qui functio sit ipsius x tantum, isque statuatur $= \Phi$, totum negotium eo redire, ut formula

$$\Phi dx (Ay + Bp + Cq + Dr + \dots + Lu)$$

sit integrabilis, quia tum formula $\Phi X dx$ per se integrationem admittit. At pro litteris, M , N , P etc. sequentes obtinebimus valores:

$$M = \frac{d\Phi}{dx} (Ay + Bp + Cq + \dots + Lu)$$

$$N = A\Phi; P = B\Phi; Q = C\Phi \text{ etc.}$$

quia igitur pro integrabilitate esse debet

$$N - \frac{dP}{dx} + \frac{d^2Q}{dx^2} - \frac{d^3R}{dx^3} + \text{etc.} = 0$$

hinc sequitur fore

$$A\Phi - \frac{Bd\Phi}{dx} + \frac{Cd^2\Phi}{dx^2} - \frac{Dd^3\Phi}{dx^3} + \text{etc.} = 0.$$

Vt autem valorem idoneum pro Φ inueniamus, supponamus $\Phi = f z dx$, adeo ut sit z quoque functio

etio

tio ipsius x , et pro $\Phi, d\Phi$ etc. eorum valoribus
 suffectis, habebimus

$$A x - \frac{B d x}{d x} + \frac{C d d x}{d x^2} - \frac{D d^2 x}{d x^3} + \text{etc.} = 0$$

quae aequatio quum prorsus congruat cum prius allata,
 statui omnino potest $x = \lambda \Phi$, designante λ nume-
 rum constantem, tum vero habebitur

$$\frac{d\Phi}{\Phi} = \lambda dx, \text{ seu } \Phi = e^{\lambda x},$$

constantem enim adiciendum tuto negligere licet.
 Substituto autem hoc valore pro Φ in aequatione
 superiori nihilo acquanda et tota aequatione per $e^{\lambda x}$
 diuisa, prodit

$$A - B \lambda + C \lambda^2 - D \lambda^3 \dots + L \lambda^n = 0$$

ex cuius aequationis resolutione, tot inueniri debent
 valores pro λ , quoti gradus fuerit aequatio differen-
 tialis proposita. Multiplicator igitur quaesitus no-
 strae aequationis, erit $\Phi = e^{\lambda x}$ ipsum autem inte-
 grale habebitur

$$A'y + \frac{B'dy}{dx} + \frac{C'ddy}{dx^2} + \frac{D'd^2y}{dx^3} \dots + \frac{K'd^{n-1}y}{dx^{n-1}} = e^{-\lambda x} \int e^{\lambda x} \cdot X dx$$

posito nimirum

$$A' = \frac{A}{\lambda}; B' = \frac{\lambda B - A}{\lambda^2}; C' = \frac{\lambda^2 C - \lambda B + A}{\lambda^3} \text{ etc.}$$

Quum vero nunc integrale inuentum similis sit for-
 mae ac aequatio proposita, facile apparet, quomo-
 do integrationem ulterius prosequi liceat, cui nego-
 tio in praesenti immorari necesse non est, quum
 haec

haec aequatio iam antea accurate sit pertractata. Notari autem meretur esse

$$\begin{aligned} \int M dx &= \int d\Phi (Ay + Bp + Cq + Dr + \text{etc.}) \\ &= \int \lambda e^{\lambda x} dx (A'y + B'p + C'q + D'r + \text{etc.}) \\ &= \lambda e^{\lambda x} (A'y + B'p + C'q + D'r + \text{etc.}) \end{aligned}$$

atque

$$\begin{aligned} \int N dx &= \int A \Phi dx = A' e^{\lambda x} \\ \int^{(1)} N dx - \int P dx &= \int (A' - B) e^{\lambda x} dx = B' e^{\lambda x} \\ \int^{(2)} N dx - \int^{(1)} P dx + \int Q dx &= \int (B' - C) e^{\lambda x} dx = C' e^{\lambda x} \text{ etc.} \end{aligned}$$

22. Operae autem pretium nunc quoque est, inuestigare multiplicatorem huius aequationis differentialis

$$X = Ay + \frac{Bx dy}{dx} + \frac{Cx^2 ddy}{dx^2} + \frac{Dx^3 d^3y}{dx^3} + \dots + \frac{Lx^m d^m y}{dx^m}$$

qui si ponatur $= \Phi$ et consideretur vi functionis ipsius x taurum, habebimus

$$V = \Phi (Ay + Bxp + Cx^2 q + Dx^3 r + \dots + Lx^m u)$$

vnde sequentes procedunt valores:

$$M = \frac{d\Phi}{dx} (Ay + Bxp + Cx^2 q + Dx^3 r + \dots + Lx^m u)$$

$$+ \Phi (Bp + 2Cxq + 3Dx^2 r + \dots + m Lx^{m-1} u)$$

$$N = A\Phi; P = B\Phi x; Q = C\Phi x^2; R = D\Phi x^3 \text{ etc.}$$

Quum nunc criterium integrabilitatis, hac exprimitur aequatione

$$N - \frac{dP}{dx} + \frac{d^2Q}{dx^2} - \frac{d^3R}{dx^3} + \text{etc.} = 0$$

pro

pro N, P, Q etc. eorum valores substituendo, aequationem obtinebimus, ex qua valor multiplicatoris Φ determinari poterit. Quo autem hoc facilius procedat, notasse iuuabit, si in genere ponatur $U = \Phi x^m$, tum vero quoque $x^m = v$, esse

$$d^m U = v d^m \Phi + m dv d^{m-1} \Phi + \frac{m(m-1)}{1 \cdot 2} ddv d^{m-2} \Phi + \frac{m(m-1)(m-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3} d^3 v d^{m-3} \Phi + \text{etc.}$$

atque

$$d^n v = m(m-1)(m-2) \dots (m+1-n) x^{m-n} dx^n,$$

quamobrem nunc erit

$$d^m U = x^m d^m \Phi + m^2 x^{m-1} dx d^{m-1} \Phi + \frac{m^2(m-1)^2}{1 \cdot 2} x^{m-2} dx^2 d^{m-2} \Phi + \frac{m^2(m-1)^2(m-2)^2}{1 \cdot 2 \cdot 3} x^{m-3} dx^3 d^{m-3} \Phi + \text{etc.}$$

Huius igitur formulae ope, criterium integrabilitatis sequentem nobis praebebit aequationem:

$$\begin{aligned} 0 = A \Phi & - B \frac{x d \Phi}{d x} + C \frac{x^2 d d \Phi}{d x^2} - D \frac{x^3 d^2 \Phi}{d x^3} + E \frac{x^4 d^3 \Phi}{d x^4} - \text{etc.} \\ & - B + 4C - 9D + 16E - 25F \\ + \frac{4 \cdot 1}{1 \cdot 2} C & - \frac{9 \cdot 4}{1 \cdot 2} D + \frac{16 \cdot 9}{1 \cdot 2} E - \frac{25 \cdot 16}{1 \cdot 2} F + \frac{36 \cdot 25}{1 \cdot 2} G \\ - \frac{9 \cdot 4 \cdot 1}{1 \cdot 2 \cdot 3} D & + \frac{16 \cdot 9 \cdot 4}{1 \cdot 2 \cdot 3} E - \frac{25 \cdot 16 \cdot 9}{1 \cdot 2 \cdot 3} F + \frac{36 \cdot 25 \cdot 16}{1 \cdot 2 \cdot 3} G - \frac{49 \cdot 16 \cdot 25}{1 \cdot 2 \cdot 3} H \\ + \frac{16 \cdot 9 \cdot 4 \cdot 1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} E & - \frac{25 \cdot 16 \cdot 9 \cdot 4}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} F + \text{etc.} - \text{etc.} + \text{etc.} \\ \text{etc.} & \quad \text{etc.} \end{aligned}$$

vbi iam progressionis lex pro omnibus terminis satis est manifesta. Verum ex hac aequatione nihil aliud concludi potest, nisi quod Φ per huiusmodi aequationem determinetur:

Tom. XVI. Nou. Comm.

D d

A' Φ

$$A'\phi + B'\frac{x d\phi}{dx} + C'\frac{x^2 d^2\phi}{dx^2} + \text{etc.} = 0$$

leui autem adhibita attentione liquet, statui posse $\phi = x^\lambda$, hunc igitur valorem introducendo, in aequatione superiori ex criterio integrabilitatis deducta, consequemur

$$\begin{aligned} 0 = & A - B(\lambda+1) + C\lambda(\lambda+1) + 4\lambda C + 2C - D\lambda(\lambda-1)(\lambda-2) \\ & - 9D\lambda(\lambda-1) - 18D\lambda - 6D + E\lambda(\lambda-1)(\lambda-2)(\lambda-3) \\ & + 16E\lambda(\lambda-1)(\lambda-2) + 72E\lambda(\lambda-1) + 96E\lambda + 24E - \text{etc.} \end{aligned}$$

quae ad hanc reducitur

$$\begin{aligned} 0 = & A - B(\lambda+1) + C(\lambda+1)(\lambda+2) - D(\lambda+1)(\lambda+2)(\lambda+3) \\ & + E(\lambda+1)(\lambda+2)(\lambda+3)(\lambda+4) \dots \pm L(\lambda+1)(\lambda+2) \dots (\lambda+m). \end{aligned}$$

Si igitur ex hac aequatione singuli valores ipsius λ inuestigentur, vnaquaeque huiusmodi expressio x^λ , pro multiplicatore idoneo formulae nostrae differentialis propositae habenda est, integration autem actu instituta, habebimus:

$$x^{\lambda+1} \left(A'y + B'\frac{xdy}{dx} + C'\frac{x^2 d^2y}{dx^2} + D'\frac{x^3 d^3y}{dx^3} \dots + L\frac{x^{m-1} d^{m-1}y}{dx^{m-1}} \right) = f x^\lambda. X dx$$

positis scilicet

$$A = (\lambda+1)A' \quad A' = \frac{A}{\lambda+1}$$

$$B = (\lambda+2)B' + A' \quad B' = \frac{B}{\lambda+2} - \frac{A}{(\lambda+1)(\lambda+2)}$$

$$C = (\lambda+3)C' + B' \quad C' = \frac{C}{\lambda+3} - \frac{B}{(\lambda+1)(\lambda+2)} + \frac{A}{(\lambda+1)(\lambda+2)(\lambda+3)}$$

etc.

etc.

Quoniam vero nunc integrale emergens similis est formae, ac ipsa aequatio differentialis proposita, mox

mox liquet quomodo integratio ulterius continuari possit, vbi quidem notari meretur, si ex aequatione vnde λ determinatur, illa tot sortiatur valores diuersos, quoti gradus aequatio differentialis proposita est, inde fieri vt pro singulis valoribus ipsius λ inueniantur aequationes differentiales gradus proxime inferioris, per quarum igitur debitam inter se combinationem, aequatio tandem eruetur, quae solas quantitates finitas x et y inuoluit. Verum huic rei explicandae diutius inhaerere minus necesse ducimus, praepremis quod artificia in huius aequationis integratione adhibenda, iam accurate sint exposita. Vid. Illustr. Euleri Calcul. Integ. Vol. II. p. 483. et seqq.

23. Pro formula differentiali:

$$dd y + K dy dx + Ly dx^2$$

vbi K et L quascunque functiones ipsius x designant, quaeratur iam multiplicator Φ eam integrabilem reddens. Quum vero sit

$$V = \Phi(q + Kp + Ly), \text{ erit}$$

$$M = \left(\frac{d\Phi}{dx}\right)(q + Kp + Ly) + \Phi\left(p\frac{dK}{dx} + y\frac{dL}{dx}\right)$$

$$N = \left(\frac{d\Phi}{dy}\right)(q + Kp + Ly) + \Phi L$$

$$P = \left(\frac{d\Phi}{dp}\right)(q + Kp + Ly) + \Phi K; Q = \Phi.$$

At pro integrabilitate formulae propositae habetur

$$N - \frac{dP}{dx} + \frac{dQ}{dx^2} = 0$$

substitutis igitur valoribus supra inuentis, hanc consequemur aequationem:

$$Dd^2$$

$$\Phi(L$$

$$\begin{aligned} & \Phi(L - \frac{dK}{dx}) - K(\frac{d\Phi}{dx}) + (Ly + 2q)(\frac{d\Phi}{dy}) - (\frac{dL}{dx} + p(L + \frac{dK}{dx}) + 2Mq)(\frac{d\Phi}{dp}) \\ & + (\frac{d}{dx} \frac{d\Phi}{dx}) + 2p(\frac{d}{dx} \frac{d\Phi}{dy}) - (\frac{d}{dx} \frac{d\Phi}{dp})(Ly + Kp - q) + pp(\frac{d}{dy} \frac{d\Phi}{dp}) \\ & - (\frac{d}{dy} \frac{d\Phi}{dp})(Ly + Kp - q) - (\frac{d}{dp} \frac{d\Phi}{dp})(Ly + Kp - q) = 0. \end{aligned}$$

Huic aequationi quum variis modis satisfieri possit, casus nonnullos particulares contemplabimur pro Φ idoneos valores exhibentes, horum vero sine dubio simplicissimus est, quo Φ supponitur tantum esse functio ipsius x , pro quo igitur habebimus

$$\Phi(L - \frac{dK}{dx}) - \frac{K}{dx} \frac{d\Phi}{dx} + \frac{d}{dx} \frac{d\Phi}{dx} = 0$$

cuius aequationis ope si Φ determinari possit, integrale formulae nostrae propositae inuenitur:

$$\Phi dy + y(\Phi K dx - d\Phi)$$

quae formula nunc facile quoque ulteriorem integrationem admittit. Si autem denuo quaeratur multiplicator aequationem

$$\frac{d}{dx} \frac{d\Phi}{dx} - \frac{K}{dx} \frac{d\Phi}{dx} + \Phi(L - \frac{dK}{dx}) = 0$$

integrabilem reddens, mox patebit eum hac aequatione contineri

$$\frac{d}{dx} \frac{d\psi}{dx} + \frac{K}{dx} \frac{d\psi}{dx} + L\psi = 0,$$

vnde si formula nostra proposita fuerit $= 0$, nullum est dubium, quin uti Φ sit multiplicator integrabilem reddens formulam

$$d dy + K dy dx + Ly dx^2 = 0$$

ita vicissim quoque formula

$$d d\Phi - K d\Phi dx + (L - \frac{dK}{dx}) \Phi dx^2 = 0$$

inte-

integrabilis reddatur multiplicatore y . Si prior multiplicetur per Φ et posterior per y , sumta differentia prodibit

$$\Phi ddy - y dd\Phi + K(\Phi dy + y d\Phi)dx + y \Phi dK dx = 0, \text{ seu}$$

$$d. (\Phi dy - y d\Phi) + dx d. K \Phi y = 0, \text{ hincque integrando}$$

$$\Phi dy - y d\Phi + K \Phi y dx = C dx$$

quod est ipsum integrale modo inuentum.

24. Statuatur nunc $\Phi = Sy + Tp$, vbi S et T sunt functiones ipsius x tantum, erit vero

$$\left(\frac{d\Phi}{dx}\right) = y \frac{dS}{dx} + p \frac{dT}{dx}; \left(\frac{d\Phi}{dy}\right) = S; \left(\frac{d\Phi}{dp}\right) = T$$

$$\left(\frac{d^2\Phi}{dx^2}\right) = y \frac{d^2S}{dx^2} + p \frac{d^2T}{dx^2}; \left(\frac{d^2\Phi}{dx dy}\right) = \frac{dS}{dx}; \left(\frac{d^2\Phi}{dx dp}\right) = \frac{dT}{dx}$$

$$\left(\frac{d^2\Phi}{dy^2}\right) = 0; \left(\frac{d^2\Phi}{dy dp}\right) = 0; \left(\frac{d^2\Phi}{dp^2}\right) = 0.$$

His autem valoribus in aequatione nostra criterium integrabilitatis exprimente substitutis, sequens orietur aequatio:

$$(Sy + Tp)(L - \frac{dK}{dx}) - K(y \frac{dS}{dx} + p \frac{dT}{dx}) + S(Ly + 2q) - T(y \frac{dL}{dx} + p(L + \frac{dK}{dx}) + 2Kq) + y \frac{d^2S}{dx^2} + p \frac{d^2T}{dx^2} + 2p \frac{dS}{dx} + \frac{dT}{dx}(q - Kp - Ly) = 0$$

vbi si termini litteris y , p et q affecti seorsim nihilo aequentur, hae tres habebuntur aequationes:

$$\text{I. } (L - \frac{dK}{dx})S - K \frac{dS}{dx} + LS - T \frac{dL}{dx} + \frac{d^2S}{dx^2} - \frac{L dT}{dx} = 0$$

$$\text{II. } (L - \frac{dK}{dx})T - K \frac{dT}{dx} - (L + \frac{dK}{dx})T + \frac{d^2T}{dx^2} + \frac{dS}{dx} - \frac{K dT}{dx} = 0$$

$$\text{III. } 2S - 2KT + \frac{dT}{dx} = 0$$

D d 3

quae

quae in sequentes contrahuntur:

$$\text{I. } \frac{d d S}{d x^2} - \frac{d \cdot (S K + L T)}{d x} + 2 L S = 0$$

$$\text{II. } \frac{d d T}{d x^2} - \frac{2 d \cdot (K T - S)}{d x} = ; \text{ III. } \frac{d T}{d x} - 2 K T + S = 0.$$

Sponte autem liquet, binas posteriores prorsus congruere, adeo ut totum negotium nunc eo redeat, ut ex prima et tertia aequatione valores litterarum S et T inuestigentur. At quum eliminando S vel T ad aequationem differentialem perueniatur tertii gradus, quae quam ipsa proposita multo difficilior soluitur, tenendum est huiusmodi multiplicatorem $S y + T p$ non nisi pro certis valoribus litterarum K et L adhibendum esse. Primum vero erit

$$K = \frac{S}{T} + \frac{d T}{T d x}, \text{ proinde } S K = \frac{S S}{T} + \frac{S d T}{T d x},$$

hinc autem fiet

$$\frac{d d S}{d x^2} - \frac{S d S}{T d x} + \frac{S S d T}{T T d x} - \frac{S d d T}{T d x^2} - \frac{d S d T}{T d x^2} + \frac{S d T^2}{T T d x^2} - \frac{L d T - T d L}{d x} + 2 L S = 0,$$

quae commodius ita exprimitur:

$$d \cdot L T - 2 L T \cdot \frac{S d x}{T} = \frac{d d S}{d x} - d \cdot \left(\frac{S S}{T} + \frac{S d T}{T d x} \right).$$

Si haec aequatio multiplicetur per $e^{-2 \int \frac{S d x}{T}}$, integrale inde orietur:

$$T \cdot L e^{-2 \int \frac{S d x}{T}} = e^{-2 \int \frac{S d x}{T}} \left(\frac{d S}{d x} - \frac{S d T}{T d x} \right) + C, \text{ hincque}$$

$$L = \frac{C}{T} e^{2 \int \frac{S d x}{T}} + \frac{d S}{T d x} - \frac{S d T}{T T d x}.$$

Si igitur proposita fuerit huiusmodi aequatio:

$$\frac{d d y}{d x^2} + \left(\frac{S}{T} + \frac{d T}{T d x} \right) \frac{d y}{d x} + y \left(\frac{C}{T} e^{2 \int \frac{S d x}{T}} + \frac{d S}{T d x} - \frac{S d T}{T T d x} \right) = 0$$

certum

FORMVLARVM DIFFERENTIALIVM. 215

certum est eam integrabilem reddi per hunc multiplicatorem $Sy + Tp$ et ipsum quidem integrale tum erit :

$$\frac{Tdy^2}{2dx^2} + \frac{Sydy}{dx} + \frac{1}{2}yy(Ce^{2\int \frac{Sdx}{T}} + \frac{SS}{T}) = \text{Const.}$$

quod posito $C = 0$, in hanc satis concinnam abit formam :

$$TTdy^2 + 2TSydydx + yySSdx^2 = BTdx^2.$$

25. Tribuamus iam multiplicatori Φ huiusmodi formam :

$$\Phi = Ryy + Sy p + T p p, \text{ critque}$$

$$(\frac{d\Phi}{dx}) = y^2 \frac{dR}{dx} + y p \frac{dS}{dx} + p^2 \frac{dT}{dx}$$

$$(\frac{d\Phi}{dy}) = 2yR + pS; (\frac{d\Phi}{dp}) = 2pT + yS$$

$$(\frac{d^2\Phi}{dx^2}) = y^2 \frac{d^2R}{dx^2} + y p \frac{d^2S}{dx^2} + p^2 \frac{d^2T}{dx^2}$$

$$(\frac{d^2\Phi}{dx dy}) = 2y \frac{dR}{dx} + p \frac{dS}{dx}; (\frac{d^2\Phi}{dx dp}) = 2p \frac{dT}{dx} + y \frac{dS}{dx}$$

$$(\frac{d^2\Phi}{dy^2}) = 2R; (\frac{d^2\Phi}{dy dp}) = S; (\frac{d^2\Phi}{dp^2}) = 2T.$$

His valoribus in aequatione pro criterio integrabilitatis allata substitutis, iisque terminis seorsim nihilo aequatis, quae productis y^2 , yp , p^2 , yq , pq afficiuntur, sequentes consequemur aequationes :

$$I. 3.RL - d. \frac{(RK + SL)}{dx} + \frac{d^2R}{dx^2} = 0,$$

$$II. 4 \frac{dR}{dx} - 2 d. \frac{(SK + TL)}{dx} + \frac{d^2S}{dx^2} = 0$$

$$III. 4R - 2(SK + TL) + \frac{dS}{dx} = 0$$

$$IV. 2R - (SK + TL) + \frac{2dS}{dx} - \frac{2d.TK}{dx} + \frac{d^2T}{dx^2} = 0.$$

$$V. 3S - 6TK + 2 \frac{dT}{dx} = 0$$

Harum

Harum II et III statim plane coincidentes habentur, deinde vero si ex 2. IV subtrahatur III, prodibit

$$\frac{1}{2} \frac{dS}{dx} - 6 \frac{dTK}{dx} + 2 \frac{dT}{dx^2} = 0$$

quae iam manifesto praebet differentiale aequationis quintae, quocirca determinatio quantitatum R, S, T ex his tribus aequationibus petenda est:

$$I. \quad 3RL - d \cdot \frac{(RK + LL)}{dx} + \frac{d^2R}{dx^2} = 0.$$

$$II. \quad 4R - 2(SK + TL) + \frac{dS}{dx} = 0$$

$$III. \quad 3S - 6TK + 2 \frac{dT}{dx} = 0.$$

Si functiones R, S, T pro datis habentur, tum vero quaeratur, quales K et L sint functiones ipsius x ut formula

$$ddy + K dy dx + Ly dx^2, \text{ per}$$

$$Ry^2 + Sy p + T p p$$

fiat integrabilis, statim obtinebimus

$$K = \frac{S}{T} + \frac{dT}{T dx} \text{ et}$$

$$L = \frac{2R - SK}{T} + \frac{dS}{T dx} = \frac{2R}{T} - \frac{SS}{T^2} - \frac{S dT}{T^2 dx} + \frac{dS}{T dx}$$

praeterea autem requiritur, ut huic quoque satisfiat aequationi;

$$\frac{d^2R}{dx^2} - d \cdot \frac{(RK + SL)}{dx} + 3RL = 0$$

adeo ut ipsa quantitas R, iam per S et T certa ratione determinetur. Plures casus multiplicatorum formulae

$$ddy + K dy dx + Ly dx^2$$

adferre

adferre superuacaneum est, pro quacunque enim multiplicatoris forma, ope aequationis §. 23. allatae, tot aequationes inuenire licet, quot requiruntur ad ipsum multiplicatorem perfecte determinandum.

26. Transcamus nunc ad formulas differentiales $V dx$ ita comparatas, vt functio V praeter x , binas alias variables y et z cum earum differentialibus quibuscunque inuoluat, posito differentiali dx constanter. Sit vero ex huiusmodi formularum numero proposita sequens

$$dx \left(1 - \frac{y z}{x^2} + \frac{y p' + z p}{x} \right),$$

quam examinare oportet, vtrum integrabilis sit nec ne? Si igitur statuamus $\frac{dy}{dx} = p$; $\frac{dp}{dx} = q$, atque $\frac{dz}{dx} = p'$; $\frac{dp'}{dx} = q'$ nec non

$$dV = M dx + N dy + P dp \\ \quad \quad \quad R dz + \mathfrak{P} dp'$$

habebimus pro nostro casu,

$$M = \frac{y z}{x^2} - \frac{(y p' + z p)}{x}; \quad N = \frac{p'}{x} - \frac{z}{x^2};$$

$$R = \frac{p}{x} - \frac{y}{x^2}; \quad P = \frac{z}{x}; \quad \mathfrak{P} = \frac{y}{x}.$$

Quocirca quum pro integrabilitate formulae propositae, binis sequentibus aequationibus satisfaciendum sit:

$$N - \frac{dP}{dx} = 0; \quad R - \frac{d\mathfrak{P}}{dx} = 0$$

valoribus substitutis, omnino patet has condiciones perfecte impleri, vnde certo indicio constat formulam nostram integrabilem esse. Erit scilicet

$$\frac{p'}{x} - \frac{z}{x^2} - d \cdot \frac{p}{x} = 0 \quad \text{et} \quad \frac{p}{x} - \frac{y}{x^2} - d \cdot \frac{y}{x} = 0$$

Tom. XVI. Nou. Comm.

E e

Ipsum

Ipsum autem integrale. formulae propositae vti cuiusvis constet erit $x - \frac{y^2}{x}$. Praeterea etiam liquet has formulas $\int M dx$, $\int N dx$, $\int R dx$ esse integrabiles, eorum integralibus existentibus

$$-\frac{y^2}{x^2}; \frac{y}{x} \text{ et } \frac{y}{x}.$$

27. Proposita nunc esto haec formula differentialis

$$dx(2yp' + 2zp + 2xpp' + xzq + xyq') = V dx$$

pro qua igitur erit

$$M = 2pp' + xzq + yq'; N = 2p' + xq'; R = 2p + xq$$

$$P = 2z + 2xp'; Q = 2y + 2xp; Q = xz \text{ et } \Omega = xy.$$

Vt haec formula bis sit integrabilis, seu vt $\int dx \int V dx$ verum constituat integrale, sequentibus quatuor aequationibus satisfaciendum est:

$$\text{I. } N - \frac{dP}{dx} + \frac{d}{dx} \frac{Q}{x^2} = 0; \text{II. } P - \frac{dQ}{dx} = 0$$

$$\text{III. } R - \frac{dQ}{dx} + \frac{d}{dx} \frac{\Omega}{x^2} = 0; \text{IV. } Q - \frac{d\Omega}{dx} = 0.$$

Quum vero sit

$$P - \frac{dQ}{dx} = z + xp'; \text{ erit}$$

$$N - \frac{dP}{dx} + \frac{d}{dx} \frac{Q}{x^2} = 2p' + xq' - \frac{d}{dx} \frac{(z + xp')}{x} = 0$$

tum vero $P - \frac{dQ}{dx} = 0$. Porro autem ob

$$Q - \frac{d\Omega}{dx} = y + xp, \text{ fiet}$$

$$R - \frac{dQ}{dx} + \frac{d}{dx} \frac{\Omega}{x^2} = 2p + xq - \frac{d}{dx} \frac{(y + xp)}{x} = 0 \text{ et}$$

$$Q - \frac{d\Omega}{dx} = 0.$$

Ex

Ex quibus igitur inferri debet formulam nostram
 bis esse integrabilem, et ipsum integrale reperietur
 esse xyz omiffis constantibus adiiciendis. Constat
 autem nunc non solum formulas

$\int M dx; \int N dx; \int R dx; \int P dx - f^{(1)} N dx; \int \mathfrak{P} dx - f^{(1)} R dx$
 $\int Q dx - f^{(1)} P dx + f^{(1)} N dx; \int \Omega dx - f^{(1)} \mathfrak{P} dx + f^{(1)} R dx$
 fore integrabiles sed etiam has sequentes :

$$f^{(1)} M dx; f^{(1)} N dx; f^{(1)} R dx; \int P dx; \int \mathfrak{P} dx$$

$$f^{(1)} P dx - 2 \int Q dx \text{ et } f^{(1)} \mathfrak{P} dx - 2 \int \Omega dx.$$

Erit enim

$$\int M dx = zp + yp'; f^{(1)} M dx = zy$$

$$\int N dx = z + xp'; f^{(1)} N dx = xz; \int P dx = 2zx$$

$$\int Q dx - f^{(1)} P dx + f^{(1)} N dx = 0; f^{(1)} P dx - 2 \int Q dx = 0$$

$$\int R dx = y + xp; f^{(1)} R dx = xy; \int \mathfrak{P} dx = 2xy$$

$$\int \Omega dx - f^{(1)} \mathfrak{P} dx + f^{(1)} R dx = 0; f^{(1)} \mathfrak{P} dx - 2 \int \Omega dx = 0.$$

28. Quum exempla modo allata quam maxime
 sint obuia nonnulla adiungere placet eiusmodi for-
 mularum differentialium, quae non quidem per se
 integrabiles sunt, ope multiplicatorum tamen ad in-
 tegrabilitatem perducı poterunt. Ponamus itaque
 propositam esse istam formulam differentialem :

$$dx(xz^2 + xy^2 - x^2zp' - x^2yp')$$

pro qua multiplicatorem Φ inuestigari oportet, ita
 comparatum, vt

$$\Phi dx(xz^2 + xy^2 - x^2zp' - x^2yp')$$

E c z

inte-

integrationem admittat. At ex iis quae supra monuimus, nunc deducitur esse:

$$M = \left(\frac{d\Phi}{dx}\right)(xz^2 + xy^2 - x^2zp' - x^2yp) + \Phi(z^2 + y^2 - 2xzp' - 2xyp)$$

$$N = \left(\frac{d\Phi}{dy}\right)(xz^2 + xy^2 - x^2zp' - x^2yp) + \Phi(2xy - x^2p')$$

$$R = \left(\frac{d\Phi}{dz}\right)(xz^2 + xy^2 - x^2zp' - x^2yp) + \Phi(2xz - x^2p')$$

$$P = -x^2y\Phi; \quad Q = -x^2z\Phi.$$

Hinc ob conditiones integrabilitatis:

$$N - \frac{dP}{dx} = 0; \quad R - \frac{dQ}{dx} = 0$$

sequentes duae deducuntur aequationes:

$$\left(\frac{d\Phi}{dy}\right)(z^2 + y^2 - xzp' - xyp) + 4\Phi y + xy\frac{d\Phi}{dx} = 0$$

$$\left(\frac{d\Phi}{dz}\right)(z^2 + y^2 - xzp' - xyp) + 4\Phi z + xz\frac{d\Phi}{dx} = 0$$

Vnde obtinemus

$$dy\left(\frac{d\Phi}{dy}\right) + dz\left(\frac{d\Phi}{dz}\right) = \frac{-4\Phi(ydy + zdz) - \frac{d\Phi}{dx}(ydy + zdz)}{z^2 + y^2 - xzp' - xyp}$$

atque si supponatur Φ esse functionem ipsorum y et z . tantum prodibit

$$d\Phi = -\frac{(4\Phi + \frac{d\Phi}{dx})(ydy + zdz)}{z^2 + y^2 - xzp' - xyp}$$

ex quo colligitur

$$d\Phi(z^2 + y^2) = -4\Phi(ydy + zdz) \quad \text{seu} \quad \frac{d\Phi}{z^2 + y^2} = -\frac{4(ydy + zdz)}{z^2 + y^2}$$

hincque integrando

$$\int L\Phi = L \int \frac{1}{z^2 + y^2}, \quad \text{siue} \quad \Phi = \frac{1}{(z^2 + y^2)^2}.$$

Evidens

FORMVLARVM DIFFERENTIALIVM. 221

Evidens vero est hunc multiplicatorem quaestioni satisfacere, quum integrale nostrae formulae inde prodeat $\frac{x^2}{z^2+y^2}$. Quod reliquas formulas integrabiles attinet, observare licet esse:

$$\int M dx = \frac{x}{z^2+y^2}; \int N dx = \frac{-x^2 y}{(z^2+y^2)^2}; \int R dx = \frac{-x^2 z}{(z^2+y^2)^2}.$$

Siquidem multiplicator iam inventus sit $\Phi = \frac{1}{(z^2+y^2)^2}$, integrali existente $\frac{x^2}{z^2+y^2}$, inde quidem mox patet, generalem formam multiplicatorum hac expressione contineri $\Phi = \frac{1}{(z^2+y^2)^2} F(\frac{x}{\sqrt{z^2+y^2}})$. Periculum igitur faciamus hunc multiplicatorem immediate ex nostris formulis eruendi. Et quia Φ nunc considerari debeat ut functio trium variabilium x, y, z ponamus $\Phi = \Phi' \psi$, vbi Φ' binas tantum variables y et z inuoluere concipitur, ψ autem omnes tres x, y, z . Tum vero erit

$$dy (\frac{d\Phi}{dy}) = \psi dy (\frac{d\Phi'}{dy}) + \Phi' dy (\frac{d\psi}{dy})$$

$$dz (\frac{d\Phi}{dz}) = \psi dz (\frac{d\Phi'}{dz}) + \Phi' dz (\frac{d\psi}{dz}) \text{ proinde}$$

$$dy (\frac{d\Phi}{dy}) + dz (\frac{d\Phi}{dz}) = \psi d\Phi' + \Phi' d\psi - \Phi' dx (\frac{d\psi}{dx})$$

inde autem consequimur

$$\begin{aligned} & \psi d\Phi (z^2+y^2-xzp'-xyp) + \Phi' (d\psi - dx (\frac{d\psi}{dx})) (z^2+y^2-xzp'-xyp) \\ & = -4\Phi' \psi (ydy + zdz) - (\psi d\Phi' + \Phi' d\psi) (xyp + xzp'), \text{ siue} \\ & \psi d\Phi (z^2+y^2) + \Phi' d\psi (z^2+y^2) - \Phi' dx (\frac{d\psi}{dx}) (z^2+y^2-xyp-xzp') \\ & = -4\Phi' \psi (ydy + zdz), \end{aligned}$$

E c 3

quam

quam aequationem in binas sequentes dispartire licebit :

$$d\Phi'(z^2 + y^2) = -4\Phi'(y dy + z dz)$$

$$d\psi(z^2 + y^2) = dx\left(\frac{d\psi}{dx}\right)(z^2 + y^2 - xzp' - xyp).$$

Ex priori statim habetur $\Phi' = \frac{1}{(z^2 + y^2)^2}$ vt antea, posterior vero praebet

$$-x\left(\frac{d\psi}{dx}\right)\left(\frac{zdz + ydy}{zz + yy}\right) = d\psi - dx\left(\frac{d\psi}{dx}\right) = dy\left(\frac{d\psi}{dy}\right) + dz\left(\frac{d\psi}{dz}\right).$$

Tentetur iam pro ψ huiusmodi forma $\psi = \Gamma : XV$, vbi X functionem incognitam ipsius x , V autem ipsorum y et z designat et differentiatione instituta, habebitur

$$-Vx\frac{dX}{dx}\left(\frac{zdz + ydy}{zz + yy}\right) = Xdy\left(\frac{dV}{dy}\right) + Xdz\left(\frac{dV}{dz}\right) = XdV$$

ex quo fit $\frac{x dX}{X dx} = -\frac{(z^2 + y^2) dV}{(zdz + ydy)V}$

cui aequationi manifesto satisfat, ponendo $\frac{dz}{x} = \frac{dx}{X}$, seu $X = x$ et

$$\frac{dV}{V} = -\frac{(zdz + ydy)}{zz + yy}, \text{ seu } V = \frac{1}{\sqrt{(yy + zz)}},$$

ex quo forma generalis multiplicatoris nunc erit

$$\Phi = \frac{1}{(yy + zz)^{\frac{3}{2}}} \Gamma : \left(\frac{x}{\sqrt{(yy + zz)}}\right).$$

Praeterea etiam obseruasse iuuat, quantitatem ψ ex hac formula determinari

$$\frac{x d\Phi}{\Phi} \left(\frac{d\psi}{dx}\right) = dy\left(\frac{d\psi}{dy}\right) + dz\left(\frac{d\psi}{dz}\right),$$

vbi si ponatur $\psi = \Gamma : X\Phi'$, hanc consequemur aequationem :

$$\frac{1}{2} x \frac{d\Phi' dx}{dx} = X dy \left(\frac{d\Phi'}{dy} \right) + X dz \left(\frac{d\Phi'}{dz} \right) = X d\Phi', \text{ unde}$$

$$\frac{dX}{X} = \frac{dx}{x}, X = x^* \text{ et } \psi = \Gamma: \frac{x^*}{(xz+yy)^2},$$

et multiplicator inuentus omnino ad priorem redit.

29. Proposita nunc sit formula differentialis :

$$dx(yx+yz+zz)+dy(zx+xz+xx)+dz(xx+xy+yy)$$

et quia constat eam non esse integrabilem, operam dare oportet, vt inueniatur multiplicator, cuius opo integrabilis fiat. Sit hic multiplicator = Φ , quapropter, si breuitatis gratia ponatur

$$yx+yz+zz+p(zx+xz+xx)+p'(xx+xy+yy)=\psi$$

erit

$$M = \psi \left(\frac{d\Phi}{dx} \right) + \Phi (pz + 2xp + yp' + 2xp')$$

$$N = \psi \left(\frac{d\Phi}{dy} \right) + \Phi (2y(1+p') + xp' + z); P = \Phi (xx + zz + xz)$$

$$R = \psi \left(\frac{d\Phi}{dz} \right) + \Phi (2z(1+p) + xp + y); Q = \Phi (xx + xy + yy).$$

Criteria igitur integrabilitatis quum nunc praebeant:

$$N - \frac{dP}{dx} = 0 \text{ et } R - \frac{dQ}{dx} = 0$$

has binas adipiscemur aequationes :

$$I. \psi \left(\frac{d\Phi}{dy} \right) - \frac{d\Phi}{dx} (xx + xz + zz) + 2\Phi (y - x + p'(y - z)) = 0$$

$$II. \psi \left(\frac{d\Phi}{dz} \right) - \frac{d\Phi}{dx} (xx + xy + yy) + 2\Phi (z - x + p(z - y)) = 0$$

quarum differentia dat

$$\psi \left(\left(\frac{d\Phi}{dy} \right) - \left(\frac{d\Phi}{dz} \right) \right) - \frac{d\Phi}{dx} ((z+y)(z-y) + x(z-y)) \\ + 2\Phi (y-z)(1+p+p') = 0$$

confe-

consequenter

$$\frac{\psi}{y-z} \left(\left(\frac{d\Phi}{dy} \right) - \left(\frac{d\Phi}{dz} \right) \right) + \frac{d\Phi}{dx} (x+y+z) + 2\Phi(1+p+p') = 0.$$

Hinc mox quidem innotescit, statui posse

$$\frac{d\Phi}{\Phi} = - \frac{z(dx + dy + dz)}{x+y+z}, \text{ siue } \Phi = \frac{1}{(x+y+z)^2},$$

quum eo ipso quoque fiat $\left(\frac{d\Phi}{dy} \right) = \left(\frac{d\Phi}{dz} \right)$, nec non utraque conditio supra praescripta impleatur. Integrabile autem formulae propositae hunc adhibendo multiplicatorem prodibit:

$$\frac{xy + xz + yz}{x+y+z}.$$

30. Quamuis multiplicator iam inuentus quaestioni satisfiat, quum tamen et alii dentur, quibus idem perficere licet, inuestigationem huius multiplicatoris ita instruamus, ut ad reliquos quoque perduxisse, censeatur. Ex natura igitur quaestionis quum facile perspiciatur pro multiplicatore Φ commode adhiberi posse functionem homogeneam ipsorum x, y, z , inde hanc elicimus aequationem:

$$n\Phi = x \left(\frac{d\Phi}{dx} \right) + y \left(\frac{d\Phi}{dy} \right) + z \left(\frac{d\Phi}{dz} \right).$$

Per aequationes vero nostras I et II consequimur

$$\begin{aligned} \Psi \left(y \left(\frac{d\Phi}{dy} \right) + z \left(\frac{d\Phi}{dz} \right) \right) &= \frac{d\Phi}{dx} (xy + xz + yz + yz + 2xy) \\ &\quad - 2\Phi'(yz + xz - xy - xz + p(zx - zy) + p'(yy - zy)) \end{aligned}$$

similique modo

$$\begin{aligned} \frac{d\Phi}{dz} \left(dy \left(\frac{d\Phi}{dy} \right) + dz \left(\frac{d\Phi}{dz} \right) \right) &= \Psi \left(\frac{d\Phi}{dx} - \left(\frac{d\Phi}{dz} \right) \right) = \frac{d\Phi}{dz} (p(xx + xz + xz) + p'(xx + xy + yy)) \\ &\quad - 2\Phi((y - x)p' - (z - x)p') \end{aligned}$$

quae

quae in hanc transformatur

$$\psi x \left(\frac{d\Phi}{dx} \right) = \frac{d\Phi}{dx} (xyy + xyz + xzz) + 2\Phi (p(yx - xx) + p'(xz - xx))$$

vnde nunc deducitur

$$\begin{aligned} \Phi \psi = \psi \left(x \left(\frac{d\Phi}{dx} \right) + y \left(\frac{d\Phi}{dy} \right) + z \left(\frac{d\Phi}{dz} \right) \right) &= \frac{d\Phi}{dx} (x+y+z)(xy+xz+yz) \\ &- 2\Phi (yy+zy+yx + p(zx+xx-zy-xy) + p'(xx+yy-xz-yz)). \end{aligned}$$

Si nunc vtrunque addantur $3\Phi\psi$, prodibit:

$$\begin{aligned} (n+3)\Phi\psi &= \frac{d\Phi}{dx} (x+y+z)(xy+xz+yz) + \Phi \frac{d^2\Phi}{dx^2} (yy+zz+3yz+2xy+2xz) \\ &+ \Phi \frac{d^2\Phi}{dx^2} (x^2+z^2+3xz+2xy+2yz) + \Phi \frac{d^2\Phi}{dx^2} (x^2+y^2+3xy+2xz+2yz). \end{aligned}$$

Leui autem adhibita attentione, quum deprehendatur esse

$$\psi dx = d.(x+y+z)(xy+xz+yz) - 2(xy+xz+yz)(dx+dy+dz)$$

coefficientis autem ipsius $\frac{d\Phi}{dx}$ fit

$$= d.(x+y+z)(xy+xz+yz),$$

nostra aequatio nunc concinnam hanc consequetur formam:

$$\begin{aligned} (n+2)d.(x+y+z)(xy+xz+yz) \\ - 2(n+3)xy+xz+yz(dx+dy+dz) &= \frac{d\Phi}{dx}(x+y+z)(xy+xz+yz) \end{aligned}$$

ex quo denique deducimus:

$$\begin{aligned} L.\Phi &= (n+2)L.(x+y+z)(xy+xz+yz) - 2(n+3)L(x+y+z), \\ \text{siue} \end{aligned}$$

$$\Phi = \frac{(xy+xz+yz)^{n+2}}{(x+y+z)^{n+2}}.$$

Tom. XVI. Nou. Comm.

F f

Hinc

Hinc quidem mox apparet, formas simplicissimas multiplicatorum obtineri, si statuatur n vel $= -2$, vel $n = -4$, priori casu fit

$$\Phi = \frac{1}{(x+y+z)^2},$$

posteriori autem

$$\Phi = \frac{1}{(xy+xz+yz)^2}.$$

Practerea etiam casus notari meretur quo $n = -3$, quum tunc multiplicator fiat

$$\Phi = \frac{1}{(x+y+z)(xy+xz+yz)}$$

qui ex natura functionum homogenearum immediate deducitur, uti infra ostendendi dabitur locus. Notandum autem est hunc ultimum multiplicatorem, integrale præbere Logarithmicum, quum sit pro isto casu

$$\frac{\psi dx}{\Phi} = \frac{d(x+y+z)(xy+xz+yz)}{(x+y+z)(xy+xz+yz)} - \frac{x(dx+dy+dz)}{x+y+z}, \text{ hincque}$$

$$\int \frac{\psi dx}{\Phi} = L. \frac{xy+xz+yz}{x+y+z}.$$

Denique etiam notari meretur, esse ob

$$\psi \left(\frac{d\Phi}{dx} \right) = \frac{d\Phi}{dx} (yy+yz+zz) + 2\Phi((y-x)p + (z-x)p')$$

$$M dx = \psi dx \left(\frac{d\Phi}{dx} \right) + \Phi dx ((2x+z)p + (2x+y)p')$$

$$= d\Phi (yy+yz+zz) + \Phi ((2y+z)dy + (2z+y)dz)$$

ideoque

$$\int M dx = \Phi (yy+yz+zz).$$

Simili ratione habebitur

$$\int N dx = \Phi (xx+zz+xz) \text{ et } \int R dx = \Phi (xx+yy+xy).$$

31. Consideremus nunc formulam differentialem homogeneam

$$R dx + S dy + T dz$$

pro qua multiplicator idoneus eam integrabilem reddens exquiri debeat, adeo ut si is ponatur Φ , sit formula

$$\Phi (R dx + S dy + T dz)$$

integrabilis. Ex natura autem quaestionis intelligitur pro Φ assumi posse functionem homogeneam ipsarum x, y, z , tunc vero si ponatur

$$\Phi R = X, \Phi S = Y, \Phi T = Z$$

erunt quoque X, Y, Z functiones homogeneae eiusdem dimensionis ipsarum x, y, z . Per naturam autem functionum homogenearum iam habebimus:

$$m X = x \left(\frac{dX}{dx} \right) + y \left(\frac{dX}{dy} \right) + z \left(\frac{dX}{dz} \right)$$

$$m Y = x \left(\frac{dY}{dx} \right) + y \left(\frac{dY}{dy} \right) + z \left(\frac{dY}{dz} \right)$$

$$m Z = x \left(\frac{dZ}{dx} \right) + y \left(\frac{dZ}{dy} \right) + z \left(\frac{dZ}{dz} \right).$$

Atqui ob integrabilitatem formulae

$$X dx + Y dy + Z dz \text{ esse debet}$$

$$\left(\frac{dX}{dy} \right) = \left(\frac{dY}{dx} \right); \left(\frac{dX}{dz} \right) = \left(\frac{dZ}{dx} \right); \left(\frac{dY}{dz} \right) = \left(\frac{dZ}{dy} \right)$$

his igitur aequalitatibus in vnum vocatis aequationes superiores in sequentes transformantur:

$$m X = x \left(\frac{dX}{dx} \right) + y \left(\frac{dY}{dx} \right) + z \left(\frac{dZ}{dx} \right)$$

$$m Y = x \left(\frac{dX}{dy} \right) + y \left(\frac{dY}{dy} \right) + z \left(\frac{dZ}{dy} \right)$$

$$m Z = x \left(\frac{dX}{dz} \right) + y \left(\frac{dY}{dz} \right) + z \left(\frac{dZ}{dz} \right)$$

ex quibus deducitur

$$m(Xdx + Ydy + Zdz) = x dX + y dY + z dZ$$

cuius aequationis integrale posito $m = -1$, manifestum est $Xx + Yy + Zz = A$, unde $\Phi = \frac{A}{Rx + Sy + Tz}$, ubi pro A tuto ponere licet 1. Pro formulis igitur differentialibus homogeneis tres variables inuoluentibus, similem iam nacti sumus proprietatem, ac pro huiusmodi formulis, binas tantum variables inuoluentibus, ex indole autem demonstrationis nostrae haud obscure cognoscitur, eam ad formulas differentiales functiones homogeneas eiusdem dimensionis, quotcunque variabilium x, y, z, u, v etc. inuoluentes, patere. Si scilicet proponatur huiusmodi formula differentialis

$$U du + V dv + X dx + Y dy + Z dz$$

ubi U, V, X etc. sunt functiones homogeneae ipsarum u, v, x etc. certo constat hanc formulam integrabilem reddi, si diuidatur per

$$Uu + Vv + Xx + Yy + Zz.$$

32. Ex iis quae iam in medium adduximus exemplis formularum differentialium tres quantitates variables inuoluentium, facile perspicitur quomodo tractari debeant formulae differentiales in quibus functiones quatuor adeo vel adhuc plurium variabilium occurrunt. Pro formulis autem huiusmodi complicatioribus exempla haec adferre eo minus e re erit, quod rariores sint casus, quibus Analysis ad resolutionem

tionem huiusmodi formularum perducatur. Praeterea vero animo quidem nobis proponebamus, aliis atque aliis exemplis ea breuiter illustrare, quae de criteriis integrabilitatis formularum differentialium duplicatarum differuimus; quum vero praeter cogitationem opella nostra iam dum nimium excreuerit, quae hac de re monenda restant, in commodiorem differre cogimur occasionem.

DEMONSTRATIO
THEOREMATIS ANALYTICI
A CELEB. LA GRANGE INVENTI.

Auctore

AND. IOH. LEXELL.

I.

Theorema hoc elegantissimum et attentione quam maxime dignum, a Ccl. *la Grange* in Tomo XXIV. Actorum Academiae Scientiarum Berolinensis p. 275 propositum est. Occasio autem qua in eius cognitionem peruenit, inde Ipsi subministrata esse videtur, quod in modum inquisiturus, quo cuiuscunque aequationis radices per series exprimi possint, inuenerit, si pro aequatione generali:

$$0 = a - b x + c x^2 - d x^3 + \text{etc. ponatur}$$

$$\xi = \frac{c x - d x^2 + e x^3 - \text{etc.}}{b},$$

tum aequationis propositae radicem p hac exprimi formula:

$$p = x + \xi x + \frac{d \cdot \xi^2 x}{1 \cdot 2 \cdot d x} + \frac{d d \cdot \xi^3 x}{1 \cdot 2 \cdot 3 d x^2} + \frac{d^2 \cdot \xi^4 x}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 d x^3} + \text{etc.},$$

quin etiam esse:

$$p^m = x^m + m(\xi x^{m-1} + \frac{d \cdot \xi^2 x^{m-1}}{2 \cdot d x} + \frac{d d \cdot \xi^3 x^{m-1}}{2 \cdot 3 d x^2} + \frac{d^2 \cdot \xi^4 x^{m-1}}{2 \cdot 3 \cdot 4 d x^3} + \text{etc.})$$

substi-

DEMONSTR. SINGVL. THEOREM. etc. 231

substituto nimirum post peractas differentiationes $\frac{a}{b}$ loco x . Hinc autem hoc in genere deduxit Theorema: *proposita aequatione generali*

$$a - x + \Phi x = 0$$

si p supponatur esse valor quicunque ipsius x praesenti aequationi satisfaciens, semper erit

$$\psi p = \psi x + \Phi x \psi' x + \frac{d. \Phi x^2. \psi' x}{2. d. x} + \frac{dd. \Phi x^3. \psi' x}{2. 3. a. x^2} + \frac{d^2. \Phi x^4. \psi' x}{2. 3. 4. d. x^3} + \text{etc.}$$

designantibus ψ^p et ψx functiones quascunque similes ipsorum p et x , vbi autem differentiationibus absolutis pro x debet substitui a . Quam igitur Celeb. huius Theorematis Auctor nullam loco allato eius attulerit demonstrationem, tanto magis operae pretium erat in eam inquirere, quanto certius est hoc Theorema non solum sua elegantia, sed etiam usu, quem per totam Analysin habet singulari, se commendare. Veritate etenim huius Theorematis demonstrata, non solum ea quae a Cel. la Grange in dissertatione modo laudata, allata sunt de radicibus aequationum per series exprimendis, sponte sequuntur; sed etiam plurimorum aliorum Problematum solutiones in potestate erunt.

II. Priusquam vero nunc Theorematis propositi demonstrationem adgrediamur, sequens praemittere necessum est Lemma, quippe cui demonstratio nostra praecipue innititur.

Lemma.

L e m m a.

Si propositis duabus quibuscunque quantitatibus variabilibus y et z fueris :

$$(A) y^m d^{m-1} z - m y^{m-1} d^{m-1} . y z + \frac{m(m-1)}{1 \cdot 2} y^{m-2} d^{m-1} . y^2 z \\ - \frac{m(m-1)(m-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3} y^{m-3} d^{m-1} . y^3 z \dots + d^{m-1} . y^m z = 0$$

erit quoque

$$y^{m+1} d^m z - (m+1) y^m d^m . y z + \frac{(m+1)m}{1 \cdot 2} y^{m-1} d^m . y^2 z \\ - \frac{(m+1)m(m-1)}{1 \cdot 2 \cdot 3} y^{m-2} d^m . y^3 z \dots + d^m . y^{m+1} z = 0.$$

Demonstratio.

Si quantitatis propositae (A) per hypothesein nihilo aequalis, fumatur differentiale illudque in y ducatur prodibit :

$$(C) y^{m+1} d^m . z - m y^m d^m . y z + \frac{m(m-1)}{1 \cdot 2} y^{m-1} d^m . y^2 z \\ - \frac{m(m-1)(m-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3} y^{m-2} d^m . y^3 z \dots + y d^m . y^m z \\ + m d y (y^m d^{m-1} z - (m-1) y^{m-1} d^{m-1} . y z) \\ + m d y \left(\frac{(m-1)(m-2)}{1 \cdot 2} y^{m-2} d^{m-1} . y^2 z \dots + y d^{m-1} . y^{m-1} z \right) = 0.$$

Deinde quum aequatio proposita (A) generaliter vera supponatur quicquid significet z , veritati quoque erit consentanea, si in locum ipsius z substituat^rur yz , adeo ut iam sit :

$$(B) y^m d^{m-1} . y z - m y^{m-1} d^{m-1} . y^2 z + \frac{m(m-1)}{1 \cdot 2} y^{m-2} d^{m-1} . y^3 z \\ - \frac{m(m-1)(m-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3} y^{m-3} d^{m-1} . y^4 z \dots + d^{m-1} . y^{m+1} z = 0$$

Si

Si vero nunc huius aequationis fumatur differentiale orietur

$$\begin{aligned}
 (D) \quad & y^m d^m. y z - m y^{m-1} d^m. y^2 z + \frac{m(m-1)}{1 \cdot 2} y^{m-2} d^m. y^3 z \\
 & - \frac{m(m-1)(m-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3} y^{m-3} d^m. y^4 z \dots \pm d^m. y^{m+1} z \\
 & + m dy (y^{m-1} d^{m-1}. y z - (m-1) y^{m-2} d^{m-1}. y^2 z) \\
 & + m dy \left(\frac{(m-1)(m-2)}{1 \cdot 2} y^{m-2} d^{m-1}. y^3 z \dots \pm d^{m-1}. y^m z \right) = 0
 \end{aligned}$$

Facta nunc tali combinatione aequationis (D) cum superiori (C), ut membrum prius aequationis (D) a priori ipsius (C), posterius vero a posteriori subtrahatur, prodibit:

$$\begin{aligned}
 & y^{m+1} d^m. z - (m+1) y^m d^m. y z + \frac{(m+1)m}{1 \cdot 2} y^{m-1} d^m. y^2 z \\
 & - \frac{(m+1)m(m-1)}{1 \cdot 2 \cdot 3} y^{m-2} d^m. y^3 z \dots \pm d^m. y^{m+1} z \\
 & + m dy (y^m d^{m-1}. z - m y^{m-1} d^{m-1}. y z + \frac{m(m-1)}{1 \cdot 2} y^{m-2} d^{m-1}. y^2 z) \\
 & + m dy \left(- \frac{m(m-1)(m-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3} y^{m-3} d^{m-1}. y^3 z \dots \pm d^{m-1}. y^m z \right) = 0
 \end{aligned}$$

posterius autem aequationis inventae membrum esse $= 0$, iam sponte liquet, quum id nihil aliud sit, quam ipsa formula (A) in $m dy$ ducta; consequenter erit quoque

$$\begin{aligned}
 & y^{m+1} d^m. z - (m+1) y^m d^m. y z + \frac{(m+1)m}{1 \cdot 2} y^{m-1} d^m. y^2 z \\
 & - \frac{(m+1)m(m-1)}{1 \cdot 2 \cdot 3} y^{m-2} d^m. y^3 z \dots \pm d^m. y^{m+1} z = 0.
 \end{aligned}$$

III. Simili ratione demonstrari potest esse:

$$\begin{aligned}
 & y^{m+2} d^{m+1}. z - (m+2) y^{m+1} d^{m+1}. y z + \frac{(m+2)(m+1)}{1 \cdot 2} y^m d^{m+1}. y^2 z \\
 & - \frac{(m+2)(m+1)m}{1 \cdot 2 \cdot 3} y^{m-1} d^{m+1}. y^3 z \dots \pm d^{m+1}. y^{m+2} z = 0
 \end{aligned}$$

Tom. XVI. Nou. Comm.

G g

atque

atque adeo in genere

$$y^{m+n} d^{m+n-1} . z - (m+n) y^{m+n-1} . d^{m+n-1} . y z \\ + \frac{(m+n)(m+n-1)}{1 \cdot 2} y^{m+n-2} d^{m+n-2} . y^2 z \dots \text{etc.} = 0$$

Si igitur formula (A) pro valore quocunque litterae m veritati fuerit consentanea, nullum est dubium, quin vera quoque sit, si in locum ipsius m substituitur $m+n$, designante n numerum quemcunque integrum positivum. Quum autem posito $m=1$ oriatur aequatio identica $y d^0 . z - d^0 . y z = 0$, liquet quoque hinc in genere esse pro numero quocunque m integro et positivo:

$$y^m d^{m-1} . z - m . y^{m-1} d^{m-1} . y z + \frac{m(m-1)}{1 \cdot 2} y^{m-2} d^{m-2} . y^2 z \\ - \frac{m(m-1)(m-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3} y^{m-3} d^{m-3} . y^3 z \dots + d^m . y^m z = 0$$

vbi vltimum membrum signo $+$ afficitur, si m fuerit numerus par, contra vero si impar.

IV. Loco Lemmatis allati, aliud multo generalius proponi potuisset ita expressum: *Si fuerit*

$$y^\lambda d^m . z - \lambda y^{\lambda-1} d^m . y z + \frac{\lambda(\lambda-1)}{1 \cdot 2} y^{\lambda-2} d^m . y^2 z \\ - \frac{\lambda(\lambda-1)(\lambda-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3} y^{\lambda-3} d^m . y^3 z + \text{etc.} = 0$$

erit quoque

$$y^{\lambda+1} d^{m+1} . z - (\lambda+1) y^\lambda d^{m+1} . y z + \frac{(\lambda+1)\lambda}{1 \cdot 2} y^{\lambda-1} d^{m+1} . y^2 z \\ - \frac{(\lambda+1)\lambda(\lambda-1)}{1 \cdot 2 \cdot 3} y^{\lambda-2} d^{m+1} . y^3 z + \text{etc.} = 0.$$

Patet vero demonstrationem huius Lemmatis, simili ratione adornari debere ac pro Lemmate praecedente, vt vero in genere liqueat esse:

$$y^\lambda d^m$$

$$y^\lambda d^m. z \sim \lambda y^{\lambda-1} d^m. y z + \frac{\lambda(\lambda-1)}{1 \cdot 2} y^{\lambda-2} d^m. y^2 z \\ - \frac{\lambda(\lambda-1)(\lambda-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3} y^{\lambda-3} d^m. y^3 z + \text{etc.} = 0$$

necessum est, ut posito $m = 0$ sit

$$y^n d^0. z \sim n y^{n-1} d^0. y z + \frac{n(n-1)}{1 \cdot 2} y^{n-2} d^0. y^2 z \\ - \frac{n(n-1)(n-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3} y^{n-3} d^0. y^3 z + \text{etc.} = 0$$

seu diuisa tota aequatione per $y^n z$

$$1 - n + \frac{n(n-1)}{1 \cdot 2} - \frac{n(n-1)(n-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} - \text{etc.} = 0$$

de quo iam nullum est dubium, quum haec expressio sit $=(1-1)^n = 0$. Quum itaque sit

$$y^n d^0. z \sim n y^{n-1} d^0. y z + \frac{n(n-1)}{1 \cdot 2} y^{n-2} d^0. y^2 z \\ - \frac{n(n-1)(n-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3} y^{n-3} d^0. y^3 z + \text{etc.} = 0$$

posito $\lambda = n + m$, inde iam tuto inferri potest esse:

$$y^\lambda d^m. z \sim \lambda y^{\lambda-1} d^m. y z + \frac{\lambda(\lambda-1)}{1 \cdot 2} y^{\lambda-2} d^m. y^2 z \\ - \frac{\lambda(\lambda-1)(\lambda-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3} y^{\lambda-3} d^m. y^3 z + \text{etc.} = 0$$

vbi obseruandum est, quod quum pro n numerus quicumque accipi queat, Lemma hoc posterius verum sit, quicumque demum fuerit valor numeri λ .

V. Hisce praemonitis ad demonstrationem Theorematis laudati progrediamur.

Theorema.

*Si designante Φx functionem quamcunque datam
ipsum x , fuerit $t - x + \Phi x = 0$, tum si ψx et ψt
G g 2 designent*

designent functiones quascunque similes ipsorum x et t , atque ponatur $\psi' t = \frac{d \psi t}{d t}$ erit:

$$\psi x = \psi t + \Phi t \cdot \psi' t + \frac{d \Phi t \cdot \psi' t}{1 \cdot 2 \cdot d t} + \frac{d d \Phi t \cdot \psi' t}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot d t^2} + \frac{d^2 \Phi t \cdot \psi' t}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot d t^3} + \text{etc.}$$

Demonstratio.

Quum sit $t = x - \Phi x$, si ψt significet functionem quancunque ipsius t , erit $\psi t = \psi(x - \Phi x)$, est vero

$$\psi(x - \Phi x) = \psi x - \Phi x \psi' x + \frac{\Phi x^2 \cdot d \psi' x}{1 \cdot 2 \cdot d x} - \frac{\Phi x^3 \cdot d^2 \psi' x}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot d x^2} + \text{etc.}$$

hinc ergo habetur

$$\psi t = \psi x - \Phi x \psi' x + \frac{\Phi x^2 \cdot d \psi' x}{1 \cdot 2 \cdot d x} - \frac{\Phi x^3 \cdot d^2 \psi' x}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot d x^2} + \text{etc.}$$

Tum vero si loco ipsius ψt successive substituantur

$$\Phi t \psi' t, \frac{d \Phi t \cdot \psi' t}{1 \cdot 2 \cdot d t}, \frac{d d \Phi t \cdot \psi' t}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot d t^2}, \text{ etc.}$$

habebimus quoque

$$\begin{aligned} \Phi t \psi' t &= \Phi x \psi' x - \frac{\Phi x \cdot d \Phi x \psi' x}{d x} + \frac{\Phi x^2 d d \Phi x \psi' x}{1 \cdot 2 \cdot d x^2} - \frac{\Phi x^3 d^2 \Phi x \psi' x}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot d x^3} + \text{etc.} \\ \frac{d \Phi t \cdot \psi' t}{1 \cdot 2 \cdot d t} &= \frac{d \cdot \Phi x^2 \cdot \psi' x}{1 \cdot 2 \cdot d x} - \frac{\Phi x d d \Phi x^2 \psi' x}{1 \cdot 2 \cdot d x^2} + \frac{\Phi x^2 d^2 \Phi x^2 \psi' x}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot d x^3} - \text{etc.} \\ \frac{d d \Phi t \cdot \psi' t}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot d t^2} &= \frac{d d \cdot \Phi x^3 \psi' x}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot d x^2} - \frac{\Phi x d^2 \Phi x^3 \psi' x}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot d x^3} + \frac{\Phi x^2 d^3 \Phi x^3 \psi' x}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot d x^4} - \text{etc.} \end{aligned}$$

etc.

Functionibus autem his ipsius t in vnam summam collectis obtinebimus:

$$\psi' t +$$

$$\begin{aligned}
\psi t + \phi t \psi' t + \frac{d \cdot \phi t^2 \psi' t}{1 \cdot 2 \cdot d t^2} + \frac{d \cdot d \cdot \phi t^2 \psi' t}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot d t^3} + \frac{d^2 \cdot \phi t^3 \psi' t}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot d t^4} + \text{etc.} = \\
\psi x - \phi x \psi' x + \frac{\phi x^2 \cdot d \psi x}{1 \cdot 2 \cdot d x} - \frac{\phi x^3 \cdot d d \psi x}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot d x^2} + \frac{\phi x^4 \cdot d^2 \psi x}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot d x^3} - \text{etc.} \\
+ \phi x \psi' x - \frac{\phi x d \cdot \phi x \psi x}{d x} + \frac{\phi x^2 d d \cdot \phi x \psi x}{1 \cdot 2 \cdot d x^2} - \frac{\phi x^3 d^2 \cdot \phi x \psi x}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot d x^3} + \text{etc.} \\
+ \frac{d \cdot \phi x^2 \cdot \psi x}{1 \cdot 2 \cdot d x} - \frac{\phi x d d \cdot \phi x^2 \psi x}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot d x^2} + \frac{\phi x^2 d^2 \cdot \phi x^2 \psi x}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot d x^3} - \text{etc.} \\
+ \frac{d d \cdot \phi x^3 \psi' x}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot d x^3} - \frac{\phi x d^2 \cdot \phi x^3 \psi' x}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot d x^4} + \text{etc.} \\
+ \frac{d^2 \cdot \phi x^4 \psi x}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot d x^4} - \text{etc.} \\
\text{etc.}
\end{aligned}$$

Si iam in Lemmate nostro §. 11. loco y substitua-
tur ϕx et loco z , $\psi' x$ patet fore generatim

$$\begin{aligned}
\phi x^m d^{m-1} \psi' x - m \phi x^{m-1} d^{m-1} \cdot \phi x \psi' x + \frac{1 \cdot 2 \cdot (m-1)}{1 \cdot 2 \cdot 3} \phi x^{m-2} d^{m-1} \phi x^2 \psi' x \\
- \frac{m(m-1)(m-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3} \phi x^{m-3} d^{m-1} \cdot \phi x^3 \psi' x + \text{etc.} = 0
\end{aligned}$$

adeoque a parte dextra aequationis inuentae, termi-
nos qui in eisdem lineis verticalibus collocantur se
mutuo destruere, adeo vt solus remaneat terminus
primus ψx , ex quo iam consequitur esse

$$\begin{aligned}
\psi x = \psi t + \phi t \cdot \psi' t + \frac{d \cdot \phi t^2 \psi' t}{1 \cdot 2 \cdot d t^2} + \frac{d d \cdot \phi t^3 \psi' t}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot d t^3} \\
+ \frac{d^2 \cdot \phi t^4 \psi' t}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot d t^4} + \text{etc.}
\end{aligned}$$

VI. Si statuatur $\psi x = x$, ideoque $\psi t = t$
et $\psi' t = 1$, habebitur

$$x = t + \phi t + \frac{d \cdot \phi t^2}{1 \cdot 2 \cdot d t} + \frac{d d \cdot \phi t^3}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot d t^2} + \frac{d^2 \cdot \phi t^4}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot d t^3} + \text{etc.}$$

i deoque

$$\phi x = x - t = \phi t + \frac{d \cdot \phi t^2}{1 \cdot 2 \cdot d t} + \frac{d d \cdot \phi t^3}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot d t^2} + \frac{d^2 \cdot \phi t^4}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot d t^3} + \text{etc.}$$

G g 3

quod

quod etiam ex Theoremate nostro, statim deducitur, ponendo $\psi x = \Phi x$ atque $\psi t = \Phi t$, habebitur enim

$$\Phi x = \Phi t + \Phi t' \cdot \Phi t + \frac{d \cdot \Phi t^2 \cdot \Phi t}{1, 2, d t} + \frac{d d \cdot \Phi t^2 \cdot \Phi t}{1, 2, 3, d t^2} + \text{etc.}$$

aequatio quae priori perfecte congruit.

VII. Quamuis nullum quidem supersit dubium, quin demonstratione iam allata, veritas Theorematis plane sit euicta, quum tamen videri posset hanc demonstrationem ita esse comparatam, ut in eam vix quisquam incideret, nisi ipsum Theorema iam prius sibi haberet cognitum, haud inutile igitur erit ostendere, quali adhibito ratio-
cinio, ad inueniendum valorem functionis ψx per-
ducti simus. Quum scilicet sit

$$\psi t = \psi x - \Phi x \psi' x + \frac{\Phi x^2 \cdot d \cdot \psi' x}{1, d x} - \frac{\Phi x^2 \cdot d \cdot d \cdot \psi' x}{1, 2, 3, d x^2} + \text{etc.}$$

ut hinc inueniatur valor ipsius ψx , in eo elabo-
randum est, ut membri posterioris ad hanc aequa-
tionem pertinentis, singuli termini praeter primum
destruantur, quo autem $-\Phi x \psi' x$ destruat, pa-
tet necessarium esse, ut ad ψt addatur eiusmodi
functio ipsius t , cuius per x expressae primus ter-
minus sit $+\Phi x \psi' x$, qualis igitur erit $\Phi t \psi' t$,
hoc autem facto habebimus:

$$\begin{aligned} \psi t + \Phi t \psi' t = \psi x + \frac{\Phi x^2 \cdot d \cdot \psi' x}{1, 2, d x} - \frac{\Phi x^2 \cdot d \cdot d \cdot \psi' x}{1, 2, 3, d x^2} + \text{etc.} \\ - \frac{\Phi x \cdot d \cdot \Phi x \psi' x}{d x} + \frac{\Phi x^2 \cdot d \cdot d \cdot \Phi x \psi' x}{1, 2, d x^2} - \text{etc.} \end{aligned}$$

Quum

Quum vero nunc ex supra allatis §. III., constet esse

$$\frac{\Phi x^2 d. \psi x}{1.2 d x} - \frac{\Phi x d. \Phi x \psi x}{d x} = - \frac{d. \Phi x^2 \psi x}{1.2 d x},$$

evidens est terminos

$$\frac{\Phi x^2 d. \psi x}{1.2 d x} - \frac{\Phi x d. \Phi x \psi x}{d x}$$

ex aequatione modo allata eliminari posse, si ad $\psi x + \Phi x \psi' x$ addatur talis functio ipsius x , cuius per x expressae primus terminus sit $\frac{d. \Phi x^2 \psi x}{d x}$, quae proprietas manifesto competit ipsi $\frac{d. \Phi x^2 \psi' x}{1.2 d x}$, tum autem fiet

$$\begin{aligned} \psi x + \Phi x \psi' x + \frac{d. \Phi x^2 \psi' x}{1.2 d x} &= \psi x - \frac{\Phi x^2 d. d. \psi x}{1.2.2. d x^2} + \frac{\Phi x^4 d^2 \psi x}{1.2.2.2. d x^3} - \text{etc.} \\ &\quad + \frac{\Phi x^2 d. d. \Phi x \psi x}{1.2 d x^2} - \frac{\Phi x^2 d^2 \Phi x \psi x}{1.2.2. d x^3} + \text{etc.} \\ &\quad - \frac{\Phi x d. d. \Phi x^2 \psi x}{1.2 d x^2} + \frac{\Phi x^2 d^2 \Phi x^2 \psi x}{1.2.2.2. d x^3} - \text{etc.} \end{aligned}$$

Iam autem liquet ad terminos

$$- \frac{\Phi x^2 d. d. \psi x}{1.2.2. d x^3} + \frac{\Phi x^2 d. d. \Phi x \psi x}{1.2 d x^2} - \frac{\Phi x d. d. \Phi x^2 \psi x}{1.2 d x^2} = - \frac{d. d. \Phi x^2 \psi x}{1.2.2. d x^2}$$

eliminandos requiri, ut addatur $\frac{d. d. \Phi x^2 \psi x}{1.2.2. d x^2}$, atque simili ratione hoc ratiocinium ulterius proseguendo, etiam termini differentialia altiorum graduum inuolventes eliminari possunt, adeo ut remaneat solus primus terminus

$$\psi x = \psi x + \Phi x \psi' x + \frac{d. \Phi x^2 \psi' x}{1.2 d x} + \frac{d. d. \Phi x^2 \psi' x}{1.2.2. d x^2} + \frac{d^2 \Phi x^2 \psi' x}{1.2.2.2. d x^3} + \text{etc.}$$

VIII. Si T designet functionem quamcunque ipsius x , ope Theorematis huius valor functionis

nis $\psi(x+T)$ facile determinari poterit. Quum enim sit

$$\psi(x+T) = \psi x + T\psi'x + \frac{T^2 d.\psi'x}{1.2 d.x} + \frac{T^3 d.d.\psi'x}{1.2.3 d.x^2} + \text{etc.}$$

si seorsim quaerantur valores functionum ψx , $T\psi'x$, $\frac{T^2 d.\psi'x}{1.2 d.x}$ etc. per t expressi, consequemur :

$$\begin{aligned} \psi(x+T) = & \psi t + \Phi t \psi' t + \frac{d.\Phi t^2 \psi' t}{1.2 d.t} + \frac{d.d.\Phi t^3 \psi' t}{1.2.3 d.t^2} + \frac{d^2.\Phi t^4 \psi' t}{1.2.3.4 d.t^3} + \text{etc.} \\ & + T\psi' t + T\Phi t \psi'' t + \frac{T d.\Phi t^2 \psi'' t}{1.2 d.t} + \frac{T d.d.\Phi t^3 \psi'' t}{1.2.3 d.t^2} + \text{etc.} \\ & + \frac{T^2 \psi'' t}{1.2} + \frac{T^2 \Phi t \psi''' t}{1.2} + \frac{T^2 d.\Phi t^2 \psi''' t}{1.2.3 d.t} + \text{etc.} \\ & + \frac{T^3 \psi''' t}{1.2.3} + \frac{T^3 \Phi t \psi'''' t}{1.2.3} + \text{etc.} \\ & + \frac{T^4 \psi'''' t}{1.2.3.4} + \text{etc.} \end{aligned}$$

vbi supponimus

$$\psi'' t = \frac{d.\psi' t}{d.t}; \quad \psi''' t = \frac{d.\psi'' t}{d.t} \text{ etc.}$$

Valorem autem hunc ipsius $\psi(x+T)$ inuentum, vel leui adhibita attentione, facile quisque inueniet sic repraesentari posse :

$$\begin{aligned} \psi(x+T) = & \psi(t+T) + \Phi t \psi'(t+T) + \frac{d.\Phi t^2 \psi'(t+T)}{1.2 d.t} \\ & + \frac{d.d.\Phi t^3 \psi'(t+T)}{1.2.3 d.t^2} + \text{etc.} \end{aligned}$$

T scilicet in singulis differentiationibus pro constante habita, nam si haec expressio euoluatur, prodibit

$$\begin{aligned} \psi(t+T) = & \psi t + T\psi' t + \frac{T^2 \psi'' t}{1.2} + \frac{T^3 \psi''' t}{1.2.3} + \frac{T^4 \psi'''' t}{1.2.3.4} + \text{etc.} \\ \Phi t \psi'(t+T) = & \Phi t \psi' t + T\Phi t \psi'' t + \frac{T^2 \Phi t \psi''' t}{1.2} + \frac{T^3 \Phi t \psi'''' t}{1.2.3} + \text{etc.} \\ \frac{d.\Phi t^2 \psi'(t+T)}{1.2 d.t} = & \frac{d.\Phi t^2 \psi' t}{1.2 d.t} + \frac{T d.\Phi t^2 \psi'' t}{1.2 d.t} + \frac{T d.d.\Phi t^3 \psi'' t}{1.2.3 d.t^2} + \text{etc.} \\ \frac{d.d.\Phi t^3 \psi'(t+T)}{1.2.3 d.t^2} = & \frac{d.d.\Phi t^3 \psi' t}{1.2.3 d.t^2} + \frac{T d.d.\Phi t^3 \psi'' t}{1.2.3 d.t^2} + \frac{T d.d.d.\Phi t^4 \psi'' t}{1.2.3.4 d.t^3} + \text{etc.} \\ \frac{d^2.\Phi t^4 \psi'(t+T)}{1.2.3.4 d.t^3} = & \frac{d^2.\Phi t^4 \psi' t}{1.2.3.4 d.t^3} + \frac{d^2.\Phi t^4 \psi'' t}{1.2.3.4 d.t^3} + \text{etc.} \end{aligned}$$

quorum

quorum terminorum summa ut modo vidimus erat
 $= \psi(x + T)$.

IX. Hinc vero patet, quomodo praesens Theorema ad casum multo latius patentem applicari debeat, quo nimirum quaeritur valor functionis cuiuscunque ambarum variabilium x et t . Si igitur proposita fuerit functio $\psi(x, t)$ ex quantitibus x et t , utcunque composita, consideremus primum t ut constantem, seu in hac functione loco ipsius x substituamus α , tum autem per Theorema nostrum, quaeramus valorem ipsius $\psi(\alpha, x)$, qui erit

$$= \psi(\alpha, t) + \Phi t \psi'(\alpha, t) + \frac{d\Phi t^2}{1 \cdot 2} \psi''(\alpha, t) + \frac{d^2\Phi t^3}{1 \cdot 2 \cdot 3} \psi'''(\alpha, t) + \text{etc.}$$

post peractas vero differentiationes loco α iterum introducatur t , atque iam expressio hinc oriunda definiet quantitatem functionis $\psi(x, t)$. Quum enim $\psi(x, t)$ sit similis functio ipsorum x et t , ac $\psi(\alpha, x)$ sit ipsorum α et x , liquet omnino, si in valore posterioris functionis loco α introducatur t , eam in priorem abire, ratio autem cur demum post peractas differentiationes t loco α introduximus, haec est, quod in valoribus differentialibus occurrat quantitas $\psi'(\alpha, t)$; quae loco α introducto t migrat in $\psi'(t, t)$, in qua functione quum prius t , ut constans haberi debeat, posterius vero pro variabili spectari, ut omnis evitetur confusio, donec omnes differentiationes absolutae fuerint praestabit α in locum ipsius t substituere. Ut vero huius asserti veritatem eo melius ob oculos ponere liceat, facili quodam exemplo id illustrare placet. Sit igitur

Tom. XVI. Nou. Comm.

H h

$t = x$

242 DEMONSTRATIO SINGULARIS

$t = x - nx$, atque supponamus hinc quaeri valorem ipsius t per solum x expressum. Quum itaque sit

$$\Phi x = nx; \Phi t = nt; \Psi(t, x) = tx$$

ideoque

$$\Psi(a, x) = ax, \Psi(a, t) = at \text{ et } \Psi'(a, t) = a,$$

hinc habebitur:

$$ax = at + nat + n^2 at + n^3 at + \text{etc.} = \frac{a t}{1-n}$$

unde substituto iam t in locum ipsius a , orietur

$$tx = \frac{t t}{1-n},$$

vti per se quoque perspicuum est.

X. Deinde vero et id praeprimis notari meretur, Theorema praesens multo generalius quoque exprimi posse. Si enim supponatur $t = x - P$, ubi P designat functionem quamcunque ambarum variabilium x et t , P' vero denotet eam functionem ipsius t , quae prodit si in P loco x substituitur t , atque tantisper ii t qui antea ipsi P inerant per t' designentur, erit

$$\psi x = \psi t + P' \psi' t + \frac{d. P^2 \psi' t}{1.2. d. t} + \frac{d d. P^3 \psi' t}{1.2.3. d. t^2} + \frac{d^3 P^4 \psi' t}{1.2.3.4. d. t^3} + \text{etc.}$$

in quibus differentiationibus, pro functione P' , sola t variabilis haberi debet, t' autem pro constante spectari, tum vero captis differentialibus loco t' substitui poterit ubique, t . Facile autem patet, demonstrationem supra (§. 5.) allatam paucis tantum immutatis huc applicari posse. Primum enim quod ad Lemma nostrum fundamenti loco positum attinet, si y designet functionem

functionem duarum variabilium, differentiatio autem tantum respectu unius earum instituitur, evidens est hoc Lemma etiam pro eo casu cum veritate perfecte consentire. Iam igitur quum sit

$$\psi t = \psi x - P \psi' x + \frac{P^2 d. \psi' x}{1.2 d x} - \frac{P^3 d d. \psi' x}{1.2.3 d x^2} + \frac{P^4 d^2 \psi' x}{1.2.3.4 d x^3} - \text{etc.}$$

loco ψt substitutis

$$P' \psi' t, \frac{d. P^2 \psi' t}{1.2 d t}, \frac{d d. P^3 \psi' t}{1.2.3 d t^2}, \text{ etc.}$$

consequemur

$$P' \psi' t = P \psi' x - P \left(\frac{d. P \psi' x}{d x} \right) + \frac{P^2}{1.2} \left(\frac{d d. P \psi' x}{d x^2} \right) - \frac{P^3}{1.2.3} \left(\frac{d^2 P \psi' x}{d x^3} \right) + \text{etc.}$$

$$\frac{d. P' \psi' t}{1.2 d t} = \frac{1}{1.2} \left(\frac{d. P^2 \psi' x}{d x} \right) - \frac{P}{1.2} \left(\frac{d d. P^2 \psi' x}{d x^2} \right) + \frac{P^2}{1.2.3.2} \left(\frac{d^2 P^2 \psi' x}{d x^3} \right) - \text{etc.}$$

Omnes igitur his valoribus in unam summam collectis, obtinebimus:

$$\begin{aligned} & \psi t + P' \psi' t + \frac{d. P^2 \psi' t}{1.2 d t} + \frac{d d. P^3 \psi' t}{1.2.3 d t^2} + \frac{d^2 P^4 \psi' t}{1.2.3.4 d t^3} + \text{etc.} \\ = & \psi x - P \psi' x + \frac{P^2 d. \psi' x}{1.2 d x} - \frac{P^3 d d. \psi' x}{1.2.3 d x^2} + \frac{P^4 d^2 \psi' x}{1.2.3.4 d x^3} - \text{etc.} \\ & + P \psi' x - P \left(\frac{d. P \psi' x}{d x} \right) + \frac{P^2}{1.2} \left(\frac{d d. P \psi' x}{d x^2} \right) - \frac{P^3}{1.2.3} \left(\frac{d^2 P \psi' x}{d x^3} \right) + \text{etc.} \\ & + \frac{1}{1.2} \left(\frac{d. P^2 \psi' x}{d x} \right) - \frac{P}{1.2} \left(\frac{d d. P^2 \psi' x}{d x^2} \right) + \frac{P^2}{1.2.3.2} \left(\frac{d^2 P^2 \psi' x}{d x^3} \right) - \text{etc.} \\ & + \frac{1}{1.2.3} \left(\frac{d d. P^3 \psi' x}{d x^2} - \frac{P}{1.2.3} \left(\frac{d^2 P^3 \psi' x}{d x^3} \right) + \text{etc.} \right. \\ & \left. + \frac{1}{1.2.3.4} \left(\frac{d^2 P^4 \psi' x}{d x^3} \right) - \text{etc.} \right. \\ & \text{etc.} \end{aligned}$$

Quum autem per Lemma nostrum in genere constet esse

$$\begin{aligned} P^m \frac{d^{m-1} \psi' x}{d x^{m-1}} - m P^{m-1} \left(\frac{d^{m-1} P \psi' x}{d x^{m-1}} \right) + \frac{m(m-1)}{1.2} P^{m-2} \left(\frac{d^{m-1} P^2 \psi' x}{d x^{m-1}} \right) \\ - \frac{m(m-1)(m-2)}{1.2.3} P^{m-3} \left(\frac{d^{m-1} P^3 \psi' x}{d x^{m-1}} \right) + \text{etc} \end{aligned}$$

H h 2

neces-

neccssum est, vt a parte dextra aequationis, omnes termini, qui in iisdem lineis verticalibus dispositi sunt, seu qui differentialia eiusdem gradus inuoluunt, sponte euaneſcant, vnde habebitur :

$$\psi x = \psi t + P' \psi' t + \frac{d \cdot P^2 \psi' t}{1 \cdot 2 \cdot d t^2} + \frac{d d \cdot P^3 \psi' t}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot d t^3} + \frac{d^2 \cdot P^4 \psi' t}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot d t^4} + \text{etc.}$$

peractis autem differentiationibus loco t' iterum scribi potest t . Nunc vero perspicua euadit ratio, cur differentiationibus institutis, t' in P' pro constanti haberi debeat, quum enim sit

$$\psi t = \psi x - P \psi' x + \frac{P' d \cdot \psi' x}{1 \cdot 2 \cdot d x} - \frac{P^2 d d \cdot \psi x}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot d x^2} + \text{etc.}$$

constat valorem ipsius ψx hinc definiri posse, si ad ψt addantur eiusmodi functiones ipsius t , quibus per x expressis, non solum quantitas $P \psi' x$, sed etiam termini qui differentialia ipsius $\psi' x$ inuoluunt, eliminari possunt, at pro $-P \psi' x$ eliminando statim liquet, ad ψt , addi debere quantitatem, quae similis est functio ipsius t ac $P \psi' x$ est ipsius x , ideoque dum in P loco t scribitur t' , patet ad ψt addi debere terminum $P' \psi' t$, vbi P' est similis functio ipsorum t' et t , ac P est ipsorum t et x , tum vero etiam perspicuum est vtrinque t' vt constantem spectari debere. Similis autem res est cum reliquis terminis differentialia ipsius $\psi' x$ inuoluentibus.

XI. Perpenſis iis quae supra (§. 9) attulimus, iam euident quodque est, qua ratione functio quaecunque ipsorum x et $t \psi(x, t)$, pro hypothese qua

$$t = x$$

$t = x - P$, per solam variabilem t determinari queat, primum enim patet esse

$$\psi(a, x) = \psi(a, t) + P' \psi'(a, t) + \frac{d \cdot P'^2 \psi''(a, t)}{1 \cdot 2 \cdot d t} + \frac{d \cdot d \cdot P'^3 \psi'''(a, t)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot d t^2} \\ + \frac{d^2 P'^4 \psi^{(4)}(a, t)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot d t^3} + \text{etc.}$$

deinde vero intelligitur quum $\psi(t, x)$ similis sit functio ipsorum t et x , ac $\psi(a, x)$ est ipsorum a et x , posteriorem functionis valorem in priorem abire, si vbique loco a introducatur t , praeterea vero semper notandum est, post peractas differentiationes vbique loco t scribi debere t . Sic exempli causa si fuerit $t = x - t x$, atque hinc inuestigari debeat valor ipsius $t x$ per t expressus, statim fiet $P = t x$, $P' = t' t$, $\psi(t, x) = t x$, $\psi(a, t) = a a t$ et $\psi'(a, t) = a a$, unde prodibit

$$a a x = a a t + a a t' t + a a t'' t + a a t''' t + \text{etc.}$$

ideoque

$$t x = t^2 + t^3 + t^4 + t^5 + \text{etc.} = \frac{t^2}{1-1},$$

qui valor omnino veritati est consentaneus.

XII. Ut iam de singulari huius Theorematibus usu, breuiter quaedam adferamus, examinemus primo, quomodo eius ope radicem cuiuscunque aequationis algebraicae per seriem exprimere liceat, in quem usum, ipsum Theorema a Celeb. la Grange inuentum esse constat. Si igitur proposita fuerit haec aequatio algebraica ad rationalitatem perducta:

$$x = a + b x^2 + c x^3 + d x^4 + e x^5 + \text{etc.}$$

H h 3

quae-

246 DEMONSTRATIO SINGVLARIS

quaeritur vt ex hac aequatione, valor ipsius x per seriem meras quantitates constantes inuoluentem exprimitur. Comparata autem hac aequatione cum illa generali:

$$x = t + \Phi x$$

euidens est, heic statui debere $t = a$ et

$$\Phi x = b x^2 + c x^3 + d x^4 + e x^5 + \text{etc.}$$

Ideoq̃ue

$$\Phi t = b t^2 + c t^3 + d t^4 + e t^5 + \text{etc.}$$

tum autem vi Theorematis habebitur

$$x = t + \Phi t + \frac{d \cdot \Phi t^2}{2 \cdot d t} + \frac{d d \cdot \Phi t^3}{2 \cdot 3 \cdot d t^2} + \frac{d^3 \cdot \Phi t^4}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot d t^3} + \text{etc.}$$

vbi nimirum post peractis differentiationes loco t scribi debet a . Non vero solum valor ipsius radicis x , sed etiam potestatis ipsius vel alius functionis cuiuscunque, hinc assignari poterit, sic enim habebitur

$$x^m = t^m + m(\Phi t \cdot t^{m-1} + \frac{d \cdot \Phi t^2 \cdot t^{m-1}}{2 \cdot d t} + \frac{d d \cdot \Phi t^3 \cdot t^{m-1}}{2 \cdot 3 \cdot d t^2} + \frac{d^3 \cdot \Phi t^4 \cdot t^{m-1}}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot d t^3} + \text{etc.})$$

XII. Dum vero has expressiones actu euoluere conabimur, ante omnia necessum est, vt valor ipsius Φt^n per seriem expressus inuestigetur, quum igitur sit

$$\Phi t = t t (b + c t + d t^2 + e t^3 + \text{etc.}), \text{ erit}$$

$$\Phi t^n = t^n (b + c t + d t^2 + e t^3 + \text{etc.})^n$$

ex quo totum negotium eo reducitur, ut polynomium

$$b + ct + dt^2 + et^3 + \text{etc.}$$

ad potestatem n euehatur, quum vero constet potestatem polynomii n huiusmodi habere debere formam :

$$b^n + c^n t + d^n t^2 + e^n t^3 + \text{etc.}$$

iam quaestio in eo versatur, ut valores coefficientium b^n , c^n , d^n etc. determinentur. At quum sit $(b + ct + dt^2 + et^3 + \text{etc.})^n = b^n + c^n t + d^n t^2 + e^n t^3 + \text{etc.}$ erit quoque

$$\frac{n(c + 2dt + 3et^2 + 4ft^3 + \text{etc.})}{b + ct + dt^2 + et^3 + ft^4 + \text{etc.}} = \frac{c^n + 2d^n t + 3e^n t^2 + 4f^n t^3 + \text{etc.}}{b^n + c^n t + d^n t^2 + e^n t^3 + f^n t^4 + \text{etc.}}$$

unde iam facile deducuntur sequentes valores ipsorum

$$b^n, c^n, d^n \text{ etc.}$$

$$b^n = b^n$$

$$c^n = \frac{n b^{n-1} c}{b} = n b^{n-1} c$$

$$d^n = \frac{n b^{n-1} d}{b} + \frac{n-1}{2} \frac{c^2 c}{b^2} = n b^{n-1} d + \frac{n(n-1)}{2} b^{n-2} c^2$$

$$e^n = \frac{n b^{n-1} e}{b} + \frac{n-1}{2} \frac{c^2 d}{b^2} + \frac{n-1}{2} \frac{d^2 c}{b^2} = n b^{n-1} e + \frac{n(n-1)}{2} b^{n-2} c d + \frac{n(n-1)(n-2)}{6} b^{n-3} c^3$$

$$f^n = n b^{n-1} f + \frac{n(n-1)}{2} b^{n-2} (2 c e + d d) + \frac{n(n-1)(n-2)}{6} b^{n-3} c c d + \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)}{24} b^{n-4} c^4$$

etc.

XIV. Inuenta igitur expressione ipsius Φs^n , iam superest, ut euoluatur quoque $s^{n-1} \Phi s^n \cdot s^{m-1}$, quem in finem notetur esse

$$\Phi s^n \cdot s^{m-1} = s^{2n+m-1} (b^m + c^m s + d^m s^2 + e^m s^3 + f^m s^4 + \text{etc.})$$

vnde posito breuitatis gratia $2n + m - 1 = \lambda$, inuenietur

$$s^\lambda \Phi s^n \cdot s^{m-1} = \lambda(\lambda-1)(\lambda-2) \dots (\lambda-x) b^m s^{\lambda-x} + (\lambda+1)\lambda(\lambda-1) \dots (\lambda+1-x) c^m s^{\lambda+1-x} \\ + (\lambda+2)(\lambda+1)\lambda \dots (\lambda+2-x) d^m s^{\lambda+2-x} + (\lambda+3)(\lambda+2) \dots (\lambda+3-x) e^m s^{\lambda+3-x} + \text{etc.}$$

ideoque si $x = n - 1$, habebitur $\lambda - x = n + m$ et proinde

$$s^{n-1} \cdot \Phi s^n \cdot s^{m-1} = \lambda(\lambda-1) \dots (m+n) b^m s^{m+n} + (\lambda+1)\lambda \dots (m+n+1) c^m s^{m+n+1} \\ + (\lambda+2)(\lambda+1) \dots (m+n+2) d^m s^{m+n+2} + \text{etc.}$$

vbi obseruari debet esse $\lambda = 2n + m - 1$.

XV. Hinc pro x^n iam sequens deducitur expressio:

$$x^m = a^m + m(a^{m-1}b + a^{m-2}c + a^{m-3}d + a^{m-4}e + \text{etc.}) \\ + \frac{m}{2}((m+3)a^{m-2}b^2 + 2(m+4)a^{m-3}bc + (m+5)a^{m-4}(cc+2bd) + \text{etc.}) \\ + \frac{m}{2 \cdot 3}((m+5)(m+4)a^{m-3}b^3 + 3(m+6)(m+5)a^{m-4}b^2c \\ + (m+7)(m+6)a^{m-5}(3b^2d + 3bcc) + \text{etc.}) \\ + \frac{m}{2 \cdot 3 \cdot 4}((m+7)(m+6)(m+5)a^{m-4}b^4 \\ + 4(m+8)(m+7)(m+6)a^{m-5}b^3c + \text{etc.}) \\ + \text{etc.}$$

quae

quae etiam sequenti ratione repraesentari potest

$$\begin{aligned}
 x^m &= a^m + m a^{m-1} b \left(1 + \frac{m+1}{1 \cdot 2} ab + \frac{(m+1)(m+2)}{1 \cdot 2 \cdot 3} a^2 b^2 + \frac{(m+1)(m+2)(m+3)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} a^3 b^3 + \text{etc.} \right) \\
 &+ m a^{m-2} c \left(1 + (m+4) ab + \frac{(m+4)(m+5)}{1 \cdot 2} a^2 b^2 + \frac{(m+4)(m+5)(m+6)}{1 \cdot 2 \cdot 3} a^3 b^3 + \text{etc.} \right) \\
 &+ m a^{m-3} d \left(1 + (m+5) ab + \frac{(m+5)(m+6)}{1 \cdot 2} a^2 b^2 + \frac{(m+5)(m+6)(m+7)}{1 \cdot 2 \cdot 3} a^3 b^3 + \text{etc.} \right) \\
 &+ \text{etc.} \\
 &+ \frac{m}{2} a^{m+4} c c \left((m+5) + \frac{(m+7)(m+6)}{1 \cdot 2} ab + \frac{(m+8)(m+7)(m+6)}{1 \cdot 2 \cdot 3} a^2 b^2 + \text{etc.} \right) \\
 &+ \frac{m}{3} a^{m+6} d d \left((m+7) + (m+9)(m+8) ab + \frac{(m+10)(m+9)(m+8)}{1 \cdot 2 \cdot 3} a^2 b^2 + \text{etc.} \right) \\
 &+ \text{etc.} \\
 &+ m a^{m+1} c d \left((m+6) + (m+8)(m+7) ab + \frac{(m+10)(m+9)(m+8)}{1 \cdot 2 \cdot 3} a^2 b^2 + \text{etc.} \right) \\
 &+ m a^{m+7} c e \left((m+8) + (m+10)(m+9) ab + \frac{(m+12)(m+11)(m+10)}{1 \cdot 2 \cdot 3} a^2 b^2 + \text{etc.} \right) \\
 &+ \text{etc. etc.}
 \end{aligned}$$

Posito igitur $m = 1$ habebimus

$$\begin{aligned}
 x &= a + a^2 b \left(1 + 2 \cdot ab + 5 \cdot a^2 b^2 + 14 a^3 b^3 + \text{etc.} \right) \\
 &+ a^2 c \left(1 + 5 \cdot ab + 21 \cdot a^2 b^2 + 84 a^3 b^3 + \text{etc.} \right) \\
 &+ a^3 d \left(1 + 6 \cdot ab + 28 \cdot a^2 b^2 + \text{etc.} \right) \\
 &+ \text{etc.} \\
 &+ a^4 c c \left(3 + 14 ab + 60 a^2 b^2 + \text{etc.} \right) \\
 &+ a^4 d d \left(4 + 45 ab + \text{etc.} \right) \\
 &+ \text{etc.} \\
 &+ a^6 c d \left(7 + 72 ab + \text{etc.} \right) \\
 &+ a^7 c e \left(9 + 110 ab + \text{etc.} \right) \\
 &+ \text{etc.}
 \end{aligned}$$

quae series iam olim a *Newtono* inuenta est.

XVI. Si aequatio proposita diuidatur per bx , tum ea ita habebitur expressa :

$$x = \frac{b}{b} - \frac{a - cx^2 - dx^4 - ex^6 - etc.}{b \cdot x}$$

quae cum hypothesi Theorematis $x = t + \Phi x$ comparata, praebet $t = \frac{b}{b}$ et

$$\Phi x = - \frac{(a + cx^2 + dx^4 + ex^6 + etc.)}{bx}$$

ideoque

$$\Phi t = - \frac{(a + ct^2 + dt^4 + etc.)}{bt}$$

hinc autem x per sequentem seriem exprimitur

$$x = t + \Phi t + \frac{d \cdot \Phi t^2}{2 \cdot d t} + \frac{d \cdot d \cdot \Phi t^3}{2 \cdot 2 \cdot d t^2} + \frac{d^3 \cdot \Phi t^4}{2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot d t^3} + etc.$$

vbi post differentiationem in locum ipsius t vbique substituitur $\frac{b}{b}$. Simili ratione, si aequatio sub hac repraesentetur forma :

$$x = \frac{-b}{c} + \frac{x - a - dx^4 - ex^6 - etc.}{cx^3},$$

erit $t = \frac{-b}{c}$ et

$$\Phi x = \frac{x - a - dx^4 - ex^6 - etc.}{cx^3}$$

nec non

$$\Phi t = \frac{t - a - dt^4 - et^6 - etc.}{ct^3},$$

ex quo fit

$$x = t + \Phi t + \frac{d \cdot \Phi t^2}{2 \cdot d t} + \frac{d \cdot d \cdot \Phi t^3}{2 \cdot 2 \cdot d t^2} + etc.$$

differentiationibus absolutis, pro t substituto $\frac{-b}{c}$. Hinc si aequatio fuerit gradus m atque omnes plane eius adsint termini, tum hoc modo, series numero m inuenientur pro valoribus radicum aequationis propositae, totidem scilicet quot radicibus ipsa aequatio prae-

praedita est, vtrum vero hisce seriebus istae radices reuera exprimantur, quaestio est quae per ratiocinia Analytica vix dirimi posse videtur. Tutissima igitur via, hoc dubium dilui posse videtur, si pro specialibus exemplis tentamen instituitur, an diuersae hae series, diuersos quoque exhibeant radicum valores, et an dum aequationis radices omnes sint reales, etiam omnes series fiant conuergentes? Hunc in finem hanc mihi proposui aequationem cubicam:

$$x^3 - 3x^2 - 4x + 12 = 0,$$

cuius radices vti constat sunt

$$x = 3, x = 2 \text{ et } x = -2,$$

examinaturus vtrum series ad praescriptum Theorematis inuentae hos valores radicum reuera exhibeant. Quum igitur haec aequatio, iam triplici modo ad formam $x - t - \Phi x = 0$ reduci queat, has formas simul cum respondentibus valoribus ipsorum t et Φt vnica tabella heic complectemur:

$$\text{I. } x - 3 - \frac{t}{x} + \frac{t^2}{x^2} = 0 \quad \left| \begin{array}{l} t = 3 \\ \Phi t = \frac{4}{3} - \frac{12}{11} \end{array} \right.$$

$$\text{II. } x + \frac{t}{x} - \frac{t^2}{x^2} - x^3 = 0 \quad \left| \begin{array}{l} t = -\frac{1}{3} \\ \Phi t = \frac{12}{7} + t t \end{array} \right.$$

$$\text{III. } x - 3 - \frac{x^2 + 3x^3}{t} = 0 \quad \left| \begin{array}{l} t = 3 \\ \Phi t = \frac{12}{4} - \frac{1}{t} \end{array} \right.$$

Pro I^a et III^a forma liquet, si in Φt loco t eius valor $+3$ substituatur, Φt euanescere, pro I^a scilicet est $\Phi t = \frac{4}{3} - \frac{12}{11} = 0$, pro III^a vero $\Phi t = \frac{12}{4} - \frac{1}{3} = 0$. Quum itaque in expressione ipsius x , omnes termini primum excipientes factorem habeant Φt , sequitur pro vtraque forma fore $x = t = 3$, ex quibus apparet fieri omnino posse, vt diuersae series ean-

dem plane exhibeant radicem. Porro pro nostro quidem exemplo, nullum est dubium, quin series formae mediae respondens fiat diuergens, unde ipsi nulla plane respondet radix. Deinde in genere notare iuuat, huiusmodi aequationem cubicam

$$x^3 + nx^2 + mx + mn = 0$$

si sub his repraesentetur formis.

$$x + n + \frac{m}{x} + \frac{mn}{x^2} = 0 \text{ et } x + n + \frac{nx^2 + x^3}{m} = 0$$

ad praescriptum Theorematis resolutam, utroque casu praebere $x = t = -n$, nam pro priori habetur $\Phi t = -\frac{m}{t} - \frac{mn}{t^2}$, pro posteriori autem $\Phi t = -\frac{nt - t^2}{m}$, utraque expressio in 0 abeunte, si pro t substituatur $-n$. Plurimis de caetero exemplis ostendi potest, pro aequatione cubica.

$x^3 = ax^2 + bx + c$, seriem ex forma $x = a + \frac{bx + c}{x^2}$ deductam, saepius fieri diuergentem. Tantum igitur abest, ut per adplicationem Theorematis Cel. *La Grange*, omnes aequationum radices assignari queant, ut plane non constet, an quouis casu, praeter unicam hoc modo determinare liceat?

XVII. Si in expressione $t = x - \Phi x$, functio Φx quascunque quantitates transcendentes inuoluat, valor tamen ipsius x aequationi satisfaciens, Theoremate praesenti in usum vocato facile definiri potest, sic si fuerit $t = x + n \sin. x$, quo casu $\Phi x = -n \sin. x$ habebitur

$$\psi x = \psi t - n \sin. t \psi' t + \frac{n^2 \cdot d \sin. t^2 \psi' t}{1 \cdot 2 \cdot d t} - \frac{n^3 \cdot d d \sin. t^3 \psi' t}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot d t^2} + \frac{n^4 \cdot d^2 \sin. t^4 \psi' t}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot d t^3} - \text{etc.}$$

Notum

Notum autem est resolutionem memorabilis illius Problematis *Kepleriani*, quo quaeritur, ut pro data quacunque anomalia media planetae, inueniatur anomalia vera, ad huiusmodi reduci aequationem $t = x + n \sin. x$. Si enim anomalia media dicatur t , anomalia vera u et anomalia excentrica x , excentricitas autem per n designetur, in Astronomicis demonstrari solet esse:

Tang. $\frac{1}{2} u = \text{Tang. } \frac{1}{2} x \frac{\sqrt{1-n^2}}{\sqrt{1+n^2}}$, tum vero $t = x + n \sin. x$.

Ponamus igitur primum esse $\psi x = \sin. x$, unde $\psi t = \sin. t$ et $\psi^2 t = \cos. t$ eritque iam

$$\sin. x = \sin. t - n \sin. t \cdot \cos. t + \frac{n^2 d. \sin. t \cos. t}{1 \cdot 2 \cdot d t} - \frac{n^3 d d. \sin. t \cos. t}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot d^2 t^2} + \text{etc.}$$

quae aequatio etiam ita exprimi potest

$$\sin. x = \sin. t - \frac{n}{2} \sin. 2 t + \frac{n^3 d d. \sin. t^2}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot d t^2} - \frac{n^5 d^2 \sin. t^4}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot d t^4} + \frac{n^7 d^4 \sin. t^6}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot d t^6} - \text{etc.}$$

Quum itaque sit

$$2^{2m-1} \sin. t^{2m} = \frac{2^m (2m-1) (2m-3) \dots (m+1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \dots m} - \frac{2^m (2m-1) (2m-3) \dots (m+2)}{2 \cdot 3 \cdot 4 \dots (m-1)} \cos. 2 t \\ + \frac{2^m (2m-1) \dots (m+1)}{2 \cdot 3 \dots (m-2)} \cos. 4 t + \frac{2^m (2m-1) \dots (m+4)}{2 \cdot 3 \dots (m-3)} \cos. 6 t \dots + \cos. 2 m t$$

vbi ultimus terminus signo $+$ afficietur, si m sit numerus par, negatiue autem si impar. Deinde habebitur quoque

$$2^{2m} \sin. t^{2m+1} = \frac{(2m+1) 2^m (2m-1) \dots (m+2)}{2 \cdot 3 \cdot 4 \dots m} \sin. t - \frac{(2m+1) 2^m (2m-1) \dots (m+3)}{2 \cdot 3 \cdot 4 \dots (m-1)} \sin. 3 t \\ + \frac{(2m+1) 2^m (2m-1) \dots (m+4)}{2 \cdot 3 \cdot 4 \dots (m-2)} \sin. 5 t \dots + \sin. (2m+1) t$$

vbi iterum ultimo termino signum $+$ tribui debet, si m sit numerus par, contra si impar. Hisce itaque notatis si iam differentiatio actu instituaturs probabit:

I i 3

sin.

$$\begin{aligned}
\sin. x = & \sin. t - \frac{n}{2} \sin. 2t - \frac{n^2}{4 \cdot 3 \cdot 2} (3 \sin. t - 3^3 \sin. 3t) \\
& + \frac{n^3}{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5} (4 \cdot 2^3 \sin. 2t - 4^3 \sin. 4t) \\
& + \frac{n^4}{16 \cdot 15 \cdot 14 \cdot 13} \left(\frac{5 \cdot 4}{3} \sin. t - 5 \cdot 3^4 \sin. 3t + 5^4 \sin. 5t \right) \\
& - \frac{n^5}{32 \cdot 31 \cdot 30 \cdot 29 \cdot 28} \left(\frac{6 \cdot 5}{2} \cdot 2^5 \sin. 2t - 6 \cdot 4^5 \sin. 4t + 6^5 \sin. 6t \right) \\
& - \frac{n^6}{64 \cdot 63 \cdot 62 \cdot 61 \cdot 60 \cdot 59} \left(\frac{7 \cdot 6 \cdot 5}{1 \cdot 2 \cdot 3} \sin. t - \frac{7 \cdot 6}{2} 3^6 \sin. 3t + 7 \cdot 5^6 \sin. 5t - 7^6 \sin. 7t \right) \\
& + \text{etc.}
\end{aligned}$$

XVIII. Supponamus iterum esse $\psi x = \cos. x$, ideoque $\psi t = \cos. t$ et $\psi^i t = -\sin. t$, eritque iam:
 $\cos. x = \cos. t + n \sin. t^2 - \frac{n^2 d. \sin. t^2}{1 \cdot 2 \cdot d \cdot t} + \frac{n^3 d. d. \sin. t^2}{1 \cdot 2 \cdot 1 \cdot d \cdot t^2} - \frac{n^4 d^2 \sin. t^2}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot d \cdot t^3} + \text{etc.}$

quae euoluta praebet:

$$\begin{aligned}
\cos. x = & \cos. t + \frac{n}{2} (1 - \cos. 2t) - \frac{n^2}{4 \cdot 1 \cdot 2} (3 \cos. t - 3 \cos. 3t) + \frac{n^3}{8 \cdot 2 \cdot 3} (4 \cdot 2^3 \cos. 2t - 4^3 \cos. 4t) \\
& + \frac{n^4}{16 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 4} \left(\frac{5 \cdot 4}{3} \cos. t - 5 \cdot 3^3 \cos. 3t + 5^3 \cos. 5t \right) \\
& - \frac{n^5}{32 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 5} \left(\frac{6 \cdot 5}{2} \cdot 2^4 \cos. 2t - 6 \cdot 4^4 \cos. 4t + 6^4 \cos. 6t \right) \\
& + \text{etc.}
\end{aligned}$$

Simili ratione aliae quaevis functiones anguli x per t exprimi possunt, quin et adeo functiones vtcunque ex x et t compositae. In genere autem notasse meretur, has series non fieri convergentes nisi excentricitas n sit satis parva, atque pro his etiam casibus adeo lente convergunt, ut vix villo cum fructu ad quaerendas aequationes centrorum in Astronomia adhiberi possint.

PHYSICO- MATHEMATICA.

DE

VIBRATIONIBVS CHORDARVM,
EX DVABVS PARTIBVS, TAM LONGITVDI-
NE QVAM CRASSITIE, AB INVICEM
DIVERSIS, COMPOSITARVM.

Auctore

DANIELE BERNOVLLI.

§. 1.

Post fertilissimam, quam varii primi ordinis
Geometrae messuerunt segetem de minimis
motibus tremulis isochronis a quibus integra
acustica, fortassis et ipsa optica, pendet, non
vereor pro spicilegio intacta aliqua, ut ut leuiores
videri possint, superaddere. Cupidus in perspicien-
da vibrationum natura, quas chorda, ex duabus par-
tibus, longitudine aequae ac crassitie inaequalibus,
composita atque tensa affectaret, in varias incidi
formulas, quae aliqua indigere interpretatione atque
commentatione visae sunt, ut omnes et singulae vi-
brationum species inde determinentur, simul ac va-
leres sonorum singulis vibrationum speciebus debito-
rum: Huiusmodi soni, quod fateor, si ambae chor-
dae partes nodo aliquo alioque modo simili inter se
essent connexae, ob nimiam suam raucedinem inter

Tom. XVI. Nou. Comm.

K k

fonos

sonos musicos referri non possent at alius fingi potest modus obiecto nostro magis accommodatus: cum nempe fidibus saepe vtantur musici, filo metallico circumducto inuolutis, eo fine vt quantum conuenit, sufficienter tensae sonum tanto grauiorem edant: quidni liceat fides supponere pro parte tantum filo metallico inuolutas, nuda manente parte reliqua: nec enim hic video quid sonum obtundere possit: huiusmodi autem fides dato pondere tensae dabunt vtique sonum acutiorem quam si totae essent suo filo metallico circumuolutae, grauiorem vero quam si tota sua longitudine essent nuda. Igitur haud abs re erit, in verum soni valorem inquirere simulque reliqua huc pertinentia explorare.

§. 2. Ante omnia ad analysin quaestionum nostrarum conducit theoria communis, de chordis vibrantibus tota sua longitudine vniformibus, passim demonstrata, cuius praecipua theorematata haec sunt.

Tab III.

Fig. 1.

Sit abc chorda tensa tota sua longitudine vniformis eaque inter vibrandum ad momentum assumere ponatur curuaturam cda ; cadet vtique maxima amplitudo bd in punctum chordae medium b ; sit semilongitudo chordae $cb = L$, maxima amplitudo $bd = a$; sumto quocunque alio puncto g , ponatur $cg = x$, paruula applicata $ge = y$; pondus chordam tendens $= P$: sumatur longitudo quacuis chordae a atque pondusculum eius longitudinis ponatur $= p$. Sit denique quadrans circuli vnitatem pro radio habentis $= q$. His factis denominationibus sequentes habentur valores atque expressiones.

A. Pro

A. Pro aequatione ad curuam cda obtinetur $y = a \sin. \text{Arc.} \frac{x}{L} q$, quae aequatio sistit curuam sinuum, ita vt posito semicirculo = longitudini ca et arcu quocunque = cg sit vbique ge proportionalis sinui huius arcus. Haec curuatura conuenit trochoidi veluti infinite elongatae.

B. Pro quouis puncto e fit subtangens $gf = \frac{L}{q} \times \frac{\sin. \text{Arc.} \frac{x}{L} q}{\cos. \text{Arc.} \frac{x}{L} q}$ siue $gf = \frac{L}{q} \text{ tang. Arc.} \frac{x}{L} q$: nec ab hoc differre censenda est valore ipsa tangens ef , quoniam applicata ge veluti infinite parua censetur. Notetur autem hanc tangentem modo affirmatiue modo negatiue sumendam esse, prouti punctum g ad vnā vel alteram partem puncti b sumtum fuerit: si itaque affirmatiue accipiat pro ramo cd , erit negatiue sumenda pro ramo ad et vicissim.

C. Longitudo penduli simplicis isochroni cum vibrationibus chordae = $\frac{p L L}{q q p a}$, vnde tempusculum vnus vibrationis definitur: sed et idem tempusculum absque supposita circuli ad radium proportionē indicatur hac formula $\frac{1}{p} \times \frac{L L}{a}$ siue simplicius, posita longitudine arbitraria $a = 2 L$, formula $\frac{p}{2} L$, quae designat minimam altitudinem quam corpus libere cadendo describit tempusculo vnus vibrationis. Igitur posito $t =$ tempori quo corpus delabitur per altitudinem L fit tempusculum vnus vibrationis = $t \sqrt{\frac{p}{2}}$, vbi nunc per p intelligitur pondus integrae chordae ac .

K k 2

D. Si

D. Si longitudo ac diuidatur in quocunque partes aequales n , vibrationes harmonicae fieri possunt simul super quavis parte, factis alternis chordae in partes contrarias incuruationibus veluti serpentinis atque tunc erit tempusculam singularum vibrationum $= \frac{1}{n} V \sqrt{\frac{p}{g}}$. Hinc oriuntur soni accessorii, qui dicuntur *harmonici* in progressionem numerorum naturalium dum pro integra longitudine chordae formatur sonus *fundamentalis*, qui unitati respondet. Imo omnes et singulas diuersi generis vibrationes simul coexistere in vna eademque chorda posse, demonstraui in Commentariis Academicis Berolinensibus.

Caeterum designabo, pro vibrationibus fundamentalibus, curuam adc nomine curuae *vibratoriae primitivae*.

§. 3. Notetur iam quod si pars chordae quavis ag ab chorda integra ac resecetur punctumque g connexum supponatur cum filo omnis grauitatis experte, cuius longitudo fg fuerit aequalis subtangenti pro puncto e , nulla plane inde oriri possit mutatio nec in curuaturam edc nec in vibrationes chordae residuae gc , filo fg omni grauitate experti connexae, figura secunda hanc integram mutationem repraesentat nec differt a figura prima, nisi quod arcus curuae ae punctis sit notatus ut inde appareat quod nullo modo ad systema propositum pertineat atque vnice pro supplemento ideali curuae vibratoriae truncatae sumendus sit: sic in vtraque figura
curuae

curuatura $aedc$ prorsus erit eadem. Tunc autem requiritur ut longitudo ac vel semilongitudo bc definatur ex datis longitudinibus fg et gc : quo facto omnia innotescunt; hocque modo facilis erit solutio sequentis quaestionis.

§. 4. Sit fg filum grauitatis expers fixum in puncto f atque connexum cum chorda vniformiter graui ge : ponatur potentia tendens = ponderi P dum chordae longitudo a pondusculum habere ponitur, quod sit = p , tum vtique fiet pro vibrationibus simplicissimis vel fundamentalibus, ut filum fe perpetuo positum sit in directum dum chorda edc incuruatur, prorsus ut in figura prima, simulque ut tangens curuae in extremitate e sit ipsa fe . Ponatur porro longitudo $fg = l$; longitudo $gc = \lambda$; his omnibus positis quaeritur natura vibrationum.

Tab. III.

Fig. 2.

Ex praemissis patet, nil aliud hic requiri quam ut determinetur longitudo ac , quia hac cognita chorda gc vibrationes suas prorsus eodem modo faciet, ac si longitudinem haberet ac essetque fixa in punctis a et c remoto filo fg , sit igitur longitudo $ac = 2L$ siue semilongitudo $bc = L$, habebitur vi §. 2. art. B. haec aequatio $l = \frac{L}{q} \times \text{tang. Arc. } \frac{\lambda}{L} q$, ubi signum ponitur negatiuum, quia hic punctum d semper cadit intra puncta d et c (§. 2. art. B): atque haec aequatio inferuit ad determinandum valorem longitudinis ac pro curua vibratoria primitiua, quam per $2L$ indicauimus: hanc nunc aequationem paulo accuratius prosequemur.

K k 3

§. 5.

§. 5. Cum quantitas $\text{Arc. } \frac{\lambda}{L} q$ indicet quadrantem circuli, unitatem pro radio habentis, multiplicatum per rationem $\frac{\lambda}{L}$, ponemus breuitatis causa $\frac{\lambda}{L} q = z$, vbi z denotat arcum circulare radio unitate descriptum, atque sic aequatio nostra abit in hanc alteram $\frac{I}{\lambda} = -\frac{\text{tang. Arc. } z}{\text{Arc. } z}$, in qua signum negatiuum indicat esse arcum $\frac{\lambda}{L} q$, siue z semper quadrante circuli maiorem; mox autem videbimus huic aequationi infinitas conuenire radices: cum arcus z inter omnes possibiles minimus est inseruit vibrationibus fundamentalibus explicandis: De hoc casu ante omnia dicemus.

I. Sit longitudo l siue longitudo fili fg infinita, erit tangens in e parallela cum linea fc atque sic cadet punctum e in ipsum punctum d sic vt fiat $bc = gc$ siue $L = \lambda$ atque adeo $Z = q$: Casus iste per se obuius immediate aequatione nostra indicatur, ideo quod tangens quadrantis est infinita.

II. Si, e contrario, ponatur $l = 0$ ita vt filum fg euanescat, erit punctum e fixum in g et chorda gc vibrationes suas pro theoria communi faciet et punctum d cadet in medium chordae gc ; sic igitur oportet vt fiat $L = \frac{1}{2} \lambda$, quod iterum aequatio nostra indicat, quandoquidem oritur $\frac{\lambda}{L} q = Z = 2q$, cuius tangens $= 0$.

III. Sic igitur, manentibus caeteris omnibus, sola variante longitudine fili, subsistent omnes *curvae vibrationis primitivae* intra limites $L = \lambda$ et $L = \frac{1}{2} \lambda$, atque adeo

adeo omnes soni, qui a diuersa longitudine fili oriri possunt, subsistent intra *octauam* sunt enim soni longitudinibus L reciproce proportionales.

§. 6. Facile nunc erit longitudinem fili ea conditione determinare, vt sonus intermedius proveniat qualiscunque datus: etenim hoc dato innotescit ratio $\frac{\lambda}{L}$; hinc valor Z atque valor $-\frac{\text{tang. Arc. } z}{\text{Arc. } z}$, qui posterior multiplicatus per longitudinem chordae dabit desideratam longitudinem fili; totum processum vnico illustrabo exemplo.

Fuerit longitudo fili fg determinanda ea conditione vt sonus a vibrationibus $fedc$ resultans intervallo vnus quintae siue diapentes deprimatur infra sonum, quem chorda gc sola edit cum est fixa in puncto g , pro quo scilicet casu inuenimus $L = \frac{1}{2} \lambda$.

Pro hoc exemplo oportet vt fiat

$$bc = L = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \lambda = \frac{1}{4} \lambda; \text{ vnde}$$

$$Z = \frac{\lambda}{L} q = \frac{1}{2} q = \text{Arc. } 120^\circ.$$

cuius valor proxime $= \frac{11}{10}$ siue 2.095 et cuius tangens $= 1.732$; vnde $fg = l = \frac{1732}{2095} \lambda$ siue $= 0.827 \lambda$ atque sic facillime determinatur longitudo fili ex data longitudine chordae pro dato sono producendo; at tædiosior fit calculus, quando ex datis longitudinibus fili atque chordae determinanda est longitudo L ; quod nunc faciam.

§. 7. Redeamus igitur ad aequationem paragraphi quarti scilicet $l = -\frac{L}{q} \text{ tang. Arc. } \frac{\lambda}{L} q$, in
qua

qua si longitudines l et λ datae fuerint, poterit longitudo quaesita L proxime inueniri tentando, quo facto variae sunt methodi, quibus longitudo haec ac qualibet accurate determinatur. Cognita longitudine L , habetur $ac = 2L$, quod indicat, chordam gc filo fg connexam vibrationes facere isochronas cum vibrationibus chordae eiusdem speciei eodemque pondere tensae, quae longitudinem habeat ac et quae fixa sit in punctis a et c , similes olim obtinui aequationes, cum inquirerem in sonos tibiagum diuersimode constructarum, de quibus tractatum conscripsi, qui extat, *dans les memoires de l'Academie R. des sciences de Paris pour l'année 1762. pag. 431.* Praefatam aequationem exemplo aliquo illustrabo.

Fuerint longitudines fili fg et chordae gc inter se aequales atque sic habebitur $\lambda = -\frac{L}{q} \text{ tang. Arc. } \frac{\lambda}{L} q$ siue $\frac{\lambda}{L} q = -\text{tang. Arc. } \frac{\lambda}{L} q$: siue simpliciter $\frac{\lambda}{L} = -\text{tang. } \frac{\lambda}{L}$; nam expressio $\text{Arc. } \frac{\lambda}{L}$ nil aliud indicat, quam quod quantitas $\frac{\lambda}{L}$ sit tanquam arcus circularis, radio unitate descriptus, considerandus; igitur exemplum nostrum postulat ut quaeratur arcus circuli, cuius tangens negative sumta sit ipsi arcui aequalis: hunc arcum inuenio $116^\circ.15'$, cuius magnitudo $= 2.028$ et cuius tangens $= -2.028$. Est igitur $\frac{\lambda}{L} = 2.028$ atque posito $q = 1$ fit $L = \frac{1000}{2.028} \lambda$; hinc $ac = 2L = \frac{2000}{2.028} \lambda$: Ergo tandem est sonus chordae simplicis gc ad sonum eiusdem chordae aequali filo fg iunctae ut 11000 ad 7098; si prior indicetur per c erit alter
medius

medius inter e et f : interuallum est vnus quintae cum dimidio semitonio.

Si ponatur generaliter $L = f\lambda$, fit $f \frac{q\lambda}{L} = -\text{tang.} \frac{q\lambda}{L}$, quae aequatio nos docet arcum inueniendum esse, qui sit ad tangentem suam negatiue sumtam vt vnitas ad numerum f siue vt longitudo chordae ad longitudinem filii: si arcus iste, quocunque modo inuentus, ponatur $= A$ erit $\frac{q\lambda}{L} = A$ atque adeo $L = \frac{q}{A} \lambda$. Intelligimus ex simplicitate harum formularum, huiusmodi quaestiones optime definiri quod fecimus, ex longitudine *curuae vibratoriae primitiuae*.

§. 8. Quae adhuc diximus, pertinent ad vibrationes primarias sonosque *fundamentales* inde formatos, hae vibrationes dicuntur primi ordinis; notum autem est geometris, dari simul, in vno eodemque systemate, infinitas alias vibrationum species quae pertinent ad ordinem secundum, tertium, quartum etc.; hos omnes ordines demonstraui in diuersis schediasmatibus de chordis inaequaliter crassis, de laminis elasticis, quae innumeris modis non vsum adhiberi possunt, de tibiis seu fistulis musicis etc. quibus Illustris *Eulerus* noster addidit vibrationes in tympanis atque campanis.

In chordis tensis simplicibus atque vniuniformibus omnes hi, varii ordinis, soni progrediuntur vt numeri naturales, quod idem valere demonstraui pro tibiis cylindricis vtraque extremitate apertis; pro tibiis autem alterutra extremitate clausis sonos pro-

gredi ostendi vt numeri naturales impares exclusi numeris paribus; in aliis systematibus alia lege, quae saepissime transcendentalis est, soni progrediuntur; tanta cum sit hac de re varietas, non abs re erit etiam vibrationes, de quibus hic sermo est, examini nostro subiicere.

§. 9. Hunc in finem notemus aequationem nostram $l = -\frac{\lambda}{q} \text{ tang. Arc. } \frac{\lambda}{L} q$ infinitas habere radices, quae successiue longitudinem L diminuunt. In prima radice, vbi L maxima est, Arcus $\frac{\lambda}{L} q$ semper maior est quadrante circuli et minor semicirculo; pro secunda radice Arcus idem continetur inter limites $3q$ et $4q$; pro tertia radice inter limites $5q$ et $6q$ et sic porro; erit nempe successiue Arcus $\frac{\lambda}{L} q = q + \alpha$; $3q + \beta$; $5q + \gamma$ etc.

In his valoribus arculi superaddendi α , β , γ etc. continue decrescant, ita vt tandem negligi possint, praesertim si longius filum chordae fuerit annexum, aut si illos negligere nolimus, possint saltem sine vilo negotio proxime determinari secundum legem aequationis: cognito autem, verbi gratia pro tertio ordine arculo γ , erit $\frac{\lambda}{L} q = 5q + \gamma$, vnde $L = \frac{q}{5q + \gamma} \lambda$, hinc sequitur fore pro primo ordine $L = \frac{q}{q + \alpha} \lambda$; pro secundo ordine $L = \frac{q}{3q + \beta} \lambda$; pro tertio ordine $L = \frac{q}{5q + \gamma} \lambda$ atque sic porro: vbi, quod iam monui, arculi α , β , γ etc. ex aequatione nostra paragraphi septimi sunt determinandi. Pro hoc procedendi modo idem, quod assumimus

para-

paragrapho septimo, exemplum prosequemur, in quo supposuimus longitudinem fili / aequalem longitudini chordae.

§. 10. In isto exemplo iam vidimus sumendum esse, pro vibrationibus fundamentalibus seu primi ordinis, arcum $116^{\circ}\frac{1}{4}$, cuius nempe valor aequalis est suae tangenti negative sumtae hic igitur est arcus $\alpha = 26^{\circ}\frac{1}{2}$ gradibus atque fit

$$L = \frac{q}{q+2} \lambda = \frac{90}{116\frac{1}{4}} \lambda.$$

Pro vibrationibus secundi ordinis fit arcus suae tangenti aequalis si sumatur $281^{\circ}\frac{1}{4}$ atque adeo ponatur $\epsilon = 11^{\circ}\frac{1}{4}$ gradibus, vnde

$$L = \frac{q}{2q+1} \lambda = \frac{90}{281\frac{1}{4}} \lambda.$$

Pro tertio ordine iterum aequalitas oritur inter arcum et tangentem, si sumatur arcus $457^{\circ}\frac{1}{2}$ grad. atque adeo $\gamma = 7^{\circ}\frac{1}{2}$ gradibus, vnde nunc

$$L = \frac{q}{3q+1} \lambda = \frac{90}{457\frac{1}{2}} \lambda.$$

§. 11. Caeterum, cum quaestio est, arcubus α , ϵ , γ etc. valorem suum proxime assignare definita formula algebraica, dico fore proxime

$$\alpha = \frac{q}{q+2} : \epsilon = \frac{2q}{2q+1} : \gamma = \frac{3q}{3q+1} \text{ etc.}$$

qui valores in gradus circuli conuersi parum a valoribus indicatis differunt: hoc modo absque vlla

L 1 2

redu-

reductione praeuia fit proxime pro primo ordine $L = \frac{q q + 1}{q q + 1} \lambda$: pro secundo ordine $L = \frac{q q q + 1}{27 q q + 6} \lambda$: pro tertio ordine $L = \frac{25 q q q + 1}{125 q q + 10} \lambda$ atque pro *infinito* ordine $L = \frac{(2n-1)^2 q q + 1}{(2n-1)^2 q q + 2(2n-1)} \lambda$ atque hae formulae vix a vero aberrant, inferuiunt autem quam maxime ad legem variationum inspiciendam. Attamen haec methodus non foret incunda si longitudo fili esset admodum parua, intelligimus hinc sonos, qui in variis ordinibus oriuntur, minime dici posse harmonicos, etiamsi a vibrationibus chordae vniformis proprie edantur; admitto quidem principia musica a D. Rameau adhibita; displicet autem fundamentum cui principia sua superstruit et quod a natura sonorum accessoriorum petit: Duo tamen casus sunt, quibus soni progressionem harmonicam formant. Primus est quando longitudo fili l tota euanescit; secundus quando haec longitudo ponitur infinita. Primus casus sistit theoriam chordarum communem; pro qua singuli arcus α , ϵ , γ etc. fiunt aequales quadranti circuli atque longitudines L successiue fiunt aequales $\frac{1}{2}\lambda$, $\frac{1}{3}\lambda$, $\frac{1}{4}\lambda$ etc. vnde soni progrediuntur in ratione numerorum naturalium. Secundus casus postulat vt singuli arcus α , ϵ , γ etc. euanescant: hoc modo longitudines L successiue fiunt aequales λ , $\frac{1}{2}\lambda$, $\frac{1}{3}\lambda$ ipsique soni progrediuntur in ratione numerorum naturalium imparium. In utroque casu soni sunt harmonici. Haec omnia quidem non aliter quam *in abstracto* sunt accipienda, quia fila grauitatis expertia vtique non dantur; attamen

aliquid

aliquid conferre possunt ad pleniorē vibrationum notionem sibi comparandam, quicquid sit, non omit-
tenda putavi, quia pro fundamento inseruiunt iis
quae mihi dicenda supersunt, cum de vibrationibus
chordae, ex duabus partibus compositae, acturus,
filo *fg* grauitatis experti substituam alius chordae
portionem cum altera chorda *gc* connexae ambas-
que data quauis grauitate donatas supponam.

§. 12. Sint nunc duae diuersae chordae *bg* et Tab. III.
gc, quae inter vibrandum assumant situm *b e* Fig. 3.
et *ec* atque propositum fuerit naturam et pro-
prietates harum vibrationum inquirere. Hunc in fi-
nem notabimus ante omnia fieri non posse quin
ambae chordae in puncto *e*, vbi sunt connexae,
communem habeant tangentem *fe*: patet quoque
vtramque chordam *be* et *ec* arcum fore alicuius
curuae vibratoriae primitivae, a cuius determinatione
omnia pendent phaenomena: ambae vero hae curuae,
quamuis ad idem pertineant genus, specie tamen
different pro ratione diuersarum longitudinum et
crassitierum quae in ambabus chordis supponuntur.
Sit itaque pro chorda leuiori *be* *curua vibratoria
primitiua bed* atque adeo arcus *ed* punctis notatis
indicet complementum chordae *be*, pariterque *aec*
repraesentet *curuam vibratoriam primitiuam* pro altera
chorda grauiore *ce*, cuius sic complementum est
arcus *ae*, haec ita sunt intelligenda, quod chorda
be suas formet vibrationes eadem plane lege cum
chorda simplici *bed* fixa in punctis *b* et *d* eodem
L 1 3 ponde-

pondere tensa et tota sua longitudine eiusdem crassitiei cum chorda be simulque altera chorda ce vibrationes suas faciat easdem quas faceret integra chorda cea fixa in punctis c et a aequaliter tensa. Caeterum integra figura nostra ita est delineata, ut chorda be minoris crassitiei supposita fuerit quam chorda altera ce ; hinc, pro priori, longitudo bd maior repraesentatur quam longitudo ca , ut synchronismo satisfiat. His ita praeparatis quaestionem nostram eo, qui sequitur modo aggredior.

§. 13. Sit longitudo chordae $cg = \lambda$ atque longitudo $ca = 2L$, fiet tangens curvae cea pro extremitate e siue $fe = -\frac{L}{q} \text{ tang. Arc. } \frac{\lambda}{L} q$. Eodem modo, posita longitudine $bg = \lambda'$ atque longitudine $bd = 2L'$ fiet eadem tangens $fe = \frac{L'}{q} \text{ tang. Arc. } \frac{\lambda'}{L'} q$, quae hic affirmatiue ponenda est, quoniam haec tangens, utrique chordae communis, modo contrario posita est pro curua ce et pro curua be : Hinc oritur talis aequatio fundamentalis,

$$-L \text{ tang. Arc. } \frac{\lambda}{L} q = L' \text{ tang. Arc. } \frac{\lambda'}{L'} q.$$

Nunc vero diuersam grauitatem utriusque chordae vnice tribuamus diuersae earum crassitiei sitque crassities chordae $cg = p$ atque crassities chordae $bg = p'$ ita ut aequales longitudes chordarum cg et bg pondera habeant quae sint ut p ad p' ; tunc erit, ut notum est, (ob synchronismum vibrationum cea et bed) $pLL = p'L'L'$ atque adeo $L' = L\sqrt{\frac{p}{p'}}$; hoc

hoc autem substituto valore, mutabitur praefata nostra aequatio fundamentalis in hanc alteram

$$\frac{-\text{tang. Arc. } \frac{\lambda}{L} q}{\sqrt{p}} = \frac{\text{tang. Arc. } \frac{\lambda \sqrt{p'}}{L \sqrt{p}} q}{\sqrt{p'}}$$

Ad normam huius aequationis unica, quae superest, incognita L determinanda restat, quo facto erit $2B$ sive longitudo ac aequalis longitudini chordae simplicis eiusdem crassitiei cum chorda cg quae eodem pondere tensa vibrationes isochronas faciet cum systemate proposito chordarum cg et bg .

§. 14. Quod si iam in aequatione nostra §. 13. Tab. III. ponatur gravitas chordae bg sive $p' = 0$, oritur Fig. 2.

iterum problema §. 4. pro filo gravitatis experie longitudinis l vel λ' : vidimus autem in eodem paragrapho quarto, esse tunc l vel nunc $\lambda' = -\frac{L}{q} \text{tang. Arc. } \frac{\lambda}{L} q$: quaeritur itaque, quod non statim apparet, quomodo haec aequatio ex nostra aequatione §. 13. deduci possit? hunc in finem consideremus gravitatem p' tanquam infinite parvam atque sic erit $\text{Arc. } \frac{\lambda \sqrt{p'}}{L \sqrt{p}} q$ infinite parvus et proinde arcus iste non differt ab sua tangente. Est itaque $\text{tang. Arc. } \frac{\lambda \sqrt{p'}}{L \sqrt{p}} q = \frac{\lambda \sqrt{p'}}{L \sqrt{p}} q$ sive $\frac{\text{tang. Arc. } \frac{\lambda \sqrt{p'}}{L \sqrt{p}} q}{\sqrt{p'}} = \frac{\lambda q}{L \sqrt{p}}$. Substituto hoc valore

pro posteriori membro aequationis hacque multiplicata per \sqrt{p} oritur $\frac{\lambda q}{L} = -\text{tang. Arc. } \frac{\lambda}{L} q$ sive tandem $\lambda' = -\frac{L}{q} \text{tang. Arc. } \frac{\lambda}{L} q$. Sic itaque problema paragraphi quarti optime deducitur ex problemate paragraphi decimi tertii.

§. 15.

§. 15. Si porro ponatur longitudo bg vel $\lambda' = 0$, oportet ut sit $\text{tang. Arc. } \frac{\lambda}{L} q = 0$, unde oritur $\frac{\lambda}{L} q = 2q$ vel $= 4q$ vel $= 6q$ etc. atque $L = \frac{1}{2}\lambda$ vel $= \frac{1}{4}\lambda$ vel $= \frac{1}{6}\lambda$, quae proprietas convenit utique chordae simplici cg longitudinis λ fixae in punctis g et c . Sed si ponatur $\lambda = 0$ oportet ut sit $\frac{\text{tang. Arc. } \frac{\lambda' + p'}{L + p}}{V p'} q = 0$, siue $\text{tang. Arc. } \frac{\lambda'}{L} q = 0$, unde nunc $\frac{\lambda'}{L} q = 2q$, vel $= 4q$, vel $= 6q$ etc. atque $L' = \frac{1}{2}\lambda'$ vel $= \frac{1}{4}\lambda'$ vel $= \frac{1}{6}\lambda'$, quae proprietas competit nunc chordae simplici bg longitudinis λ' fixae in punctis g et b .

§. 16. Quod si praeterea ponatur $p = p'$ tunc ambae chordae bg et cg vnam eandemque constituent chordam bc atque erit etiam $L = L'$: aequatio autem nostra simpliciter mutabitur in hanc $\text{tang. Arc. } \frac{\lambda}{L} q = \text{tang. Arc. } \frac{\lambda'}{L} q$, quae nunc indicat esse summam arcuum $\frac{\lambda}{L} q + \frac{\lambda'}{L} q = 2q$ vel $= 4q$ vel $= 6q$ etc. Ergo L siue L' erit $= \frac{\lambda + \lambda'}{2}$ vel $= \frac{\lambda + \lambda'}{4}$ vel $= \frac{\lambda + \lambda'}{6}$ etc. haec autem proprietas competit chordae bc vniuniformiter crassae atque fixae in punctis b et c . Omnia haec corollaria per se obuia ipsi rei naturae perfecte conueniunt; simul autem ab aequatione nostra, si debito modo tractetur, obtime indicantur.

§. 17. Progredior ad casus, qui integrum postulant calculum numericum aequatione nostra indica-

dicatum; hi vero ab initio non possunt aliter quam congruis positionibus pro arcu $\frac{\lambda}{L} q$ successiue corrigendis euolui, quo facto verus valor huius arcus mox proxime innotescet, quod ex sequenti apparebit exemplo.

Exemplum. Ponantur ambae chordae cg et bg longitudine inter se aequales, fuerit autem crassities seu grauitas chordae bg quadrupla alterius chordae cg . Sic fiet $\lambda' = \lambda$ et $p' = 4p$ atque aequatio nostra §. 13. erit $-2 \text{ tang. Arc. } \frac{\lambda}{L} q = \text{tang. Arc. } \frac{\lambda'}{L'} q$. Si ponatur $\text{Arc. } \frac{\lambda}{L} q = 55 \text{ graduum}$, oportet vt fit $-2 \text{ tang. } 55^\circ = \text{tang. } 110^\circ$. siue $2.856 = 2.747$. Si vero idem arcus ponatur $= 54^\circ$. prodibit $2.752 = 3.077$: vnde iam liquet fore proxime $\text{Arc. } \frac{\lambda}{L} q = 54^\circ.45'$, pro quo obtinetur $2.829 = 2.824$, quod mendacium tuto negligitur. Ergo erit proxime $\frac{\lambda}{L} = \frac{54\frac{1}{2}}{90} = \frac{11}{10}$; vnde $L = \frac{10}{11} \lambda$ atque $L' = \frac{10}{11} \lambda$; siue $2L = \frac{20}{11} \lambda$ atque $2L' = \frac{20}{11} \lambda$. Ergo vibrationes ambarum chordarum connexarum isochronae erunt cum vibrationibus chordae simplicis eiusdem crassitiei cum chorda cg atque eodem pondere tensae, cuius longitudo sit $= \frac{20}{11} \lambda$ siue etiam cum vibrationibus chordae simplicis eiusdem crassitiei cum chorda bg eodemque pondere tensae cuius longitudo foret $= \frac{10}{11} \lambda$. Si porro sumatur sonus chordae simplicis longitudinis bc seu 2λ , eiusdem crassitiei cum chorda bg , pro sono fundamentali, erit sonus chordae eiusdem lon-

Tom. XVI. Nou. Comm. M m gitu.

gitudinis sed aequaliter crassae cum chorda *cg* prioris octaua: sonus autem systematis propositi exprimitur per $\frac{11}{10}$ atque erit medius inter tertiam minorem et tertiam maiorem soni fundamentalis.

§. 18. Apparet ex allato exemplo ante omnia, repetitis tentaminibus, explorandum esse arcum siue angulum $\frac{\lambda}{L} q$ fundamentalem, qui aequationi paragraphi decimi tertii satisfaciat. Fuerit angulus iste $= \Phi$ habebitur

$$\frac{\lambda}{L} q = \Phi \text{ atque } L = \frac{q}{\Phi} \lambda.$$

At rursus patet aequationem paragraphi decimi tertii infinitas habere radices, quae longitudinem L successive minorem atque minorem faciunt sonoque acutiori respondent, dum indicant vtramque chordam pluries posse axem intersecare atque inflexiones contrarias assumere prouti figura quinta et sequentes indicant. Sic omnes configurationes, quas chordae inter vibrandum assumere possunt, obtinebuntur, si nulla radix praetermittatur. De his configurationibus atque inflexionibus, quae ambas chordas in plures ramos siue concamerationes dissecant, notandum est, quod vnica concameratio irregularis sit, illa scilicet quae punctum ambas chordas connectens continet: Reliquae concamerationes omnes in vtraque chorda erunt regulares instar chordarum simplicium tota sua longitudine uniformium vibrantium: quae in vna eademque chorda formantur sunt omnes
inter

inter se aequales, longiores autem sunt in chorda tenuiori, breuiores in crassiori; eritque longitudo concamerationum in vna chorda praecise $= 2 L$ in altera $= 2 L' = \frac{2\sqrt{p}}{\sqrt{p'}} L$: haec omnia ex ipsa rei natura absque calculo per se patent.

Similes forent vibrationes aëreae in fistulis, si columna aërea fistulae inclusâ in duas diuersas partes disperceretur diuersa densitate praeditas aut etiam in aëre libero, in quo sonus propagatur, si aër a subita mutatione caloris densitatem suam aliquo in loco confestim mutare putetur; annon suspicari licet, simile aliquid contingere, quoties radius luminis ex vno medio in aliud incidit. Quicquid sit, operae pretium erit accuratius in vibrationes altiorum ordinum inquirere, quod exemplo aliquo nunc faciam.

§. 19 Sit iterum, vt §. 13 $\lambda' = \lambda$ atque $p' = 4 p$, quibus suppositionibus conuenit. aequatio $- 2 \text{ tang. Arc. } \frac{\lambda}{L} q = \text{tang. Arc. } \frac{2\lambda}{L} q$, pro quo vidimus §. 17. esse arcum fundamentalem $\frac{\lambda}{L} q = 54^{\circ} 45'$ atque arcum

$\frac{2\lambda}{L} q = 109^{\circ} 30'$ sit $\Phi = \text{ang. } 54^{\circ} 45'$,

atque sumantur successiue anguli

$\Phi, 2q - \Phi, 2q + \Phi, 4q - \Phi, 4q + \Phi, 6q - \Phi, 6q + \Phi$ etc.

patet singulos hos arcus communem habere tangentem sed alternatim affirmatiuam aut negatiuam:

M m 2

Dein-

Deinde sumantur horum angularum dupli atque obtinebitur

$$2\Phi, 4q - 2\Phi, 4q + 2\Phi, 8q - 2\Phi, 8q + 2\Phi, 12q - 2\Phi, \\ 12q + 2\Phi \text{ etc.},$$

quorum iterum singuli communi gaudent tangente alternatim affirmatiue et negatiue sumta: Igitur satisfaciens angulo Φ , satisfaciens omnes reliqui

$$2q - \Phi, 2q + \Phi, 4q - \Phi, 4q + \Phi, 6q - \Phi, 6q + \Phi \text{ etc.}$$

vnde obtinentur successiue pro $\frac{\lambda}{L}q$ sequentes valores

$$\Phi, 2q - \Phi, 2q + \Phi, 4q - \Phi, 4q + \Phi, 6q - \Phi, 6q + \Phi, \text{ etc.} \\ \text{atque adeo}$$

$$L = \frac{q}{\Phi} \lambda; L = \frac{q}{2q - \Phi} \lambda; L = \frac{q}{2q + \Phi} \lambda; L = \frac{q}{4q - \Phi} \lambda; \\ L = \frac{q}{4q + \Phi} \lambda; L = \frac{q}{6q - \Phi} \lambda; L = \frac{q}{6q + \Phi} \lambda; \text{ etc.}$$

Substituatur pro q et Φ valores 90° . et $54^\circ\frac{1}{2}$, atque sic pro longitudine L prodibunt successiue sequentes valores

$$\frac{160}{119} \lambda; \frac{360}{151} \lambda; \frac{560}{219} \lambda; \frac{760}{281} \lambda; \frac{960}{359} \lambda; \frac{1160}{441} \lambda; \frac{1360}{519} \lambda \text{ etc.}$$

Ita quoque pro altera chorda longitudo L' , dimidiatis terminis, fit successiue aequalis

$$\frac{160}{119} \lambda'; \frac{360}{151} \lambda'; \frac{560}{219} \lambda'; \frac{760}{281} \lambda'; \frac{960}{359} \lambda'; \frac{1160}{441} \lambda'; \frac{1360}{519} \lambda' \text{ etc.}$$

soni autem progrediuntur in ratione denominatorum 219:501:939:1221 etc.

Configurationes, quas ambae chordae inter vibrandum assumunt, sistuntur pro quatuor casibus simpli-

simplicissimis figuris 4. 5. 6. 7. quarum affectiones Tab. III. quisque propria sua contemplatione conspiciet. Determinatis longitudinibus L et L' habetur $2L =$ longitudini cuiusvis concamerationis in chorda tenuiori et $2L' =$ longitudini concamerationum in chorda crassiore: Erunt autem in vtraque chorda concamerationes replicandae donec proxime ad punctum b , in quo chordae vnitae sunt, peruentum fuerit; tunc concameratio intermedia utrobique reliqua ex duabus portionibus vtriusque chordae erit composita, simul tamen cum reliquis concamerationibus synchrona.

Intersectiones, quas curuae cum toto axe formant, fient omnes pro eadem chorda sub angulis perfecte aequalibus: at vero maximae amplitudines concamerationum in chorda tenuiori, pro nostro exemplo fiunt maiores quam in chorda crassiori, quamuis axem sub angulo minori interfecerint, exceptis casibus, qui figuris 8, 9 etc. respondent, de quibus nunc dicam.

§. 20. Notabile est, quod praememoratae vibrationum species diuersae, quamuis infinitae sint, nondum tamen omnes, quae oriri possunt, explcant. Id quidem non potui non animadvertere, postquam vidi transitum a configuratione figurae quintae ad sextam, in qua posteriori tres sunt nodi, cum in praecedente vnicus esset; vnde intellexi, configurationem dari mediam duobus nodis donatam, qualem

M m 3

sistit

fistit figura octaua. Ita quoque deficere video configurationem figurae nonae, quae quinque fistit nodos. In genere methodus praemissa praetermittit configurationes pro quibus punctum connexionis b incidit in nodum et in quibus numerus nodorum fit $= 3n - 1$, si per n intelligatur numerus qualiscunque integer. Alteram hanc vibrationum classem ita definire licet.

In paragrapho praecedente monui, quod si arcus $\frac{\lambda}{L}q = \Phi$ satisficiat aequationi $-2 \tan \text{Arc. } \frac{\lambda}{L}q = \tan \text{Arc. } \frac{2\lambda}{L}q$, futurum sit ut simul arcus $2q - \Phi, 2q + \Phi, 4q - \Phi, 4q + \Phi, 6q - \Phi, 6q + \Phi$, etc. satisficiant. Iam vero patet praefatam aequationem admittere quoque suppositionem $\Phi = 0$, indeque deduci arcus $2q - 0, 2q + 0, 4q - 0, 4q + 0, 6q - 0, 6q + 0$ etc. quorum singuli bini, a se non differunt ita ut simpliciter enumerari debeant arcus $2q, 4q, 6q$ etc. Igitur pro hac vibrationum classe, faciendum successiue erit $\frac{\lambda}{L}q = 2q; \frac{\lambda}{L}q = 4q; \frac{\lambda}{L}q = 6q$ etc. vnde pro L successiue proueniunt valores $\frac{1}{2}\lambda, \frac{1}{3}\lambda, \frac{1}{4}\lambda$ etc. atque pro L' valores $\frac{1}{2}\lambda, \frac{1}{3}\lambda, \frac{1}{4}\lambda$ etc. qui nunc valores figuris 8 et 9 perfecte conueniunt; hae itaque nouae configurationes prioribus erunt ordine suo intercalandae, quo facto omnes ordines obtinentur et numerus nodorum cuius numero naturali poterit esse aequalis.

§ 21. Ad ductum praemissi exempli, singula alia pertractari atque computari poterunt: Conducet autem praeuio uti examine synthetico de proportionem, quae intercedit inter Vp et Vp' , quae inferuiet ad proportionem inter tangentes indicandam; tum et de proportionem, quae ipsis arcubus competere debet; etenim si alterutra tangens multo maior debeat esse sua focia, indicium habemus angulum non multum a recto deficere atque si simul ipse angulus multum excedere debeat angulum focium, indicium quoque habebimus de paruitate posterioris anguli.

§ 22. Plurima forent superaddenda, veluti quaestiones de abbreviatione alterutrius chordae requisita, ut sonus fundamentalis emergens datum inde formet interuallum musicum cum sono fundamentali qui editur absque ista abbreviatione. In huiusmodi quaestionibus ante omnia, longitudo L vel L' peraequationem §. 13. est determinanda, quo facto ex interuallo musico dato innotescit valor nouae longitudinis L vel L' , unde determinatur longitudo chordae abbreviandae. Sic pro exemplo §. 17. si chorda crassior apposito digito reducatur ad longitudinem $\frac{16}{17}$ longitudinis suae naturalis, inde obtinebitur octaua soni qui editur remoto digito.

Potest etiam alius considerari modus, quo lex continuitatis in chorda vibrante interrumpitur, geometra-

metrarum attentione non indignus, si scilicet chorda, tota sua longitudine vniformis, in puncto aliquo annexum habere ponatur pondusculum: Hic equidem ambo segmenta chordae in puncto, vbi pondusculum superadditum habent, neutiquam communem habent tangentem; ambae vero tangentes sunt tanquam fila grauitatis expertia atque pondusculo alligata consideranda, simulque efficiendum, vt vibrationes pondusculi fiant isochronae, cum vibrationibus vtriusque chordae segmenti.

SECTIO QVARTA DE MOTV AERIS IN TVBIS.

Auctore
L. EVLERO.

CAPVT I.

DE
AERIS AGITATIONIBVS MINIMIS IN
TVBIS AEQUALITER AMPLIS.

Problema 67.

I.

Dum aer in tubo aequaliter amplo horizontaliter Tab. IV.
posito siue sit rectus siue curuus vtcunque agi- Fig. 70.
tatur, aequationes inuenire, quibus eius motus de-
terminatur.

Solutio.

Sit A B tubus propositus, qui siue sit rectus
siue curuus, tanquam rectus in figura representa-
Tom. XVI. Nou. Comm. N n tur,

tur, quoniam vidimus ab eius curuamine motum non perturbari. Sit ergo eius amplitudo constans = ff . Ad hoc autem problema resolendum vt conueniat methodo posteriori, qua status aeris in tubo quicumque cum statu initiali comparatur. Solutionem ergo ex problemate 45 petamus quem in finem consideremus aëris particulam, quae initio, vbi erat tempus $t = 0$, fuerit in S , ac ponamus spatium $AS = S$, eius particulae vero densitatem = Q ; at amplitudo tubi, quae ibi posita erat = Ω hic nobis est = ff . Iam elapso tempore = t eadem particula peruenerit in s , statuaturque spatium $As = s$, eius densitas = q , pressio = p , et celeritas secundum directionem $sB = u = (\frac{ds}{dt})$ amplitudine tubi existente $\omega = ff$. His positis prima aequatio ibi inuenta praebet $q(\frac{ds}{ds}) = Q$; deinde quia ob tubum horizontaliter positum grauitas motum non afficit, altera aequatio ibi inuenta hanc inducet formam $\frac{u}{q} \frac{dp}{ds} = -ds(\frac{ddt}{ds})$, quae cum tempus hic vt constans spectetur, ita repraesentari potest

$$\frac{u}{q} (\frac{dp}{ds}) + (\frac{ds}{ds}) (\frac{ddt}{ds}) = 0;$$

vbi meminisse iuuabit quantitates p, q, s functiones esse duarum variabilium S et t quantitatem Q vero tantum functionem ipsius S . Aëris autem natura hic praeterea introducat, qua nouimus pressionem p perpetuo densitati q esse proportionalem; vnde si densitati datae b conueniat pressio = a , erit $p = \frac{a}{b} q$, ex quo posterior aequatio fit

$$\frac{u}{b} (\frac{dq}{ds}) + (\frac{ds}{ds}) (\frac{ddt}{ds}) = 0,$$

prima

prima existente $q \left(\frac{ds}{dt} \right) = Q$. Hinc igitur densitatem q elidere licet cum sit

$$\left(\frac{dq}{ds} \right) = \frac{dQ}{ds \left(\frac{ds}{dt} \right)} - \frac{Q \left(\frac{d \left(\frac{ds}{dt} \right)}{\left(\frac{ds}{dt} \right)^2} \right)}{\left(\frac{ds}{dt} \right)^2} \text{ ob } q = \frac{Q}{\left(\frac{ds}{dt} \right)}$$

ideoque

$$\frac{1}{q} \left(\frac{dq}{ds} \right) = \frac{dQ}{Q ds} - \frac{\left(\frac{d \left(\frac{ds}{dt} \right)}{\left(\frac{ds}{dt} \right)} \right)}{\left(\frac{ds}{dt} \right)}.$$

Quocirca habebimus hanc aequationem, qua motus determinatio continetur

$$\frac{1}{b} \frac{g a d Q}{Q ds} \left(\frac{ds}{dt} \right) - \frac{1}{b} \frac{g a}{Q} \left(\frac{d \left(\frac{ds}{dt} \right)}{\left(\frac{ds}{dt} \right)} \right) + \left(\frac{ds}{dt} \right)^2 \left(\frac{d \left(\frac{ds}{dt} \right)}{\left(\frac{ds}{dt} \right)} \right) = 0$$

quam aequationem ita resolui oportet, ut posito $t = 0$ fiat $s = S$, tum autem fiet $\left(\frac{ds}{dt} \right) = x$, ideoque $q = Q$ ut rei natura postulat.

COROLL. 1.

2. Si ergo hanc aequationem ita resolvere liceret, ut qualis futura sit functio quantitas s binarum variabilium S et t assignari posset, tum omnes motus, qui quidem in aërem tubo contentum cadere queant, definiri possent. Sicque totum negotium ad resolutionem huius aequationis est perductum.

COROLL. 2.

3. Cum illa aequatio differentialia secundi gradus inuoluat, eius integrale completum duas

N n 2

functio-

functiones indefinitas continere debet, quas deinceps ex statu initiali determinari oportet, et quoniam non solum cuiusque particulæ locus initio sumitur datus sed etiam motus, ad hoc efficiendum utrique binis functionibus indeterminatis opus est.

Scholion 1.

4. Determinatio ergo motus aëris opus est longe difficilimum cum casus simplicissimus quo aerem eodem caloris gradu praeditum in tubo aequaliter amplo, et gravitatis effectû remoto moveri ponimus, ad eiusmodi aequationem sit perductus, cuius resolutio nullo adhuc artificio cognito expediri potest: quod eo minus est mirandum quod ea Analysis infinitorum pars, quorsum haec aequatio est referenda nuper demum excoli est coepta, neque in ea ultra prima elementa vix quicquam adhuc est praestitum. Maxime ergo arduae sunt iudicandae omnes quaestiones, qua circa motum aëris instituuntur, etiamsi forte primo intuitu facillimae videantur veluti si aër in tubo ope emboli vel condensetur vel rarefiat, cuius certe motus determinatio frustra susciperetur. Quando enim ex vi aëris condensati vulgo motus globuli in sclopeto pneumático definiri solet, nullo modo ad motum ipsius aëris respicitur sed is potius quovis momento, quasi esset in quiete spectatur, ex quo neglectu etiamsi in motu globuli vix vltus error gigni videatur, minime tamen hoc exemplum proferre licet, in quo circa motum aëris quic-

quicquam fuerit definitum: quin potius confiteri cogimur, nos circa hanc Theoriae motus fluidorum partem etiamnunc in maxima ignoratione versari.

Scholion 2.

5. Quoniam solutionem problematis methodo posteriori supra exposita sum aggressus, ne quis inspicetur methodum priorem feliciori successu forte adhiberi, solutionem inde petitam hic apponam. Secundum problema 44 igitur sine respectu ad statum initialem habito ad tempus $= t$ consideremus aëris particulam in s versantem vocato spatio $As = s$ sitque ibi densitas $= q$, pressio $= p$ et celeritas $= v$ in directione sB : et quoniam amplitudo tubi est constans seu $\omega = ff$ et nullae admittuntur vires sollicitantes, habebuntur hae duae aequationes:

$$\left(\frac{dv}{dt}\right) + \left(\frac{dq}{dt}\right) = 0 \text{ et } \frac{v}{q} \frac{dp}{dt} = -v \frac{dv}{dt} - ds \left(\frac{dv}{dt}\right)$$

Cum autem ex natura aëris sit $p = \frac{a^2}{b}$ posterior aequatio fiet

$$\frac{v}{b} \frac{dq}{q} + v \frac{dv}{dt} + ds \left(\frac{dv}{dt}\right) = 0.$$

quae cum tempus t ponatur constans reducitur ad hanc formam:

$$\frac{v}{b} q \left(\frac{dq}{ds}\right) + v \left(\frac{dv}{ds}\right) + \left(\frac{dv}{dt}\right) = 0$$

Quia igitur prior euoluta praebet,

$$v \left(\frac{dq}{ds}\right) + q \left(\frac{dv}{ds}\right) + \left(\frac{dv}{dt}\right) = 0$$

N n 3

pona-

ponamus $q = e^y$ inde fiet:

$$u \left(\frac{dy}{ds} \right) + \left(\frac{du}{ds} \right) + \left(\frac{dy}{dt} \right) = 0$$

ex altera vero

$$\frac{1}{b} \left(\frac{dy}{dt} \right) + u \left(\frac{du}{ds} \right) + \left(\frac{du}{dt} \right) = 0$$

Hinc elicitur

$$\left(\frac{dy}{ds} \right) = - \frac{b}{u} \left(\frac{du}{ds} \right) - \frac{b}{u} \left(\frac{du}{dt} \right)$$

ex illa vero

$$\left(\frac{dy}{dt} \right) = - \left(\frac{du}{dt} \right) + \frac{b}{u} \left(\frac{du}{dt} \right) + \frac{b}{u} \left(\frac{du}{ds} \right)$$

Quare cum sit $\left(\frac{d}{dt} \frac{dy}{ds} \right) = \left(\frac{d}{ds} \frac{dy}{dt} \right)$ concludimus.

$$(uu - \frac{1}{b}) \left(\frac{d^2 u}{ds^2} \right) + 2u \left(\frac{du}{ds} \right)^2 + 2 \left(\frac{du}{ds} \right) \left(\frac{du}{dt} \right) + 2u \left(\frac{d}{dt} \frac{du}{ds} \right) + \left(\frac{d^2 u}{dt^2} \right) = 0$$

vnde nunc inuestigari oportet qualis sit u functio binarum variabilium s et t . Haec autem aequatio ea, quam in solutione problematis dedimus, non solum non est tractatu facilior, sed illa etiam hoc commodo est praedita, ut felici successu ad aëris agitationes minimas accommodari possit quemadmodum in sequente problemate docebitur.

Problema 68.

6. In casu praecedentis problematis si motum aëris ita comparatum esse nouerimus ut singulae particulae non nisi quam minime a loco initiali recedant, istas aëris agitationes minimas determinare.

Solutio.

Tab. IV. Praecedentis problematis solutio ad hunc casum
Fig. 70. accommodabitur si spatium Ss , quo aëris particulae

lam

Iam s a situ suo initiali S remotam ponimus, in calculo tanquam minimum tractemus. In hunc finem ponamus $s = S + z$ ita ut z spectanda sit ut quantitas minima, atque aequatio, motum determinans hanc induet formam:

$$\frac{g}{b} Q \frac{dQ}{ds} \left(1 + \left(\frac{dz}{ds}\right)\right) - \frac{g}{b} \left(\frac{dz}{ds}\right)^2 + \left(1 + \left(\frac{dz}{ds}\right)\right) \left(\frac{d^2z}{ds^2}\right) = 0$$

quae cum formula $\left(\frac{dz}{ds}\right)$ prae unitate quasi evanescat contrahitur in hanc:

$$\frac{g}{b} Q \frac{dQ}{ds} - \frac{g}{b} \left(\frac{d^2z}{ds^2}\right) + \left(\frac{d^3z}{ds^3}\right) = 0$$

cuius si modo primus terminus abesset, integrale exiis, quae iam in hoc nouo calculi genere sunt comperta, dari posset; foret enim

$$z = \Gamma: (S + s \sqrt{\frac{g}{b}}) + \Delta: (S - s \sqrt{\frac{g}{b}})$$

Cum autem primus terminus solam variabilem S contineat cuius Q est functio data, integratio eo non turbatur, eritque aequationis nostrae integrale completum:

$$z = f dS \frac{Q}{b} + \Gamma: (S + s \sqrt{\frac{g}{b}}) + \Delta: (S - s \sqrt{\frac{g}{b}})$$

quo inuento ut reliquae motus conditiones eliciantur, ob $s = S + z$ erit

$$\left(\frac{dz}{ds}\right) = 1 + \frac{Q}{b} + \Gamma': (S + s \sqrt{\frac{g}{b}}) + \Delta': (S - s \sqrt{\frac{g}{b}}) \text{ et}$$

$$\left(\frac{d^2z}{ds^2}\right) = \frac{g}{b} \Gamma': (S + s \sqrt{\frac{g}{b}}) - \frac{g}{b} \Delta': (S - s \sqrt{\frac{g}{b}})$$

ex quarum formarum illa colligitur densitas aëris in s elapso tempore t quae est $q = \left(\frac{Q}{ds}\right)$; hincque por-

ro

ro pressio $p = \frac{a}{b}$, ex hac vero celeritas in eodem loco $v = (\frac{ds}{dt})$, sicque ad quodvis tempus status in quo aer versabitur, perfecte assignari poterit, si modo binæ functiones indefinitæ Γ et Δ ex statu initiali dato debite determinentur: id quod sequenti modo fieri debet. Status initialis duabus conditionibus continetur quarum altera pro singulis locis S datur æris densitas Q , altera vero motus ei in initio impressus, ponamus ergo tum particulæ in S existentis celeritatem in plagam SB fuisse $= Y$, ita ut Q et Y sint functiones ipsius S datae. Hinc in formulis generalibus inuentis ponendo tempus $t = 0$, primo fieri necesse est $s = S$ seu $z = 0$, unde habetur

$$0 = \int ds \sqrt{\frac{Q}{S}} + \Gamma : S + \Delta : S.$$

hocque modo simul illi conditioni satisfiat, quæ posito $t = 0$ prodire debet $q = Q$. Nam generatim si z eiusmodi fuerit functio ipsorum S et t , ut posito $t = 0$ fiat $z = 0$ tum etiam fieri $(\frac{dz}{ds}) = 0$, ideoque $(\frac{ds}{dz}) = 1$ necesse est. Deinde pro motu, qui æri ab initio fuerit impressus, hæc obtinebitur æquatio

$$Y = \frac{\sqrt{\frac{Q}{S}}}{\sqrt{b}} \Gamma' : S - \frac{\sqrt{\frac{Q}{S}}}{\sqrt{b}} \Delta' : S$$

ex quibus duabus ergo conditionibus indoles utriusque functionis Γ et Δ determinatur. Quo facto deinceps ad quodvis tempus status motusque æris in tubo definiri poterit.

Coroll.

Coroll. 1.

7. Quoniam per hypothesin quantitas z minima esse debet, ut status initialis ad hunc casum sit accommodatus densitas aëris Q ubique quam minime a densitate ad æquilibrium requisita, quam posui B discrepare debet; si enim densitas nimium alteraretur, quantitas z inde tantum valorem accipere posset, qui hypothesi aduersaretur.

Coroll. 2.

8. Deinde ne functiones Γ et Δ ipsi z nimis magnum valorem inducant, eas per fractionem quandam minimam α multiplicari convenit, ut statuatur $z = s - S = f dS / \frac{Q}{B} + \alpha \Gamma : (S + \sqrt{\frac{2g}{b}}) + \alpha \Delta : (S - \sqrt{\frac{2g}{b}})$ hoc modo nil impedit quo minus ipsæ functiones valores quantumvis magnos adipiscantur:

Coroll. 3.

9. Hoc multiplicatore minimo introducto pro statu initiali his duabus aequationibus satisfieri oportebit:

$$0 = f dS / \frac{Q}{B} + \alpha \Gamma : S + \alpha \Delta : S \text{ et}$$

$$\Gamma = \frac{\alpha \sqrt{\frac{2g}{b}}}{\sqrt{b}} \Gamma' : S - \frac{\alpha \sqrt{\frac{2g}{b}}}{\sqrt{b}} \Delta' : S$$

unde patet etiam in statu initiali non nisi celeritates minimas admitti posse.

Coroll. 4.

10. Quod si tum ad quoduis tempus t status aeris definiri debeat, primo pro densitate $q = \frac{Q}{(\frac{ds}{dt})}$, habebitur:

$$(\frac{ds}{dt}) = 1 + \frac{Q}{S} + a \Gamma': (S + t \sqrt{\frac{g}{b}}) + a \Delta': (S - t \sqrt{\frac{g}{b}})$$

tum vero pro celeritate $u = (\frac{ds}{dt})$ erit

$$u = \frac{a \sqrt{\frac{g}{b}}}{\sqrt{\frac{g}{b}}} \Gamma': (S + t \sqrt{\frac{g}{b}}) - \frac{a \sqrt{\frac{g}{b}}}{\sqrt{\frac{g}{b}}} \Delta': (S - t \sqrt{\frac{g}{b}})$$

vnde et haec celeritas semper erit minima.

Scholion 1.

11. Si rem accuratius perpendamus pro motus determinatione non absolute necessarium est, vt ipsa quantitas z posito $s = S + z$ sit minima, dummodo ea ita sit comparata, vt formula inde orta $(\frac{dz}{dt})$ fiat valde parua, id quod euenit si ad valorem ipsius z ante datum insuper adiciamus terminum ξt , existente ξ quantitate quantumuis magna. Quoniam enim hinc neque formulae $(\frac{ds}{dt})$ neque huius $(\frac{d \frac{ds}{dt}}{dt})$ valor immutatur, aequationi propositae perinde satisfat. Inde autem tantum celeritates Γ et u quantitate constante ξ augebuntur, totumque negotium eo redibit, ac si totus tubus cum aëre incluso motu vniformi deferretur vel si toti massae aereae in tubo motus quidam vniformis ab initio esset impressus, qui deinceps perpetuo conseruaretur. Cum autem phaenomena hinc oriunda

oriunda per se sint perspicua, operae non est pretium huiusmodi casus seorsim pertractare.

Scholion 2.

12 Quod si ratio functionum Γ et Δ pro lubitu assumatur, inde status initialis facile definitur difficilius autem erit vicissim ex statu initiali dato indolem earum functionum elicere. Quoniam autem satisfieri oportet huic conditioni

$$0 = f d S / \frac{Q}{B} + \alpha \Gamma : S + \alpha \Delta : S$$

statim atque altera functio $\Gamma : S$ fuerit assumpta hinc simul altera definitur, id quod ex illa ratione quae functiones per applicatas curvarum repraesentari solent clarissime hoc modo ostenditur. Referat recta AB tubi longitudinem in qua capiatur abscissa $AS = S$, super ea construat lineam curvam DQE , cuius sit applicata $SQ = f d S / \frac{Q}{B}$, tum vero pro lubitu alia curva FGG , cuius applicata sit $S\Gamma = \alpha \Gamma : S$. Iam infra axem AB construat novam curvam $H\Delta I$ hac lege ut vbique sit eius applicata $S\Delta = SQ + S\Gamma$, eritque $S\Delta = -\alpha \Delta : S$; sicque hoc modo ex binis prioribus curvis haec tertia functionem $\Delta : S$ referens construetur. Hinc autem porro celeritas aëris in statu initiali pro quovis loco S facile innotescet ex hac aequatione:

$$\gamma \sqrt{\frac{b}{g a}} = \alpha \Gamma' : S - \alpha \Delta' : S$$

quandoquidem est

$$\alpha \Gamma' : S = \frac{d. S \Gamma}{d. A S} \text{ et } \alpha \Delta' : S = \frac{d. S \Delta}{d. A S}$$

O o 2

ita

Tab. IV.
Fig. 71.

ita ut sit

$$\Upsilon \vee \frac{b}{g^a} = \frac{d(6\Upsilon + S\Delta)}{dAS} = \frac{dF\Delta}{dAS},$$

sicque tangentibus ducentis facile assignatur. Quando autem vicissim celeritas Υ in singulis locis S pro statu initiali datur, quomodo inde vicissim ambas curvas FG et $H\Delta$ definiri oporteat, in sequente problemate inuestigabimus.

Problema 69.

13. Datis in statu initiali pro quouis tubi loco S tam aëris densitate Q quam celeritate Υ in plagam SB directa, clauso inde tempore t definire statum et motum aëris in tubo, siquidem status initialis valde parum a statu aequilibrii fuerit diuersus.

Solutio.

Tab. IV.
Fig. 72. Totum negotium iam eo est perductum, ut indeles functionum Γ et Δ ex his duabus aequationibus determinetur:

$$0 = f dS / \frac{Q}{B} + a \Gamma : S + a \Delta : S \text{ et}$$

$$\Upsilon \vee \frac{b}{g^a} = a \Gamma' : S - a \Delta' : S$$

Iam prior differentiatia praebet

$$- / \frac{Q}{B} = a \Gamma' : S + a \Delta' : S$$

ex qua cum altera combinata deducimus:

$$a \Gamma' : S = \frac{1}{2} \Upsilon \vee \frac{b}{g^a} - \frac{1}{2} / \frac{Q}{B} \text{ et}$$

$$a \Delta' : S = - \frac{1}{2} \Upsilon \vee \frac{b}{g^a} - \frac{1}{2} / \frac{Q}{B}.$$

quos

quos valores sequenti modo construere licebit. Ex data in puncto S densitate Q valde parum a densitate B quae in aequilibrio subsistit, discrepante, colligatur $I \frac{Q}{B}$ pro quo summissa sufficiet $\frac{Q}{B} - B$ hincque describatur super axe A B linea curva C Q D, et cuique abscissae AS = S conveniat applicata SQ = $I \frac{Q}{B} - \frac{Q}{B} - B$. Deinde cum etiam detur celeritas in S, qua vno minuto secundo conficiatur spatium = Y, constituatur in S applicata SY = $Y \sqrt{\frac{B}{2g}}$ sicque describatur curva E Y F. His iam duabus lineis constructis C Q D et E Y F super eodem axe AB duae novae lineae formentur primo scilicet linea G T H supra axem A B sumendo applicatas ST = $\frac{1}{2} SY - \frac{1}{2} SQ$, tum vero linea I Δ K infra axem sumendo applicatas S Δ = $\frac{1}{2} SY + \frac{1}{2} SQ$; quo facto erit αΓ': S = ST et αΔ': S = -S Δ; hincque integralia per areas exhibendo:

Tab. IV.

Fig. 72.

$$\alpha \Gamma: S = A G S T \text{ et } \alpha \Delta: S = -A I S \Delta$$

Per binas autem solas superiores curvas (fig. 72) habebimus:

$$\alpha \Gamma': S = \frac{1}{2}(SY - SQ); \alpha \Delta': S = -\frac{1}{2}(SY + SQ)$$

$$\alpha \Gamma: S = \frac{1}{2}(AEST - ACSQ); \alpha \Delta: S = -\frac{1}{2}(AEST + ACSQ)$$

Iam elapso tempore quocunque t, minorum secundorum in axe AB utrinque a puncto S capiatur spatium ST = St = $t \sqrt{\frac{2g}{B}}$, ut sit AT = S + $t \sqrt{\frac{2g}{B}}$ et A t = S - $t \sqrt{\frac{2g}{B}}$ hincque evidens est fore

Tab. IV.

Fig. 72.

$$\alpha \Gamma': (S + t \sqrt{\frac{g a}{b}}) = \frac{1}{2} (T N - T M)$$

$$\alpha \Delta': (S - t \sqrt{\frac{g a}{b}}) = -\frac{1}{2} (t n + t m)$$

$$\alpha \Gamma: (S + t \sqrt{\frac{g a}{b}}) = \frac{1}{2} (A E T N - A C T M)$$

$$\alpha \Delta: (S - t \sqrt{\frac{g a}{b}}) = -\frac{1}{2} (A E t n + A C t m)$$

His inuentis post hoc tempus $= t$ particula aëris, quae initio erat in S , nunc erit translata in tubi locum s ut sit

$$S s = A C S Q + \frac{1}{2} A E T N - \frac{1}{2} A C T M - \frac{1}{2} A E t n - \frac{1}{2} A C t m$$

quae spatia rediguntur ad hanc formam:

$$S s = \frac{1}{2} T N t n - \frac{1}{2} S Q T M + \frac{1}{2} S Q t m$$

Deinde aëris particulae, quae nunc in s versatur densitas inuenta $q = \frac{Q}{(\frac{d s}{d t})}$, formulis autem supra erutis ad figuram relatis fit

$$(\frac{d s}{d t}) = 1 + S Q + \frac{1}{2} T N - \frac{1}{2} T M - \frac{1}{2} t n - \frac{1}{2} t m$$

cuius expressionis membra posteriora cum prae unitate sint minima erit proxime

$$q = Q (1 - S Q - \frac{1}{2} T N + \frac{1}{2} T M + \frac{1}{2} t n + \frac{1}{2} t m)$$

Denique pro motu quo haec particula iam agitabitur, eius celeritas secundum directionem $s B$ erit

$$v = \frac{1}{2} (T N - T M + t n + t m) \sqrt{\frac{g a}{b}}$$

Coroll. 1.

14. Data ergo agitatione, qua aër in tubo contentus ab initio de statu aequilibrîi fuerit perturbatus,

batus, et quae per binas lineas CQD et EYF repraesentatur, deinceps ad quoduis tempus translatio, densitas et motus cuiusque aëris particulae in tubo assignari poterit

Coroll. 2.

15. Si initio aëris aequilibrium prorsus non fuerit turbatum, ut ubique fuerit $Q = B$ et motus nullus seu $Y = 0$, tum binae lineae CQD et EYF fient rectae et in ipsum axem AB incident. Cum igitur tam omnes areae quam applicatae evanescent nulla mutatio neque in loco neque densitate singularum particularum orietur, ideoque aequilibrium perseverabit.

Coroll. 3.

16. Si initio densitati naturali tantum mutatio quaedam sine ullo motu fuerit inducta, linea EYF in rectam AB incidet, indeque fiet:

$$Ss = -\frac{1}{2}SQTM + \frac{1}{2}SQsm; \text{ tum vero } \\ q = Q(1 - SQ + \frac{1}{2}TM + \frac{1}{2}sm) \text{ et } v = \frac{1}{2}(sm - TM)\sqrt{\frac{g}{b}}.$$

Coroll. 4.

17. Si initio aëri in tubo motus quicunque fuerit impressus neque simul densitas primo saltem instanti ullam mutationem fuerit passa, linea CQD cum axe congruet, et pro agitatione sequente ad quoduis tempus t habebitur:

$$Ss = \frac{1}{2}TNsn; \quad q = Q(1 - \frac{1}{2}TN + \frac{1}{2}sn) \text{ et } v = \frac{1}{2}(TN + sm)\sqrt{\frac{g}{b}}.$$

Scho-

Scholion. 1.

18. Obseruari hic oportet binarum nostrarum curuarum CQD et EYF applicatas non quantitatibus linearibus sed numeris absolutis exponi, ex quo earum constructio postulat, ut linea quaedam recta ad libitum assumta pro unitate accipiat; ex qua deinceps quantitas singularum applicatarum debite determinetur; eam ergo rectam tantam statui conveniet, ut mutationes etiam minimae aëri inductae satis sensibilibiter in figura referantur. Hinc meminisse iuuabit, quatenam litterae in calculum introductae numeros absolutos, et quatenam quantitates lineares significant. Primum autem tempus t utpote in minutis secundis exprimendum numerum denotat absolutum tum vero etiam litterae b , B , Q et q , quibus densitates indicamus, quoniam referuntur ad certam quandam densitatem unitate signatam, qua in pressionibus definiendis utitur, sunt numeri absoluti. Reliquae litterae in calculum ingredientibus sunt quantitates lineares; primo namque littera g denotat altitudinem qua graua vno minuto secundo delabuntur, quae aestimatur 15,625 ped. Rhen. litterae vero Y et y pro celeritatibus usurpatae spatia denotant linearia, quae his celeritatibus vno minuto secundo percurrerentur: litterae denique pro pressionibus introductae a et p altitudines, siquae etiam quantitates lineares significant. His enim denotatur altitudo columnae materiae uniformi, cuius densitas ponitur $= 1$; constantis, cuius pondus aequale est pres-

pressioni parem basin vrgenti. Cum igitur nostrarum curvarum, quarum alteram C Q D scalam densitatum, alteram E Y F scalam celeritatum appellare licet, applicatae sint numeri absoluti, abscissae vero quantitates lineares, areae iis comprehensae quoque erunt quantitates lineares. His animaduversis perspicuum est formulam ex tempore formatam $\sqrt{\frac{g}{b}}$ esse quantitatem linearem, ut abscissae $AS = S$ addi ab eaque subtrahi possit; tum vero expressionem pro translatione Ss inuentam esse quantitatem linearem perinde atque eam, quae pro celeritate y est exhibita; rationem denique densitatum q et Q numero absoluto exprimi vti rei natura postulat. Postremo probe teneatur vtramque scalam ita construui debere ut si initio ad s fuerit densitas $= Q$ et celeritas $= Y$ pro scala densitatum capi debeat applicata

$$SQ = \sqrt{\frac{Q}{b}} = \frac{Q - b}{b}$$

pro scala celeritatum vero applicata

$$SY = Y \sqrt{\frac{b}{g}}$$

Scholion 2.

19. Commodissime hic vsu venisse mirandum est, quod ex datis binis scalis densitatum et celeritatum ad statum initialem relatis tam expedite ad quoduis tempus elapsum aëris agitatio inde orta assignari possit, cum tamen quaestio haec primo intuitu vires analysis superare sit visa, atque etiam

Tom. XVI. Nou. Comm.

P p

certo

certo superaret, nisi agitationes quam minimae essent assumtae; praeterea vero etiam hypothesis, qua tubo vbiq; eandem amplitudinem tribuimus, plurimum ad hanc commodam solutionem contulisse est censenda, quandoquidem pro tubis inaequaliter amplis grauissima adhuc obstacula occurrunt. Quanquam autem haec solutio ad motus speciem maxime specialem restringitur, in inuestigationibus tamen physicis amplissimum praestat vsum, indeque iam felicissimo successu duo phaenomena, quae adhuc maxime fuerunt abscondita frustra a naturae scrutatoribus tractata, si solum Geometram acutissimam Taurinensem *Ludovicum la Grange* excipiamus, explicari possunt. Alterum phaenomenon consistit in propagatione soni, vbi explicari oportet quomodo, dum aëri vno in loco quaedam agitatio minima inducitur, inde similes agitationes successiue ad maximas distantias proferantur. Alterum vero phaenomenon, in quo multo adhuc minus ab auctoribus est praestitum versatur in explicatione soni, quem tibiae edunt inflatae, cuius quidem olim pulchra a me similitudo cum cordis vibrantibus est obseruata; nullo autem modo ipsam aëris agitationem, qua hi soni producuntur, definire licuit. Vtrumque igitur phaenomenon, quatenus in tubis aequaliter amplis producit, deinceps omni cura sum persecuturus.

Scholion 3.

20. Antequam aptem hoc opus aggrediar circa ambas scalas densitatum et celeritatum, earumque

que continuationem, quaedam circumstantiae maximi momenti sunt euoluendae. Primo quidem obseruo si tubus vtrunque in infinitum extendatur, solutionis nostrae applicationem nulli difficultati esse subiectam; quia enim tum pro statu initiali ambae scalae per se vtrunque in infinitum continuantur; elapso quantumvis magno tempore t , si a quouis axis puncto S vtrunque abscindantur intervalla $ST = S; = t \sqrt{\frac{g}{b}}$, his punctis T et s in vtraque scala determinatae semper respondebunt applicatae, ex quibus status aëris vbique in tubo ad hoc tempus definiri poterit. Sin autem tubus vel vtrunque vel ex altera saltem parte fuerit terminatus, ibique siue clausus siue apertus, ibidem quoque ambae scalae ad statum aëris initialem extractae terminentur necesse est; hinc necessario eueniet vt tempore labente intervalla ST et $S;$ vel alterum saltem vltra scalarum terminum cadat, ita vt tum ipsae scalae nullas plane suppedient applicatas, ex quibus aëris status ad haec tempora definiri queat. Cum igitur solutionis datae natura semper postulet, vt scalae vtrunque in infinitum sint continuatae, etiamsi tubus finitam habeat longitudinem maximum solutionis momentum in eo versatur, vt definiamus, qua lege his casibus vtramque scalam continuari oporteat, vt inde vera solutio eliciatur. Atque idem quoque praestari debbit, quando tubus habet figuram in se redeuntem; quanquam enim hic tubi directricem vt lineam rectam repraesento, tamen iam

fatis est ostensum curvaturam ideo non excludi, quoniam hinc motus non alteratur.

Problema 70.

21. Si tubus aequaliter amplius in puncto B terminetur, ibique sit apertus, utramque scalam tum densitatum quam celeritatum quae ex statu initiali super eo fuerit extructa, ultra punctum B super axe AB producto continuare.

Solutio.

Quia tubus in B est apertus ideoque aër in tubo contentus cum aëre externo communicatur, in ipsa tubi extremitate B pressio aëris interni a pressione externi diuersa esse nequit, quamobrem etiam densitas aëris interni in hoc loco conuenire debet cum densitate externi, quae si vocetur $=B$, erit non solum initio sed etiam perpetuo pro hac tubi extremitate B tam densitas initialis $Q=B$ quam

Tab. V. elapso tempore quocunque $q=B$. Pro scala ergo
Fig. 74 densitatum CQD ex statu initiali formata in extremitate B, ob $Q=B$ fit applicata $BD=0$. Sit igitur AB tubus propositus in B terminatus et apertus ultra A autem utcumque extensus, atque ex statu initiali formata sit scala densitatum CmB in B cum axe AB concurrens; scala autem celeritatum sit EnF . Quia iam elapso tempore quocunque $=t$ densitas aëris ad B perpetuo debet esse eadem $=B$, primum obseruo hanc conditionem perinde locum habere

habere debere, quaecunque fuerit scala celeritatum; hoc est siue aëri in tubo impressus fuerit initio quispiam motus, siue tota agitatio tantum in perturbatione celeritatis subsisterit. Quamquam autem haec proprietas illi aëris elemento, quod quouis tempore in orificio BB versatur, conuenit, tamen quia translatio singulorum elementorum est quam minima, etiam illi elemento, quod initio orificium BB occupauerat, constanter tribui potest. Effluerit ergo tempus quodcunque $=t$ at a puncto B sumto vtriusque interuallo $Bt = BT = t\sqrt{\frac{2ag}{b}}$, continuatio scalarum ita esse debet comparata, vt fiat $q = Q = B$, quare ob $SQ = 0$ hoc casu fieri oportet

$$-\frac{1}{2}TN + \frac{1}{2}TM + \frac{1}{2}tn + \frac{1}{2}tm = 0$$

$$\text{seu } TM + tm - TN + tn = 0,$$

quod cum euenire necesse sit quaecunque fuerit scala celeritatum seorsum debet esse

$$\text{et } TM + tm = 0 \text{ et } TN - tn = 0.$$

Ex priori conditione patet scalam densitatum CmB ita ultra B continuari debere vt curua BMe similis fiat et aequalis curuae BmC , sed ad partem axis contrariam disponatur. Deinde pro scala celeritatum continuatio FNc pariter similis et aequalis statuatur curuae FnE simulque ad eandem axis partem posita, hacque lege vtramque scalam densitatum et celeritatum ultra terminum B continuari conuenit.

Coroll. 1.

22. Si tubus ex parte A in infinitum extendatur, hac constructione utraque scala B in infinitum continuabitur. At si tubus in A quoque sit terminatus, tum hoc modo scalas non ultra terminum a existente $Ba = AB$ continuari licebit. Quia vero similis continuatio ultra A institui debet hac ratione utrinque in infinitum progredi poterimus.

Coroll. 2.

23. In hac ergo scalarum continuatione neutiquam earum indoles interna spectatur, neque si eae fuerint curvae algebraicae vel aequatione quadam comprehensae continuatio ex hac aequatione est petenda, sed sola figura externa eiusue ductus continuationem, qua hic opus est suppeditat. Atque regula hic data perinde est observanda, siue scalae illae sint in se lineae continuae, siue irregulares cuiusmodi libero manus ductu describuntur.

Scholion.

24. Haec circumstantia eo maiore est attentione digna, quod vulgo in analysi nullae aliae lineae curvae, nisi quae certa quadam aequatione earum naturam exprimente contineantur, admitti, lineaeque discontinuae nulla huiusmodi lege comprehensae inde penitus excludi solent. Analysis enim tam finitorum, quam ea pars infinitorum quae adhuc potissimum est exculta, utique ad nullas alias
lineas

lineas curvas, nisi quae certa continuitatis lege sint complexae, applicari potest, quandoquidem his casibus aequatio earum naturam exprimens semper in calculum introduci debet; neque ante lineis discontinuis, nulla certa lege ductis locus in Analyysi concedi potuit, quam sublimior Analyseos infinitorum pars, quae circa functiones duarum pluriumue variabilium versatur excoli est coepta, cuius equidem naturam primus ita comparatam esse observavi, ut huiusmodi lineae discontinuae ad eam aequae referri debeant, atque lineae curvae regulares certa quadam aequatione expressae, neque adeo his posterioribus vlla praerogativa sit tribuenda; cum hic earum quasi interna natura neutiquam spectetur. Quare si forte linea CmB fuerit arcus circuli in nostro instituto ad circuli naturam plane non respicitur, sed in continuatione illi alius arcus aequalis BMc inverso situ adiungitur, prorsus uti fieri deberet, si linea CmB nulla certa ratione esset ducta, quod etiam de altera scala EnF est tenendum, cuius continuatio FNc illi semper similis et aequalis statui debet, etiamsi forte illius natura longe aliam continuationem inuoluat. Quoniam haec linearum curvarum consideratio prorsus est nova, iisque qui huius calculi generi nondum sunt assueti, a receptis Analyseos principiis maxime abhorrere videri solet, hanc circumstantiam saepius inculcasse minime superfluum est iudicandum.

Pro-

Problema 71.

Tab. V. 25. Si tubus aequaliter amplius in B terminetur, ibique sit clausus, utramque scalam tam densitatum quam celeritatum ad statum initialem constructum, ultra terminum B super axe AB producto continuare.

Solutio.

Quia tubus AB in B est clausus in hac ipsa extremitate aëri in tubo contento nullus plane motus inesse potest, aërisque ultimum stratum operculo BB adiacens perpetuo in quiete perseverare debet, ex quo non solum in initio sed etiam omni tempore celeritas aëris in puncto B nihilo debet esse aequalis. Hinc scalae celeritatum EYF (fig. 72.) extremum punctum F in axis punctum B incidat, necesse est; habeatque propterea haec scala figuram ENB scala vero densitatum sit CMD. Cum nunc elapso tempore quocunque t formula pro celeritate supra inuenta, si ad punctum B applicetur, semper evanescere debeat; idque pro omni scala densitatum, continuationem viriusque scalae ad hoc requisitum accommodari oportet. Super axe ergo utrinque a termino B capiantur intervalla aequalia $BT = BT = t \sqrt{\frac{2g}{\rho}}$, et quia celeritas in puncto B supra ita exprimi est inuenta, ut esset:

$$u = \frac{1}{2} (TN + tN - TM + tm) \sqrt{\frac{2g}{\rho}}$$

-0.1

hinc

hinc duplicem aequationem elicimus, alteram pro scala celeritatum $TN + tn = 0$ alteram pro scala densitatum $TM = tm$; vnde discimus scalam celeritatum ENB ita continuari debere vt sit $TN = -tn$, ideoque partem continuatam BNe similem fore et aequalem scalae BnE , ad contrariam autem axis partem dispositam. Cum autem pro scala densitatum sit $TM = tm$, eius continuatio DMc omnino similis et aequalis erit lineae DmC , ad eandem axis partes disposita. Vtraque scilicet similitudo refertur ad punctum B ita vt inde sumtis vtrinque abscissis aequalibus $BT = Bt$, in vtraque scala etiam applicatae fiant aequales $TN = tn$ et $TM = tm$, illa quidem ad contrariam haec vero eandem axis partem sita.

Coroll. 1.

26. Prout ergo tubus in B fuerit vel apertus vel clausus vtriusque scalae continuatio diuerso quidem ratione axis sed pari modo respectu ipsarum applicatarum institui debet. Illo scilicet casu scalae densitatum, hoc vero scalae celeritatum continuatio ad contrariam axis partem est disponenda.

Coroll. 2.

27. Quoniam casu quo tubus in BB est clausus, aeris ad B siti celeritas semper est nulla, hinc sponte sequitur eum nunquam de loco suo recedere: vnde translationis spatium Ss supra in genere defini-

Tom. XVI. Nou. Comm.

Qq

tum

tum hic quoque euanescere debet. Puncto autem S in B translato fit vtique.

$SJ = \frac{1}{2}TN:n - \frac{1}{2}BD:TM + \frac{1}{2}BD:m + = \frac{1}{2}TN:n = 0$
quia est $TN:n = B:n - BT:N = 0$, area enim BTN in contrariam axis partem cadens negative capi debet.

Problema 72.

28. Si tubus aequaliter amplius fuerit in se rediens, quamcunque habuerit figuram, vtramque scalam densitatum et celeritatum ad statum initialem extractam vtrinque in infinitum continuare.

Solutio.

Tab. V.
Fig. 76.

Longitudo tubi in directum extensa in tabula repraesentetur linea recta ASA', ita vt punctum A' tota perimetro percurfa in punctum A recidere sit concipiendum. Extracta ergo super hac linea ASA' tam scala densitatum CQC' quam scala celeritatum EYE' ita vt si in S initio fuerit densitas = Q et celeritas secundum directionem SA' = Y sint applicatae $SQ = \frac{1}{2} \frac{Q}{B} = \frac{Q}{2B}$ et $SY = Y \sqrt{\frac{b}{2g}}$ evidens est in puncto A' esse debere A'C' = AC et A'E' = AE quandoquidem punctum A' cum puncto A conuenit. Simili modo tubum pluries percurrento pro singulis reuolutionibus repetitis in axe capiantur intervalla A'A'', A''A''', A'''A'''' etc. tubi longitudini AA' aequalia, et quia singula puncta A, A', A'', A''', A'''' etc. reuera idem tubi punctum A re-

A repræsentant, continuatio ambarum scalarum ita debet esse comparata, vt applicatæ in omnibus his punctis sint eadem. Idem quoque tenendum est de omnibus punctis S, S', S'', S''' etc. sumtis interuallis $AS = A'S' = A''S'' = A'''S'''$ etc. quæ omnia cum vnicum tubi punctum exhibere sint censenda, in omnibus quoque ambae applicatæ congruere debent. Quare quæcunque fuerint ambae curvæ CQC' et EYE' eadem continuo super axe prolongato repetitæ repræsententur, quod pariter super altera axis prolongatione in infinitum fieri est concipiendum. Cum autem hoc modo ambae scalæ vtrinq; in infinitum fuerint continuatæ, manifestum est si pro quouis tempore elapso aëris elementi, quod initio fuerat in S secundum præcepta supra data tam translatio Ss quam eius densitas et celeritas Y definiatur eodem prodituros esse valores, ac si eadem inuestigatio pro punctis S', S'', S''' etc. institueretur.

Coroll. 1.

29. Neque ergo hoc casu ad naturalem vtriusque scalæ CQC' et EYE' continuationem, quam ex sua propria indole essent habituræ, est respiciendum, sed vtraque continuo eadem super axe AA' vtrinq; producto construi debet.

Coroll. 2.

30. Hæc autem vtriusque scalæ continuatio vtrinq; in infinitum facta tam hoc casu quam præceden-

Qq 2

cedentibus ideo est necessaria ut elapso tempore quantumvis magno t a quouis puncto S vtrunque tanta spatia $t V \frac{1}{2} g$ abscindi queant, in iisque punctis applicatae respondentes reperiantur.

CAPVT II.

DE

PROPAGATIONE PULSVVM AERIS IN
TVBIS AEQUALITER AMPLIS AD SONI
GENERATIONEM ET PROPAGATIO-
NEM ILLUSTRANDAM.

Problema 73.

31. In tubo vtrunque in infinitum extenso si alicubi in spatio minimo excitetur pulsus, quo aër vtcunque de statu aequilibrîi deturbetur, huius agitationis propagationem ad quodvis tempus definire.

Solutio.

Tab. V. Sit AB tubi directrix in directum extensa et
Fig. 77. in spatiolo $GH = b$ aëri in tubo contento cuiusmodi agitatio inducta sit ut linea $GM'nH$ exhibeat scalam densitatum, linea vero $GN'nH$ scalam celeritatum, cuius applicatae $t n$, quatenus in figura supra axem AB cadunt motum versus B indicent il-
lius

lius vero curvae applicatae $t m$ supra axem cadentes maiorem solito densitatem, contrariae vero $T M$ minorem solito densitatem ostendant, quam scilicet status aequi-librii postulat vtrunque autem ultra hoc intervallum GH aër etiam nunc in quiete versetur; ita ut ibi ambae scalae in ipsum axem incidant, earumque applicatae evanescant; quam ob causam etiam vtramque scalam in terminis G et H cum axe convenientes feci. Hoc statu initiali constituto consideremus locum tubi quercunque S versus B situm, et quia ad aeris hoc loco contenti agitationem inveniendam pro tempore quovis t ab initio elapsi vtrunque a puncto S in axe abscindi oportet intervalla $= t \sqrt{\frac{2ga}{b}}$; ante omnia observo quamdiu fuerit $t \sqrt{\frac{2ga}{b}} < HS$ nullam agitationem ad punctum S pervenire, ibique adeo aequilibrium esse futurum donec tempus ab initio elapsum evadat $= HS \sqrt{\frac{b}{2ga}}$, ac tum denuin aërem in S agitationem esse sentiendum. Elapsum ergo iam sit maius tempus t capiaturque intervallum $St = t \sqrt{\frac{2ga}{b}}$, ad alteram enim partem non opus est aequale spatium ST abscindi, quia ibi scalae in axem incidunt. Nunc igitur aeris elementum ex S translatum erit in s , ut sit spatium $Ss = \frac{1}{2} H t n + \frac{1}{2} H t m$, tum vero densitas huius elementi erit $q = B(1 + \frac{1}{2} t m + \frac{1}{2} t n)$ et celeritas versus B tendens $v = \frac{1}{2} (t m + t n) \sqrt{\frac{2ga}{b}}$, postquam autem elapsum fuerit tempus $t = SG \sqrt{\frac{b}{2ga}}$, ob $t m = 0$, et $t n = 0$ eius motus iterum extinguitur

guitur densitasque naturalis B restituitur, in quo statu deinceps perpetuo perseverabit.

Simili modo in altera tubi parte res se habebit, punctumque S' quiescet donec elapsum fuerit tempus $t = S' G \sqrt{\frac{b}{2ga}}$, deinceps autem elapso tempore $t = S' T' \sqrt{\frac{b}{2ga}}$, translatio fiet per spatium $S' s' = \frac{1}{2} G T' N' + \frac{1}{2} G T' M'$ quia in figura applicata $T' M'$ infra axem cadit; tum autem densitas erit $q = B(1 - \frac{1}{2} T' N' - \frac{1}{2} T' M')$ et celeritas versus B directa $v = \frac{1}{2} (T' N' + T' M') \sqrt{\frac{2ga}{b}}$. Statim autem ac tempus $t = S' H \sqrt{\frac{b}{2ga}}$ effluxerit aer in S' in aequilibrium restituetur, omniaque aeris elementa non diutius agitationi erunt subiecta quam durante tempore $= GH \sqrt{\frac{b}{2ga}} = \frac{b \sqrt{b}}{\sqrt{2ga}}$ min. sec. Manifestum ergo est, quomodo pulsus initio in intervallo GH excitatus labente tempore vtrunque in tubo propagetur.

Coroll. 1.

32. Posita ergo distantia $HS = s$, pulsus initio in spatio GH excitatus ad S vsque propagatur tempore $= \frac{s \sqrt{b}}{\sqrt{2ga}}$ min. sec. vnde patet propagationem esse vniformem et tempore vnus minuti secundi fieri per spatium $= \sqrt{\frac{2ga}{b}}$: quod si densitas mercurii fumatur pro vnitae, vt sit a altitudo barometri quasi $2\frac{1}{2}$ ped. lond. erit densitas aeris $b = \frac{1}{14.735} = \frac{1}{10700}$, ob $g = 16$ ped. lond. fiet circiter 916 ped.

Coroll.

Coroll. 2.

33. Ex solutione etiam intelligitur, cuiusmodi agitatione particula aeris S concitetur, primo nempe propelletur per spatium $Ss = \frac{1}{2} H \tau n + \frac{1}{2} H \tau m$ deinde densitatem obtinebit $q = B(1 + \frac{1}{2} \tau m + \frac{1}{2} \tau n)$ ac tertio celeritatem versus B. acquirat $v = \frac{1}{2}(\tau n + \tau m) \sqrt{\frac{2g}{b}}$, unde patet celeritatem hanc excessui densitatis supra densitatem naturalem esse proportionalem; quandoquidem est $\frac{q-B}{B} = v \sqrt{\frac{b}{2g}}$.

Coroll. 3.

34. Imprimis autem hic notari meretur pulsus in spatio GH excitati propagationem in plagam A non necessario aequae fore atque in plagam B. Si enim in pulsu initiali scala densitatum congrueret cum scala celeritatum ut esset $T'M' = T'N'$ et $\tau m = \tau n$, tum propagatio versus A prorsus evanesceret, altera vero versus B maxime vigeret.

Scholion 1.

35. Hac pulsuum promotione soni propagatio pulcherrime illustratur; quocunque enim modo sonus producat, semper copia quaedam aëris in spatio GH contenta de statu aequilibræ deturbatur, siue in sola densitate siue sola celeritate siue vtraque coniunctim ipsi mutatio inducatur. Quocunque autem modo hoc eveniat propagatio huius pulsus vtrunque in tubo pari absoluitur celeritate, etiamsi forte in alteram tubi plagam multo sit vehementior quam

quam in alteram. Id autem tantum hic oblici, potest, quod experientia spatium per quod sonus intervallo unius minuti secundi propagatur multo maius, scilicet 1040 ped. lond. exhibeat; quam nostra Theoria ostendit. Cuius phaenomeni causa vel in eo est posita quod hic in calculo pulsus tantum minimos admittimus, ii autem soni, quorum propagatio per experimenta est definita, tam fuerint vehementes, ut calculus noster ad eos non debeat accommodari; ideoque adhuc in dubio relinquatur annon soni maxime debiles ea ipsa celeritate quam inuenimus, reuera progrediantur. Vel si etiam hic experientia refragetur, suspicari liceret, accelerationem hanc ingenti particularum solidarum in aëre volantium copiae tribui debere, dum enim agitatio ad vnum terminum huiusmodi particulae pertingit, eodem instanti etiam terminus oppositus impellitur neque tempore opus foret ad sonum per substantiam harum particularum propulsandum. Huic certe circumstantiae, quod hic sonum in tubo includimus hic dissensus ab experientia tribui nequit, quoniam infra videbimus etiam in aëre undique aperto eandem celeritatem pro soni propagatione inveniri. Interim tamen hic dissensus non obstat, quo minus hinc tam productio quam propagatio soni recte explicari sit censenda. Fortasse etiam rationem huius dissensus in eo quaeri licebit quod aërem tantum 750 vicibus rariorem statuimus aqua; si enim ei raritatem 966 vicibus maiorem tribuamus, calculus cum experientia pulcre consentiet.

Scho-

Scholion 2.

36. Quoniam elapso tempore $t = S t V \frac{h}{\frac{1}{2} K a}$ agitatio puncti S ita per ambas applicatas $t m$ et $t n$ scalarum definitur, ut sit ibi densitas $q = B(1 + \frac{1}{2} t m + \frac{1}{2} t n)$ et celeritas $v = \frac{1}{2} (t m + t n) V \frac{2 K a}{b}$ evidens est totum pulsum initialem GH hoc tempore transferri in spatium $Y X = G H$, ut sit $H X = t V \frac{2 K a}{b}$, reliquo aëre in aequilibrio existente, praeterquam in simili spatio ad alteram partem in tubo sumto. In hoc autem spatio $Y X$ agitatio per vnicam scalam $Y Z X$ ita formatam ut applicata $S Z$ sit semisummae illarum $t m + t n$ aequalis, repraesentabitur quippe quae eadem simili modo, quo in pulsu initiali et densitatem et celeritatem in S exhibebit, cum iam pro puncto S sit $q = B(1 + S Z)$ seu $\frac{1}{2} S Z$, et $v = S Z V \frac{2 K a}{b}$, hincque translatio elementi S ita determinetur ut sit $S h = a e a c X S Z$. Haec ergo in qua scala simplex $Y Z X$ ex binis initialibus formata incoleit pulsum versus B propagatorum declarat unde etiam diuersae sonorum qualitates explicari debebunt. Primum autem hic distinguitur latitudo pulsum $Y X = H G$ quae prout fuerit maior minorem, sonus inde centam incoleit habebit. Deinde ex ipsa curuae $Y Z X$ figura prout vel maiorem minoremue habuerit amplitudinem $S Z$, vel tota ad eandem axis partem vel partim supra axem partim infra eum fuerit sita, vel alia quacunque ratione fuerit affecta, sonus quoque diuerso modo sensum auditus afficiet. Ab amplitudine

Tom. XVI. Nou. Comm.

R r

qui-

quidem SZ fortitudo seu vehementia soni pendere videtur quales autem qualitates reliquis proprietatibus figurae YZ X respondeant haud satis liquet; id saltem perspicuum est infinitam fere sonorum varietatem hinc explicari debere; cuiusmodi sunt soni diuersas litteras vocales *a, e, i, o, u* exprimentes, aliaeque innumerae differentiae. Deinde etiam ratio singularis phaenomeni adhuc non explicati hinc intelligitur, quomodo fiat, vt si agitatio YZ X tanquam initialis consideretur, ea tantum in vnam plagam B vltterius propagetur, neque vllos novos pulsus retro versus A excitet. Videmus enim si ipse pulsus initialis GH iam ita esset comparatus, vt binae scalae inter se conuenirent, quemadmodum fit in pulsibus propagatis, tum etiam nullam propagationem in plagam A esse secuturam. Imprimis etiam hic notandum est, eosdem pulsus propagatos ex infinitis pulsibus initialibus oriri posse, quoniam infinitis modis ex binis scalis diuersis pulsus initialis GH, eadem scala pro pulsibus propagatis YX produci potest, vnde non mirum si saepe diuersae causae similes sonos efficiunt.

Scholion 3.

Tab. V. 37. Haecenus vnicum tantum pulsus sum
Fig. 78. contemplatus neque propterea ad eas sonorum affectiones respexi, quae ex successione et ordine plurium pulsuum nascuntur, quales sunt grauitas et acumen; ex quo fonte soni etiam infinitam varietatem adipiscuntur. Quoniam vero hic non vniuersam

ſum ſonorum doctrinam tradere eſt propoſitum, tantum obſeruo ſi initio non vnus ſed plures pulſus α , β , γ in aëre ſint excitati quemlibet eorum perinde propagari ac ſi reliqui plane abeſſent, neque propterea plures ſonos ſimul excitatos inter ſe confundi. Quod phaenomenon cum alias ſolutu perquam difficile ſit viſum, ex principiis ſtabilitis ſponte ſequitur. Cum enim ſuper directrice AB ambae ſcalae vbique praeterquam in locis α , β , γ cum ipſo axe congruant, ſi locum quemcunque S conſideremus, ad eum elapſo tempore $t = S \gamma V \frac{b}{a g^2}$ ſolus pulſus γ cum ſuis affectionibus propagatur, neque reliqui pulſus α et β quicquam turbant; elapſo autem tempore $t = S \beta V \frac{b}{a g^2}$, quo ille pulſus iam ultra eſt promotus, ad locum S pulſus β cum ſuis affectionibus perſertur, ac deinceps poſt tempus $t = S \alpha V \frac{b}{a g^2}$ pulſus α . Ex quo clariffime intelligitur, quemadmodum plures ſoni vel ſimul vel ſucceſſiue excitati ita ſtatis temporibus ad quemvis locum S proferantur, vt nullus eorum reliquis ſit impedimento, ſed quilibet aequè aërem in S excitet, ac ſi reliqui plane abeſſent. Ceterum quatenus hic pulſus tubo aequaliter amplo incluſos conſideramus; huic cauſae eſt tribuendum, quod ſinguli pulſus propagati perpetuo eandem vim retineant, quantumvis enim punctum S a pulſibus primitiuis diſtans accipiat, pulſus propagati ſemper per ſimilem ſcalam repraeſentantur vnde non ſolum eandem vim ſed etiam eaſdem affectiones retineant neceſſe eſt. Quando autem tales

R r 2

pulſus

pulsus in libero aere quaquaversus propagantur, tum utique videbimus eos in maioribus distantis continuo magis debilitari.

Problema 74.

Tab. V. 38. Si tubus in B sit apertus ex altera parte
Fig. 79. vero A in infinitum extensus, in eoque alicubi GH
pulsus quicumque excitetur, eius propagationem in
tubo definire.

Solutio.

Pro pulsu in spatio GH excitato sit GmH scala
densitatum et GnH scala celeritatum, quarum ergo
utraque extra spatium GH per totum tubum cum
axe confundatur. Quia vero tubus in BB est ter-
minatus et apertus, utriusque scalae continuatio uti
in fig. 74. institui debet: hinc scala densitatum
 $BHmGA$ in partem oppositam inversa fiet
 $BbMga$ scala celeritatum vero $BHnGA$ ad eandem
axis partem circa B inversa dabit continuationem
 $BbNga$. Vnde in tubo pulsus GH propagatio
perinde fiet, ac si extra tubum ad parem ab orificio
BB distantiam similis pulsus gb existeret, scala
densitatum tantum ad alteram axis partem conversa
ita ut sumta abscissa $BT = Bt$, sint applicatae
 $TN = tn$ et $TM = tm$. Nunc igitur videamus
quando et quomodo pulsus in quemvis tubi locum
sit peruenturus, ac primo quidem in orificio BB
aer quiescet, quoad ab initio effluerit tempus $t = BH\sqrt{\frac{b}{2ga}}$;
deinceps

deinceps vero ita agitari incipiet, ut elapso tempore
 $t = B t \sqrt{\frac{b}{2ga}}$ ibi futura sit densitas

$q = B(1 - \frac{1}{2}TN - \frac{1}{2}TM + \frac{1}{2}tn + \frac{1}{2}tm) = B$
 et celeritas

$$v = \frac{1}{2}(TN + TM + tn + tm) \sqrt{\frac{2ga}{b}} = (tn + tm) \sqrt{\frac{2ga}{b}}$$

densitas scilicet ibi nullam mutationem patietur, ce-
 leritas vero versus a eo maior erit, quo maior
 fuerit summa applicatarum tn et tm , quarum tn
 denotat celeritatem versus B directam tm vero den-
 sitatem naturali maiorem in pulsu initiali. Agitatio
 haec aeris in ipso orificio BB durabit per tempus
 $= GH \sqrt{\frac{b}{2ga}}$. Intra tubum autem in S successive
 duae generabuntur agitationes, prior scilicet quando
 pulsus GH eo appellit, indeque elapso tempore
 $t = St \sqrt{\frac{b}{2ga}}$ ibi erit densitas $q = B(1 + \frac{1}{2}tn + \frac{1}{2}tm)$
 et celeritas $v = \frac{1}{2}(tn + tm) \sqrt{\frac{2ga}{b}}$. Deinde vero
 de nouo agitabitur, quando pulsus secundarius bg eo
 transferetur; tempore enim elapso $t = ST \sqrt{\frac{b}{2ga}}$
 ibi fiet densitas

$$q = B(1 - \frac{1}{2}TN - \frac{1}{2}TM) = B(1 - \frac{1}{2}tn - \frac{1}{2}tm)$$

et celeritas $v = \frac{1}{2}(tn + tm) \sqrt{\frac{2ga}{b}}$: in agitatione
 scilicet posteriori densitas eo minor erit naturali,
 quando priori fuerat maior, celeritate existente eadem.
 In ipso autem loco GH postquam pulsus primarius cessa-
 verit elapso tempore $t = Hb \sqrt{\frac{b}{2ga}} = 2BH \sqrt{\frac{b}{2ga}}$
 denuo agitari incipiet, ibique quasi echo prioris per-
 cipietur. In quouis autem tubi loco A pone pulsum

R r 3

pri-

primarium GH eiusmodi duplex agitatio sentietur, ut pro priori elapso tempore $= A t \sqrt{\frac{b}{2ga}}$ ibi sit densitas $q = B(1 - \frac{1}{2} t n + \frac{1}{2} t m)$ celeritas vero $v = \frac{1}{2} (t n - t m) \sqrt{\frac{2ga}{b}}$; pro posteriori vero elapso tempore $= A T \sqrt{\frac{b}{2ga}}$, futura sit densitas $q = B(1 + \frac{1}{2} t n - \frac{1}{2} t m)$ et celeritas $v = \frac{1}{2} (t n - t m) \sqrt{\frac{2ga}{b}}$. Tardius autem pulsus hic posterior ad A pertinet tempore $= 2 B H \sqrt{\frac{b}{2ga}}$. Vnde patet si in pulsu principali ubique esset $t n = t m$ tum versus A nullas plane agitationes excitatum iri, contra vero nullas versus B si fuerit $t n = -t m$.

Coroll. 1.

39. In ipso ergo orificio BB tubi pulsus simplex excitabitur, ibique vnicus sonus exaudietur; in tubo autem ad pulsus locum accedendo duo soni successiue se excipient, quorum posteriorem ut resonantiam prioris spectare licebit; eorumque interuallum eo maius euadet, quo magis ad pulsus principalem GH appropinquemus.

Coroll. 2.

40. In ipso autem pulsus principalis loco GH et post eum versus A binae agitationes eo perlatae interuallo temporis $= 2 B H \sqrt{\frac{b}{2ga}}$ a se inuicem distabunt, quod si fuerit satis notabile posterior prioris quasi *echo* exhibebit.

Coroll.

Coroll. 3.

41. Si initio plures in tubo excitati fuerint pulsus eodem modo atque in praecedente problemate ostendi potest, singulorum propagationem a reliquis minime perturbari, sicque etiam hic plures sonos inuicem non confundi.

Scholion 1.

42. Solutio huius problematis nos praeter ex- Tab. v.
pectationem ad explicationem duorum phaenomeno- Fig. 8a.
rum imprimis memorabilium manuducit, resonantiae
scilicet et *echo*. Primum autem videmus horum
phaenomenorum causam vulgo perperam repercussio-
ni cuiusdam esse adscriptam; cum enim in tubo ad
BB aperto, in altera vero parte ad AA quasi in
infinitum extenso si vspiam in L pulsus seu sonus
excitetur, is nonnisi in orificio BB simplex exau-
diatur; inde vero ad L recedendo, ita duplicetur,
vt intervallum continuo fiat maius primo hic reso-
nantia oritur, tum vero in L et ultra hunc locum
versus A, si modo intervallum LB satis sit magnum
vt tempus, quo a sono eius duplum percurreretur,
sentiri queat, repetitio illius soni exaudietur, cum
tamen hic nulla reflexio cernatur, nisi forte dicere
velimus repercussionem hic in BB fieri ab aere ex-
terno quod tamen ab opinione vulgari plurimum
abhorret. Ita si intervallum BL esset 1040 pedum
sonus in L editus post duo minuta secunda ibi ite-
rum audiretur, et quod hic de tubis est dictum,
quo-

quodammodo etiam ad ambulacra et vicos angustos præcipue si superne fuerint tecti, transferri licet, unde plurimum phaenomenorum in huiusmodi locis obseruatorum ratio reddi poterit.

Scholion 2.

43. Deinde etiam hinc rationem tubarum stentorearum iam quodammodo colligere poterimus, si enim in tubo ad L sonus fuerit excitatus, pulsus inde per orificium B B pari propemodum vi in liberum aërem expellitur, et quia hic non amplius in adolem habet pulsum propagatum, in qua tantum in rivam plagam proferatur etiam quaquaversus expanditur. Quia vero orificium B B non est magis quam pulsus initialis, et longinquo sonus non fortior sed cum quadam resonantia coniunctus audietur. Sin autem tubus ut vulgo fieri solet circa orificium magis dilatetur, nullum est dubium, quin scopo proposito magis satisfiat: quoniam in B B multo maior aëris copia agitur; ideoque in ære externo fortiores pulsus generat. Nunc autem etiam propagationem pulsum in tubis ex altera parte clausis scrutemur.

Problema 75.

Tab. VI. 44. Si Tubus aequaliter amplus ad B B sit
Fig. 81. clausus, ad alteram vero partem A A in infinitum
extensus, et aëre quocunque vetori in spatio G H
pulsus quicunque excitetur, huius pulsus propaga-
tionem per totam tubum investigare.

Solutio.

Solutio.

Si in spatii GH quo pulsus excitatur puncto t fuerit densitas $= Q$ naturali existente $= B$, et celeritas versus B directa $= Y$ statuatur applicatae $tm = l \frac{Q}{B} = \frac{Q}{B} \frac{b}{g^a}$ et $tn = Y \sqrt{\frac{b}{g^a}}$, ut obtineantur scalae densitatum et celeritatum GmH et GnH , quae per reliquam tubi extensionem cum ipso axe convenire sunt censendae. Axe iam AB extra tubum in infinitum prolongato, sumtoque intervallo $BT = Bt$ statuatur applicata $TM = tm$ ad eandem axis partem, ad contrariam vero $TN = tn$, ut sic scalae quasi pulsus secundarii bMg et bNg extruantur. Hinc in ipso termino BB aer tandiu quiescet, quoad uterque pulsus eo propagetur, quod simul continget elapso tempore $= BH \sqrt{\frac{b}{g^a}}$ elapso autem tempore maiore $t = Bt \sqrt{\frac{b}{g^a}}$, eiusmodi in BB agitatio excitabitur, ut futura sit densitas $q = B(1 + \frac{1}{2}TN + \frac{1}{2}TM + \frac{1}{2}tn + \frac{1}{2}tm) = B(1 + tn + tm)$, celeritas vero u nulla quia aer in BB non potest non esse quiescens. In alio vero quouis tubi loco S intra terminum B et locum primi pulsus GH accepto ad eum hic primus pulsus prius appellet, et elapso tempore $t = St \sqrt{\frac{b}{g^a}}$ densitas ibi erit $q = B(1 + \frac{1}{2}tn + \frac{1}{2}tm)$ celeritas vero $u = \frac{1}{2}(tn + tm) \sqrt{\frac{b}{g^a}}$. Deinde vero etiam alter pulsus secundarius gb eo perferetur, et elapso tempore $t = ST \sqrt{\frac{b}{g^a}} = (Bt + BS) \sqrt{\frac{b}{g^a}}$ ibi erit densitas $q = B(1 + \frac{1}{2}tn + \frac{1}{2}tm)$ ut ante celeritas vero $u = -\frac{1}{2}(tn + tm) \sqrt{\frac{b}{g^a}}$,

Tom. XVI. Nou. Comm.

S 6

ill

illi contraria. In ipso autem pulsus GH loco et pone eum versus A ambo pulsus se excipient elapso tempore $\approx BH \sqrt{\frac{b}{2ga}}$; atque in A pro pulsu principali elapso tempore $t = A \sqrt{\frac{b}{2ga}}$ erit densitas $q = B(1 - \frac{1}{2}tn + \frac{1}{2}tm)$ et celeritas $v = \frac{1}{2}(tn - tm) \sqrt{\frac{2ga}{b}}$, qua agitatione finita pro pulsu secundario elapso tempore $t = AT \sqrt{\frac{b}{2ga}} = (At + 2Bt) \sqrt{\frac{b}{2ga}}$ reperiatur ad A densitas $q = B(1 - \frac{1}{2}tn + \frac{1}{2}tm)$ et celeritas $v = -\frac{1}{2}(tn - tm) \sqrt{\frac{2ga}{b}}$. Sicque propagatio pulsus primum excitati GH per totum tubum innotescit.

Coroll. 1.

45. Perinde ergo atque in casu praecedente per spatium BH quaedam soni repetitio percipietur, quae nisi temporis intervallum sentiri queat, pro resonantia erit habenda, in ipso autem loco GH et post eum in A echo eo magis erit distinctum, quo maius fuerit spatium BH .

Coroll. 2.

46. Pulsus autem in spatio GA pone pulsum principalem excitati alius erunt indolis, ac pulsus ante eum in spatio BH producti, fierique adeo potest ut in alterutram plagam nulla propagatio contingat, quoniam altero casu agitatio definitur summa applicatarum $tn + tm$, altero vero earum differentia $tn - tm$.

Scho-

Scholion.

47. Dissimilitudini pulsuum in tubo vtrunque propagatorum experientia neutiquam aduersari est putanda, si in sonis nullum discrimen animaduertitur. Etiam si enim binæ scalæ GmH et GnH ita sint comparatæ, vt prouti vel summa vel differentia applicatarum tm et tn capi debeat, maximum discrimen oriri debeat, tamen perpendendum est, quoniam omnes soni pluribus pulsibus successiue productis constant; qui a motu quodam reciproco nascuntur, eos semper ita esse comparatos, vt alternatim scalas illas contrario modo dispositas præbeant, ideoque si vnus pulsus in vnâ plagam fuerit fortior quam in alteram, contrarium in sequente eueniet, et quoniam sensus nostri singulos discernere non valent, etiam illud discrimen in sensus non cadit. Quod si alterni pulsus in alteram plagam prorsus non propagentur, sonus percipietur vna *octaua* grauior, etiam si corpus sonorum duplo plures edat vibrationes. An autem huiusmodi casus vnquam eueniant, in dubio est relinquendum.

Problema 76.

48. Si in tubo æqualiter amplo et vtrunque aperto $AA BB$ alicubi in t pulsus quicunque ex-
 Tab. VI.
 Fig. 8a.
 citetur, eius propagationem per totum tubum determinare.

S s 2

Solutio.

Solutio.

Et si agitatio semper in quodam spatio, uti
 hactenus assumimus fieri debet, tamen nunc a la-
 titudine pulsus animum abstrahamus, quandoquidem
 ex præcedentibus effectus inde oriundus satis intelli-
 gitur, et agitationem in unico puncto t factam hic
 contemplerur, ubi si fuerit densitas $= Q$ naturali
 existente $= B$, et celeritas in plagam AB directa
 $= Y$ capiatur $t m = \frac{1}{B} Q = \frac{Q}{B}$ et $t n = Y \sqrt{\frac{b}{g a}}$,
 in reliquis autem tubi punctis hæc binæ applicatæ
 evanescent. Producto iam axe AB utrinque in in-
 finitum, sumtisque spatiis BA' , $A'B''$ etc. AB' ,
 $B'A''$ longitudini tubi aequalibus, ex præceptis
 supra datis continuatio ambarum scalarum ita insti-
 tuti debet. Primo sumto intervallo $BTBt$, quia
 tubus in B est apertus capiatur $TM = tm$ infra,
 at $TN = tn$ supra axem: tum simili modo ad alter-
 ram partem sumto $AT' = At$, quia tubus in A
 etiam est apertus capiatur $T'M' = tm$ infra et
 $T'N' = tn$ supra axem. Iam hac scala $T'M'N'$
 cum orificio BB collato, sumatur $Bt' = BT'$,
 $t'm' = T'M'$ et $t'n' = T'N'$ utrumque supra
 axem, sicque utrinque in infinitum progrediendo
 applicatæ TN et tn omnes supra axem, alteræ
 vero TM et tm alternatim supra et infra axem erunt
 dispositæ, et in quovis spatio intervalla AT et At
 primo At , uti et intervalla BT , Bt etiam pri-
 mo Bt erunt aequalia. His positis ad quodvis tubi
 punctum S successive plures adeoque infiniti pulsus
 per-

perferentur, primo nempe pulsus principalis $t m n$ post tempus $= S t \sqrt{\frac{b}{2ga}}$, tum pulsus $T M N$ post tempus $= S T \sqrt{\frac{b}{2ga}} - (B t + B S) \sqrt{\frac{b}{2ga}}$, tertio pulsus $T' M' N'$ post tempus $= S T' \sqrt{\frac{b}{2ga}} - (A t + A S) \sqrt{\frac{b}{2ga}}$ et ita porro, quorum pulsuum successuorum indoles in sequente tabella exhibetur:

Elapso tempore ab initio :	In tubi puncto S erit densitas	celeritas séc. AB
$S t \sqrt{\frac{b}{2ga}}$	$B(1 + \frac{1}{2} t n + \frac{1}{2} t m)$	$+\frac{1}{2}(t n + t m) \sqrt{\frac{2ga}{b}}$
$(2 B t - S t) \sqrt{\frac{b}{2ga}}$	$B(1 - \frac{1}{2} t n - \frac{1}{2} t m)$	$+\frac{1}{2}(t n + t m) \sqrt{\frac{2ga}{b}}$
$(2 A t + S t) \sqrt{\frac{b}{2ga}}$	$B(1 + \frac{1}{2} t n - \frac{1}{2} t m)$	$+\frac{1}{2}(t n - t m) \sqrt{\frac{2ga}{b}}$
$(2 A t + 2 B t - S t) \sqrt{\frac{b}{2ga}}$	$B(1 - \frac{1}{2} t n + \frac{1}{2} t m)$	$+\frac{1}{2}(t n - t m) \sqrt{\frac{2ga}{b}}$
$(2 A t + 2 B t + S t) \sqrt{\frac{b}{2ga}}$	$B(1 + \frac{1}{2} t n + \frac{1}{2} t m)$	$+\frac{1}{2}(t n + t m) \sqrt{\frac{2ga}{b}}$
$(2 A t + 4 B t - S t) \sqrt{\frac{b}{2ga}}$	$B(1 - \frac{1}{2} t n - \frac{1}{2} t m)$	$+\frac{1}{2}(t n + t m) \sqrt{\frac{2ga}{b}}$
$(4 A t + 2 B t + S t) \sqrt{\frac{b}{2ga}}$	$B(1 + \frac{1}{2} t n - \frac{1}{2} t m)$	$+\frac{1}{2}(t n - t m) \sqrt{\frac{2ga}{b}}$
$(4 A t + 4 B t - S t) \sqrt{\frac{b}{2ga}}$	$B(1 - \frac{1}{2} t n + \frac{1}{2} t m)$	$+\frac{1}{2}(t n - t m) \sqrt{\frac{2ga}{b}}$
etc.	etc.	etc.

Coroll. I.

49. Pulsus ergo successive aërem in S concitantes ratione indolis sunt quadruplices, quatuor enim quisque eadem indole est praeditus, tempore autem $= 2 A B \sqrt{\frac{b}{2ga}}$ quaterni pulsus in eundem tubi locum appellant, hique paribus intervallis se insequuntur, si fuerit $B t = A t$ et $S t = \frac{1}{2} B t$.

S s 3

Coroll.

Coroll. 2.

50. Cum tempore $2 AB \sqrt{\frac{b}{g a}}$ quatuor pulsus edantur, singulis minutis secundis euenient $\frac{1}{AB} \sqrt{\frac{g a}{b}}$ pulsus, qui numerus si AB in pedibus Lond. exprimatur fit $= \frac{1000}{AB}$. Si hi pulsus sint satis fortes sonum referent, qui ergo ab vnico aëris pulsu ortus est censendus.

Coroll. 3.

51. Si primus pulsus in ipso orificio BB exciteretur, ibidemque quasi auris teneatur, ob $St=0$, $Bt=0$ et $At=AB$, omnes pulsus erunt geminati, seque sequentur temporibus $2 AB \sqrt{\frac{b}{g a}} = \frac{AB}{\frac{1}{2} \sqrt{\frac{g a}{b}}}$ sec. siquidem AB in pedibus exprimatur. Hinc si longitudo AB sit quasi 500 ped. plures eiusdem toni repetitiones singulis minutis secundis se excipient et exaudientur.

Scholion.

52. Hiuc intelligere licet quomodo echo plurium repetitionum generetur, cum tubus satis longus tale phaenomenum exhibere possit, neque tamen ylla toni percussio eueniat. Secundum calculum quidem singulae repetitiones aequae deberent esse fortes verum tamen facile intelligitur plures esse causas quibus sequentes repetitiones continuo debilitentur quoniam conditionibus in calculo assumtis, in praxi nequitiam satisfieri potest. Cum tamen exempla non defi-

deficiant, quibus eiusdem vocis plures repetitiones satis distincte eduntur, nullum est dubium, quin earum causa in simili aëris agitatione qualem hic sumus contemplati, sit quaerenda. Deinde etiam resonantiae ratio hinc potissimum explicari debere videtur etiamsi laterum tubi natura, quatenus ab aëre interno simul motum vibratorium recipiunt, eo non parum conferat. Praeterea ex praecedentibus satis est manifestum, his similia phaenomena prodire debere, si tubus vtriusque clausus accipiat, pulsus enim deriuati super axe eodem plane modo erunt dispositi, hoc tantum discrimine, quod hic applicatae *s* ex celeritatibus natae alternatim infra et supra axem collocari debeant; neque ergo opus esse arbitror ut hunc casum seorsum euoluam. Inde autem non contemnendae dilucidationes pro motu tympanorum deriuari poterunt; etsi enim membranae quibus tympana teguntur, eorumque latera sonum potissimum moderantur, tamen in aëre incluso quoque ratio repetitionis pulsuum quaerenda videtur. Superest igitur in hoc capite tantum, ut agitationem aëris in tubis ex altera parte clausis, ex altera vero apertis inuestigemus.

Problema 77.

53. Si tubus aequaliter amplus $AABB$ fuerit Tab. VI in altero termino AA apertus, in altero vero BB Fig. 83. clausus atque in eo ad *s* pulsus quicunque fuerit excitatus, eius propagationem in tubo inuestigare.

Solutio.

Solutio.

In aere ad t agitato sit densitas $= Q$ naturali
 existente $= B$, et celeritas secundum directionem
 $AA = T$, inde capiat $tm = \frac{t}{B} T$ et $tn = T \sqrt{\frac{k}{2g}}$
 ita ut punctum m referat scalam densitatum, pun-
 ctum n vero scalam celeritatum siquidem reliqua
 utriusque scalae puncta in ipsum axem incidunt.
 Iam eo utrinque producto sumtoque intervallo BT
 $= Bt$, quia tubus in BB est clausus, applicata
 $TM = tm$ supra, altera vero $TN = tn$ infra axem
 est ponenda. Ad alteram vero partem quia tubus
 in AA est apertus, sumto spatio $AT' = At$,
 applicata $T'M' = tm$ infra, altera vero $T'N' = tn$
 supra axem statuat, similique modo sumto At''
 $= AT$, fieri oportet $t''m' = -TM = -tm$ et
 $t''n' = +TN = +tn$. Tum iterum ultra B
 progrediendo sumto intervallo $Bt' = BT'$ capi de-
 bet $t'm' = +T'M' = +tm$ et $t'n' = -T'N'$
 $= -tn$, sic porro utrinque in infinitum. Nunc
 videamus quomodo omnes isti pulsus successive ad
 tubi punctum quodcunque S perveniant, id quod ex
 adiuncta tabella perspicietur:

Elapſo ab initio tempore.	In tubi puncto S erit Densitas	Celeritas ſec. A B
$S t \sqrt{\frac{b}{2ga}}$	$B(x + \frac{1}{2} t n + \frac{1}{2} t m)$	$+ \frac{1}{2} (t n + t m) \sqrt{\frac{2ga}{b}}$
$(2 B t - S t) \sqrt{\frac{b}{2ga}}$	$B(x + \frac{1}{2} t n + \frac{1}{2} t m)$	$- \frac{1}{2} (t n + t m) \sqrt{\frac{2ga}{b}}$
$(2 A t + S t) \sqrt{\frac{b}{2ga}}$	$B(x + \frac{1}{2} t n - \frac{1}{2} t m)$	$+ \frac{1}{2} (t n - t m) \sqrt{\frac{2ga}{b}}$
$(2 A t + 2 B t - S t) \sqrt{\frac{b}{2ga}}$	$B(x + \frac{1}{2} t n - \frac{1}{2} t m)$	$- \frac{1}{2} (t n - t m) \sqrt{\frac{2ga}{b}}$
$(2 A t + 2 B t + S t) \sqrt{\frac{b}{2ga}}$	$B(x - \frac{1}{2} t n - \frac{1}{2} t m)$	$- \frac{1}{2} (t n + t m) \sqrt{\frac{2ga}{b}}$
$(2 A t + 4 B t - S t) \sqrt{\frac{b}{2ga}}$	$B(x - \frac{1}{2} t n - \frac{1}{2} t m)$	$+ \frac{1}{2} (t n + t m) \sqrt{\frac{2ga}{b}}$
$(4 A t + 2 B t + S t) \sqrt{\frac{b}{2ga}}$	$B(x - \frac{1}{2} t n + \frac{1}{2} t m)$	$- \frac{1}{2} (t n - t m) \sqrt{\frac{2ga}{b}}$
$(4 A t + 4 B t - S t) \sqrt{\frac{b}{2ga}}$	$B(x - \frac{1}{2} t n + \frac{1}{2} t m)$	$+ \frac{1}{2} (t n - t m) \sqrt{\frac{2ga}{b}}$
$(4 A t + 4 B t + S t) \sqrt{\frac{b}{2ga}}$	$B(x + \frac{1}{2} t n + \frac{1}{2} t m)$	$+ \frac{1}{2} (t n + t m) \sqrt{\frac{2ga}{b}}$
etc.	etc.	etc.

Coroll. 1.

54. Hoc ergo caſu maior diſparitas in pulſibus ſucceſſivis ad eundem locum appellentibus cernitur, quoniam hic demum octauus quiſque ad eandem indolem reuertitur. Temporis autem interualla eandem legem tenent vt ante.

Coroll. 2.

55. Si ſit $S t = 0$ et $A t = 0$, ita vt ſonus in A edatur ibique auris conſtituatur, ordo et indoles pulſuum ad aurem ſucceſſive delatorum ita ſe habebit :

Tom. XVI. Nou. Comm.

T t

Elapſo

Elapso tempore	densitas	celeritas
$2 AB \sqrt{\frac{b}{2ga}}$	$B(1)$	$-2tn \sqrt{\frac{2ga}{b}}$
$4 AB \sqrt{\frac{b}{2ga}}$	$B(1)$	$+2tn \sqrt{\frac{2ga}{b}}$
$6 AB \sqrt{\frac{b}{2ga}}$	$B(1)$	$-2tn \sqrt{\frac{2ga}{b}}$

densitas ergo hic nullam subit mutationem, vnde si primus pulsus nullam habuerit celeritatem, sequentes omnes se mutuo destruunt.

Coroll. 3.

56. Sin autem sonus in BB excitetur, ibique a sensu auditus pulsus sequentes excipiantur, vt sit $St=0$, $Bt=0$ et $At=AB$ tum celeritas in pulsibus appellentibus erit nulla, densitas sola alternatim erit $=B(1-2tm)$ et $B(1+2tm)$ hique pulsus temporis intervallis $2AB\sqrt{\frac{b}{2ga}}$ se insequentur. His autem duobus casibus quaterni pulsus in vnum vniuntur quam ob causam etiam hi pulsus complexi alia proprietate praediti sunt ac pulsus simplices propagati.

Scholion 1.

57. Quae haecenus hic sunt tradita de pulsum indole et propagatione, Physicis occasionem praebere possunt in naturam tam sonorum quam auditus accuratius inquirendi. In quo negotio imprimis erit perpendendum, si pulsus a quacunque causa excitatus secundum directionem AB in aere propagetur, et nunc quidem spatium YX occupet; eius naturam semper

Tab. VI.

Fig. 34.

semper una quadam linea curva XZY representari posse; quae simul sit scala densitatum et celeritatum etiam si in pulsu principali haec duae scalae maxime fuerint diuersae; hoc autem de pulsibus simplicibus est intelligendum, non vero de complexis, qui ex pluribus simplicibus a contrariis plagis in eundem locum venientibus coalescunt, cuiusmodi sunt ii, quos in coroll. 2 et 3 descripsi. Dum igitur pulsus ille simplex in spatio XY versatur, primum eius latitudo XY considerari debet intra quam aer de statu aequilibræ est deturbatus, extra eam vero ubique quiescit: quo enim haec latitudo fuerit maior eo plenior quasi erit sonus. Deinde curva illa XZY hoc modo aeris agitationem declarat: ea scilicet aeris particula quae ante pulsus aduentum erat in S nunc erit translata in s , ut sit spatium $Ss =$ areae XSZ ad lineam illam rectam, qua unitas designatur, applicatae: tum vero eius densitas q ita erit comparata, ut sit $q = B(1 + SZ)$ denotante B densitatem naturalem seu erit $SZ = \frac{q}{B}$, motu autem simul versus B feretur, cuius celeritas erit $= SZV^{\frac{1}{2}}$. Eadem autem hic recta pro unitate assumpta est intelligenda, qua in scalis pulsus principalis construendis fuerimus vsi. Quod si ergo aer hac agitatione ad aurem perferatur, hinc erit colligendum, quomodo auditus organum afficiatur.

Scholion 2.

38. In figura totam curvam XZY supra axem descriptam exhibeo; id quod euenit, cum in

T t 2

toto

Tab. VI.
Fig. 85.

toto pulsus interuallo densitas aeris naturali est maior, simulque singulae aeris particulae motu versus B directo sunt praeditae: quod si eueniat postrema pulsus particula ex Y in y erit translata vt sit spatium $Yy =$ areae XZY , hoc scilicet casu vniversus aër post pulsus ab agitatione praecedente per tantum spatium successisse est intelligendus. Quod si talis successio non contingat vt postrema pulsus particula Y in loco suo naturali persistat, curua XZY agitationem exhibens ita erit comparata vt partim supra partim infra axem sit disposita, eiusque area negatiua $YZ'O$ positivae XZO fiat aequalis. Tum igitur si pars superior antecedit, ad aurem prius perferentur aeris particulae naturali densiores et in plagam B motae, post vero sequentur particulae rariores, motum retro directum habentes. Ex quo concludendum videtur, essentiale sonorum discrimen in hoc esse constituendum, prout pars superior XZO vel praecedat vel sequatur. Si eueniret vt haec curua ter vel quinques axem XY secaret, inde sine dubio peculiares affectiones in sonum redundarent. Semper autem figura huius curuae XZY , maxime essentiale discrimen sonorum repraesentare est censenda; eo nimirum discrimine remoto quod a successione plurium pulsuum proficiscitur. Quanquam autem haec ex sola consideratione tuborum aequae amplorum sunt deducta, tamen multo latius patent, et per ea quae circa tubos inaequaliter amplos perferutari licebit confirmantur.

CAPVT

CAPVT III.

DE

MOTV OSCILLATORIO AERIS IN TV-
BIS AEQUALITER AMPLIS AD SONOS
TIBIARVM EXPLICANDOS.

Problema 78.

59. Si tubus A A B B vtrunque fuerit aper- Tab. VI.
tus, aerque in eo contentus quomodocunque de fla- Fig. 86.
tu aequilibrii deturbetur, motum oscillatorium, quo
aer in tubo deinceps agitabitur, determinare.

Solutio.

Aequilibrii primam perturbationem ad calcu-
lum reuocaturi ponamus in loco tubi quocunque S
densitatem esse $= Q$ naturali existente $= B$, et ce-
leritatem secundum directionem A B ibi esse $= Y$;
hinc supra axem A B in puncto S erigantur duae
applicatae $SQ = l \frac{Q}{B}$ et $SY = Y \sqrt{\frac{b}{g a}}$, certa qua-
dam linea recta pro vnitae assumpta, quo facto pun-
ctum Q erit in scala densitatum, Y vero in scala
celeritatum. Quia autem tubus in A et B est aper-
tus, necesse est vt scala densitatum in vtroque ter-
mino A et B in axem incidat, vti A Q B tota
autem scala celeritatum sit E Y F. Nunc pro mo-
tu sequente definiendo vtramque scalam secundum
praecepta supra data vtrunque in infinitum continua-

T t 3

ri

ri oportet. Hunc in finem axe vtriusque producto, in eoque abscissis intervallis BA' , $A'B'$, AB'' , $B'A''$ etc. longitudi tubi aequalibus scala primo densitatum AQB alternatim infra et supra axem applicetur, scala vero celeritatum ad eandem axis partem repetatur FE' , $E'F'$, etc. EF'' , $F''E''$ etc. eo ordine, quem figurae inspectio ostendit, singulas partes alternatim dextrorsum et sinistrorsum disponendo. His ita praeparatis si ad tempus quodcumque elapsum $= t$ statum aëris qui initio erat in S , cognoscere velimus a puncto S vtriusque in axe abscindamus intervalla $ST = S't = t\sqrt{\frac{g}{\phi}}$, atque in punctis T et t ad utramque scalam ductis applicatis supra ostendimus fore (13)

densitatem $q = Q(1 - SQ - \frac{1}{2}TN + \frac{1}{2}TM + \frac{1}{2}tn + \frac{1}{2}tm)$
 et celeritatem $v = \frac{1}{2}(TN - TM + tn + tm)\sqrt{\frac{g}{\phi}}$
 quo motu aër in S versus B promotus erit intervallo

$$= \frac{1}{2}TNtn - \frac{1}{2}SQTM + \frac{1}{2}SQtm,$$

quod ergo si tota scala celeritatum supra axem sit sita quantumvis magnum evadere potest, id quod evenit, dum aër continuo per tubum AB transfluit, eoque continuo novus aer intrat, locum egressi occupans; cuius autem status binis prioribus formulis pro q et v datis definitur. Iam observo, si tempus t tantum capiatur ut fiat $t\sqrt{\frac{g}{\phi}} = 2AB$, tum puncta T et t in s et s' cadere, quae puncta ipsi S sunt analogae, indeque fieri $q = Q$ et $v =$

$v = SY \sqrt{\frac{2g}{b}} = Y$ ita ut nunc punctum S simul-
 que omnis aer in tubo contentus in eundem statum
 sit reductus, in quo initio versabatur. Interea ergo
 hic aer duas oscillationes absoluisse est censendus,
 ex quo singularum oscillationum tempora erunt
 $= AB \sqrt{\frac{b}{2g}}$ perspicuum enim est omnia haec tem-
 pora inter se esse aequalia, quia siue capiatur $\sqrt{\frac{2g}{b}}$
 $= 2 AB$ siue $= 4 AB$ siue $= 6 AB$ semper pro-
 dit $g = Q$ et $v = Y$, notandum autem est formu-
 lam $\sqrt{\frac{2g}{b}}$ exprimere distantiam, per quam sonus
 vno minuto propagatur. Ponamus hoc spatium
 brevitatis gratia $= k$ quod est circiter 1000 pedum,
 et quia tempus cuiusque oscillationis est $= \frac{k}{v}$, vno
 minuto secundo absoluentur $\frac{k}{AB}$ oscillationes, cui
 numero sonus inde editus proportionalis statuitur.

Coroll. 1.

60. Si igitur tubi vtrique aperti et aequali-
 ter ampli longitudo sit $AB = d$, aerque in eo con-
 tentus de statu aequilibrîi deturbetur, motum oscil-
 latorium recipiet, quo singulis minutis secundis $\frac{k}{d}$ —
 oscillationes absoluentur, denotante k spatium, per
 quod sonus vno minuto secundo propagatur: hinc-
 que auditus percipiet sonum numero $\frac{k}{d}$ repraesentat-
 um.

Coroll. 2.

61. Quia autem est $k = \sqrt{\frac{2g}{b}}$, vbi a deno-
 tare potest altitudinem mercurii in barometro, si
 densi-

densitas mercurii vnitato exhibeatur, et pro δ densitas aëris scribatur, inde patet hos sonos partim ab elasticitate aëris pendere partim ab eius densitate: ita vt maior elasticitas sonum acutiorē reducat, maior vero densitas grauiorem.

Coroll 3.

62. Si tubi longitudo sit vnus pedis, ob $k = 1000$ ped. singulis minutis secundis edentur 1000 oscillationes; et a tubo longitudinis 8 pedum 125 oscillationes, cui numero respondet sonus in instrumentis musicis littera C indicari solitus. Hinc pro quouis sono musico longitudo tubi aperti consoni assignari potest.

Scholion 1.

63. Quaecunque ergo agitatio aëri in tubo AB contento fuerit inducta, siue motus impressione siue densitatis immutatione, eiusmodi motus oscillatorius in eo generabitur qualis est inuentus. Interim tamen euenire potest, vt numerus oscillationum vel duplo vel triplo, vel quadruplo vel in ratione quacunque multipla fiat maior; id quod a certa indole primae agitationis pendet. Si enim ambae scalae agitationem determinantes AQB et EYF ita formentur, vt similes fiant scalis per duplum spatium AA' continuatis, vel per triplum AB', vel per quadruplum AA'' etc. motus oscillatorius perinde se habebit ac si tubus AB esset vel duplo vel triplo vel quadruplo breuior, sicque numerus

merus oscillationum vno minuto secundo editarum fiet vel duplo vel triplo vel quadruplo maior; unde soni continuo acutiores secundum numeros 1, 2, 3, 4 etc. orientur. Cum autem ad hos sonos acutiores singularis proprietates primae agitationis requiratur, ii pro secundariis sunt habendi, dum sonus primarius est is qui formula $\frac{k}{AB}$ indicatur, quia hic nullam huiusmodi conditionem singularem postulat. Existente ergo sono principali $= \frac{k}{AB}$ soni secundarii erunt $\frac{2k}{AB}$, $\frac{3k}{AB}$, $\frac{4k}{AB}$ etc.

Scholion 2.

64. Hae tiorum proprietates tam pulcre conveniunt cum iis, quos tibiae inflatae edunt, ut nullum sit dubium, quin soni tiliarum ex hoc principio explicari debeant. Dum enim tibia inflatur, aer in tubo contentus non solum ratione densitatis de statu aequilibril deturbatur, sed etiam ad motum quendam concitatur quo per tubum AB propellitur; unde nascitur scala quaedam densitatum AQB et celeritatum EYF, cuius applicatae erunt positivae motum secundum directionem AB indicantes. Ex huiusmodi igitur agitatione eiusmodi motus oscillatorius indeque sonus nascitur, qualem definiimus; omnesque circumstantiae observatae cum nostra Theoria egregie conveniunt; dum etiam eadem tibia omnes illos sonos secundarios praeter primarium edere posse deprehenditur. Imprimis autem hic notandum est, continua inflatione aërem in tubo cen-

tentum etiam motu oscillatorio imbutum continuo ex tubo expelli, sicque eo facilius propagationem in aëre externo effici; huicque causae esse tribuendum, quod cessante inflatione sonus subito quoque extinguatur cum tamen secundum Theoriam motus oscillatorius in ipso tubo diu durare deberet.

Scholion 3.

65. Sic quidem intelligitur, cur inflatione cessante tibiae nullum amplius sonum edant, verumtamen in genere, quando idem aer in tubo manet, ratio minus est perspicua, cur motus oscillatorius in eo mox extinguatur? et cur in casibus praecedentis capitis neutiquam tot vocis repetitiones percipiantur, quot Theoria indicat, in quo Theoria plurimum ab experientia dissentit. In praesente enim casu elapso tempore quantumvis magno calculus etiam nunc aequae vehementem aeris agitationem in tubo ostendit ac statim ab initio, interim tamen experientia novimus totam agitationem initio productam mox penitus interire, nisi continuo de nouo instauretur, unde certe grauissimum argumentum contra nostram Theoriam peti posse videtur. Verum praeter plurima alia motus impedimenta ipsa tubi indoles ad hanc obiectionem diluendum potissimum spectari debet etiam si enim tubus ex durissima materia sit confectus tamen ea aëris agitationibus semper aliquantillum cedit, cum tamen in calculo latera tubi tanto rigore praedita assumantur, ut nullius plane impressionis et agitationis sint capacia; cui

cui conditioni cum praxis maxime aduersetur; minime mirum est; quando huiusmodi aëris agitationes tam cito pereunt. Pleraque autem materiae, ex quibus tales tubi confici solent, manifesto eo rigoris gradu destituuntur, qui ad perennitatem motus oscillatorii requireretur, ob eamque solam causam, etiamsi alia impedimenta non adessent, is motus diu durare non posset. Interim tamen quo fortior et durior fuerit tubi materia, eo minus experientia a Theoria recedere deprehenditur.

Problema 79.

66. Si tubus aequaliter amplus in altero termino AA fuerit apertus, in altero vero BB clausus, aëque in eo contentus utcumque de statu aequilibrîi deturbetur, motum oscillatorium quo aer in tubo deinceps agitabitur, determinare. Tab. VII.
Fig. 87.

Solutio.

Primo agitationis momento aëri in tubo circa S versanti sit inducta densitas $= Q$ naturali existente $= B$ simulque celeritas $= Y$ secundum directionem AB, inde binæ scalæ ita formentur, ut pro scalâ densitatum AD sit applicata $SQ = l \frac{Q}{B} = \frac{Q - B}{B}$, pro scalâ vero celeritatum EB applicata $SY = Y \sqrt{\frac{b}{2ga}}$, quarum illa scalâ, quia tubus ad AA est apertus per punctum A, hæc vero quia tubus ad BB est clausus per punctum B transire debet. Has iam scalas utrinque ita continuari oportet, ut sumtis in

V v 2

axe

axe AB productio interuallis BA', A'B', B'A' etc. item AB'', B''A'' etc. ipsi AB aequalibus BD sit diameter scalae densitatum vnde ea per A' ita transibit, vt rami circa A' sint alternatim aequales, ita vt ramus A'D' aequalis sit et similis, arcui A'D sed ad axis partes contrarias positus, quod idem de puncto A valet, tum vero rectae B'D' et B''D'' iterum erunt diametri, punctaque A'' et A''' centra ramorum alternatim aequalium vt puncta A, et A', sicque porro vtrinque in infinitum. Pro scalae celeritatum EB continuatione autem recta AE est eius diameter puncta vero B et B' centra ramorum alternatim aequalium, vnde rectae A'E', A''E'' iterum erunt diametri sicque ambae scalae facile in infinitum continuantur. Quodsi iam a prima agitatione elapsum sit tempus = t , a puncto S vtrinque super axe abscindantur spatia $ST = St = t\sqrt{\frac{1}{2}g}$, ibique ductis ad vtramque scalam applicatis TM, TN, tm , tn , quia eae hic contra cadunt ac supra assumimus, particulae aëris quae initio erat in S nunc erit

densitas $q = Q(1 - SQ + \frac{1}{2}TN - \frac{1}{2}TM - \frac{1}{2}tn + \frac{1}{2}tm)$
et celeritas

$$v = -\frac{1}{2}(TN - TM + tn + tm)\sqrt{\frac{1}{2}g}$$

secundum AB, ipsa vero haec particula translata erit in s vt sit spatiolum

$$Ss = \frac{1}{2}TNtn - \frac{1}{2}SQTm + \frac{1}{2}SQtm$$

quatenus

quatenus scilicet hae areae supra axem cadunt, quae partes enim infra axem cadunt negatiuae sunt censendae.

Ponamus autem tantum elapsum esse tempus t , ut sit $ST = St = 2AB$ ideoque $t = 2AB\sqrt{\frac{b}{2ga}}$, et manifestum est puncta T et t in interuallis $A'B'$ et $A''B''$ similiter esse sita ac punctum S in interuallo AB , ideoque fore $TM = tm = SQ$ et $TN = tn = SY$; vnde post hoc tempus erit densitas in S nempe $q = Q(1 - 2SQ)$ et celeritas $v = -SY\sqrt{\frac{2ga}{b}} = -Y$. Hinc si initio fuerit in S densitas $Q = B + O$ naturali scilicet B tantillo maior, ob $SQ = \frac{O}{B}$ erit nunc $q = B - O$, tantundem minor naturali, tum vero etiam celeritas v primae est aequalis sed in plagam oppositam directa; ex quo statu, qui primo directe est contrarius, intelligitur iam aërem vnam oscillationem absoluisse, quia non nisi post tempus duplo maius in statum initialem reuertetur, ita ut tempus cuiusque oscillationis sit censendum $= 2AB\sqrt{\frac{b}{2ga}}$. Quod autem ad translationis spatium Ss attinet, ob

$$TNtn = -AEYS - ABE + BSY + AEYS + AEB - BSY = 0$$

$$SQTm = SQDB + ABD - ASQ \text{ et}$$

$$SQtm = ASQ - ABD - SQDB = SQTm$$

vnde patet hanc translationem euanescere. Concludimus ergo si spatium a sono vno minuto secundo percursum ponatur $\sqrt{\frac{2ga}{b}} = k$, tempus vnus oscillationis fore $= \frac{2AB}{k}$, et singulis minutis secundis ab-

solui oscillationes $\frac{h}{\frac{1}{AB}}$, qui numerus simul naturam soni hinc editi exhibet.

Coroll. 1.

67 Quando ergo tubus ex altera parte est clausus singulae oscillationes duplo longius durant, quam si idem tubus vtrunque esset apertus, eodemque propterea tempore dimidium tantum oscillationum numerum absoluit. Seu tubus ex altera parte clausus sonum vna octaua edit grauiorem, quam si esset vtrunque apertus.

Coroll. 2.

68. Soni autem hic aequae atque in tubis vtrunque apertis inter se tenent rationem reciprocam longitudinum, ita vt quo tubus fuerit longior, eius sonus eo futurus sit grauior; vnde si tubi longitudo sonum C edentis sit cognita, quae hoc casu quasi 4 erit pedum, pro omnibus reliquis sonis musicis longitudo facile assignabitur.

Scholion. 1.

69. Hic autem primam agitationem non ita accommodare licet, vt oscillationes duplo fiant frequentiores, quemadmodum in casu tuborum vtrunque apertorum vsu venit, si enim hic iisdem manentibus scalis tubo longitudinem duplam AA' tribuamus eumque in A' clausum ponamus, figura scalae celeritatum, quae in punctum A' incidere deberet

beret huic hypothesi aduersatur, eademque repugnantia deprehenditur, si longitudinem tubi quater vel sexies vel octies vel secundum quemvis numerum parem, multiplicare vellemus, ita ut huiusmodi tubus nullo modo ad sonum, qui ad principalem teneat rationem ut $2:1, 4:1, 6:1$ seu $2i:1$ edendum sit aptus. Secundum numeros impares autem haec reductio egregie succedit: concipiamus enim tubum triplo longiorem AB' in A apertum in B vero clausum, in quo aeri eiusmodi sit agitatio inducta, ut scala densitatum sit $ADA'D'$ et scala celeritatum $EBE'B'$, quarum forma conditionibus praescriptis utique conuenit; et cum continuatio ambarum scalarum se quoque habeat ut ante oscillationes etiam eadem inde nascentur, ex quo intelligitur in huiusmodi tubo primam agitationem ita comparatam esse posse, ut motus oscillatorius inde genitus prorsus conueniat cum tubo triplo breviori, quod etiam de quintuplo, septuplo etc. brevioribus valet. Cum igitur tubi AB in altera parte clausi sonus principalis sit $= \frac{k}{2AB}$ idem tubus quoque sub certis circumstantiis edere poterit hos sonos $\frac{1}{2} \frac{k}{AB}; \frac{3}{2} \frac{k}{AB}; \frac{5}{2} \frac{k}{AB}$ etc.

Scholion 2.

70. Cum ex praecedente problematae naturam tibiarum superne apertarum tam dilucide explicauerimus, multo minus hic dubitare licet, quin motus oscillatorius hic definitus rationem contineat tibiarum superne

superne clausurarum. Experimenta autem consulentes omnia egregie cum hac theoria consentire deprehendimus. cum constet eandem tibiā, si superne claudatur, sonum vna octaua grauiorem esse edituram: deinde etiam iam obseruatum est, si huiusmodi tibiae superne clausae certo modo insentur, fieri posse vt sonus edatur triplo vel quintuplo altior, nunquam autem duplo altior, qui scilicet principali foret vna octaua altior. In huiusmodi autem tibiis iam videmus aerem alternis vicibus in eas intrare iterumque expelli, qui aer expulsus et iam descripto motu oscillatorio praeditus, cum externo aëre hunc motum eo facilius communicabit, in eoque propagabit, interim tamen ob hanc ipsam causam discrimen aliquod inerit inter sonos tiliarum apertarum et clausurarum, vade eos dignoscere liceat. Deinde etiam mirum non est, quod tiliarum soni haud parum a materia, ex qua tibiae sunt confectae pendcant, indeque notam quandam manifestam secum gerant. Iam enim animaduertimus materiam tuborum motum oscillatorium plurimum impedire posse, et nunc addere licet, ab aëre etiam quendam motum gyratorium cum ipso tubo communicari a quo deinceps sonus tibiae vicissim afficitur. At si gravitatem et acumen sonorum tantum spectemus, solius longitudinis ratio est habenda, neque materia vel forma tubi quicquam eo conferet, dummodo sint tubi aequaliter ampli. Cuiusmodi tamen sonos sint editurae tibiae inaequaliter amplae quaestio est altioris indaginis, cuius solutionem vix adhuc sperare licet.

Pro-

Problema 80.

71. Si tubus aequaliter amplius in utroque ter-Tab. VII.
mino AA et BB fuerit clausus, et aer in eo con- Fig. 88.
tentus utcumque de statu aequilibrîi deturbetur,
motum oscillatorium aëris inde oriundum determinare.

Solutio.

Sit densitas aëris initio in tubi loco S inducta
 $= Q$, naturali existente $= B$ celeritas vero in pla-
 gam AB $= Y$, capiaturque $SQ = l \frac{Q}{B} = \frac{Q - B}{B}$ et
 $SY = Y \sqrt{\frac{b}{2ga}}$, vnde utraque scala densitatum CD,
 et celeritatum AYB construatur, quarum haec ne-
 cessario per puncta A et B transire debet. Tum
 secundum praecepta data utraque scala utrinque super
 axe producto per continuam replicationem, uti ex
 figura videre licet continuetur. Quo facto si post
 tempus quodcumque elapsum $= t$ a puncto S utrin-
 que capiantur intervalla $ST = St = t \sqrt{\frac{2ga}{b}}$, ex
 utriusque scalae applicatis in punctis T et t defini-
 tur nunc aëris, qui initio fuerat ad S

$$\text{I. densitas } q = Q(1 - SQ - \frac{1}{2}TN + \frac{1}{2}TM + \frac{1}{2}tn + \frac{1}{2}tm).$$

$$\text{II. celeritas } Y = \frac{1}{2}(TN - TM + tn + tm) \sqrt{\frac{2ga}{b}}$$

ac praeterea spatium, quo is versus B crit pro-
 motus nempe

$$\text{III. spatium } S\sigma = \frac{1}{2}TNtn - \frac{1}{2}SQTM + \frac{1}{2}SQtm$$

hincque ergo status aëris in tubo ad quodvis tem-
 pus t definietur. Ponamus nunc tempus elapsum

Tom. XVI. Nou. Comm.

X x

esse

esse $t = 2 AB \sqrt{\frac{b}{2ga}}$, vt puncta T et t cadant in S' et S'' puncta ipsi S homologa, eritque tum in loco S

I. densitas $q = Q(1 - SQ - \frac{1}{2}SY + \frac{1}{2}SQ + \frac{1}{2}SY + \frac{1}{2}SQ) = Q$

II. celeritas $v = \frac{1}{2}(SY - SQ + SY + SQ) \sqrt{\frac{2ga}{b}} = SY \sqrt{\frac{2ga}{b}} = Y$

III. spatiolum $S\sigma = 0$

ita vt nunc aer in ipsum statum primitium sit reductus, cum elapso tantum tempore dimidio $t = AB \sqrt{\frac{b}{2ga}}$ statum fere contrarium habuisset. Cum igitur illo tempore duas oscillationes absoluisse sit censendus, tempus singularum oscillationum erit $= AB \sqrt{\frac{b}{2ga}} = \frac{AB}{k}$, denotante $k = \sqrt{\frac{2ga}{b}}$ spatium, per quod aer vno minuto secundo propagatur; vnde numerus oscillationum singulis minutis secundis editarum erit $= \frac{k}{AB}$, qui simul pro mensura soni hoc motu producti habetur.

Coroll. 1.

72. Si tubus effet duplo longior $= AA'$ iisdem manentibus scalis, quippe quae huic tubo vtrinque clauso conuenire possunt, motus oscillatorius idem oriretur, vnde fieri potest, vt tubus vtrinque clausus eundem edat sonum, ac tubus duplo breuior quod idem valet si tubus triplo, vel quadruplo etc. longior acciperetur.

Coroll.

Coroll. 2.

73. Cum igitur sonus principalis sit $= \frac{k}{AB}$, idem tubus vtrunque clausus, si prima agitatio certo quodam modo temperetur, hos quoque sonos $\frac{2k}{AB}$, $\frac{3k}{AB}$, $\frac{4k}{AB}$ etc. edere poterit: omninoque horum tuborum eadem erit ratio ac tuborum vtrunque apertorum, dum contra ii, qui ex altera parte sunt aperti, ex altera vero clausi sonos una octava graviores edunt.

Scholion 1.

74. Quemadmodum autem aeri huiusmodi tubo incluso agitatio induci possit, haud liquet vnde etiam nulla exempla sonorum hac ratione genitorum proferre licet: quin etiam quamvis ibi quaedam agitatio excitaretur, tamen quia tubus vndique est clausus, motus oscillatorius neque cum aere externo communicari neque sonus exaudiri posset. Si enim tubi latera simul contremiscant, eorum sonus proprius potius quam aeris inclusi per aerem externum propagabitur: statim autem atque ipsa tubi materia motum vibratorium concipit, aeris inclusi motus maxime turbatur, neque amplius leges per calculum inuentis sequitur: si enim aeri ubi est magis compressus ipsa tubi latera aliquantillum cedant, eo debilius inde aer vicinus concitabitur, haecque praecipua causa esse videtur, cur talis aeris motus tam cito extinguatur, cum tamen secundum Theoriam

X x 2

peren-

perennis esse deberet; quod non solum de his tubis vtrunque clausis sed etiam reliquis omnibus est intelligendum. Quomodoenque autem haec motus debilitatio ob tubi materiam eueniat inde tamen duratio singularum oscillationum non afficitur, quarum tempora cum calculo semper consentire deprehenduntur etsi ob illam causam motus oscillationum continuo debilitetur, et mox prorsus extinguatur.

Scholion 2.

75. Quanquam autem in his tubis singulae oscillationes certis temporibus absoluuntur, atque in eodem tubo soni ratione grauitatis et acuminis discrepare non possunt tamen in iis ratione reliquarum qualitatum maximum discrimen inesse potest, a diuersa indole pulsuum in aere excitatorum oriundum. Cum enim aer in huiusmodi tubis infinitis modis de statu aequilibrii deturbari possit, dum vel sola densitas in singulis aëris elementis alteratur, vel iis tantum motus quidam inducitur, vel vtrumque simul euenit, hinc maxima diuersitas in motu singularum oscillationum oriri poterit, vnde mirum videbitur quod eadem tibia inflata sonum semper eiusdem indolis edat; non loquor autem hic de grauitate, quae nullam variationem patitur, sed de ea qualitate, qua sonos tiliarum a sonis cordarum aliorumque instrumentorum distinguimus. Quia autem tibiae inflatione ad sonos edendos excitantur, facile intelligitur, hinc ambas scalas densitatum et celeritatum non in infinitum variari posse, sed semper ab aëre inflato
tam

tam certam condensationem quam certum motum produci debere, ita ut hic non amplius infinita varietas locum inuenire queat: huicque causae qualitas illa qua soni tiliarum a reliquis instrumentis discrepant, sine dubio est tribuenda. Vnde si forte quocunque modo aeri in tubis vtrunque clausis agitatio induci posset, sonus quidem ratione grauitatis et acuminis cakulo foret consentaneus, sed a sono tiliarum maxime differre posset.

CAPVT IV.

DE

AGITATIONE MINIMA AERIS IN TVBIS
INAEQUALITER AMPLIS.

Problema 81.

76. Dum aer quomodocunque in tubo inaequaliter amplo mouetur, eius motum ad formulas analyticas renocare, quibus prius determinatio ad quoduis tempus contineatur.

Solutio.

Initio statum aeris tanquam cognitum spectamus; tum igitur pro loco tubi quocunque S vocata distantia $AS = S$ ponamus fuisse densitatem $= Q$, et celeritatem secundum tubi directionem $AB = Y$,

 $X x 3$

ita

ita ut Q et Y sint functiones datae quantitatis S ; cuius etiam functio erit amplitudo tubi in hoc loco, quae sit $= \Omega$, perinde atque eius altitudo super plano quodam horizontali fixo, quae sit $= Z$, siquidem et gravitatis rationem in motu aeris habere velimus. Nam elapso tempore $= t$ illam aeris particulam ponamus pervenisse in s , ut sit spatium $As = s$, et tubi amplitudo $= \omega$, eiusque altitudo super illo plano horizontali $= z$, quae quantitates ω et z sunt functiones datae ipsius s , ipsa vero haec quantitas s est functio duarum variabilium S et t ; nunc vero in hoc loco s sit aeris densitas $= q$, celeritas versus $B = Y$, quae est $= (\frac{ds}{dt})$, et pressio $= p$, quam per densitatem q ita determinari novimus, ut sit $p = \frac{a}{b} q$; densitas q est quoque functio binarum variabilium S et t . His positis principia supra stabilita pro hoc casu praebent has duas aequationes:

$$q \omega (\frac{ds}{dt}) = Q \Omega \text{ et } \frac{1}{q} \frac{dp}{dt} = -2g dz - ds (\frac{d}{dt} \frac{ds}{dt}) = \frac{1}{b} \frac{dq}{dt}$$

in qua posteriori tempus t ut constans spectatur, quae propterea ita exhiberi potest

$$\frac{1}{b} \frac{a}{q} (\frac{dq}{ds}) + 2g (\frac{dz}{ds}) + (\frac{ds}{dt}) (\frac{d}{dt} \frac{ds}{dt}) = 0.$$

Ex priori autem habemus $lq = lQ + l\Omega - l\omega - l(\frac{ds}{dt})$
unde solam S variabilem sumendo colligimus:

$$\frac{1}{q} (\frac{dq}{ds}) = \frac{dQ}{Q ds} + \frac{d\Omega}{\Omega ds} - \frac{1}{\omega} (\frac{d\omega}{ds}) - \frac{(\frac{ds}{dt} \frac{d}{dt} \frac{ds}{dt})}{(\frac{ds}{dt})}$$

Quo

Quo valore substituto aequationem habebimus a q liberam hanc :

$$\frac{1}{b} \frac{g a}{Q} \left(\frac{dQ}{ds} + \frac{d\Omega}{\Omega ds} \right) \left(\frac{dt}{ds} \right) - \frac{1}{b} \frac{g a}{\omega} \left(\frac{d\omega}{ds} \right) \left(\frac{dt}{ds} \right) - \frac{1}{b} \frac{g a}{\omega} \left(\frac{dz}{ds} \right) \left(\frac{dt}{ds} \right) + 2 \frac{g}{\omega} \left(\frac{dz}{ds} \right) \left(\frac{dt}{ds} \right) + \left(\frac{dt}{ds} \right)^2 \left(\frac{ddt}{ds^2} \right) = 0$$

vbi Q et Ω sunt functiones datae ipsius S , quantitates vero ω et z functiones ipsius s , quae ipsa est functio binarum variabilium S et t , eiusque natura hinc determinari debet. Quodsi ergo ponatur $d\omega = u ds$ et $dz = r ds$, vt u et r sint functiones ipsius s datae, aequatio nostra hanc induet formam :

$$\frac{1}{b} \frac{g a}{Q} \left(\frac{dQ}{ds} + \frac{d\Omega}{\Omega ds} \right) \left(\frac{dt}{ds} \right) + 2 \frac{g}{\omega} \left(r - \frac{a u}{b \omega} \right) \left(\frac{dt}{ds} \right)^2 - \frac{1}{b} \frac{g a}{\omega} \left(\frac{ddt}{ds^2} \right) + \left(\frac{dt}{ds} \right)^2 \left(\frac{ddt}{ds^2} \right) = 0$$

vnde qualis s sit functio ipsarum S et t inuestigare oportet, ea autem inuenta statim cognoscitur celeritas $v = \left(\frac{dt}{ds} \right)$, tum vero densitas

$$q = \frac{Q \Omega}{\omega \left(\frac{dt}{ds} \right)},$$

simulque pressio $p = \frac{a q}{b}$.

Scholion.

77. Ex hac aequatione generali, quae omnes motus, qui in aerem in tubis quibuscunque cadere possunt, in se complectitur, satis liquet quantopere etiamnunc ab eius solutione perfecta simus remoti, idque ob solum Analyseos defectum. Cum enim functio s quae quaeritur praeter formulas differentia-

rentiales etiam in litteris ω , u et r inuoluantur, haec tanta complexio in causa est, quod generalem nostri problematis solutionem nullo modo sperare queamus. Quare ut supra iam obseruauimus, omnia quae hic praestare licet, ad solos motus minimos restringuntur, cuiusmodi sunt generatio et propagatio soni, dum interea casus, qui alias simplicissimi videantur, veluti si aer in tubo comprimitur vel relaxatur, prorsus intactos relinquere cogimur. Mirum igitur est quod ii casus, qui primo intuitu maxime ardui sunt visi, et ab Auctoribus vix suscepti, nunc soli nostrae inuestigationi permittuntur, reliquis omnibus exclusis. Quocirca aequationem generalem hic inuentam ad eum casum accommodabo, quo agitatio aeris ut minima spectari potest.

Problema 82.

78. Si aeris agitatio in tubo inaequaliter amplo excitata fuerit quam minima, aequationem inuenire qua huius motus continuatio continetur.

Solutio.

Maneant omnes denominationes, uti in praecedente problemate sunt constitutae, et quia ibi erat $u = \frac{d\omega}{dt}$ et $r = \frac{d^2s}{dt^2}$, restituantur hi valores, insuperque breuitatis gratia ponatur $\frac{2g}{b} = cc$ ut c denotet spatium, per quod sonus vno minuto secundo propagatur; quo facto aequatio inuenta hanc induet formam:

$$\frac{1}{c} \left(\frac{ds}{dt} \right)' \left(\frac{ds}{dt} \right) = \left(\frac{ds}{dt} \right)^2 + \frac{d\omega}{\omega ds} \left(\frac{ds}{dt} \right)^2 - \frac{d\omega}{\omega ds} \left(\frac{ds}{dt} \right) - \frac{b}{a} \frac{d^2s}{dt^2} \left(\frac{ds}{dt} \right)^2 - \frac{d\omega}{Q ds} \left(\frac{ds}{dt} \right)$$

qua

qua resoluta porro habebitur pro tempore elapso
 $=t$:

densitas $q = \frac{Q \Omega}{\omega \left(\frac{d s}{d t}\right)}$; celeritas $v = \left(\frac{d s}{d t}\right)$ et pressio $p = \frac{a q}{b}$.

Iam ponamus $s = S + v$ ut v sit eiusmodi functio
 ipfarum S et t quae evanescat posito tempore $t=0$,
 quandoquidem tum fieri debet $s=S$; $q=Q$; $\omega=\Omega$
 et $v=Y$; hicque spectamus v ut quantitatem valde
 parvam prae S , vel saltem talem ut $\left(\frac{d v}{d t}\right)$ prae uni-
 tate negligi queat. Cum igitur sit

$$\left(\frac{d s}{d t}\right) = \left(\frac{d v}{d t}\right); \left(\frac{d d s}{d t^2}\right) = \left(\frac{d d v}{d t^2}\right); \left(\frac{d s}{d s}\right) = 1 + \left(\frac{d v}{d S}\right) \text{ et } \left(\frac{d d s}{d s^2}\right) = \left(\frac{d d v}{d s^2}\right);$$

vbi in nostra aequatione occurrit $\left(\frac{d s}{d s}\right)$ eius loco uni-
 tatem scribere licet praeterquam in duobus terminis

$$\frac{d \omega}{\omega d s} \left(\frac{d s}{d s}\right)^2 - \frac{d \Omega}{\Omega d s} \left(\frac{d s}{d s}\right),$$

quia hic ob differentiam inter s et S minimam fere
 est.

$$\frac{d \omega}{\omega d s} = \frac{d \Omega}{\Omega d s},$$

ideoque prae differentia non amplius particula $\left(\frac{d v}{d s}\right)$
 ut evanescens spectari potest. Qua circumstantia ob-
 servata habebimus

$$\frac{1}{c} \left(\frac{d d v}{d t^2}\right) = \left(\frac{d d v}{d s^2}\right) + \frac{d \omega}{\omega d s} - \frac{d \Omega}{\Omega d s} + \frac{d \Omega}{\Omega d s} \left(\frac{d v}{d s}\right) - \frac{b d \pi}{a d s} - \frac{d Q}{Q d s}$$

vbi cum puncta S et s sibi sint proxima, loco $\frac{d \pi}{d s}$
 scribere licet $\frac{d \pi}{d S}$ functionem ipsius S tantum. De-
 inde ob eandem rationem quia formula $\frac{d \omega}{\omega d s}$ nasci-

Tom. XVI. Nou Comm.

Y y

tur

tur ex formula $\frac{d\omega}{\omega ds}$ si hic loco S scribatur $S + v$, erit

$$\frac{d\omega}{\omega ds} = \frac{d\omega}{\omega ds} + \frac{v}{ds} d. \frac{d\omega}{\omega ds}$$

Ponamus ergo breuitatis gratia $\frac{d\omega}{\omega ds} = U$, quae erit functio data ipsius S , unde fit amplitudo $\Omega = A e^{\int U ds}$, fietque nostra aequatio:

$$\frac{1}{e} \left(\frac{d^2 v}{ds^2} \right) = \left(\frac{d^2 v}{ds^2} \right) + U \left(\frac{dv}{ds} \right) + \frac{v}{ds} U - \frac{b dz}{e ds} - \frac{dQ}{Q ds}$$

qua resoluta erit pro motus determinatione:

$$q = \frac{Q \Omega}{\omega (1 + \frac{dv}{ds})} = \frac{Q}{(1 + Uv) \cdot 1 + (\frac{dv}{ds})} = Q (1 - Uv - (\frac{dv}{ds}))$$

quia est $\omega = \Omega + \frac{v d\omega}{ds} = A e^{\int U ds} (1 + Uv)$

deinde celeritas $v = (\frac{dv}{ds})$ et pressio $p = \frac{e}{q}$.

Coroll. I.

79. Totum ergo negotium huc redit ut ex aequatione differentiali secundi gradus inuenta inuestigetur, qualis functio sit quantitas v binarum variabilium S et t , vbi quidem obseruo binos terminos postremos $-\frac{b dz}{e ds} - \frac{dQ}{Q ds}$ resolutionem non impedire quoniam functionem solius variabilis S continent.

Coroll. 2.

80. Conditiones autem, sub quibus aequationis inuentae integrale completum eruere licet ope methodorum quidem adhuc cognitarum, ab indole functionis U , qua ea per variabilem S definitur pendent. Pro

Pro eiusque natura fieri potest, ut integratio modo succedat modo calculi vires superet.

Scholion.

81. Hic igitur confugiendum est ad ea analyticos sublimioris, quae circa functiones duarum variabilium versatur artificia, quibus huiusmodi aequationes

$$\frac{1}{\phi} \left(\frac{d^2 v}{ds^2} \right) = \left(\frac{d^2 v}{ds^2} \right) + U \left(\frac{dv}{ds} \right) + \psi T$$

tractare docui; ubi in eos casus functionum U et T , quae solam variabilem S involuere assumuntur, inquiri oportet quibus integrale completum exhibere licet. Ante omnia autem hic observari oportet, quoties haec integratio succedit per methodos quidem cognitae, integrale semper huiusmodi forma exprimi ut sit

$v = Lf: (S \pm ct) + Mf': (S \pm ct) + Nf'': (S \pm ct)$ etc. ubi circa haec functionum signa tenendum est; si fuerit

$$f: u = V \text{ esse } f': u = \frac{dv}{du}; f'': u = \frac{d^2 v}{du^2}, \text{ etc.}$$

Hinc patet infinitas solutiones locum habere posse, prout huius formae progressio ulterius continuetur. Primam ergo solutionem seu primos integrabilitatis casus ex solo primo termino huius progressionis investigabo, deinde duos eius terminos in subsidium vocando secundos integrabilitatis casus eliciam, sicque porro ad altiores ascendere licebit, plures continuo terminos accipiendo.

Y y 2

Proble-

Problema 83.

82. Inuenire rationem amplitudinis tubi, in quo aer minimas peragit agitationes, vt motus determinatio per primam soluendi methodum succedat.

Solutio.

Cum posita tubi amplitudine $\Omega = A e^{f v ds}$ haec aequatio integrari, debeat:

$$\frac{1}{c c} \left(\frac{d d v}{d t^2} \right) = \left(\frac{d d v}{d s^2} \right) + U \left(\frac{d v}{d s} \right) + \frac{v d U}{d s} - \frac{b d z}{a d s} - \frac{d Q}{Q d s}$$

statuamus $v = L f: (S + c t) + O$ vbi L et O tantum sint functiones ipsius S , et facta substitutione obtinebimus:

$$\begin{aligned} \left(\frac{d d v}{d s^2} \right) &= L f'' : (S + c t) + \frac{1}{a s} f' : (S + c t) + \frac{d d L}{d s^2} f : (S + c t) + \frac{d d O}{d s^2} \\ U \left(\frac{d v}{d s} \right) &= U L f' : (S + c t) + \frac{U d L}{d s} f : (S + c t) + \frac{U d O}{d s} \\ \frac{v d U}{d s} &= \frac{L d U}{d s} f : (S + c t) + \frac{O d U}{d s} \\ - \frac{b d z}{a d s} - \frac{d Q}{Q d s} &= - \frac{b d z}{a d s} - \frac{d Q}{Q d s} \end{aligned}$$

quae iunctim sumta ipsi $\frac{1}{c c} \left(\frac{d d v}{d t^2} \right) = L f'' : (S + c t)$ aequari oportet: vnde nascuntur haec aequationes:

$$\text{I. } \frac{1}{a s} \frac{d L}{d s} + L U = 0$$

$$\text{II. } \frac{d d L}{d s^2} + \frac{U d L + L d U}{d s} = 0$$

$$\text{III. } \frac{d d O}{d s^2} + \frac{U d O + O d U}{d s} - \frac{b d z}{a d s} - \frac{d Q}{Q d s} = 0$$

quarum secunda integrata dat $\frac{d L}{d s} + L U = C$, quae cum prima collata praebet $-\frac{d L}{a s} = C$, hincque $L = a S + \frac{1}{2}$ et $U = \frac{-1}{a S + \frac{1}{2}} = -\frac{d \Omega}{a d s}$. Quare cum sit

fit $\frac{d\Omega}{dS} = \frac{-\frac{1}{2}\alpha dS}{aS + \epsilon}$ fiet amplitudo tubi $\Omega = \frac{ff}{(aS + \epsilon)^2}$,
 solutionem ope primae methodi admittens. Tertia
 vero aequatio integrata dat;

$$\frac{dO}{dS} + UO - \frac{b}{a}Z - IQ = C \text{ seu ob } U = \frac{-\frac{1}{2}\alpha}{aS + \epsilon}$$

$$dO - \frac{\frac{1}{2}\alpha O dS}{aS + \epsilon} - \frac{b}{a}Z dS - dS IQ = C dS$$

quae per $(aS + \epsilon)^2$ diuisa et integrata producit

$$\frac{O}{(aS + \epsilon)^2} = \int \frac{dS (\frac{b}{a}Z + IQ + C)}{(aS + \epsilon)^3}$$

Quare si amplitudo tubi ita sit variabilis, vt lon-
 gitudini $AS = S$ respondeat amplitudo $\Omega = \frac{ff}{(aS + \epsilon)^2}$,
 tum aequationis motum determinantis integrale com-
 pletum erit

$$v = (aS + \epsilon)^2 \int \frac{dS(C + \frac{b}{a}Z + IQ)}{(aS + \epsilon)^3} + (aS + \epsilon) \Gamma : (S + \epsilon t)$$

$$+ (aS + \epsilon) \Delta : (S - \epsilon t)$$

quandoquidem functionem assumtam $f : (S + \epsilon t)$
 geminare licet introducendo tam $-\epsilon$ quam $+\epsilon$.

Coroll. I.

83. In hac solutione statim continetur casus
 tuborum aeque amplorum constantes ita definiendo
 vt sit $\alpha = 0$ et $\epsilon = 1$. Haec autem solutio multo
 latius patet, cum eius ope agitationes aeris in tubis
 eiusmodi inaequaliter amplis quoque definiri queant,
 quorum amplitudo in hac formula continetur
 $\Omega = \frac{ff}{(aS + \epsilon)^2}$.

Y y 3

Coroll.

Coroll. 2.

84. Inuenta autem hac functione ψ elapso tempore t aer qui initio erat ad S translatus erit per intervallum $S\delta = \psi$ tum vero eius densitas ob $U = \frac{1}{a\delta + \epsilon}$ erit

$$q = Q \left(+ \frac{1}{a\delta + \epsilon} - \left(\frac{d\psi}{dS} \right) \right) \text{ et celeritas } u = \left(\frac{d\psi}{dS} \right),$$

Coroll. 3.

85. Cum autem differentiando sit:

$$\left(\frac{d\psi}{dS} \right) = 2a(aS + \epsilon) \sqrt{\frac{dS(C + \frac{b}{a}Z + Q)}{(aS + \epsilon)^3}} + C + \frac{b}{a}Z + Q + a\Gamma : (S + ct) + a\Delta : (S - ct) \\ + (aS + \epsilon)\Gamma' : (S + ct) + (aS + \epsilon)\Delta' : (S - ct)$$

habebitur pro densitate:

$$\frac{q}{Q} = 1 + Q - \frac{b}{a}Z - Q + a\Gamma : (S + ct) + a\Delta : (S - ct) \\ - (aS + \epsilon)\Gamma' : (S + ct) - (aS + \epsilon)\Delta' : (S - ct)$$

et pro celeritate:

$$u = c(aS + \epsilon)\Gamma' : (S + ct) - c(aS + \epsilon)\Delta' : (S - ct).$$

Scholion.

85. Si tubos, ad quos haec solutio est accommodata, rotundos statuamus, ut omnes sectiones ad eius directionem normaliter factae sint circuli, eorum figura est conoidica hyperbolica conversione hyper-
Tab. VII. bolae aequilaterae KCM circa alteram asymptotam
Fig. 80. IB nata. Cum enim in hac hyperbola sit SM .
 $IS = aa$, erit amplitudo in $S = \pi SM^2 = \frac{\pi a^2 a}{1S^2}$,
sumto

sumto ergo intervallo $IA = \frac{e}{a}$, et posito $AS = S$ ob. $IS = \frac{a^2 S + e^2}{a}$, fiet amplitudo $\Omega = \frac{\pi a a a a}{(a^2 S + e^2)^{3/2}}$, ideoque $ff = \pi a a a a$. Quoties ergo tubus habuerit huiusmodi figuram conoidicam hyperbolicam, aeris agitationes in huiusmodi tubis, dummodo sint minimae, perinde definiri poterunt, atque in tubis aequaliter amplis. Interim tamen ipsa motus determinatio aliquanto erit operosior. Ceterum hic observari conuenit aeris gravitatem, quam in superioribus capitibus negleximus, inuestigationem plane non turbare: id quod etiam de aliis viribus, quae forte aerem sollicitarent est tenendum.

Problema 84.

86. Inuestigare rationem qua tubi amplitudo debet esse comparata vt aequationis differentiodifferentialis integrale completum per secundam formam exhiberi possit.

Solutio.

Hic scilicet quaeritur indoles functionis U a sola variabili S pendentis, vt aequationis nostrae integrale completum huiusmodi forma exprimi queat;

$$v = O + Mf'(S + \epsilon t) + Lf(S + \epsilon t)$$

vbi L, M, O sint functiones solius variabilis S . Faciamus ergo substitutionem in nostra aequatione, ac reperiemus:

$$0 =$$

$$\begin{aligned}
& 0 = \frac{d d O}{d S^2} + M f''' : (S + c t) + \frac{d d M}{d S} f'' : (S + c t) + \frac{d d N}{d S^2} f' : (S + c t) \\
& + \frac{U d O}{d S} + L + \frac{d d L}{d S} + \frac{d d L}{d S^2} f : (S + c t) \\
& + \frac{O d U}{d S} + U M + \frac{U d M}{d S} \\
& - \frac{b d Z}{d S} + U L + \frac{U d L}{d S} \\
& - \frac{d O}{d S} - M f'' : (S + c t) - L f' : (S + c t) + \frac{M d U}{d S} + \frac{L d U}{d S}
\end{aligned}$$

cuius singula membra, quatenus diuerſas functiones complectuntur ſeorſim ad nihilum redigi oportet: ex quo ſequentes quatuor aequationes naſcuntur.

$$\text{I. } \frac{d d M}{d S} + U M = 0$$

$$\text{II. } \frac{d d M}{d S^2} + \frac{d d L}{d S} + \frac{U d M + M d U}{d S} + U L = 0$$

$$\text{III. } \frac{d d L}{d S^2} + \frac{U d L + L d U}{d S} = 0$$

$$\text{IV. } \frac{d d O}{d S} + U d O + O d U - \frac{b}{d} d Z - \frac{d O}{d S} = 0$$

Tertia integrata dat $\frac{d L}{d S} + U L = A$, quae cum prima combinata eliminando U praebet $M d L - 2 L d M = A M d S$, vnde colligitur $L = A M M \int \frac{d S}{M M}$, et $U = - \frac{d M}{M d S}$. His valoribus in ſecunda aequatione ſubſtitutis peruenitur ad hanc aequationem,

$$- \frac{d d M}{d S^2} + 2 A + \frac{d d M}{d S} \int \frac{d S}{M M} = 0$$

Ad hanc reſoluendam ſit $\int \frac{d S}{M M} = R$, hincque $d S = M M d R$, et quia eſt $\frac{d d M}{d S} = d \cdot \frac{d M}{d S} = d \cdot \frac{d M}{M M d R}$, illa aequatio per $d S$ multiplicata praebet

$$- d \cdot \frac{d M}{M M d R} + 2 A M M d R + 2 A M R d M = 0$$

qua

qua resoluta habebitur $dS = MMdR$; $L = AMMR$
 et $U = -\frac{dM}{M^2dR}$. Verum ista aequatio per R mul-
 tiplicata integrabilis redditur cum sit

$$\int R d \frac{dM}{MMdR} = \frac{RdM}{MMdR} + \frac{1}{M} \text{ ideoque habebimus:}$$

$$\frac{RdM}{MMdR} + \frac{1}{M} = AMMR + B = \frac{MR + RdM}{MMdR} = L$$

Ponatur denique $MR = x$, seu $M = \frac{x}{R}$ erit Axx
 $+ B = \frac{RRdx}{xxdR}$ hincque $\frac{dR}{RR} = \frac{dx}{x(Ax+B)}$ seu $\frac{BdR}{RR}$
 $= \frac{dx}{x} - \frac{A dx}{Ax+B}$; ideoque $\frac{B}{R} = \frac{1}{x} + \int \frac{A dx}{Ax+B}$.

unde R datur per x , tum ob $M = \frac{x}{R}$ reliquae quan-
 titates omnes per x dabuntur: sit autem $dS = \frac{xxdR}{RR}$
 $= \frac{dx}{Ax+B}$ et $UdS = \frac{d\Omega}{\Omega} = -\frac{dM}{M}$ ita ut sit am-
 plitudo $\Omega = \frac{C}{MM} = \frac{CRR}{xx}$. Euoluamus hinc casus

quibus amplitudo Ω per variabilem S algebraice de-
 finitur, quod fit si constans $B = 0$, tum enim erit
 $\frac{dR}{RR} = \frac{dx}{Ax^2}$, ideoque $\frac{1}{R} = \frac{1}{Ax} + \frac{D}{x^2}$, et $R = \frac{1}{\frac{1}{Ax} + \frac{D}{x^2}}$, at-
 que $M = \frac{1}{\frac{1}{Ax} + \frac{D}{x^2}}$. Cum autem sit $dS = \frac{dx}{Ax^2}$ erit
 $\frac{1}{x} = -AS - E$, seu $x = -\frac{1}{AS+E}$ hincque

$$M = \frac{(AS+E)^2 - D}{1(A(AS+E))}, \text{ et } R = -\frac{1}{(AS+E)^2 - D};$$

unde porro colligimus

$$\Omega = \frac{AA C (AS+E)^2}{((AS+E)^2 - D)^2}, \text{ et } L = -\frac{(AS+E)^2 + D}{1(AS+E)^2}$$

Denique pro quantitate O obtinemus:

$$\frac{dO}{dS} + UO - \frac{b}{a} Z - lQ + lF = 0 \text{ seu}$$

$$dO + \frac{O d\Omega}{\Omega} - \frac{b}{a} Z dS - dS l \frac{Q}{F} = 0. \text{ Ergo}$$

$$O = \frac{1}{\Omega} \int \Omega dS \left(\frac{b}{a} Z + l \frac{Q}{F} \right)$$

Tom. XVI. Nou. Comm.

Z z

Im-

Immutemus parumper constantes, et quando amplitudo tubi Ω pro abscissa $AS = S$ ita fuerit comparata, vt sit $\Omega = \frac{ff(\alpha S + \epsilon)^2}{(\alpha S + \epsilon)^2 - \gamma^2}$, tum sumtis

$$O = \frac{1}{\alpha} f \Omega dS \left(\frac{1}{\alpha} Z + l \frac{\gamma}{\alpha} \right)$$

$$M = \frac{(\alpha S + \epsilon)^2 - \gamma}{\alpha (\alpha S + \epsilon)} \text{ et } L = - \frac{(\alpha S + \epsilon)^2 + \gamma}{\alpha (\alpha S + \epsilon)^2}$$

erit nostrae aequationis integrale completum,

$$v = O + M \Gamma' : (S + \epsilon t) + L \Gamma : (S + \epsilon t) \\ + M \Delta' : (S - \epsilon t) + L \Delta : (S - \epsilon t)$$

vnde porro definitur densitas $q = Q \left(1 - \frac{v d \Omega}{\Omega d S} - \left(\frac{d v}{d S} \right) \right)$
et celeritas $v = \left(\frac{d v}{d t} \right)$.

Coroll. 1.

87. Hic primum obseruandum est quantitates pro L et M inuentas per quantitatem quamcunque constantem multiplicari posse, quam functiones indefinitae complecti sunt censendae, hinc sumi poterit

$$M = \frac{(\alpha S + \epsilon)^2 - \gamma}{\alpha \delta (\alpha S + \epsilon)} \text{ et } L = - \frac{(\alpha S + \epsilon)^2 + \gamma}{\delta (\alpha S + \epsilon)^2}$$

quod tenendum est si forte illi valores fiant infiniti.

Coroll. 2.

88. Si enim capiatur $\gamma = \infty$, et $f = n \gamma$, vt amplitudo fiat $\Omega = n n (\alpha S + \epsilon)^2$, sumatur quoque $\delta = \gamma$, critque

$$M = \frac{1}{\alpha (\alpha S + \epsilon)} \text{ et } L = \frac{1}{(\alpha S + \epsilon)^2}$$

Hoc

Hoc autem casu tubi habebuntur conici vel pyramidici, in quibus ergo pariter agitationes aeris minimas definire licebit.

Coroll. 3.

89. Si sumatur $\gamma = 0$, tubus ita erit formatus ut sit $\Omega = \frac{ff}{(\alpha S + \epsilon)^2}$ seu amplitudines erunt reciproce ut biquadrata abscissarum: tum autem fit

$$M = \frac{1}{2}(\alpha S + \epsilon)^2 \text{ et } L = -(\alpha S + \epsilon).$$

Coroll. 4.

90. In genere autem haec solutio ad eiusmodi Tab. VII: tubos conoidicos applicari potest, qui oriuntur ex con- Fig. 90.
versione huiusmodi curvae hyperbolicae circa axem IB, pro qua posita abscissa $AS = x$, et applicata $SM = y$, sit $y = \frac{a^2 x}{x^2 + b^2}$: quae curva axem in A secans duas habet asymptotas GH et KL inter se normales.

Scholion 1.

91. Si etiam figuras tubi transcendentes cognoscere velimus, faciamus $B = Amm$ et $A = \frac{a}{m}$ et aequatio $dS = \frac{dx}{\alpha x x + B}$ seu $\alpha dS = \frac{m dx}{x x + m m}$ dabit $x = m \text{ tang. } (\alpha S + \epsilon)$, unde porro colligitur $\frac{\alpha m m}{R} = \alpha S + \gamma + \cot. (\alpha S + \epsilon)$ seu $R = \frac{\alpha m m}{\alpha S + \gamma + \cot. (\alpha S + \epsilon)}$ hincque

$$M = \frac{1 + (\alpha S + \gamma) \text{ tang. } (\alpha S + \epsilon)}{\alpha m} \text{ et } L = \frac{1 + (\alpha S + \gamma) \text{ tang. } (\alpha S + \epsilon)}{m \cot. (\alpha S + \epsilon)}$$

Z z 2

Deinde

Deinde fit amplitudo $\Omega = \frac{C}{(1 + (dS + \gamma) \log. (a^2 + 4\gamma^2))}$,
quantitas vero O hinc definitur ut ante

$$O = \frac{1}{A} \int \Omega dS \left(\frac{b}{s} Z + \frac{1}{s} \right).$$

Ex his autem formis colligimus methodum aequationes primam erutas multo facilius resolvendi. Cum eni prima det $U = -\frac{1}{M} \frac{dM}{dS}$, tertia vero integrata $\frac{dL}{dS} + UL = A$, erit $dL = \frac{1}{M} \frac{dM}{dS} = A dS$, ponamus $L = My$, fietque $M dy - y dM = A dS$. Nunc secunda quod fieri potest integrata praebet

$$\frac{dM}{dS} + 2L + UM + fUL dS = 0$$

quare ob

$$UM = -\frac{1}{M} \frac{dM}{dS} \text{ et } fUL dS = -2f \frac{dM}{M} = -2f y dM$$

transit in:

$$\frac{dM}{dS} + 2My - \frac{1}{M} \frac{dM}{dS} - 2f y dM = 0,$$

quae contrahitur in hanc $2fM dy - \frac{1}{M} \frac{dM}{dS} = 0$. Ex illa autem fit

$$2M dy = A dS + y dM + M dy \text{ ita ut sit}$$

$$2fM dy = A dS + My + B = \frac{dM}{dS}$$

unde cum parum colligere liceat, consideremus has duas aequationes:

$$M dy - y dM = A dS \text{ et } 2fM dy = \frac{dM}{dS}$$

quas ambas differentiemus sumto elemento dS constante

$$M ddy - y ddM = 0 \text{ et } 2M dy = \frac{dM}{dS}$$

unde

unde fit $\frac{dM}{M} = \frac{dy}{y} = 2 dy dS$ seu $dM = 2y dy dS$

cuius integrale est $dy = dS (y^2 + m^2)$ hincque
porro Ang. tang. $\frac{y}{m} = mS + n$ et convertendo $y = m$
tang. $(mS + n)$. iam ex aequatione

$$\frac{M dy - y dM}{y^2} = \frac{A dS}{y^2} = \frac{A dS}{m^2 \text{ tang.}^2 (mS + n)} \text{ fit}$$

$$\frac{M}{y} = - \frac{M}{m \text{ tang.} (mS + n)} = \frac{A}{m} \int \frac{dS \cos (mS + n)}{\sin^2 (mS + n)}$$

$$= \frac{A}{m} \int \frac{dS}{\sin (mS + n)} - \frac{A S}{m \text{ tang.} (mS + n)} - \frac{A S}{m m} + \frac{A}{m}$$

unde fit

$$M = \frac{A}{m} (x + (mS + k) \text{ tang.} (mS + n))$$

hincque porro

$$L = \frac{A (1 + (mS + k) \text{ tang.} (mS + n))}{m \cos (mS + n)}$$

ac denique prodit amplitudo $\Omega = \frac{Cm}{Mx}$ seu

$$\Omega = \frac{Cm}{A (1 + (mS + k) \text{ tang.} (mS + n))}$$

Scholion 2.

98. Adhuc facilius hanc resolutionem instituere
licet hac modo: cum ex prima aequatione fit

$$U = - \frac{dM}{M^2} \text{ ponatur statim } L = My, \text{ eritque}$$

$$MU = - \frac{dM}{dS} \text{ et } LU = - \frac{dM}{dS}$$

ex quo secunda aequatio fiet

$$\frac{dM}{dS} + 2 dMy - 2 d \frac{dM}{dS} - 2 y dM = 0 \text{ seu}$$

$$- \frac{dM}{dS} + 2 M dy = 0 \text{ seu } \frac{dM}{M} = 2 dy dS$$

Z z 3

simili

simili modo tertia abit in hanc formam:

$$\frac{d d M}{d S} - 2 y \frac{d M}{d S} = 0 \text{ habet } d M = 0$$

factaque evolutione

$$M d d y + 2 d M d y + y d d M - 2 d y d M - 2 y d d M = 0$$

hoc est

$$M d d y - y d d M = 0 \text{ seu } \frac{d d M}{M} = \frac{d d y}{y}$$

Ex his coniunctis fit ut ante $d d y = 2 y d y d S$.

Quod si hinc statim tubi formas algebraicas elicere

velimus sumatur superior constans $m = 0$, ut fit

$d y = y y d S$ ideoque $\frac{1}{y} = -S - \frac{e}{a}$, seu $y = \frac{-a}{a S + e}$.

Tum aequatio $M d y - y d M = A d S$ dat

$$-\frac{M}{y} = \frac{A}{a} d S (a S + e)^2 = \frac{A}{a^2} ((a S + e)^2 - \gamma),$$

ideoque

$$M = \frac{A((a S + e)^2 - \gamma)}{a a (a S + e)} \text{ et } L = -\frac{A((a S + e)^2 - \gamma)}{a a (a S + e)^2},$$

ac denique amplitudo $\Omega = \frac{C(a S + e)^2}{(a S + e)^2 - \gamma}$ prorsus ut ante.

Scholion 3.

93. Praeter hos duos casus autem, quibus forma tubi vel est algebraica, vel a circulo pendet,

tertium non omitti convenit, quo ea per quantitates

exponentiales determinatur. Pro eo autem aequationis

$d d y = 2 y d y d S$ integrale sumitur $d y = d S (y y - m m)$

vnde fit $2 m S + 2 n = \frac{1^2 - m^2}{2 + m}$ vnde fit

$$y = \frac{x + e^{m S + n}}{x - e^{m S + n}}$$

cum

tum vero porto

$$-\frac{M}{f} = \frac{A}{mm} \int \frac{dS(1 - e^{2mS+2n})^2}{(1 + e^{2mS+2n})^2} = \frac{A}{m^2} \cdot \frac{e^{2mS+2n}(mS+k-1)+mS+k+1}{1 + e^{2mS+2n}}$$

ideoque

$$M = -\frac{A}{mm} \cdot \frac{e^{2mS+2n}(mS+k-1)+mS+k+1}{1 + e^{2mS+2n}}$$

et

$$L = -\frac{A}{m} \cdot \frac{e^{2mS+2n}(mS+k-1)+mS+k+1}{(1 - e^{2mS+2n})^2} (1 + e^{2mS+2n})$$

atque amplitudo

$$\Omega = \frac{C(1 - e^{2mS+2n})^2}{(e^{2mS+2n}(mS+k-1)+mS+k+1)^2}$$

Certum est ex hoc casu perinde atque ex priori a circulo pendente casum algebraicum prodire debere, si statuatur $m=0$ quae tamen euolutio minus est obuia, et haud exiguam industriam Analystae posulat.

Problema 85.

92. Inuestigare casus pro tubi amplitudine, ut aequatio differentio-differentialis inuenta per operationes tertii ordinis integrari queat, vel eius integrale completum per tertiam formam supra explicatam exhiberi queat.

Solutio.

Hoc ergo casu integrale quaesitum talem formam habere debet:

$$\psi = O + Nf'' : (S+ct) + Mf' : (S+ct) + Lf : (S+ct)$$

et

et quia iam patet quantitatem O ut ante definitum
iri, tantum diversas functionum species notemus:

$$f^{III}:(S+ct) \quad f^{II}:(S+ct) \quad f^I:(S+ct) \quad f^0:(S+ct) \quad f^{-1}:(S+ct)$$

$+N$	$+\frac{2dN}{dS}$	$+\frac{ddN}{dS^2}$	$+\frac{ddM}{dS^2}$	$+\frac{ddL}{dS^2}$
$+M$	$+L$	$+\frac{UdN}{dS}$	$+\frac{UM}{dS}$	$+\frac{UL}{dS}$
$+UN$	$+UM$	$+\frac{NdU}{dS}$	$+\frac{NdU}{dS}$	$+\frac{NdU}{dS}$
$-N$	$-M$	$-L$		

unde deducimus quatuor sequentes aequationes:

$$I. \frac{ddN}{dS^2} + UN = 0$$

$$II. \frac{ddN}{dS^2} + \frac{ddM}{dS^2} + \frac{UdN + NdU}{dS} + UM = 0$$

$$III. \frac{ddN}{dS^2} + \frac{ddL}{dS^2} + \frac{UdN + NdU}{dS} + UL = 0$$

$$IV. \frac{ddL}{dS^2} + \frac{UdL + LdU}{dS} = 0$$

Cum nunc ex prima sit $U = -\frac{ddN}{NdS}$, ponamus
 $M = Ny$ et $L = Nz$, ut fiat

$$UN = -\frac{ddN}{dS}; \quad UM = -\frac{ddN}{dS}; \quad UL = -\frac{ddN}{dS};$$

quibus valoribus substituendis aequatio II. fit

$$\frac{ddN}{dS^2} + \frac{2Ndy + ydN}{dS} - \frac{ddN}{dS^2} - \frac{ydN}{dS} = 0$$

quae contrahitur in hanc formam:

$$II. \frac{ddN}{dS} + 2NdY = 0$$

Tertia

Tertia aequatio vero hinc euadit:

$$\frac{Nddy + 1Ndy + yddN}{dS^2} + \frac{1Ndz + 1zdn}{dS} - \frac{yddN - dydn}{dS^2} - \frac{1zdn}{dS} = 0$$

quae contrahitur in hanc formam:

$$\text{III. } \frac{Nddy - yddN}{dS} + 2Ndz = 0.$$

Quarta denique ita euoluitur:

$$\frac{Nddz + 1dNdz + zddN}{dS^2} - \frac{1zddN - 1dzdn}{dS^2} = 0$$

quae ergo praebet hanc formam:

$$\text{IV. } \frac{Nddz - zddN}{dS} = 0.$$

Ex his triplici modo fit:

$$\frac{ddN}{N} = 2dy dS = \frac{ddy + 1zdz}{y} = \frac{ddz}{z}$$

vnde hae duae aequationes resoluendae proponuntur:

$$2ydydS = ddy + 2zdz \text{ et } yddz - zddy = 2zdzdS$$

quarum posterior integrata statim dat.

$$ydz - zdy = dS(zz + A)$$

prior vero pariter integrata praebet:

$$dy + 2z dS = dS(yy + B)$$

$$\text{feu } dy = dS(yy - 2z + B).$$

Iam illa per hanc diuisa suppeditat hanc aequationem ab elemento dS liberam:

$$\frac{ydz - zdy}{dy} = \frac{zz + A}{yy - 2z + B}$$

fit $z = uy$ et haec aequatio fit

$$\frac{yydu}{dy} = \frac{uuyy + A}{yy - 2uy + B}$$

$$\text{feu } y^2 du - 2uy^2 du + Byy du - uuyy dy - A dy = 0.$$

Tom. XVI. Nou. Comm. A a a Necot-

Necessitas hic urget, vt faciamus $A = 0$ et $B = 0$; quo facto habebimus:

$$yydu - 2uydu - uudy = 0 \text{ seu } yydu = d.uyy$$

diuidamus per $u^2 y^2$ erit $\frac{du}{u} = \frac{d.uyy}{u^2 y^2}$ eiusque integrale:

$$\frac{1}{u^2} = \frac{1}{uy} - \frac{1}{m^2} \text{ seu } y = \frac{m^2 u}{m^2 + u^2} \text{ et } z = \frac{m^2 u}{m^2 + u^2},$$

vnde fit

$$dS = \frac{dy}{yy - 2uy} = \frac{ydz - zdz}{zz}, \text{ siue}$$

$$dS = \frac{du}{u} = -d. \frac{z}{u}, \text{ ita vt sit } \frac{1}{u} = S - \frac{z}{u} \text{ et } u = \frac{z}{S - z}.$$

Ergo iam per S habebimus hos valores:

$$y = \frac{m^2 \alpha (\alpha S + 6)^2}{m^2 (\alpha S + 6)^2 - \alpha^2} \text{ et } z = \frac{m^2 m^2 (\alpha S + 6)}{m^2 (\alpha S + 6)^2 - \alpha^2}.$$

Ponamus breuitatis gratia $\frac{\alpha^2}{m^2} = \gamma^2$ vt fiat

$$y = \frac{\alpha (\alpha S + 6)^2}{(\alpha S + 6)^2 - \gamma^2} \text{ et } z = \frac{\alpha \alpha (\alpha S + 6)}{(\alpha S + 6)^2 - \gamma^2}.$$

Nunc porro ex acuatione IV colligimus:

$$N dz - z dN = A dS = \frac{A du}{uu}$$

quae ob $z = \frac{\alpha^2 u}{\alpha^2 + \gamma^2 u^2}$ diuisa per zz dat

$$-d. \frac{N}{z} = \frac{B du}{u^6} (\alpha^2 + \gamma^2 u^2)^2 \text{ et integrando}$$

$$-\frac{N}{z} = C + B (\gamma^6 u - \frac{\alpha^2 \gamma^2}{u^3} - \frac{\alpha^6}{u^3})$$

hinc $N = \frac{Bz}{u^3} (\alpha^6 + 5\alpha^2 \gamma^2 u^3 - 5\gamma^6 u^6) - Cz$ et euoluendo

$$N = \frac{A(\alpha S + 6)^6 - 5A\gamma^2(\alpha S + 6)^3 - 5A\gamma^6 + B(\alpha S + 6)}{(\alpha S + 6)^3 - \gamma^2}$$

mutatis scilicet constantibus, vnde statim definitur amplitudo tubi $\Omega = \frac{C}{NN}$, tum vero erit

$$M = \frac{\alpha (\alpha S + 6)^2}{(\alpha S + 6)^2 - \gamma^2} N \text{ et } L = \frac{\alpha \alpha (\alpha S + 6)}{(\alpha S + 6)^2 - \gamma^2} N.$$

Pro

Pro quantitate autem O ut ante est

$$O = \frac{1}{\Omega} / \Omega dS \left(\frac{b}{a} Z + l \frac{O}{B} \right).$$

Quoties ergo amplitudo Ω hoc modo definitur, solutio completa nostri problematis ita se habebit ut sit :

$$\varphi = O + N\Gamma'' : (S + ct) + M\Gamma' : (S + ct) + L\Gamma : (S + ct) \\ + N\Delta'' : (S - ct) + M\Delta' : (S - ct) + L\Delta : (S - ct).$$

Deinde vero est densitas $q = Q \left(1 - \frac{v}{a} \frac{d\Omega}{dS} - \left(\frac{dv}{dS} \right) \right)$
et celeritas $v = \left(\frac{dv}{dS} \right).$

Coroll. 1.

95. Determinatio hæc amplitudinis tubi resolutionem propositam admittens duplici modo est particularis, dum duas constantes arbitrarias in æquatione inter y et z inuenta nihilo æquales posuimus; interim tamen forma pro Ω eruta plures adhuc constantes arbitrarias complectitur, ideoque latius patet quam casus præcedens in omni extensione acceptus.

Coroll. 2.

96. Casus simpliciores in hac solutione contenti oriuntur, si fiat $\gamma = 0$, tum enim erit :

$$N = \frac{A(\alpha S + \epsilon)^2 + B(\alpha S + \epsilon)}{(\alpha S + \epsilon)^2}$$

prout igitur fuerit vel $A = 0$ vel $B = 0$, reperitur vel

$$N = (\alpha S + \epsilon)^{-2} \text{ vel } N = (\alpha S + \epsilon)^{-1};$$

A a a 2

illo

illo igitur casu amplitudo ita definitur ut sit

$$\Omega = C(\alpha S + \xi)^4, \text{ hoc vero } \Omega = C(\alpha S + \xi)^{-6}.$$

Coroll. 3.

97. Solutio per operationem primi ordinis inuenta etiam duos casus simpliciores dederat hos:

$$\Omega = C(\alpha S + \xi)^0 \text{ et } \Omega = C(\alpha S + \xi)^{-1}$$

operatio vero secundi ordinis praeberat hos duos

$$\Omega = C(\alpha S + \xi)^2 \text{ et } \Omega = C(\alpha S + \xi)^{-2}$$

nunc haec tertii ordinis suppeditat:

$$\Omega = C(\alpha S + \xi)^4 \text{ et } \Omega = C(\alpha S + \xi)^{-6},$$

vnde concludere licet hanc methodum ad omnes tubos applicari posse hac formula $\Omega = C(\alpha S + \xi)^{\pm 1}$ contentos; exclusis exponentibus imparibus.

Scholion 1.

98. Omnes plane tuborum formae hoc modo resolutionem admittentes repeti debent ex hac aequatione

$$y^2 du - 2uy^2 du - uuyy dy + Byy du - A dy = 0$$

vbi A et B constantes ab arbitrio nostro pendentes denotant, quas tamen ambas in praecedente solutione evanescentes facere sum coactus, ut integratio succederet. Nunc autem obseruo dummodo sit $A=0$ ideoque

$$dS = \frac{2dz - zdy}{2u} = \frac{du}{u},$$

inte-

integrationem etiam nunc administrari posse, quaecunque constans pro B assumatur. Cum enim tum fit

$$yydu - 2uydu - uudy + Bdu = 0$$

ponamus $uuy = x$ seu $y = \frac{x}{u}$ erit

$$\frac{x}{u^2} du - dx + Bdu = 0 \text{ seu } d\left(\frac{x}{u}\right) + Bdu = 0$$

qui est casus integrabilis aequationis Riccatianae, cui satisfacit forma $\frac{x}{u} = \frac{a}{u} + \frac{c}{u^2}$; fit enim

$$\frac{-x}{u^2} - \frac{c}{u^3} + \frac{Bax}{u^2} + \frac{Bac}{u^3} + \frac{Bc}{u^2} + \frac{1}{u} = 0$$

unde sumi debet

$$B = -\frac{1}{c} \text{ et } a = \frac{1}{B} = -c,$$

ita ut fit

$$\frac{x}{u} = -\frac{c}{u} + \frac{c}{u^2}.$$

Ponatur ergo

$$\frac{x}{u} = -\frac{c}{u} + \frac{c}{u^2} + \frac{1}{p},$$

ut aequationis

$$d\left(\frac{x}{u}\right) - \frac{d u}{c u^2} + \frac{d u}{u^2} = 0$$

integrale completum eruamus, orieturque:

$$dp - \frac{p du}{u} + \frac{p du}{c u^2} + \frac{du}{c u^2} = 0$$

quae per $\frac{e^{-\frac{1}{c u}}}{u u}$ multiplicata et integrata praebet:

$$\frac{e^{-\frac{1}{c u}} p}{u u} + \frac{e^{-\frac{1}{c u}}}{2 c} = \frac{C}{2 c} \text{ seu } p = \frac{C e^{\frac{1}{c u}} u u}{2 c} - \frac{u u}{2 c}$$

$$\text{ita ut sit } \frac{x}{x} = -\frac{v}{u} + \frac{v}{uu} + \frac{2v}{uu(Ce^{\frac{2}{u}} - 1)}$$

$$\text{hincque } x = \frac{uu(Ce^{\frac{2}{u}} - 1)}{v(1 + v) + Ce^{\frac{2}{u}}(1 - v)} = uxy.$$

$$\text{Ergo } y = \frac{Ce^{\frac{2}{u}} - 1}{v(1 + v) + Ce^{\frac{2}{u}}(1 - v)} \quad \text{et } z = \frac{u(Ce^{\frac{2}{u}} - 1)}{v(1 + v) + Ce^{\frac{2}{u}}(1 - v)}$$

existente $\frac{1}{u} = \frac{1}{ms} + \frac{1}{n}$; tum vero est $N dz - z dN$
 $= D dS = \frac{D d u}{u u}$ ex qua per $z z$ diuisa reperitur N
 indeque reliqua.

Si hic faceremus $v = \infty$ praecedens solutio resularet:

Scholion 2.

Si hoc modo ulterius progredi placeat, calculus quidem fit laboriosior, sed tamen artificio hic visitato praecipuas difficultates superare licebit. Veluri si pro integralis forma quarti ordinis ponamus:

$$v = O + N f''' : (S + ct) + M f'' : (S + ct) + L f' : (S + ct) + K f : (S + ct)$$

et ob

$$U dS = \frac{dN}{N} = -\frac{dN}{N} \quad \text{ideoque } \Omega = \frac{ff}{NN} \text{ ponatur}$$

$$M = Nx, L = Ny \text{ et } K = Nz;$$

perueniturque ad has aequationes:

$$\frac{dN}{N} = 2 dx dS = \frac{dx}{x} + \frac{dx ds}{x} = \frac{dx}{x} + \frac{dx ds}{y} = \frac{dx}{x}$$

unde

unde

unde

unde deducimus:

$$I. \quad 2x dx dS = ddx + 2y dy dS$$

$$II. \quad y ddx - x ddy + 2y dy dS - 2x dx dS = 0$$

$$III. \quad ddx - 2x dx dS = 0$$

$$IV. \quad x ddy - y ddx + 2x dx dS = 0$$

hincque integrando

$$I. \quad x x dS = dx + 2y dS + \text{Const. } dS$$

$$II + III. \quad y dx - x dy + dz + y y dS - 2x x dS = \text{Const. } dS$$

$$IV. \quad x dy - y dx + z z dS = \text{Const. } dS.$$

Omnes has tres constantes nihilo sumamus aequales, et ultima praebet $\frac{z}{S} = -S$, ita ut sit $y = -zS$, ubi constantis additione non est opus, quia loco S scriptum concipere licet $S + \frac{e}{S}$ uti supra. Posito igitur $y = -zS$ ex prima fit $dx = dS(x x + 2zS)$, et ex secunda

$$-S z dx + S x dz - x z dS + dz + S S z z dS = 0$$

quae per $z z$ divisa et integrata edite

$$-\frac{S z}{z} - \frac{1}{z} + \frac{1}{2} S^2 + \frac{1}{2} A = 0 \text{ ideoque } z = \frac{S(1 + S z)}{A + S^2}$$

hocque valore in prima substituto fit

$$dx = dS \left(x x + \frac{S S (1 + S z)}{A + S^2} \right)$$

cui cum satisfiat $x = -\frac{1}{S}$, ponatur $x = -\frac{1}{S} + \frac{y}{S}$ eritque $0 = d y - \frac{S y d S}{S} + \frac{S y S S d S}{A + S^2} + d S$, cuius integrale,

$$y = \frac{B S S + A A S - A S^2 - \frac{1}{2} S^4}{(A + S^2)^2} \text{ suppeditat}$$

TVBIS

$x =$

$$x = \frac{-B + 3ASS + \frac{1}{2}S^2}{BS + AA - AS^2 - \frac{1}{2}S^2}, \text{ hincque porro}$$

$$z = \frac{-3(A + S^2)}{BS + AA - AS^2 - \frac{1}{2}S^2} \text{ et } y = \frac{-3S(A + S^2)}{BS + AA - AS^2 - \frac{1}{2}S^2}.$$

Supereſt $z dN - N dz = C dS$, ideoque $\frac{N}{z} = C/\frac{1}{2}S$
vnde reliqua facile expediuntur.

Scholion 3.

100. Hoc modo progrediendo continuo plures reperiuntur tuborum figuræ, in quibus aeris agitationes minimas definire licebit, et quælibet adeo operatio infinities maiorem multitudinem ſuppeditat, quam præcedens. Interim tamen infinitæ tuborum figuræ manent excluſæ, pro quibus etiamnum aeris motum determinari non licet. Poſt figuram ergo cylindricam, quam ſelici ſucceſſu expediuimus, ſequitur conoidica hyperbolica, vix difficiliorem ſolutionem poſtulans quam illa, cum ab eadem operatione prima ſit ſuppeditata, ita vt hæc duæ figuræ ad primum ordinem ſint referendæ. Ex ordine ſecundo imprimis notatu eſt digna figura conica æquatione $\Omega = A s s$ contenta, tum vero etiam hyperbolica $\Omega = \frac{A}{s}$, nec non hæc algebraica multo latius patens. $\Omega = \frac{A s s}{(s^2 + B)^2}$, præter quas innumera- biles aliæ tranſcendentes ſunt erutæ; pro altioribus autem ordinibus motus determinatio continuo fit operoſior, vt operæ non ſit pretium tantos labores ſuſcipere. Species itaque tantum ſimpliciſſimas examini ſum ſubiecturus.

CAPVT

CAPVT V.

DE

MINIMIS AERIS AGITATIONIBVS IN TV-
BIS FIGVRAM CONOIDICAM HYPER-
BOLICAM HABENTIBVS.

Problema 86.

101. Si tubi figura oriatur ex conversione Tab. VII.
arcus hyperbolae aequilaterae AB circa asymptotam Fig. 91.
IL facta, et aer in eo contentus initio quomodo-
cunque de statu aequilibrui fuerit deturbatus, agita-
tiones eius sequentes ad quoduis tempus inuestigare.

Solutio.

Sit I intersectio asymptotarum, sumtoque spatio
IS = S amplitudo tubi ibi ponatur $\Omega = \frac{c}{ss}$, agi-
tatio autem aeri primum inducta ita se habeat, vt
in tubi loco S fuerit densitas = Q et celeritas se-
cundum IB = Y. Elapso iam tempore quocunque
t, ex solutione supra (82 et 84) exhibita, vbi
ob $a = 1$, $\beta = 0$, negligamus grauitatis effectum
aer ex S per spatium $Ss = v$ erit translatus vt sit

$$v = SS / \frac{ds}{ss} / \frac{Q}{\beta} + S\Gamma : (S + ct) + S\Delta : (S - ct)$$

posito $V \frac{ds}{\beta} = c$, tum vero erit mutata constante
densitas

$$q = Q(1 - \frac{Q}{\beta} + \Gamma : (S + ct) + \Delta : (S - ct) - S\Gamma' : (S + ct) - S\Delta' : (S - ct))$$

et celeritas

$$v = cS(\Gamma'(S + ct) - \Delta'(S - ct)).$$

Quaestio autem nunc huc redit: ut ad statum initialem natura functionum Γ et Δ accommodetur:posito ergo $t = 0$, fieri debet $v = 0$, $q = Q$ et $v = Y$, unde colligimus has aequationes:

$$\text{I. } SS \int \frac{dS}{SS} \int \frac{Q}{B} + S\Gamma:S + S\Delta:S = 0$$

$$\text{II. } -\int \frac{Q}{B} + \Gamma:S + \Delta:S - S\Gamma':S - S\Delta':S = 0$$

$$\text{III. } Y = cS(\Gamma':S - \Delta':S)$$

quarum quidem duae priores inter se conveniunt, ut tam ex rei natura quam differentiatione prioris intelligitur. Ponamus brevitatis gratia $\Gamma:S + \Delta:S = x$ et $\Gamma:S - \Delta:S = y$, ut prodeat

$$\text{II. aequatio } -\int \frac{Q}{B} + x - \frac{Sdx}{dS} = 0 \text{ et}$$

$$\text{III. aequatio } Y = \frac{cSdy}{dS}, \text{ atque}$$

$$\text{I. } SS \int \frac{dS}{SS} \int \frac{Q}{B} + Sx = 0.$$

quae quidem illam in se complectitur. Hinc ergo est $x = -S \int \frac{dS}{SS} \int \frac{Q}{B}$, inde vero $y = \frac{1}{c} \int \frac{TdS}{S}$, ita ut obtineamus:

$$\Gamma:S = -\frac{1}{S} S \int \frac{dS}{SS} \int \frac{Q}{B} + \frac{1}{c} \int \frac{TdS}{S} \text{ et}$$

$$\Delta:S = -\frac{1}{S} S \int \frac{dS}{SS} \int \frac{Q}{B} - \frac{1}{c} \int \frac{TdS}{S}$$

unde fit

$$\Gamma':S = -\frac{1}{S} \int \frac{dS}{SS} \int \frac{Q}{B} - \frac{1}{S} \int \frac{Q}{B} + \frac{T}{cS} \text{ et}$$

$$\Delta':S = -\frac{1}{S} \int \frac{dS}{SS} \int \frac{Q}{B} - \frac{1}{S} \int \frac{Q}{B} - \frac{T}{cS}.$$

Cum

Cum igitur pro singulis axis punctis S ex statu initiali dentur quantitates $l \frac{Q}{B} = \frac{Q - B}{B}$ proxime et Y hinc construantur duae curvae CTc et $D\Delta d$, ut sint earum applicatae $ST = \Gamma' : S$ et $S\Delta = \Delta' : S$, quae curvae autem non ultra tubi longitudinem AB extendantur, eritque tum per quadraturas harum curvarum :

$$\Gamma : S = A C S \Gamma \text{ et } \Delta : S = A D S \Delta.$$

His curvis constructis elapso tempore $= t$, in axe a puncto S vtrinque capiantur intervalla $ST = S\Gamma = c \cdot t$ eritque tum $SS = SS \int \frac{ds}{s} l \frac{Q}{B} + S(AC TM + AD t n)$, translatio $q = Q(1 - l \frac{Q}{B} + ACTM + AD t n - S \cdot TM - S \cdot t n)$ densitas $v = c S(TM - t n)$ quae determinationes valent quamdiu puncta T et δ non extra tubum AB cadunt.

Coroll. i.

102. Si super axe IL intra tubi extensionem Tab. VII. AB , in cuius loco S posito intervallo $IS = S$, de Fig. 92. amplitudo $\Omega = \frac{f}{s}$, aliae duae construantur lineae curvae EQe et FYf , quarum applicatae sint

$$SQ = \int \frac{ds}{s} l \frac{Q}{B} + \frac{1}{2} l \frac{Q}{B} = \int \frac{ds}{s} l \frac{Q}{B} \text{ et } SY = \frac{T}{c}$$

illae functiones hinc ita determinantur, ut sit

$$\Gamma' : S = -\frac{1}{2} SQ + \frac{1}{2} SY \text{ et } \Delta' : S = -\frac{1}{2} SQ - \frac{1}{2} SY$$

hincque porro

$$\Gamma : S = -\frac{1}{2} AESQ + \frac{1}{2} AF SY \text{ et } \Delta : S = -\frac{1}{2} AESQ - \frac{1}{2} AF SY$$

Bbb 2

Coroll.

et celeritas

$$v = c S (\Gamma' : (S + c t) - \Delta' :$$

Quaestio autem nunc huc redit

lem natura functionum Γ et

sito ergo $t = 0$, fieri debet

$v = Y$, unde colligimus has

$$I. S S \int \frac{dS}{S^2} \int \frac{Q}{B} + S \Gamma : S -$$

$$II. - \int \frac{Q}{B} + \Gamma : S + \Delta :$$

$$III. Y = c S (\Gamma' : S -$$

quarum quidem duae p

tam ex rei natura quam

gitur. Ponamus bre

et $\Gamma : S - \Delta : S = y$,

II. aequatio $- \int$

III. aequatio Y

$$I. S S \int \frac{dS}{S^2} \int \frac{Q}{B}$$

quae quidem illa

$$x = - S \int \frac{dS}{S^2} \int \frac{Q}{B}$$

obtinemus :

$$\Gamma : S = -$$

$$\Delta : S =$$

$$vnde fit$$

$$\Gamma' : S =$$

$$\Delta' : S$$

$$\Delta' : S$$

$$\Delta' : S$$

$$\Delta' : S$$

$$\Delta' : S$$

$$\Delta' : S$$

$$\Delta' : S$$

$$\Delta' : S$$

$$\Delta' : S$$

si plu-
camen ad
multo magis
ationes, quae
el ob motum
tur. Haec autem
li continuationem
et FYf explorare
ctam motus cognitio-
Commodius autem
ollunt, ut non pendeant
a tubi

a tubi termino A: cum enim ex ipsa constructione pateat esse:

$$\int \frac{dS}{S} \frac{1}{B} = \frac{A B S Q}{S}, \text{ ex positione}$$

$$S Q = \int \frac{dS}{S} \frac{1}{B} + \frac{1}{S} \frac{1}{B} \text{ colligimus}$$

$$\frac{1}{B} = S. S Q - A E S Q,$$

quibus valoribus introductis, obtinebimus has determinationes:

$$\frac{2}{Q} = 1 + \frac{1}{2} S(T M + t m - 2 S Q) - \frac{1}{2} S(T N - t n)$$

$$+ \frac{1}{2} (S Q t m - S Q T M) + \frac{1}{2} T N t n$$

$$v = \frac{1}{2} c S(t m - T M + T N + t n)$$

$$S v = \frac{1}{2} S(S Q t m - S Q T M) + \frac{1}{2} S. T N t n$$

quae formulae ideo ad calculum magis sunt accommodatae quod a neutro tubi termino pendent. Id autem hic imprimis notari convenit, distantiam cuiusque puncti S ab asymptotae initio I scilicet $IS = S$ in computum venire.

Scholion 2.

105. Antequam autem hic ulterius progredi liceat, accuratius scalas, quibus ad motum definendum utor, perpendi convenit. Vtraque scilicet ex statu qui aeri in tubo contento initio fuerit inductus constitui debet, hunc autem statum ita determinari assumo, ut aeris ad S versa t s celeritas fuerit $= Q$ naturali existente $= B$, celeritas vero secundum directionem $AB = Y$. His positis constructio scalae t Y nulla laborat difficultate cum eius sit applicata $S Y = \frac{r}{c s}$, altera vero scala E Q e, quae

Bbb 3

for-

formulam integram inuoluit, quandam dilucidationem ob constantem implexam postulat. Primo igitur
 Tab. VII. Fig. 93. cum in singulis punctis S densitas datur Q ita construat^r curua CV , vt vocato intervallo $CSV = S$, sit eius applicata $SV = \frac{1}{55} \sqrt{\frac{Q}{B}}$, sumta scilicet recta quacunque pro unitate. Tum vero hac curua descripta scala EQe , qua opus est, ita construi debet, vt capiatur vbique eius applicata $SQ = S.SV + ACSV$, sicque huius scalae singulae applicatae, qua tubus extenditur, ex curua data CV assignari poterunt. Cum deinde etiam area scalae $AESQ$ in nostras formulas ingrediatur, notari conuenit esse $AESQ = S.SQ - SS.SV$ ideoque $AESQ = S.ACSV$.

Scholion 3.

Tab. VIII. Fig. 94. 106. Operae pretium erit hanc curuam CV , quae proprie scala densitatum vocari potest, loco illius scalae EQe ad vsum adhibere. Sit igitur CQc ista scala densitatum, in qua posito intervallo $IS = S$ sit applicata $SQ = \frac{1}{55} \sqrt{\frac{Q}{B}}$, in scala celeritatum vero FYf sit vt ante applicata $SY = \frac{1}{55}$. Quod si igitur istam scalam CQc loco praecedentis EQe substituere velimus, in formulis inuentis loco SQ scribi oportet $S.SQ + ACSQ$ et $S.ACSQ$ loco illius areae $AESQ$. Cum nunc sit $\sqrt{\frac{Q}{B}} = SS.SQ$ ex §. 103 obtinebimus pro tempore quocunque elapso t sumtis interuallis $ST = St = ct$.

denfi-

$$\left. \begin{array}{l} M - iS. ACim \\ S(TN - in) \end{array} \right\}$$

1).

A:

(Nin)

maxime ac-

87.

erit terminatus ibique
triusque scalae densita-
ti in scholio praecedente
continuationem super axe
figurare.

olutio.

I $A = a$, ac primo consideremus Tab. VIII.
us in A est apertus; ibi ergo den- Fig. 95.
fitas

fitas semper naturali erit aequalis ideoque $Q=B$; unde scala densitatum $A M$ per punctum A transibit, scala vero celeritatum sit $F N$. Cum iam perpetuo esse debeat $q=Q=B$, elapso tempore quocunque t sumtisque a puncto A utrinque intervallis $A T=A t=c t$ formula, quae tum densitatem in A exprimere est inuenta, praebere debet $q=Q$. Quare illa formula sumendo punctum indefinitum S in ipso puncto A huc transferatur: fiet ergo

$$S Q=0, S Y=A F, \text{ et } S=a;$$

unde continuationem utriusque scalae ita comparatam esse oportet, ut fiat

$$S S(T M+t m)-S(T N-t n)+T N t n=0$$

idque ita ut neutrius continuatio ab altera pendeat. Scorsim ergo esse debet $t m=-T M$, ex quo intelligitur scalam densitatum $A M$ ita continuari oportere, ut pars continuata $A m$ ipsi scalae $A M$ similis sit sed ad axis partem contrariam relata. Pro continuatione vero scalae celeritatum invenienda statuamus

$$A T=A t=x, T N=y \text{ et } t n=z,$$

et cum esse debeat

$$T N t n-a(T N-t n)=0$$

fiet

$$\int y d x+\int z d x-a y+a z=0;$$

hinc differentiendo

$$y d x+z d x-a d y+a d z=0,$$

quae

quae per $e^{\frac{x}{a}}$ multiplicata dat

$$\text{integrale } e^{\frac{x}{a}} a z = \int e^{\frac{x}{a}} (a dy - y dx) = e^{\frac{x}{a}} ay - 2 \int e^{\frac{x}{a}} y dx$$

$$\text{ideoque } z = y - \frac{2}{a} e^{-\frac{x}{a}} \int e^{\frac{x}{a}} y dx$$

integrali hoc ita capto ut evanescat posito $x = 0$.

Sit iam tubus in A clausus, ibique celeritas Tab. VIII.
 & semper esse debet nulla ynde scala celeritatum Fig. 26.

A N per punctum A transeat necesse est. Cum igitur elapso tempore t , pro quo sumantur intervalla $A T = A t = c t = x$, celeritas & quoque nulla prodire debeat, quaecunque fuerit scala densitatum C M primo esse oportet $T N + t n = 0$, seu scalae celeritatum A N continuatio A n ipsi est similis in contrariam axis partem disposita: Pro continuatione autem scalae densitatum esse debet

$$-a a (T M - t m) - a T M t m = 0.$$

Ponamus in hunc finem

$$A T = A t = x, T M = y \text{ et } t m = z$$

haecque conditio ad istam deducit aequationem:

$$a(y-z) + \int y dx + \int z dx = 0 \text{ seu } a dy - a dz + y dx + z dx = 0$$

cuius integrale est

$$e^{-\frac{x}{a}} a z = \int e^{-\frac{x}{a}} (a dy + y dx) = e^{-\frac{x}{a}} ay + 2 \int e^{-\frac{x}{a}} y dx$$

ita ut pro hac continuatione habeamus:

$$z = y + \frac{2}{a} e^{\frac{x}{a}} \int e^{-\frac{x}{a}} y dx.$$

Tom. XVI. Nou. Comm.

C c c

Coroll.

Coroll. 1.

108. Casu ergo priori, quo tubus in A est apertus, continuatio scalae celeritatum ita est comparata, ut sit

$$AFTN + AFtn = a(TN - tn)$$

ideoque inuenta applicata tn , habebitur area curvae continuatae

$$AFtn = IA(TN - tn) - AFTN.$$

Coroll. 2.

109. Simili modo pro casu posteriori, quo tubus in A est clausus, continuatio scalae densitatum CM ita est comparata ut sit

$$ACTM + ACtm = a(tm - TM).$$

Quare inuenta eius applicata tm , eius area ita se habebit

$$ACtm = IA(tm - TM) - ACTM.$$

Coroll. 3.

110. Si priori casu aer in tubo nullum habuerit motum initialem, solaque densitas fuerit perturbata; tum quia scala celeritatum in axem incidit, ubi $y = 0$, etiam eius continuatio in axem incidet. Posteriori vero casu, si aeris densitas initio per totum tubum fuerit naturalis, tum scala densitatum simulque eius continuatio in axem incidit. His autem casibus exceptis continuationes inuentae

maxi-

maxime discrepant a scalis principalibus; earumque constructio nonnisi per quadraturas, quantitatem exponentialem insuper in subsidium vocando perfici potest.

Problema 88.

111. Si tubus in B fuerit terminatus ibique vel apertus vel clausus, utriusque scalae densitatum et celeritatum secundum praecepta (106) formatae, continuationem super axe ultra B producto definire.

Solutio.

Posita distantia $1B = b$, examinemus primo Tab. VIII.
Fig. 97.
casum quo tubus in B est apertus, ideoque densitas in B tam initio quam semper eadem $= B$, vnde scala densitatum mB per ipsum punctum B transibit, nf vero sit scala celeritatum. Capiantur utrinque a B spatia aequalia $Bt = BT = x$, existente $x = ct$, atque cum post tempus t futura sit densitas in B ex §. 106.

$$q = Q(1 + \frac{1}{2}bb(TM + tm) - \frac{1}{2}b(TN - tn) + \frac{1}{2}TNtn)$$

neccesse est vt primo fiat $TM + tm = 0$, ideoque scala densitatum Bm in formam similem BM ad alteram axis partem describendam continuetur. Pro scalae vero celeritatum nf continuatione fN inuenienda vocentur $tn = y$ et $TN = z$ esseque debet $fydx + fzdxdx = b(z - y)$ vnde colligitur:

$$\begin{aligned} e^{-\frac{x}{b}}bz &= f e^{-\frac{x}{b}}(b dy + y dx) = e^{-\frac{x}{b}}by + 2 \int e^{-\frac{x}{b}}y dx \\ &= -e^{-\frac{x}{b}}by + 2 \int e^{-\frac{x}{b}}b dy \\ \text{C c c 2} & \qquad \qquad \text{ideo-} \end{aligned}$$

ideoque

$$z = y + \frac{1}{b} e^{\frac{x}{b}} \int e^{-\frac{x}{b}} y dx = -y + 2 e^{\frac{x}{b}} \int e^{-\frac{x}{b}} dy.$$

Tab. VII. Sit nunc tubus in B clausus, et altera scala
Fig. 98. celeritatum n B ita per B transibit, ut semper ibi
fiat celeritas $v = 0$, ideoque

$$0 = -bb(TM - tm) - b.TMtm + b(TN + tn).$$

Primo ergo esse oportet $TN + tn = 0$, et scalae
 n B continuatio erit BN ipsi aequalis et contrario
sita; pro alterius vero scalae densitatum e m con-
tinuatione inuenienda vocatis spatiis $BT = Bt = x$,
applicata cognita $tm = y$ et incognita

$TM = z$, fieri debet $\int y dx + \int z dx + b(z - y) = 0$,
vnde reperitur

$$z = y - \frac{1}{b} e^{-\frac{x}{b}} \int e^{\frac{x}{b}} y dx = -y + 2 e^{-\frac{x}{b}} \int e^{\frac{x}{b}} dy.$$

Coroll. I.

Fig. 97. 112. Casu quo tubus in B est apertus, post-
quam ex formula inuenta singulae applicatae TN
fuerint definitae, non opus est aream huius conti-
nationis seorsim quaeri, cum ex conditione prae-
scripta sit area

$$BfTN = IB(TN - tn) - Bfstm.$$

Coroll.

Coroll. 2.

113. Simili modo pro casu quo tubus in B Tab. VIII. est clausus continuationis scalae densitatum $c M$ area Fig. 98. hac ratione definitur

$$B c T M = I B (t m - T M) - B c t m$$

ex quo sufficit eius applicatas $T M$ assignauisse.

Coroll. 3.

114. Si distantia $I B = b$ prae interuallis $B T = B t = x$ fuerit valde magna, vt sit $e^{\frac{x}{b}} = 1$; vel si fractio $\frac{x}{b}$ vt constans spectari possit, erit $2 e^{\frac{x}{b}}$
 $\int e^{\frac{x}{b}} dy = 2 y$; ex quo pro vtroque casu fit $z = y$,
 hincque continuatio perinde se habebit, ac si tubus
 esset cylindricus.

Problema 89.

115. Si tubus hyperbolicus in termino A sue- Tab. VIII.
 rit apertus, et aer in eo contentus per spatium mi- Fig. 99.
 nimum $G H$ de aequilibrio vtcunque turbetur, hu-
 ius pulsus propagationem determinare.

Solutio.

Super interuallo $G H$ describatur vtrique scala
 densitatum $G M H$ et celeritarum $G N H$, ita vt si
 in T posita distantia $I T = S$, initio fuerit densitas
 $= Q$ et celeritas in plagam $A H = Y$ sint applica-
 tae $T M = \frac{1}{s s} / \frac{Q}{B}$ et $T N = \frac{Y}{c s}$. His scalis consti-

C c c 3

tutis

tutis per praecepta ante tradita continuatio earum
 ultra A versus I ita institui debet: Primo scilicet
 quia ambae scalae ab A ad G in ipsum axem A G
 incidunt, per tantumdem spatium $Ag = AG$ vtra-
 que scala pariter in axem A g cadet; tum vero quia
 tubus ad A est apertus scala densitatum continuabi-
 tur in gmb curva simili ipsi G M H ad contrariam
 axis partem sita. Pro continuatione vero scalae ce-
 leritatum sumta abscissa $At = AT = x$, et vocata
 applicata $Tm = y$, existente intervallo $IA = a$;
 quantitas $\frac{x}{a^2}$, quia x tantum per spatium mini-
 mum G H variatur, ut constans spectari poterit ita
 ut sit ex (107) $zn = y$ seu $tn = TN$, totaque cur-
 va gnb similis scalae G N H et ad eandem axis
 partem disposita. Hoc modo tota vtriusque scalae
 continuatio haberetur, si tubus ad alteram partem
 in infinitum esset extensus; sin autem alicubi in B
 terminaretur, prout ibi foret apertus vel clausus,
 novae repetitiones vtriusque scalae inde orirentur
 prorsus ut in tubis cylindricis. Hic autem tantum
 agitationem quae in ipso orificio A a gignetur, per-
 scrutari est propositum, quoniam ea cum aere libe-
 ro communicatur, in eoque ulterius propagatur;
 quae autem deinceps adhuc nascerentur repetitiones,
 eas hic utpote meras resonantias non persequar, si-
 quidem earum ratio ex superioribus satis est mani-
 festa. In A ergo aer erit tranquillus donec effuxe-
 rit tempus $= \frac{AG}{c}$; ac tum simul vterque pulsus eo
 appellet. Sumamus vtrinque intervallum $AT = At$
 $= ct$,

$= c t$, et quia puncti A distantia a centro hyperbolae I est $IA = a$, in formulis §. 106 datis erit $S = a$ et $SQ = 0$, vnde tum colligitur pro aere in hoc loco:

densitas $q = B(1 + \frac{1}{2}aa(TM - tm) - \frac{1}{2}a(TN - tn) - \text{area GTN})$

et quia haec area pro evanescente est habenda fit $q = B$ vti rei natura pro aere aperto postulat. Deinde vero ibidem erit

celeritas $v = -\frac{1}{2}aac(TM + tm) + \frac{1}{2}ac(TN + tn)$

seu $v = -aac.TM + ac.TN = \frac{aa}{ss}.c.l\frac{Q}{B} + \frac{c}{s}Y$

spatium vero translationis $= -aa.GTM + a.GTN$, quod quidem erit minimum.

Coroll. 1.

116. Ex ipsa solutione satis liquet in huiusmodi tubis pulsus eadem plane celeritate propagati, atque in tubis cylindricis; ex quo concludere licet, figuram tubi nihil plane conferre ad celeritatem propagationis pulsuum; etiamsi id ex Theoria pro omnibus tubi figuris ostendere non valeamus.

Coroll. 2.

117. Deinde etiam perspicitur, omnia quae supra de pulsuum propagatione in tubis aequaliter amplis, eorumque repetitione demonstravimus, etiam hic locum habere cum pulsus in intervallo minimo excitati easdem exhibeant vtriusque scalae continuationes, superfluum

fluum ergo foret, quae ante de eiusdem soni resonantia sunt dicta hic repetere.

Scholion 1.

Tab. VIII.
Fig. 100.

118. Problema hoc ideo attuli ut explicationi effectus a tubis stentoreis editi inferuiret, quandoquidem harum tubarum figura parum discrepat a conoidica hyperbolica quam hic tractamus. Sit ergo kab hyperbola aequilatera intra asymptotas IB et IK descripta cuius portio ab circa axem AB gyrata generet tubam stentoream, in cuius orificio Bb vox quaecunque edatur. Hac voce aeri ad Bb proximo densitas imprimatur Q maior naturali, simulque celeritas secundum $BA = Y$, cuius ergo directio illi, quam in solutionem problematis introduximus est contraria. Tum vero ponatur distantia $IA = a$ et $IB = b$, quae in problemate erat S atque inde patet aeri in orificio ampliori Aa imprimi celeritatem versus I , quae sit $= \frac{a}{b} \cdot Y + \frac{aa}{bb} \cdot \frac{Q}{B}$; quae cum distantia $IA = a$ multo sit minor distantia $IB = b$, etiam multo foret minor celeritate Y in primo pulsū genita, nisi ob densitatem naturali B maiorem Q haud mediocriter abgeretur, propterea quod e denotat distantiam quasi 1000 pedum. Neque tamen huic pulsus in Aa translati celeritati effectum tribuere licet, sed praecipua causa quaerenda est in amplitudine orificii Aa , per quod is pulsus pari velocitate praedictus est extensus idemque praestat, ac si tot voces ibi simul ederentur, quoties haec aper-

apertura superat aperturam oris clamantis. Si enim remota tuba vox in liberum aerem ederetur, ea quaquaversus diffusa in distantia BA vehementer diminueretur; nunc autem dum in tuba cohibetur, totumque spatium Aa multo maiore celeritate implet, quam fieret si tubus abesset, mirum non est quod eius effectus tam sit fortis. De cetero facile intelligitur figuram ipsam tubi haud multum ad hunc effectum conferre, dum ab usitata non admodum abhorreat.

Scholion 2.

119. Hinc etiam ratio petenda videtur eorum sonorum, quos tubae, buccina cornua, aliaeque instrumenta similia edunt, quae in hoc a tibiis discrepant, quod in his uti vidimus, totus aer in tubo conteatus per novi aeris inflationem simul concitatur hincque motum oscillatorium consequitur, quo sonus producitur. In illis vero instrumentis iam sonus quidam per orificium inflatur, vel ex ore instantis vel dum in eo termino elastrum quodpiam ad motum vibratorium excitatur. Vtroque autem modo in illo termino tantum eiusmodi pulsus excitatur quales hic sumus contemplati, qui deinceps per totam tubi longitudinem propagantur, et dum a diffusionem ad latera coercentur, eo maiorem vim acquirunt, sicque grauitas soni editi potissimum a pulsibus successive in orificio productis pendent, quam ob causam etiam soni horum instrumentorum a sonis tibiaram maxime differunt. Interim tamen etiam in istis in-

Tom. XVI, Nou. Comm.

D d d

stru-

strumentis longitudo et figura tubi plurimum ad soni grauitatem conferunt, ita vt hic vtraque soni causa simul concurrere videatur, quandoquidem horum instrumentorum ope non omnes sed tantum certi soni ratione grauitatis edi possunt, qui plerumque rationem numerorum 1, 2, 3, 4, 5 etc. naturali ordine progredientium inter se tenent. Quod phaenomenon cum etiam in tibiis obseruauerimus, hinc potius concludendum videtur sonorum a tubis, bucinis, cornibus etc. editorum causam esse mixtam, et partim in sonitu primum inflato, partim in agitatione totius aeris in his tubis contenti quaeri debere. Verum quia Theoriam motus aeris vix adhuc libauimus, plurimum adhuc abest, quominus perfectam horum sonorum explicationem sperare queamus. Quia potius in iis, quae prima huius nouae scientiae principia nobis largiuntur, acquiescere debemus, vberiorrem cognitionem tum demum expectaturi, quando eam scientiam magis excolere licuerit.

Problema 90.

Tab. IX. 120 Si in huiusmodi tubo hyperbolico $AaBb$
Fig. 101. vtrunque aperto aer ita de statu aequilibril deturbetur, vt eius sola densitas sine villo motu varietur, motum oscillatorium, qui deinceps in tubo generabitur, definire.

Solutio.

Sit I centrum hyperbolae, ex qua tubus est formatus, et posita puncti in tubo vtrunque assumi
S distan-

S distantia $IS = S$, inducta sit ibi aeri initio densitas $= Q$ naturali existente $= B$, capiaturque applicata $SQ = \frac{1}{SS} / \frac{Q}{B}$, erit punctum Q in scala densitatum AQB , quam quia tubus vtrique est apertus per, ambos terminos A et B transire oportet. Scala autem celeritatum hac hypothesi in axem incidit. Iam per praecepta ante tradita facile haec scala densitatum vtrique continuatur, eandem alternatim ad contrarias axis partes describendo, ut puncta A, B, A', B', A'', B'' etc. intervallis $= AB$ inter se diffita sint centra arcuum vtrique alternatim aequalium. Hinc ad quoduis tempus ab initio elapsum $= t$ status aeris qui initio circa S versabatur sequenti modo definietur: a puncto S vtrique in axe abscindantur spatia $ST = St = ct$, denotante c spatium per quod sonus vno minuto secundo propagatur ex applicationis scalae densitatum in his punctis T et t per §. 106 erit

$$\text{I. Densitas } q = Q(1 + \frac{1}{2}SS(TM + tm - 2SQ))$$

$$\text{II. Celeritas } v = -\frac{1}{2}SS(TM - tm) - \frac{1}{2}cS. TMtm$$

$$\text{III. Spatiolum } Ss = \frac{1}{2}SS(SQtm - SQTm)$$

Vnde patet sumto $ST = St = 2AB$ seu post tempus $t = \frac{2AB}{c}$, fieri $TM = tm = SQ$, hincque densitatem $q = Q$ celeritatem $v = 0$, et pariter $Ss = 0$, ob $SQtm = 0$ et $SQTm = 0$.

Coroll. 1.

121 Aer igitur in tubo tempore $t = \frac{2AB}{c}$ duas oscillationes peregrisse est censendus; vnde cum

D d d 2

tem-

tempora singularum oscillationum sint $= \frac{A \cdot B}{c}$, singulis minutis secundis edentur $\frac{c}{A \cdot B}$ oscillationes, qui numerus simul soni gravitatem exprimit.

COROLL. 2.

122. Tubus igitur hyperbolicus eundem plane edet sonum ac tubus cylindricus eiusdem longitudinis, si quidem vterque vtrinque sit apertus; et in hyperbolico aeri primum nullus motus fuerit impressus.

Scholion.

123. Inuenimus quidem tempore $t = \frac{2A \cdot B}{c}$, quo aer perfecte in pristinum statum restituitur, duas oscillationes peragi, ad similitudinem cordarum vibrantium, ita vt si nunc aer in excursionem maxima versetur, elapso hoc tempore iterum in eandem reuertatur. Verum hinc non sequitur, elapso tempore dimidio $t = \frac{A \cdot B}{c}$ aerem ad alteram excursionem contrariam pertingere: tum enim tantum hoc eueniret si curua AQB duabus constaret partibus similibus, seu diametrum haberet per medium punctum rectae AB normaliter transeuntem. Quod nisi eueniat singulae oscillationes ita se invicem excipient vt alternatim intervalla sint maiora et minora vnde sonum minus purum oriri necesse est, quam si omnia intervalla essent aequalia. Atque haec fortasse praecipua est causa, quod tibiae cylindricae puriores sonos edant, quam vel conuergentes vel diuergentes; huc autem accedit,

accedit, quod hic primam aëris agitationem cum nullo motu coniunctam assumimus, quippe quo accedente continuatio scalae celeritatum pro tubis hyperbolicis longe aliam sequitur legem, ac si tubus ubique esset aequaliter amplius. Quomocunque autem scala celeritatum fuerit comparata, ex formulis §. 106. datis liquet, agitationes sequentes ita ex utraque scala determinari, ut componantur ex effectu utriusque seorsim producto. Cum igitur in hoc problemate effectum ex sola scala densitatum oriundum assignauerimus, nunc scalam celeritatum seorsim examini subiiciamus, ut deinceps utrumque effectum coniungendo agitationes ex duabus quibuscunque skalis simul oriundae definiri queant.

Problema 91.

124. Si prima aequilibrii perturbatio in solo Tab. IX.
motu constet, densitate ubique naturali relicta, seu Fig. 102.
fi detur scala celeritatum, ex ea agitationes aeris sequentes in tubo hyperbolico $AaBb$ utrinque aperto definire.

Solutio.

Sit ergo FYG scala celeritatum data, cuius applicatae ex celeritatibus initio impressis ita definiuntur, ut si in S cuius distantia a centro hyperbolae sit $IS = S$, celeritas in plagam AB fuerit T fiat $SY = \frac{T}{eS}$. Hanc igitur curuam utrinque continuari oportet secundum praecepta in probl. 87 et 88 tradita. Statuantur in hunc finem distantiae $IA = a$

Ddd 3

et

et $IB = b$, et pro continuatione vltra A inuenienda
capiatur $AS' = AS = x$, vt fit $x = S - a$ et po-
natur applicata $SY = y$, eritque applicata in S'
constituenda

$$S'Y' = z = y - \frac{1}{a} e^{-\frac{x}{a}} \int e^{\frac{x}{a}} y dx$$

integrali hoc ita sumto vt euanescat posito $x = 0$.
Ergo ob $x = S - a$ erit

$$S'T' = ST - \frac{1}{a} e^{-\frac{S}{a}} \int e^{\frac{S}{a}} dS. ST$$

et area

$$AFS'T' = a(ST - S'T') - AFS'T$$

Iam vltra B progrediamur, sumtisque $BS'' = BS$
 $= x = b - S$, manente $ST = y$, applicata in S''
erigenda ex Pr. 88 reperitur

$$z = y + \frac{1}{b} e^{\frac{x}{b}} \int e^{-\frac{x}{b}} y dx \text{ seu}$$

$$S''T'' = ST - \frac{1}{b} e^{-\frac{S}{b}} \int e^{\frac{S}{b}} dS. ST$$

et area

$$BGS''T'' = b(S''T'' - ST) - BGS'T.$$

Nunc ad aperturam A reuertamur et sumto spatio
 $AS''' = AS'' = x = 2b - a - S$, fit $S''T'' = y$
et applicata in S''' erigenda erit

$$z = y - \frac{1}{a} e^{-\frac{x}{a}} \int e^{\frac{x}{a}} y dx \text{ seu}$$

$$S'''Y''' = S''Y'' + \frac{1}{a} e^{\frac{S}{a}} \int e^{-\frac{S}{a}} dS. S''Y''$$

quae

quae facta reductione transit in hanc formam :

$$S^{III} Y^{III} = SY + \frac{1}{a(a+b)} e^{\frac{S}{a}} \int e^{-\frac{S}{a}} dS . SY + \frac{1}{b(a+b)} e^{\frac{S}{b}} \int e^{-\frac{S}{b}} dS . SY$$

Redeamus ad aperturam B b fumamusque

$$BS^{IV} = BS' = x = b - 2a + S,$$

et posito $S' Y' = y$, applicata in S^{IV} statuenda erit

$$x = y + \frac{1}{b} e^{\frac{x}{b}} \int e^{-\frac{x}{b}} y dx \text{ seu}$$

$$S^{IV} Y^{IV} = S' Y' + \frac{1}{b} e^{\frac{S}{b}} \int e^{-\frac{S}{b}} dS . S' Y'$$

quae loco $S' Y'$ supra inuentum valorem substituendo reducitur ad hanc formam :

$$S^{IV} Y^{IV} = SY - \frac{1}{a(a+b)} e^{\frac{S}{a}} \int e^{\frac{S}{a}} dS . SY - \frac{1}{b(a+b)} e^{\frac{S}{b}} \int e^{-\frac{S}{b}} dS . SY$$

sicque ulterius progredi licet, quousque libuerit.

Verum hic potissimum videamus, in quo statu futurus sit aer, qui initio erat ad S post tempus $t = \frac{2AB}{c}$, quo casu abscissae vtrinque abscindendae cadent in S^{IV} et S''' ita vt in solutione generali §. 106 fiat

$$TN = S^{IV} Y^{IV} \text{ et } t n = S''' Y''',$$

tum igitur colligetur,

$$\text{densitas } q = Q(1 - \frac{1}{2} S(S^{IV} Y^{IV} - S''' Y''')) + \frac{1}{2} S''' Y''' S^{IV} Y^{IV})$$

$$\text{celeritas } v = \frac{1}{2} c S(S^{IV} Y^{IV} + S''' Y''')$$

$$\text{translatio } Ss = \frac{1}{2} S . S''' Y''' S^{IV} Y^{IV}.$$

Area autem haec $S''' Y''' S^{IV} Y^{IV}$ ita per meras applica-

plicas exprimi potest; cum ex continuationis indole sit

- I. $SY S' Y' = a(SY - S' Y')$
- II. $S'' Y'' S''' Y''' = a(S'' Y'' - S''' Y''')$
- III. $SY S'' Y'' = b(S'' Y'' - SY)$
- IV. $S' T' S^{IV} T^{IV} = b(S^{IV} T^{IV} - S' T')$

erit combinando:

- IV-I. $ST S^{IV} S^{IV} = b(S^{IV} T^{IV} - S' T') - a(ST - S' T')$
- II-III. $ST S'' Y'' = a(S'' Y'' - S''' Y''') - b(S' T' - ST)$

unde colligimus aream

$$S^{III} Y^{III} S^{IV} Y^{IV} = (b-a)(SY - S' Y' - S'' Y'') + b S^{IV} Y^{IV} - a S^{III} Y^{III}.$$

In qua si valores pro his applicatis iuuentos substituas reperitur ista area ponendo $SY = y$

$$\frac{a(b-a)}{a+b} (e^{-\frac{S}{a}} \int e^{\frac{S}{a}} y dS - e^{\frac{S}{a}} \int e^{-\frac{S}{a}} y dS + e^{-\frac{S}{b}} \int e^{\frac{S}{b}} y dS - e^{\frac{S}{b}} \int e^{-\frac{S}{b}} y dS)$$

vbi integralia ita capi debent vt ea, quae inuoluunt a euanescant posito $S = a$, altera vero posito $S = b$. Haec ergo expressio pro area inuenta in $\frac{1}{2} S$ ducta praebet spatium translationis Ss . Deinde pro reliquis elementis habebimus:

$$S^{IV} Y^{IV} - S^{III} Y^{III} = \frac{a(b-a)}{a+b} (\frac{1}{2} e^{\frac{S}{a}} \int e^{\frac{S}{a}} y dS + \frac{1}{2} e^{\frac{S}{a}} \int e^{-\frac{S}{a}} y dS + \frac{1}{2} e^{\frac{S}{b}} \int e^{\frac{S}{b}} y dS + \frac{1}{2} e^{\frac{S}{b}} \int e^{-\frac{S}{b}} y dS)$$

et

$$S^{IV} Y^{IV} + S^{III} Y^{III} = 2y \cdot \frac{a(b-a)}{a+b} (\frac{1}{2} e^{\frac{S}{a}} \int e^{\frac{S}{a}} y dS - \frac{1}{2} e^{\frac{S}{a}} \int e^{-\frac{S}{a}} y dS + \frac{1}{2} e^{\frac{S}{b}} \int e^{\frac{S}{b}} y dS - \frac{1}{2} e^{\frac{S}{b}} \int e^{-\frac{S}{b}} y dS)$$

Coroll.

Coroll. 1.

125. Hinc ergo patet ob scalam celeritatum post tempus $= \frac{v \cdot A \cdot B}{c}$ statum aeris in tubo multum ab initiali discrepare posse quod discrimen eo minus evadet, quo minor fuerit fractio $\frac{v \cdot (b-a)}{a+b}$, et quo propius scala principalis F T G ad axem accesserit.

Coroll. 2.

126. Quodsi ergo aeri in tubo hyperbolico simul motus fuerit impressus, post tempus $\frac{v \cdot A \cdot B}{c}$ aer in tubo non duas oscillationes perfecisse censetur; multo minus ad aliud quodpiam tempus oscillationes reuocari poterunt, sed potius sonus inde perceptus valde erit rudis et ad harmoniam ineptus.

Scholion.

127. Tibiae ergo ad figuram hyperbolicam formatae hoc insigni vitio laborabunt, ut sonos neutiquam puros atque ad harmoniam idoneos edant, propterea quod motum non in oscillationes distinctas resolvere licet. Hocque vitium eo erit maius, quo fortius huiusmodi tibia inflatur, quoniam tum multo minus oscillationes distingui poterunt, inflatione autem lenissima sonus etiam nunc tolerabilis edetur. Facile autem intelligitur hoc vitium tibiis hyperbolicis non esse proprium, sed ad omnes alias formas eo magis extendi, quo magis ab amplitudine aequabili differant. Ratio igitur hinc perspicitur, cur

Tom. XVI. Nou. Comm.

E c c

omnis

omnis generis tibiæ, quæ Organis pneumaticis inferi solent, figuram habeant vel cylindricam vel prismaticam, vt amplitudo vbique sit eadem, hæcque sola figura ad Musicam accommoda videtur; quod quidem duplici modo fieri licet, dum eae superne vel apertæ sunt, vel clauduntur. At si tibias hyperbolicas claudere velimus, soni multo rudiores edentur, quia tum neutra scala seorsim considerata motum oscillatorium regularem producere valet; ex quo operæ pretium haud erit casum, quo tubus hyperbolicus in altero termino apertus in altero vero clausus sumeretur, euolui.

CAPVT VI.

DE

MINIMIS AERIS AGITATIONIBVS IN TVBIS CONICIS.

Problema 92.

128. Si tubus habuerit figuram conicam, æque in eo contentus vtcunque de statu æquilibrii deturbetur, describere ambas scalas, ex quibus deinceps status aeris ad quoduis tempus definiri queat.

Solutio.

Solutio.

Sit vertex conii in A et recta AB eius axis, Tab. IX.
 in quo sumto puncto quocunque S, positoque inter- Fig. 103.
 vallo AS = S, aëri in S initio eiusmodi inductus
 sit status, vt densitas fuerit = Q naturali existente
 = B celeritas vero in directione AB = Y. Cum
 nunc tubi amplitudo in S sit $\Omega = nnSS$ ex (88)
 ad hunc casum accommodato habebimus $\alpha = 1$, $\beta = 0$,
 hincque $M = -\frac{1}{S}$ et $L = \frac{1}{SS}$ Quodsi iam solutio-
 nem probl. 84. huc transferamus, et grauitatis actio-
 nem negligamus, obtinebimus primo

$$0 = \frac{1}{SS} \int SS dS / \frac{Q}{B},$$

tum vero elapso tempore quocunque t status aeris,
 qui initio fuerat in S ita definitur vt sit spatium
 translationis

$$S t = \frac{1}{SS} \int SS dS / \frac{Q}{B} - \frac{1}{S} \Gamma' : (S + ct) + \frac{1}{SS} \Gamma : (S + ct) = v \\ - \frac{1}{S} \Delta' : (S - ct) + \frac{1}{SS} \Delta : (S - ct)$$

vnde pro densitate q et celeritate v deducimus:

$$\left(\frac{dv}{ds}\right) = -\frac{1}{SS} \int SS dS / \frac{Q}{B} - \frac{1}{S} \Gamma'' : (S + ct) + \frac{1}{SS} \Gamma' : (S + ct) - \frac{1}{S} \Gamma : (S + ct) \\ + \frac{1}{B} - \frac{1}{S} \Delta'' : (S - ct) + \frac{1}{SS} \Delta' : (S - ct) - \frac{1}{S} \Delta : (S - ct)$$

ab ob $\frac{d\Omega}{\Omega ds} = \frac{2}{S}$ est

$$\frac{v d\Omega}{\Omega ds} = \frac{2}{SS} \int SS dS / \frac{Q}{B} - \frac{2}{SS} \Gamma' : (S + ct) + \frac{2}{SS} \Gamma : (S + ct) \\ - \frac{2}{SS} \Delta' : (S - ct) + \frac{2}{SS} \Delta : (S - ct)$$

quare cum sit $q = Q(1 - \frac{v d\Omega}{\Omega ds} - (\frac{dv}{ds}))$ colligimus

$$q = Q(1 - \frac{1}{B} + \frac{1}{S} \Gamma'' : (S + ct) + \frac{1}{S} \Delta'' : (S - ct))$$

E c c 2

ac

ac denique ob $v = \left(\frac{d}{dt}v\right)$ erit

$$v = -\frac{c}{s} \Gamma'' : (S + ct) + \frac{c}{s^2} \Gamma' : (S + ct) \\ + \frac{c}{s} \Delta'' : (S - ct) - \frac{c}{s^2} \Delta' : (S - ct).$$

Hinc ergo pro statu initiali ponendo $t = 0$ adipiscimur :

$$v = \frac{1}{s^2} fSS dS l \frac{Q}{s} - \frac{1}{s} (\Gamma' : S + \Delta' : S) + \frac{1}{s^2} (\Gamma : S + \Delta : S) \\ q = Q \left(1 - l \frac{Q}{s} + \frac{1}{s} (\Gamma'' : S + \Delta'' : S)\right) \\ v = -\frac{c}{s} (\Gamma'' : S - \Delta'' : S) + \frac{c}{s^2} (\Gamma' : S - \Delta' : S).$$

Cum igitur tum fuerit $v = 0$, $q = Q$ et $v = Y$, sequentes nanciscimur aequationes ex quibus naturam binarum functionum Γ et Δ definiri oportet

$$\text{I. } fSS dS l \frac{Q}{s} - S(\Gamma' : S + \Delta' : S) + \Gamma : S + \Delta : S = 0 \\ \text{II. } S l \frac{Q}{s} = \Gamma'' : S + \Delta'' : S \\ \text{III. } \frac{1}{2} SS Y = -S(\Gamma'' : S - \Delta'' : S) + \Gamma' : S - \Delta' : S$$

quarum prima differentiatum cum secunda convenit, uti quidem rei natura postulat, ita ut duabus tantum conditionibus sit satisfaciendum. Ponamus brevitate gratia :

$$\Gamma' : S + \Delta' : S = y \text{ et } \Gamma' : S - \Delta' : S = z \text{ ut fiat}$$

$$\text{II. } S dS l \frac{Q}{s} = dy \text{ et III. } \frac{1}{2} SS Y dS = -S dz + z dS$$

hincque

$$y = fS dS l \frac{Q}{s} \text{ et } \frac{-z}{s} = \frac{1}{2} fY dS \text{ seu } z = -\frac{s}{2} fY dS$$

vnde functiones ita definiuntur, vt fit:

$$\Gamma' S = \frac{1}{2} f S d S l \frac{Q}{B} - \frac{S}{2c} f Y d S \text{ et}$$

$$\Delta' S = \frac{1}{2} f S d S l \frac{Q}{B} + \frac{S}{2c} f Y d S$$

hincque porro differentiando

$$\Gamma'' S = \frac{1}{2} S l \frac{Q}{B} - \frac{1}{2c} f Y d S - \frac{1}{2c} S Y$$

$$\Delta'' S = \frac{1}{2} S l \frac{Q}{B} + \frac{1}{2c} f Y d S + \frac{1}{2c} S Y$$

integrando vero reperitur:

$$\Gamma S = \frac{1}{2} f S d S l \frac{Q}{B} - \frac{1}{2c} f S S d S l \frac{Q}{B} - \frac{1}{2c} S S f Y d S + \frac{1}{2c} f S S T d S$$

$$\Delta S = \frac{1}{2} f S d S l \frac{Q}{B} - \frac{1}{2c} f S S d S l \frac{Q}{B} + \frac{1}{2c} S S f Y d S - \frac{1}{2c} f S S Y d S$$

Construantur ergo super axe ex dato statu initiali
duae lineae curuae A Q D et A Y F fumendo ap-
plicatas

$$S Q = S l \frac{Q}{B} \text{ et } S Y = \frac{1}{2c} f Y d S + \frac{1}{2c} S Y$$

et functionum Γ et Δ natura inde ita determinabitur
vt fit

$$\Gamma'' S = \frac{1}{2} S Q - \frac{1}{2c} S Y; \Delta'' S = \frac{1}{2} S Q + \frac{1}{2c} S Y$$

hincque porro per areas

$$\Gamma' S = \frac{1}{2} A S Q - \frac{1}{2c} A S Y; \Delta' S = \frac{1}{2} A S Q + \frac{1}{2c} A S Y$$

tum vero si haec forma $M : A S Q$ denotet eam quan-
tatem quae exprimit integrale $\int d S . A S Q$ habe-
bitur:

$$\Gamma S = + \frac{1}{2} M : A S Q - \frac{1}{2c} M : A S Y$$

$$\Delta S = + \frac{1}{2} M : A S Q + \frac{1}{2c} M : A S Y.$$

E c c 3

His

His curvis descriptis post tempus elapsum $= t$, a puncto S vtrunque abscindantur intervalla $ST = St = ct$ et ex applicatis his punctis respondentibus status aeris qui initio ad S versabatur nunc ita definitur, vt fit

$$q = Q \left(1 - \frac{SQ}{S} + \frac{1}{2S} (TM - TN + tm + tn) \right)$$

$$u = \frac{c}{2S} (tm + tn - TM + TN) + \frac{c}{2SS} (ATM - ATN - Atm - Atn)$$

at spatium translationis $Ss = \varphi$ ita exprimetur :

$$\begin{aligned} Ss &= \frac{1}{2S} \int SS dS \frac{Q}{B} - \frac{1}{2S} (ATM - ATN + Atm + Atn) \\ &\quad + \frac{1}{2SS} (M : ATM - M : ATN) \\ &\quad + \frac{1}{2SS} (M : Atm + M : Atn) \quad \text{feu} \end{aligned}$$

$$Ss = \frac{1}{2S} \int SS dS \frac{Q}{B} - \frac{1}{2S} (ATM - ATN + Atm + Atn) + \frac{1}{2SS} (M : ATM - M : ATN + M : Atm + M : Atn)$$

$$\text{vbi est } \int SS dS \frac{Q}{B} = \int S \cdot SQ \cdot dS = S \cdot ASQ - M : ASQ$$

Coroll. I.

128. Ad quodvis ergo tempus t sumtis intervallis $ST = St = ct$ aeris qui initio erat in S status ita definitur vt fit

I. densitas $q = Q \left(1 + \frac{1}{2S} (TM + tm - 2SQ) - \frac{1}{2S} (TN - tn) \right)$

II. celeritas $u = \frac{c}{2S} (tm - TM) + \frac{c}{2S} (TN + tn) + \frac{c}{2SS} \cdot tm \cdot TM - \frac{c}{2SS} (ATN + Atn)$

III. spatium $Ss = \frac{1}{2S} (2ASQ - ATM - Atm) + \frac{1}{2S} \cdot tn \cdot TN$

$$- \frac{1}{2SS} (2M : ASQ - M : ATM - M : Atm) - \frac{1}{2SS} (M : ATN - M : Atn)$$

Coroll.

Coroll. 2.

129. Si distantia A S consideretur vt infinita, tubus conicus abibit in cylindricum; et quia tum fit

$$\frac{1}{s} SQ = l \frac{Q}{s}, \frac{1}{s} SY = \frac{T}{c}; \frac{1}{s} ASQ = \int dS l \frac{Q}{s},$$

ideoque

$$\frac{1}{ss} ASQ = 0; \text{ at } \frac{1}{ss} M: ASQ = \int dS l \frac{Q}{s}$$

tum vero $\frac{1}{s} ASY = \frac{1}{c} \int T dS$ hinc

$$\frac{1}{ss} ASY = 0 \text{ et } \frac{1}{ss} M: ASY = \frac{1}{c} \int Y dS,$$

hae formulae cum illis, quae supra pro tubus cylindricis sunt inuentae, conuenient.

Scholion 1.

130. Constructio prioris scalae A Q D, ex densitate initiali formatae nulli est subiecta difficultati, at altera scala A Y F non simpliciter ex celeritatibus initialibus Y construitur, sed insuper formulam quandam integram inuoluit, quemadmodum ergo hinc eam construi oporteat, perpendamus. Descripta ergo linea curua A v C cuius applicatae S v ipsam celeritatem initialem Y in loco S exhibeant, ex ea scala illa A Y F ita construitur, vt sit eius applicata $SY = \frac{1}{c} AS \cdot S v + \frac{1}{c} AS v$ tum vero erit huius curuae area $AST = \frac{1}{c} AS \cdot AS v$, cum sit vt vidimus $\int dS (Y S + \int Y dS) = \int S Y dS$. Hanc ergo curuam A v C loco illius introducendo, habebimus

$$TN =$$

$$TN = \frac{1}{2} AT.TL + \frac{1}{2} ATL;$$

$$sn = \frac{1}{2} As.sl + \frac{1}{2} Asl$$

$$ATN = \frac{1}{2} AT.ATL; Asn = \frac{1}{2} As.Asl$$

vnde fit pro formula celeritatum

$$v = \frac{c}{ss}(sm - TM) + \frac{c}{ss} sm TM + \frac{1}{ss}(AT.TL + As.sl) - \frac{c}{ss}.TLsl$$

$$\text{ob } ST = Ss = cs$$

Atque hinc iam perspicitur, si per totum spatium Ts tam densitas initialis fuerit naturalis; quam celeritas nulla, tum etiam fore $q = Q$ et $v = 0$, quod posterius ex formula priori minus perspicitur. Si enim intra spatium As initio fuerit motus, et curua $A\psi C$ ibi incluserit aream quandam, etiam si deinceps haec curua tota in axem incidat, haec area praebit applicatas pro curua ATF etiam per totum axem sequentem sT , vnde neque areae ATN et Asn neque applicatae TN et sn evanescant: sicque dubium foret, utrum forma

$$\frac{c}{ss}(TN + sn) - \frac{c}{ss}(ATN + Asn)$$

hoc casu evanesceret; quod autem nunc quidem scilicet $A\psi C$ in calculum introducta necessario euenire debere intelligitur.

Scholion 2.

131. Loco indicis M , quem supra arcis praefiximus, ut scriptio $M: ASQ$ denoter integrale $\int dS. ASQ$ commodius signo summatorio \sum utemur,

ut

vt $fASQ$ idem denotet, quod $f dS.ASQ$, quoniam differentiale abscissae dS facile mente suppletur
 Hoc praemisso etiam pro scala ATF loco $M:ASY$
 scribam $fASY$ quae forma autem ex scala celeritatum naturali $A \vee C$ ita determinatur vt sit

$$fASY = \frac{1}{c} (ASfASv - ffASv)$$

ideoque

$$M: ATN = \frac{1}{c} (ATfATL - ffATL)$$

$$M: Atn = \frac{1}{c} (AtfAtl - ffAtl)$$

Quare per scalam densitatum AQD et celeritatum $A \vee C$ nostrae determinationes ita se habebunt

$$q = Q \left(1 + \frac{1}{cs} (TM + tm - 2SQ) - \frac{1}{cs} (AT.TL - At.tl + t.TL) \right)$$

$$v = \frac{c}{cs} (tm - TM) + \frac{c}{cs} TM + \frac{1}{cs} (AT.TL + At.tl) - \frac{s}{cs} t.TL$$

$$Ss = \frac{1}{cs} (SQtm - SQTm) - \frac{1}{cs} (fSQtm - fSQTm)$$

$$+ \frac{1}{cs} (AT.ATL - At.Atl) - \frac{1}{cs} (AT.fATL - At.fAtl - ff.t.TL)$$

quae ad vsum magis videntur accommodatae.

Problema 93.

132. Si in tubo conico ABb in infinitum Tab. IX.
 extenso alicubi per spatium minimum GH pulsus Fig. 104.
 excitetur, propagationem huius pulsus in tubo versus
 Bb ortam determinare.

Solutio.

Cum pulsus in spatiolo GH contineatur, in
 utroque termino G et H densitatem naturalem et
 Tom. XVI. Nou. Comm. Fff cele-

celeritatem nullam esse oportet. Sit igitur GH scala celeritatum, cuius applicata tl celeritatem ipsam initialem in loco t exprimat ut sit $tl = T$ directione ad B versa: pro scala densitatum GmH vero applicata $tm = A t \cdot l \frac{Q}{B}$ denotante Q densitatem in t initialem, et B naturalem. His positis consideremus locum tubi quemcunque S ; existente $AS = S$ et quia ambae scale extra spatium GH in axem incidunt, aer in S tam diu in aequilibrio perseverabit, quoad ab initio effluxerit tempus $= \frac{S}{c} \frac{H}{B}$ min. sec. elapso autem tempore $\frac{S}{c} \frac{G}{B}$ pulsus iterum cessasse est existimandus ita ut totus pulsus ibi nonnisi per tempus $\frac{GH}{c}$ sit duraturus. Ponamus ergo ab initio elapsum esse tempus $t = \frac{St}{c}$, et quia ad alteram partem B versus aequali spatio $ST = S t$ abscisso ibi ambae applicatae TL et TM evanescunt, densitas aeris q et celeritas u versus B tendens in loco S ita experimentur:

$$q = B \left(1 + \frac{tm}{sS} + \frac{At \cdot tl}{s c S} - \frac{H t l}{s c S} \right)$$

quia initio densitas in S erat $= B$, tum vero erit:

$$u = \frac{c \cdot tm}{s S} + \frac{c \cdot H t m}{s c S} + \frac{A t \cdot tl}{s S} - \frac{S t \cdot H t l}{s c S}$$

Cum autem intervallum GH minimum assumatur, areae Htl et Htm pro evanescentibus haberi possunt; quare ob $tl = T$ et

$$tm = A t \cdot l \frac{Q}{B} = A t \left(\frac{Q}{B} - 1 \right) \text{ habebimus:}$$

$$q = B \left(1 + \frac{A t}{s AS} \left(\frac{Q}{B} - 1 \right) + \frac{A t \cdot T}{s c AS} \right) \text{ seu } q = \frac{A t}{s AS} \left(l \frac{Q}{B} + \frac{T}{c} \right)$$

$$u = \frac{c \cdot A t}{s AS} \left(\frac{Q}{B} - 1 \right) + \frac{A t \cdot T}{s AS} = \frac{c \cdot A t}{s AS} \left(l \frac{Q}{B} + \frac{T}{c} \right).$$

Coroll.

Coroll. 1.

133. Si areolas HtI et Htm negligere nolumus, habebimus

$$I \frac{Q}{B} = \frac{At}{AS} (I \frac{Q}{B} + \frac{T}{C}) - \frac{Ar.HtI}{AS} \text{ et} \\ v = \frac{c.At}{AS} (I \frac{Q}{B} + \frac{T}{C}) + \frac{c}{AS} (Ar.Htm - \frac{S}{C} Ar.HtI)$$

vbi $\frac{S}{C}$ denotat tempus ab initio elapsum t in min. sec. expressum.

Coroll. 2.

134. Areas autem has eo minus negligere licet, quo maius spatium GH , et quo propius fuerit vertici coni A quoniam tum ob $tI = T$, area HtI prae rectangulo AtI nequaquam pro evanescente haberi potest.

Coroll. 3.

135. Si tempus elapsum t maius fuerit quam $\frac{SC}{C}$, ita ut punctum t ultra G versus A cadat, vbi initio erat $I \frac{Q}{B} = 0$ et $T = 0$; pro loco S adhuc erit:

$$I \frac{Q}{B} = -\frac{Ar.GIH}{AS} \text{ et } v = \frac{c}{AS} (Ar.GmH - t.GIH)$$

tum ergo neque densitas est naturalis neque motus penitus extinctus.

Scholion.

136. Omnino singulare est hoc phaenomenon, quod etiam si pulsus in S iam cessavisse est aestimandus

dus tamen aeris aequilibrium nondum prorsus sit re-
 stitutum, sed fieri possit ut etiamnum tam densitas
 q a naturali B discrepet, quam aer ipse motu quo-
 dam proferatur. Discrimen quidem hoc in valde
 magnis distantis A S ut nullum spectari potest; in
 minoribus vero eo magis est notatu dignum, quod
 perpetuo durare videatur, cum calculus nullam porro
 mutationem indicet. Verum hic obleruari oportet,
 nostras scalas hic non ultra verticem A porrigi, ear-
 umque continuationem ex altera parte ipsius A si-
 milem pulsum GH ad parem distantiam implicare,
 quo si tempus S t pertigerit in S nouus pulsus se-
 cundarius excitetur, quo finito demum aer ad S
 prorsus in aequilibrium restituatur. Hic enim simi-
 lis repetitio oriri debet ac si tubus esset cylindricus
 et in A clausus: nunc autem videmus hoc discrimen
 intercedere, quod in casu tubi conici interea
 dum pulsus secundarius ad S appellit, aerem ibi
 quandam adhuc agitationem retinere secus ac sit in
 cylindricis. Quare quemadmodum ambae scalae ultra
 conici verticem continuari debeant in sequente Problemate
 inuestigabimus.

Problema 94.

Tab. IX 137. Si circa verticem conici A aer utcumque
 Fig. 105. de statu aequilibrui deturbetur seu pulsus ibi quicun-
 que excitetur scalas ambas quibus ad propagationem
 definiendam opus est, retro ultra verticem A con-
 tinuare, indeque propagationem in tubo pro quouis
 loco S determinare.

Solutio.

Solutio.

Extendatur pulsus primo excitatus per spatium AD , et in loco quocunque T posito intervallo $AT=S$, fuerit densitas aeris $=Q$ naturali existente $=B$, celeritas vero $=T$ secundum directionem AB hinc construatur primo curua AMD sumendo applicatas $TM = S \frac{Q}{B}$, quae ergo ultra D in ipsum axem DB incidit. Deinde construatur etiam curua ANF sumendo applicatas $TN = \frac{ST + \int T dS}{c}$, cuius quidem primum membrum in D ubi $T=0$ evanescit, alterum vero $\frac{1}{2} \int T dS$ ibi certum valorem adipiscetur, cui sequentes applicatae omnes versus B erunt aequales, ita ut haec scala ANF ultra F abeat in rectam FG ipsi axi AB parallelam; at area huius curuae ita definitur ut sit $ATN = \frac{5}{6} \int T dS$: unde cum puncto T in D promotum fiat applicata $DF = \frac{1}{6} \int T dS$, erit area $ADF = AD \cdot DF$ periunde ac si tota scala $ANFG$ esset recta GF ipsi axi parallela et supra verticem A usque continuata. His positis primo quaeritur quomodo has scalas ultra A continuari oporteat, ubi ante omnia est observandum aerem in ipso vertice A nullum plane motum concipere posse. Quare si tubi punctum S , in quo supra generatum celeritatem u definiuimus, in A transferamus, formula ibi pro celeritate exhibita

$$u = \frac{c}{5} (tm - TM + TN + tn) + \frac{c}{55} (ATM - Atm - ATN - Atn)$$

hoc casu nulla esse debet. At hoc casu habebimus $S=0$, quia in hac formula posuimus $AS=S$, ex quo necesse est continuationem quaesitam ita esse

Fff 3

com-

comparatam vt fit $t m = TM$ et $t n = -TN$. Quamobrem in nostra figura scalam AMD sine vlla variatione super axe Ad describi conuenit vt fit ea $Am d$ altera vero scala $ANFG$ ibi ad contrariam axis partem describi debet vt fit $Anfg$. His iam ambabus scalaris vltra A continuatis consideremus in tubo locum quemcunque S , statuendo nunc distantiam a vertice $AS = S$, vbi cum aer initio fuerit in aequilibrio, ideoque $T = 0$ et $Q = B$ hincque $SQ = 0$, elapso tempore $= t$, capiamus vtrinque ab S interualla $ST' = St' = ct$, sintque in punctis T' et t' applicatae ambarum scalarum $T'M'$, $T'N'$ et $t'm'$ $t'n'$; atque ex his status aeris in S ita definitur vt fit ibi

$$\begin{aligned} \text{densitas } q &= B \left(1 + \frac{1}{\gamma S} (T'M' + t'm') - \frac{1}{\gamma S} (T'N' - t'n') \right) \text{ et} \\ \text{celeritas } v &= \frac{c}{\gamma S} (t'm' - T'M') + \frac{c}{\gamma S} (T'N' + t'n') \\ &\quad - \frac{c}{\gamma S S} (A t'm' - A T'M') - \frac{c}{\gamma S S} (A T'N' + A t'n') \end{aligned}$$

vnde primo patet, quamdiu tempus ab initio elapsum t minus fuerit quam $\frac{\gamma D}{c}$, tum ob

$$T'M' = 0, \quad t'm' = 0, \quad \text{et} \quad T'N' = t'n' = DF$$

fore $q = B$ et ob

$$A t'm' = A T'M' \quad \text{et} \quad A T'N' = A T'. DF$$

atque $A t'n' = A t'. DF$ prodire

$$v = \frac{c}{\gamma S} DF - \frac{c \cdot DF}{\gamma S S} (A T' + A t') = 0 \quad \text{ob} \quad A T' + A t' = 2AS = 2S,$$

tamdiu ergo aer ibi in aequilibrio manebit. Statim autem ac tempus elapsum t maius fit quam $\frac{\gamma D}{c}$,
aer

aer in S agitari incipiet; ponamus ergo elapsum iam esse tempus $t = \frac{AS}{c}$, et quia nunc est

$$T'M' = 0, t'm' = 0, T'N' = DF, t'n' = 0,$$

$$AT'M' = AMD, At'm' = 0, AT'N' = AT'.DF = 2S.DF \text{ et } At'n' = 0$$

erit tum in loco S

$$\text{densitas } q = B \left(1 - \frac{DF}{2S}\right) \text{ et}$$

$$\text{celeritas } v = \frac{c.DF}{2S} + \frac{c.AMD}{2SS} - \frac{c.DF}{S} = \frac{c.AMD}{2SS} - \frac{c.DF}{2S}.$$

Pro tempore autem quovis medio elapso $t = \frac{ST}{c}$ elicitur

$$\text{densitas } q = B \left(1 + \frac{TM + TN - DF}{2S}\right) \text{ et}$$

$$\text{celeritas } v = \frac{c}{2S} (TM + TN - DF) + \frac{c}{2SS} (DTM + DFTN - DT, DF).$$

Videamus denique etiam quomodo status aeris in S se sit habiturus cum effluxerit tempus

$$t = \frac{Sd}{c} = \frac{AS + AD}{c};$$

tum vero erit

$$T'M' = 0, AT'M' = AMD : T'N' = DF : AT'N' \\ = AT'.DF = 2S.DF + AD.DF:$$

porro

$$t'm' = 0, At'm' = Amd = AMD, t'n' = -df = -DF, \\ At'n' = -Adf = -AD.DF,$$

ideoque

$$\text{densitas } q = B \left(1 - \frac{DF}{S}\right) \text{ et}$$

$$\text{celeritas } v = -\frac{c.DF}{S}.$$

Coroll.

Coroll. 1.

138. Celeritas ergo pulsus, cum ad locum quemvis S peruenerit duabus constat partibus, quarum prior decrefcit in ratione distantiae $AS = S$, posterior vero in ratione duplicata distantiae, quae autem posterior pars prae priori euanescit statim ac distantia $AS = S$ fit modica.

Coroll. 2.

139. Cum impulsio in organo auditus facta pendeat sine dubio a celeritate agitationis in quouis pulsu, hinc patet quomodo sonus aucta distantia continuo diminuatur; et quia vis impulsione quadrato celeritatis proportionalis statuenda videtur, soni debilitatio sequetur rationem duplicatam distantiarum.

Scholion. 1.

140. Insignis hic difficultas occurrit, quod postquam pulsus penitus per locum S transferit, aer tamen ibi non in aequilibrium restituatur, nisi pulsus initialis ita fuerit comparatus, ut interuallum DF euanescat. Talis certe commotio post transitum pulsus nullo modo admitti potest, ideoque calculus noster defectus potius cuiuspiam arguendus videtur, nisi dicere velimus, omnem agitationem aeri primum inductam necessario ita semper esse comparatam, ut interuallum DF inde prodeat euanescens. Quoniam vero hoc nulla ratione probari potest, ori-

go huius incommodi in eo quaerenda videtur, quod cum intervalum DF ex valore integrali $\frac{1}{2} \int Y dS$ sit natum, in hac ipsa integratione iusta constans sit neglecta: dummodo ergo talem constantem introduxissemus, qua hoc integrale per totam scalam celeritatum extensam ad nihilum fuisset reductum, omnis haec difficultas penitus evanuisset, cum inde etiam curua ANF ultra D tota in axem DB incidisset. Nullum ergo est dubium quin hic origo istius defectus calculi sit sita, totumque calculum hoc modo expediri conveniat. Talia autem incommoda in argumento prorsus nouo minime sunt miranda, et sperare licet, cum id diligentius fuerit excultum, tum omnia sponte dissipatum iri. Hic autem continuatio scalarum ultra verticem A merito suspecta videtur, propterea quod in hoc loco sit $S=0$, iique termini quos destrui oportet infiniti; cui incommodo in sequenti problemate medelam afferre conabor.

Scholion 2.

141. Ex hoc problemate colligere licet, quemadmodum pulsus quicunque in libero aere quaque versus propagetur; si enim quasi centrum pulsus propagati sit in A , vniuersus aer circumfusus in infinitos conos, quorum vertices in A concurrant distributus concipi potest; et manifestum est per quemlibet eorum pulsus perinde propagatum iri, ac per liberum aerem quoniam qua duo huiusmodi tubi se mutuo tangunt, ibi densitas ac propterea etiam

Tom.XVI. Nou.Comm.

G g g — pressio

pressio est eadem, ita vt etiam tubis remotis propagatio eandem legem sit secutura. Nunc ergo intelligimus pulsus in libero aere eadem prorsus celeritate propagari atque in tubis cylindricis; at vero ob tuborum amplificationem pulsus continuo debilitari, ita vt celeritas cuiusque agitationis diminuatur in ratione distantiarum a pulsu initiali A; latitudinem vero pulsuum, ceterasque soni qualitates in propagatione non alterari.

Problema 95.

Tab. IX. 142. Si tubus conicus citra verticem I in Aa
Fig. 106. sit terminatus ibique siue apertus siue clausus, ex agitatione initiali aeri in tubo Aa Bb contento inducta formulas pro motu sequente definiendo exhibere.

Solutio.

Posita termini A a vertice con i distantia $IA = a$, sumatur in cono locus quicumque S vocata distantia $AS = s$, vt distantia quam ante posuimus S hic sit $= a + s$, initio autem in S fuerit densitas $= Q$ naturali existente $= B$ et celeritas secundum $SB = T$. Elapso autem tempore quocunque t eiusdem aeris, qui initio fuerat in S, sit densitas $= q$, celeritas $= v$ et translationis spatium $Ss = v$. Cum iam amplitudo tubi in S sit $\Omega = n n (a + s)^2$, erit $\frac{d\Omega}{\Omega ds} = \frac{2}{a+s}$, hincque ex formulis supra inuentis obtinebimus:

$$v =$$

$$v = \frac{1}{(a+s)^2} f(a+s)^2 ds l \frac{Q}{B} - \frac{1}{a+s} \Gamma^I: (s+ct) + \frac{1}{(a+s)^2} \Gamma: (s+ct) \\ - \frac{1}{a+s} \Delta^I: (s-ct) + \frac{1}{(a+s)^2} \Delta: (s+ct)$$

$$q = Q(1 - l \frac{Q}{B} + \frac{1}{a+s} \Gamma^{II}: (s+ct) + \frac{1}{a+s} \Delta^{II}: (s-ct) \text{ et} \\ s = \frac{-c}{a+s} \Gamma^{II}: (s+ct) + \frac{c}{a+s} \Delta^{II}: (s-ct) + \frac{c}{(a+s)^2} \Gamma^I: (s+ct) \\ - \frac{c}{(a+s)^2} \Delta^I: (s-ct)$$

vnde pro statu initiali cognito colligimus :

$$0 = \frac{1}{(a+s)^2} f(a+s)^2 ds l \frac{Q}{B} - \frac{1}{a+s} (\Gamma^I: s + \Delta^I: s) \\ + \frac{1}{(a+s)^2} (\Gamma: s + \Delta: s)$$

$$0 = -l \frac{Q}{B} + \frac{1}{a+s} (\Gamma^{II}: s + \Delta^{II}: s)$$

$$s = \frac{-c}{a+s} (\Gamma^I: s - \Delta^I: s) + \frac{c}{(a+s)^2} (\Gamma^I: s - \Delta^I: s).$$

Ex illa fit

$$\Gamma^{II}: s + \Delta^{II}: s = (a+s) l \frac{Q}{B} \text{ et } \Gamma^I: s + \Delta^I: s = f(a+s) ds l \frac{Q}{B}$$

atque

$$\Gamma: s + \Delta: s = f ds f(a+s) ds l \frac{Q}{B}$$

ex ista vero

$$f \Upsilon ds = \frac{-c}{a+s} (\Gamma^I: s - \Delta^I: s), \text{ seu } c(\Gamma^I: s - \Delta^I: s) = -(a+s) f \Upsilon ds$$

hincque

$$c(\Gamma^{II}: s - \Delta^{II}: s) = -f T ds - (a+s) T \text{ et } c(\Gamma: s - \Delta: s) \\ = -f(a+s) ds f T ds.$$

Qui valores in prima aequatione substituti praebent:

$$0 = f(a+s)^2 ds l \frac{Q}{B} - (a+s) f(a+s) ds l \frac{Q}{B} + f ds f(a+s) ds l \frac{Q}{B}$$

unde ambiguitas ob constantem per integrationem ingressam oriunda tollitur, cum debeat esse:

$$f ds f(a+s) ds l \frac{Q}{B} = (a+s) f(a+s) ds l \frac{Q}{B} - f(a+s)^2 ds l \frac{Q}{B}$$

quae duo integralia simplicia ita capiantur, ut posito $s = 0$ evanescant. Functiones ergo Γ et Δ ita definiuntur ut sit

$$\Gamma^h: s = \frac{1}{2}(a+s) l \frac{Q}{B} - \frac{(a+s)T - fTds}{2c}$$

$$\Delta^h: s = \frac{1}{2}(a+s) l \frac{Q}{B} + \frac{(a+s)T + fTds}{2c}$$

$$\text{tum vero } \Gamma^l: s = \frac{1}{2}f(a+s) ds l \frac{Q}{B} - \frac{(a+s)fTds}{2c}$$

$$\Delta^l: s = \frac{1}{2}f(a+s) ds l \frac{Q}{B} + \frac{(a+s)fTds}{2c} \text{ et}$$

$$\Gamma: s = \frac{1}{2}(a+s) f(a+s) ds l \frac{Q}{B} - \frac{1}{2}f(a+s)^2 ds l \frac{Q}{B} - \frac{f(a+s)ds fTds}{2c}$$

$$\Delta: s = \frac{1}{2}(a+s) f(a+s) ds l \frac{Q}{B} + \frac{1}{2}f(a+s)^2 ds l \frac{Q}{B} + \frac{f(a+s)ds fTds}{2c}$$

Statuamus ergo in S duas applicatas

$$SQ = (a+s) l \frac{Q}{B} \text{ et } SV = \frac{(a+s)T + fTds}{c}$$

descriptisque binis scalis CQc et DVd , erit

$$\Gamma^h: s = \frac{1}{2}SQ - \frac{1}{2}SV; \quad \Delta^h: s = \frac{1}{2}SQ + \frac{1}{2}SV$$

$$\Gamma^l: s = \frac{1}{2}ACSQ - \frac{1}{2}ADSV; \quad \Delta^l: s = \frac{1}{2}ACSQ + \frac{1}{2}ADSV$$

Pro tempore ergo elapso t sumtis intervallis $ST = St = ct$ densitas q et celeritas u ita definiuntur ut sit:

$$q = Q \left(1 + \frac{1}{2(a+s)} (TM - TN + tm + tn - 2SQ) \right)$$

$$u = \frac{c}{2(a+s)} (tm + tn - TM + TN) + \frac{c}{2(a+s)^2} (ACTM - ADTN - ACtm - ADtn)$$

quae

quae duo elementa nosse sufficit, cum inde tertium, nempe spatium Ss facile concludatur.

Vt iam inuestigemus quomodo utramque scalam ultra A continuari oporteat, sumamus punctum S in ipso termino A , ut sit $s = 0$, et abscissis utrinque $AT' = A't' = c't$, quoniam areas curvarum a puncto A dextrorsum computauimus, quae nunc sinistrorsum cadunt, negatiue capi debent, eritque pro hoc puncto A

$$q = Q \left(1 + \frac{1}{2a} (T'M' + t'm' - 2AC) - \frac{1}{2a} (T'N' - t'n') \right) \\ v = \frac{c}{2a} (t'm' - T'M') + \frac{c}{2a} (T'N' + t'n') + \frac{c}{2aa} (ACT'M' + ACt'm') \\ - \frac{c}{2a^2} (ADT'N' - ADt'n').$$

Nunc duo casus sunt expediendi prout tubus in termino A fuerit apertus vel clausus:

I. Sit tubus in Aa apertus et quia ibi densitas perpetuo manet naturalis, ut sit $Q = B$ et $q = B$, erit $AC = 0$; fierique necesse est

$$T'M' + t'm' = 0 \quad \text{et} \quad T'N' = t'n'$$

hoc ergo casu utraque scala prorsus ut in tubis cylindricis continuatur; scala scilicet densitatum CQc ad alteram axis partem, celeritatum vero DVd ad eandem describitur.

II. Sit tubus in Aa clausus, et quia ibi celeritas perpetuo manet nulla, pro scala densitatum primo esse debet:

$$a(t'm' - T'M') + ACT'M' + ACt'm' = 0$$

G g g 3

statua-

statuamus

$A T' = A t' = x$, $T' M' = y$ et $t' m' = z$,
vt habeamus :

$a(z-y) + f(y+z)dx = 0$ seu $adz + zdx - ady + ydx = 0$
quae integrata dat :

$$e^{\frac{x}{a}} az = f e^{\frac{x}{a}} (a dy - y dx) = e^{\frac{x}{a}} ay - 2 \int e^{\frac{x}{a}} y dx = -e^{\frac{x}{a}} ay + 2 a \int e^{\frac{x}{a}} dy$$

hincque

$$z = t' m' = y - \frac{1}{a} e^{-\frac{x}{a}} \int e^{\frac{x}{a}} y dx = -y + 2 e^{-\frac{x}{a}} \int e^{\frac{x}{a}} dy.$$

Deinde pro scala celeritatum oportet fit :

$a(T' N' + t' n') - A D T' N' + A D t' n' = 0$
faciamus

$A T' = A t' = x$, $T' N' = y$, $t' n' = z$,
et aequatio

$a(y+z) - f y dx + f z dx = 0$ seu $adz + zdx + ady - ydx = 0$
integrata praebebat :

$$e^{\frac{x}{a}} az = f e^{\frac{x}{a}} (y dx - a dy) = -e^{\frac{x}{a}} ay + 2 \int e^{\frac{x}{a}} y dx = e^{\frac{x}{a}} ay - 2 a \int e^{\frac{x}{a}} dy$$

hincque

$$z = t' n' = -y + \frac{1}{a} e^{-\frac{x}{a}} \int e^{\frac{x}{a}} y dx = y - 2 e^{-\frac{x}{a}} \int e^{\frac{x}{a}} dy$$

utroque casu integralia ita definiri debent, vt posito $x = 0$ fiat $z = y$.

Coroll. I.

143. Cum casu, quo tubus in $A a$ est apertus

tus ambae scalae eodem modo continuentur quo in tubis cylindricis, eadem quoque lex continuationis locum habebit si tubus conicus etiam in altero termino Bb fuerit apertus, vnde sequitur in tubo conico vtrinque aperto agitationes aeris prorsus convenire cum iis, quas supra pro tubis cylindricis definiuimus.

Coroll. 2.

144. Quae igitur supra de sonis, quos tibiae apertae edunt annotauimus, eadem quoque locum habent si tibiis figura conica tribuatur. Neque tamen figura nimis diuergens admitti potest, quia tum agitationes per vnamquamque sectionem non amplius forent aequabiles, vti Theoria nostra postulat.

Coroll. 3.

145. Ex hoc problemate theoria tuborum cylindricorum deducitur si distantia $IA = a$ statuatur infinita. Tum autem pro casu quo tubus in Aa est clausus eadem lex pro vtriusque scalae continuatione colligitur, quia ob $a = \infty$ erit $i'm' = T'M'$ et $i'n' = -T'N'$.

Scholion 1.

146. Nunc dubia quae supra circa propagationem pulsus in ipso vertice coni excitati superebant, perfecte tolluntur, cum enim totum negotium eo redeat, quomodo vtramque scalam vltra verticem coni oporteat continuari, ad hunc casum nostrum

hunc problema accommodabimus, si distantiam $IA=a$ evanescentem simulque tubum in A clausum statuamus quoniam enim conus in vertice per se clauditur ibi certe aer nullum motum concipere potest. Ex quo primum pro continuatione scalae densitatum quaestio huc redit, ut ex hac aequatione

$$z = -y + 2e^{\frac{x}{a}} \int e^{\frac{x}{a}} dy$$

valor ipsius z definiatur casu quo $a=0$, quod cum ob exponentem $\frac{x}{a}$ infinitum minus pateat ad aequationem differentialem

$$a dz + z dx - a dy + y dx = 0$$

confugiamus, unde ob $a=0$ manifesto sequitur $z=-y$, ita ut scala densitatum axi ad partem contrariam applicari debeat, secus ac supra per evanescentiam intervalli $S=0$ decepti fecimus. Deinde vero pro scala celeritatum ex aequatione differentiali

$$a dz + x dx + a dy - y dx = 0 \text{ ob } a=0$$

deducimus $z=y$, ita ut haec scala ad eandem axis partem constitui debeat utraque scilicet continuatio ea-

Tab. IX. dem lege peragitur ac si tubus esset apertus. Hinc
Fig. 105. ergo postrema evolutio in probl. 94 ita emendabitur ut cum scalae in contrarias plagas cadant atque infigura sunt repraesentatae elapso tempore $t = \frac{x}{c}$, fiat $t' m' = 0$, $t' n' = +DF$ area $A t' m' = +A m d = A M D$ quia hic duplex signi mutatio fieri debet altera quatenus haec area ultra A , altera quatenus infra

infra axem cadit. Denique vero fit area $A t' n' = -A df$
 $= -A D, DF$; unde consequimur:

$T' M' + t' m' = 0$; $T' N' - t' n' = 0$; $A t' m' - A T' M' = 0$
 $t' m' - T' M' = 0$; $T' N' + t' n' = 2 DF$; $A T' N' + A t' n' = 2 S, DF$
 hincque porro
 densitatem $q = B$ et celeritatem

$$v = \frac{c}{2S} \cdot 0 + \frac{c}{2S} \cdot 2 DF - \frac{c}{2SS} \cdot 0 - \frac{c}{2SS} \cdot 2 S, DF \text{ seu}$$

$$v = \frac{c}{S} \cdot DF - \frac{c}{S} \cdot DF = 0$$

ex quo manifestum est elapso tempore $t = \frac{S}{c} d$ aerem in
 S penitus in aequilibrium restitui, sicque veritatem
 egregie saluari.

Scholion 2.

147. Quoniam vidimus tibias conicas pro lon-
 gitudine eodem edere sonos atque cylindricos siqui-
 dem sint apertae, probe notandum est hanc conveni-
 entiam neutiquam in tibiis clausis locum habere.
 Cum enim si tubus conicus ad $A a$ fuerit clausus,
 ambae scalae in lineas ipsis maxime dissimiles conti-
 nuari debeant, hinc nullae oscillationes regulares
 oriri poterunt; sed sonus iis editus admodum erit
 rudis et inconditus minimeque ad harmoniam effici-
 endam accommodatus.

DE
PERTURBATIONE
MOTVS TERRAE AB ACTIONE
VENERIS ORIVNDA.

Auctore

L. EULER O.

I.

Quamquam orbita Veneris a plano eclipticae declinat, tamen in praesenti inuestigatione, ab hac declinatione mentem abstrahamus, quandoquidem perturbatio, qua terra a plano eclipticae dimoueretur quam minima esset futura, quamobrem Venerem in ipso plano eclipticae motum suum absolueret assumamus, sicque tota nostra inuestigatio ad binas coordinatas reduceatur.

2. Reperiantur ergo certo quodam tempore centra Solis, Terrae et Veneris in punctis \odot , \oplus et \ominus in plano eclipticae, in quo recta $\odot \vee$ dirigatur ad punctum aequinoctiale vernal, massae autem horum trium corporum iisdem signis \odot , \oplus , \ominus indicentur. Pro loco terrae autem vocentur coordinatae

Tab. X.
Fig. 1. $\odot X = x$ et $X \oplus = y$, ipsa vero a Sole distantia dicatur $\odot \oplus = u$, Veneris vero a Sole distantia $\odot \ominus = v$, eiusque a terra distantia $\ominus \oplus = w$, tum vero vocentur anguli Longitudinem exhibentes

$\vee \odot \oplus$

$\nabla \odot \delta = \theta$ et $\nabla \odot \varphi = \Phi$, ac manifestum est fore
 $= u \cos. \theta$ et $y = u \sin. \theta$, ideoque $uu = xx + yy$,
 tum vero erit $ww = uu + vv - 2uv \cos. (\Phi - \theta)$.

3. Iam ob actionem Solis terra vrgetur in
 directione $\delta \odot vi = \frac{\odot}{u}$, ob actionem Veneris au-
 tem, terra vrgetur in directione $\delta \varphi vi = \frac{\varphi}{w}$, prae-
 terea vero quia Solem in quiete spectamus, vires
 quibus ipse Sol sollicitatur contrario modo in ter-
 ram transferri oportet, a terra autem Sol vrgetur
 in directione $\odot \delta vi = \frac{\delta}{u}$, ex quo eadem vis ipsi
 terrae in directione $\delta \odot$ applicata est censenda. De-
 inde quia Sol a Venere vrgetur secundum $\odot \varphi vi$
 $= \frac{\varphi}{v}$, ducta recta δV ipsi $\varphi \odot$ parallela, terra
 quoque censenda est vrgeri in directione δV , vi $\frac{\varphi}{v}$
 quocirca terra omnino his tribus viribus sollicitari
 est concipienda, *primo* in directione $\delta \odot$ adest vis
 $= \frac{\odot + \delta}{u}$. *Secunda* vis agit in directione δV est que
 $= \frac{\varphi}{v}$. *Tertia* vero vis agit in directione $\delta \varphi$, quae
 est $= \frac{\varphi}{w}$.

4. Quo iam has vires secundum directiones
 coordinatarum nostrarum resolvamus, demittatur ex
 φ in $\odot \nabla$ perpendiculum φP , ad quod ex δ rectae
 $\odot \nabla$ parallela agatur δQ , eritque $\odot P = v. \cos. \Phi$
 et $P \varphi = V \sin. \Phi$, vnde colligitur $\delta Q = x - v \cos. \Phi$,
 et $\varphi Q = v \sin. \Phi - y$, atque hinc pro directione
 abscissae $X \odot$ resultant istae vires

$$= \frac{\odot + \delta}{u} \cdot \frac{x}{u} + \frac{\varphi}{v} \cos. \Phi + \frac{\varphi}{w} \cdot \frac{x - v \cos. \Phi}{u} = \frac{(\odot + \delta)x}{u^2} + \frac{\varphi \cos. \Phi}{v} + \frac{\varphi(x - v \cos. \Phi)}{w^2}$$

H h h 2

Tum

428 DE PERTVRBATIONE MOTVS

Tum vero pro directione applicatae $\frac{1}{2} X$, colliguntur hae vires

$$\frac{\odot + \delta}{u u} \cdot \frac{\gamma}{u} + \frac{v}{v v} \sin. \Phi - \frac{v (\odot \sin. \Phi - \gamma)}{w w}.$$

Denotet nunc $d\tau$ elementum temporis pro constante habendum, sitque α quantitas constans naturae huius temporis conueniens ac principia motus nobis binas sequentes suppeditant aequationes:

$$I. \frac{d}{\alpha} \frac{d \frac{1}{2}}{d \tau^2} + \frac{(\odot + \delta) x}{u^2} + \frac{v \cos. \Phi}{v v} + \frac{v (x - v \cos. \Phi)}{w w} = \odot$$

$$II. \frac{d}{\alpha} \frac{d \gamma}{d \tau^2} + \frac{(\odot + \delta) \gamma}{u^2} + \frac{v \sin. \Phi}{v v} + \frac{v (\gamma - v \sin. \Phi)}{w w} = 0.$$

5. Calculum autem ab his coordinatis, ad alias traduci conuenit, quae ad longitudinem terrae mediam referantur. Ducatur ergo recta $\odot M$ longitudinem terrae mediam repraesentans, ad quam ex terra demittatur perpendicularis $\frac{1}{2} x$, vt habeantur nouae coordinatae, $\odot x = X$ et $x \frac{1}{2} = Y$, tum vero vocetur angulus $\vee \odot M = t$, qui ipsam longitudinem terrae mediam exprimit cuius differentiale $d t$ vtique illi elemento temporis $d \tau$ est proportionale, ideoque eius loco vsurpari poterit, vti mox videbimus, hinc autem coordinatae praecedentes ita determinantur, vt sit

$$x = X \cos. t - Y \sin. t, \quad y = Y \cos. t + X \sin. t,$$

manebit autem vt ante

$$u u = X^2 + Y^2, \quad \text{et} \quad w w = u u + v v - 2 u v \cos. (\Phi - t).$$

6. Per differentiationem igitur elicimus :

$$dx = dX \cos. t - dY \sin. t - a t (X \sin. t + Y \cos. t)$$

$$= dX \cos. t - dY \sin. t - y dt \quad \text{et}$$

$$dy = dY \cos. t + dX \sin. t + d t (X \cos. t - Y \sin. t)$$

$$= dX \sin. t + dY \cos. t + x dt.$$

Denuoque differentiando

$$ddx = ddX \cos. t - ddY \sin. t - dX dt \sin. t - dY dt \cos. t - dy dt$$

$$= ddX \cos. t - ddY \sin. t - 2 dt (dX \sin. t + dY \cos. t) - dt^2 (X \cos. t - Y \sin. t)$$

$$ddy = ddX \sin. t + ddY \cos. t + 2 dt (dX \cos. t - dY \sin. t) - dt^2 (X \sin. t + Y \cos. t)$$

vnde aequationes nostrae ita erunt comparatae :

$$\text{I. } \frac{ddX \cos. t - ddY \sin. t - 2 dt (dX \sin. t + dY \cos. t) - dt^2 (X \cos. t - Y \sin. t)}{a dt^2}$$

$$+ \frac{(\odot + \otimes) X \cos. t - Y \sin. t}{u^2} + \frac{\otimes \cos. \Phi}{v^2} + \frac{\otimes (X \cos. t - Y \sin. t - v \cos. \Phi)}{w^2} = \odot$$

$$\text{II. } \frac{ddX \sin. t + ddY \cos. t + 2 dt (dX \cos. t - dY \sin. t) - dt^2 (X \sin. t + Y \cos. t)}{a dt^2}$$

$$+ \frac{(\odot + \otimes) X \sin. t + Y \cos. t}{u^2} + \frac{\otimes \sin. \Phi}{v^2} + \frac{\otimes (X \sin. t + Y \cos. t - v \sin. \Phi)}{w^2} = \odot_2$$

7. Quo autem hinc formas simpliciores eruamus, duplici combinatione utemur, prima scilicet combinatio. I. $\cos. t + \text{II. } \sin. t$ suppeditat :

$$\frac{ddX - a dt dY - X dt^2}{a dt^2} + \frac{(\odot + \otimes) X}{u^2} + \frac{\otimes \cos. (\Phi - t)}{v^2} + \frac{\otimes (X - v \cos. (\Phi - t))}{w^2} = \odot$$

altera vero combinatio esto

I. $-\sin. t + \text{II. } \cos. t$ quae praebet :

$$\frac{ddY + 2 dt dX - Y dt^2}{a dt^2} + \frac{(\odot + \otimes) Y}{u^2} + \frac{\otimes \sin. (\Phi - t)}{v^2} + \frac{\otimes (Y - v \sin. (\Phi - t))}{w^2} = \odot$$

Quo has aequationes adhuc tractabiliores reddamus, mentem primo abstrahamus ab actione Veneris, seu ponamus $\varphi = 0$, vt habeamus istas aequationes

$$\frac{ddX - \frac{dtdY - Xdt^2}{a d\tau^2}}{a d\tau^2} + \frac{(\odot + \frac{\delta}{a})X}{u^3} = 0$$

$$\frac{ddY + \frac{dtdX - Ydt^2}{a d\tau^2}}{a d\tau^2} + \frac{(\odot + \frac{\delta}{a})Y}{u^3} = 0$$

nunc autem terram secundum ipsum motum medium ferri assumamus, ita vt posita distantia media terrae a Sole $= a$, pro hoc casu habituri sumus

$X = a$; $Y = 0$ et $u = a$, qui valores in nostris aequationibus producunt

$$-\frac{dt^2}{a d\tau^2} + \frac{\odot + \frac{\delta}{a}}{a^2} = 0,$$

altera vero sponte euanescit, vnde intelligimus loco elementi $d\tau$ differentiale motus medii dt introductum iri, si modo loco $a d\tau^2$ scribatur $\frac{a^2 dt^2}{\odot + \frac{\delta}{a}}$, hacque adeo substitutione in genere vti licebit, quo pacto non solum formulā indefinita $a d\tau^2$, sed etiam notio massarum $\odot + \frac{\delta}{a}$ e calculo euanescit. Multiplicemus scilicet nostras aequationes per $\frac{a^2}{\odot + \frac{\delta}{a}}$, tum vero ponatur fractio $\frac{\odot}{\odot + \frac{\delta}{a}} = \lambda$, atque nostrae expressiones ita satis concinnae expressae prodibunt:

$$\text{I. } \frac{ddX}{dt^2} - \frac{dY}{dt} - X + \frac{a^2 X}{u^2} + \frac{\lambda a^2 \cos(\Phi - t)}{\odot u} + \frac{\lambda a^2 (X - \frac{Y \sin(\Phi - t)}{u})}{\odot^2} = 0$$

$$\text{II. } \frac{ddY}{dt^2} + \frac{dX}{dt} - Y + \frac{a^2 Y}{u^2} + \frac{\lambda a^2 \sin(\Phi - t)}{\odot u} + \frac{\lambda a^2 (Y - \frac{X \sin(\Phi - t)}{u})}{\odot^2} = 0$$

8. Postremam nunc transformationem adhibeamus inde deductam, quod ob excentricitatem terrae satis paruum locus $\frac{\delta}{a}$ a puncto x nunquam, admodum sit discrepaturus; hunc in finem statuamus

$$X = a$$

$X=a(1+x)$ et $Y=ay$, unde fit $u=a\sqrt{((1+x)^2+yy)}$
et aequationes nostrae per a diuisae euadent

$$\text{I. } \frac{d^2x}{dt^2} - \frac{1}{a} \frac{dy}{dt} - (1+x) + \frac{(1+x)}{((1+x)^2+yy)^{3/2}} + \frac{\lambda aa}{p^2 v} \cos(\Phi-t) \\ + \frac{\lambda a^2 (1+x - \frac{v}{a} \cos(\Phi-t))}{w^2} = 0$$

$$\text{II. } \frac{d^2y}{dt^2} + \frac{1}{a} \frac{dx}{dt} - y + \frac{y}{((1+x)^2+yy)^{3/2}} \\ + \frac{\lambda aa}{v^2} \sin(\Phi-t) + \frac{\lambda aa}{w^2} (ay - v \sin(\Phi-t)) = 0$$

vbi notandum ambas has nouas coordinatas x et y
prae vnitatem semper fore satis exiguas, quam ob
causam formulam u facile in seriem valde conuer-
gentem euoluere licet. Est autem *B. Lector* monean-
dus, ne has litteras x et y confundat cum superiori-
bus, quas iam penitus obliuisci oportet.

*Euolutio harum formularum remota actione
Veneris.*

9. Antequam Veneris rationem habeamus, utri-
que necesse est, pro binis nostris incognitis x et y
eos valores inuestigare, qui ex sola actione Solis
et Terrae oriuntur, hancobrem nobis istae duae aequa-
tiones sint propositae:

$$\text{I. } \frac{d^2x}{dt^2} - \frac{1}{a} \frac{dy}{dt} - (1+x) + \frac{1+x}{((1+x)^2+yy)^{3/2}}$$

$$\text{II. } \frac{d^2y}{dt^2} + \frac{1}{a} \frac{dx}{dt} - y + \frac{y}{((1+x)^2+yy)^{3/2}}$$

ex

ex quibus valores utriusque incognitae x et y defini-
niri oportet. Hunc in finem formulam irrationalem
 $((1+x)^2 + yy)^{-\frac{1}{2}}$ in seriem convergentem resolu-
mus, quae est

$$\frac{1}{(1+x)^2} - \frac{1}{2} \frac{yy}{(1+x)^3} + \frac{3}{8} \frac{y^2 y^2}{(1+x)^5} -$$

et quum porro fit

$$\frac{x}{(1+x)^n} = x - nx + \frac{n(n+1)}{1 \cdot 2} x^2 - \frac{n(n+1)(n+2)}{1 \cdot 2 \cdot 3} x^3 \\ + \frac{n(n+1)(n+2)(n+3)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} x^4 - \text{etc.}$$

facta evolutione binae nostrae aequationes sequentes
induent formas :

$$\text{I. } \frac{d^2 x}{dt^2} - \frac{d^2 y}{dt^2} - 3x, + 3xx - \frac{1}{2}y^2, + 6xy^2 - 4x^3, \\ + 5x^5 - 15xxyy + \frac{1}{2}y^5 = 0$$

$$\text{II. } \frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{d^2 y}{dt^2} - 3xy, + 6xxy - \frac{1}{2}y^3, \\ - 10x^2y + \frac{1}{2}xy^3 = 0$$

quae series quum x et y sint fractiones satis parvae
vehementer convergunt, quod quo clarius appareat,
has aequationes in membra dispescimus secundum
dimensionum numerum, quas binae litterae x et y
adimplent. Ac prima quidem membra vocabimus
principalia, sequentia vero annexa.

10. Facile hic perspicere licet quantitatem x
per certam seriem cosinuum exprimi debere, alteram
vero y per similem seriem sinuum, hinc in sub-
sidium solutionis observasse iuvabit, si membra annexa
prioris aequationis contineant $\sin \mu t$, posterioris
vero

vero aequationis hunc terminum $M \sin. \mu t$, tum in
in ipsis seriis ipsarum x et y , similes terminos
occurrere debere. Pro x igitur occurrere sumamus
terminum $N \cos. \mu t$, pro y vero $N \sin. \mu t$, qui
valores in partes principales inducti praebent:

$$M = \mu^2. N + 2 \mu N + 3 N = N(\mu^2 + 3) + 2 \mu N$$

$$M = \mu^2. N + 2 \mu N,$$

vnde colligimus

$$N = \frac{\mu M - 2 \mu N}{\mu^2 (\mu^2 - 1)}; N = \frac{(\mu^2 + 3) M - 2 \mu M}{\mu^2 (\mu^2 - 1)}$$

sive quatenus N iam est inuentum erit

$$N = \frac{M}{\mu^2} - \frac{2 \mu N}{\mu^2}.$$

Hinc notari conuenit casu quo $\mu = 0$, fore $M = 3 N$,
 $N = \frac{1}{3} M$ siquidem fuerit $M = 0$, id quod semper
eueniet, tum vero casu quo $\mu = 1$, necessario fiet
 $M = 2 M$, tum vero valor N manet indefinitus, ex
coque prodibit $N = M - 2 N$.

11. Quoniam iam vidimus pro motu terrae
medio siue circulari, fieri tam $x = 0$, quam $y = 0$,
vnde eatenus tantum quantitates x et y certos for-
tiantur valores, quatenus orbita terrae excentricitate
est praedita, denotet igitur K excentricitatem orbitae
terrestreis, et pro utraque quantitate x et y sequen-
tes ordines constitui conueniet

$$x = K P + K' Q + K'' R + K''' S;$$

$$y = K P + K' Q + K'' R + K''' S$$

quos singulos ordines successive euolui necesse est.

Tom. XVI. Nou. Comm.

I i i

Pro

Pro primo igitur ordine, qui excentricitate simpliciter K est affectus, habebimus has duas aequationes:

$$\left. \begin{array}{l} \text{I. } \frac{dd\mathfrak{P}}{dt^2} - \frac{2dP}{dt} - 3\mathfrak{P} = 0 \\ \text{II. } \frac{ddP}{dt^2} + \frac{2d\mathfrak{P}}{dt} = 0 \end{array} \right\} \text{I.}$$

Pro secundo ordine qui quadrato K K est affectus:

$$\left. \begin{array}{l} \text{I. } \frac{dd\Omega}{dt^2} - \frac{2dQ}{dt} - 3\Omega + 3\mathfrak{P}^2 - \frac{1}{2}P^2 = 0 \\ \text{II. } \frac{ddQ}{dt^2} + \frac{2d\Omega}{dt}, - 3\mathfrak{P}P = 0 \end{array} \right\} \text{II.}$$

Pro tertio ordine qui cubo K³ est affectus, aequationes nostrae erunt

$$\left. \begin{array}{l} \text{I. } \frac{dd\mathfrak{R}}{dt^2} - \frac{2dR}{dt} - 3\mathfrak{R} + 6\mathfrak{P}\Omega - 3PQ; + 6\mathfrak{P}P^2 - 4\mathfrak{P}^3 = 0 \\ \text{II. } \frac{ddR}{dt^2} + \frac{2d\mathfrak{R}}{dt}, - 3\mathfrak{P}Q - 3P\Omega; + 6\mathfrak{P}^2P - \frac{1}{2}P^3 = 0 \end{array} \right\} \text{III.}$$

Pro quarto denique ordine biquadrato K⁴ affecto, aequationes erunt

$$\left. \begin{array}{l} \text{I. } \frac{dd\mathfrak{S}}{dt^2} - \frac{2dS}{dt} - 3\mathfrak{S}; + 6\mathfrak{P}\mathfrak{R} + 3\Omega^2; + 6\Omega P^2 + 12\mathfrak{P}PQ \\ \quad - 3PR - \frac{1}{2}Q^2 - 12\mathfrak{P}^2\Omega; \\ \quad + 5\mathfrak{P}^4 - 15\mathfrak{P}^2P^2 + \frac{1}{2}P^4 = 0 \\ \text{II. } \frac{ddS}{dt^2} + \frac{2d\mathfrak{S}}{dt}; - 3\mathfrak{P}R - 3P\mathfrak{R} - 3\Omega Q; + 6\mathfrak{P}^2Q + 12P\mathfrak{P}\Omega \\ \quad - \frac{1}{2}P^2Q; \\ \quad - 10\mathfrak{P}^3P + \frac{1}{2}\mathfrak{P}P^3 = 0 \end{array} \right\} \text{IV.}$$

12. Evolutio primi ordinis omnino est facillima, quia membra annexa defunt, quare pro angulo quocunque μ t semper erit $\mathfrak{M} = 0$ et $M = 0$, unde etiam \mathfrak{N} et N evanescerent, solo excepto casu $\mu = 1$, quo casu littera \mathfrak{N} manet indeterminata pro qua igitur unitatem scribere licet, quia ism
habet

habet indefinitum coefficientem K , inde autem colligitur $N = -2$. Quocirca pro primo ordine hanc habemus solutionem: $\mathcal{P} = \cos. t$; $P = -2 \sin. t$. Hic evidens est angulum t simul anomaliam mediam terrae designare, quae utique pari passu cum longitudine procederet, si terra a sola vi Solari sollicitaretur, quemadmodum hic assumimus, hac scilicet hypothese aphelium quiesceret, quippe quod non nisi ob perturbationes motum adipiscitur. Supra quidem hunc angulum t ab initio arietis computauimus et hanc ob rem, hic isti angulo t constantem adiici oportebat, quae quum facile subintelligatur, eam breuitatis causa omisimus.

13. Progrediamur ergo ad ordinem secundum litteris Ω et Q contentum ac pro priore aequatione membrum annexum

$$3 \mathcal{P}^2 - \frac{1}{2} P^2 \text{ praebet } -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos. 2t$$

pro altera vero aequatione membrum annexum

$$-3 \mathcal{P} P \text{ praebet } +3 \sin. 2t.$$

Hic ergo pro parte constante seu angulo $\mu t = 0$, est $\mathcal{M} = -\frac{1}{2}$ et $M = 0$, vnde definitur $\mathcal{N} = -\frac{1}{2}$, tum vero $N = 0$, pro angulo autem $2t$, vbi $\mu = 2$ habemus $\mathcal{M} = +\frac{1}{2}$ et $M = +3$, vnde colligimus $\mathcal{N} = \frac{1}{2}$; $N = \frac{1}{2}$, pro ordine ergo secundo nacti sumus

$$\Omega = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos. 2t; Q = +\frac{1}{2} \sin. 2t.$$

14. Hinc pro ordine tertio membra annexa prioris aequationis praebent ut sequitur:

I i i 2

pro

pro \mathfrak{M}

$$+ 6 \mathfrak{P} \Omega = -\frac{1}{2} \cos. t + \frac{1}{2} \cos. 3 t$$

$$- 3 \mathfrak{P} Q = +\frac{1}{2} \cos. t - \frac{1}{2} \cos. 3 t$$

$$+ 6 \mathfrak{P} P^2 = + 6 \cos. t - 6 \cos. 3 t$$

$$- 4 \mathfrak{P}^3 = - 3 \cos. t - 1 \cos. 3 t$$

$$\frac{1}{2} \cos. t - \frac{1}{2} \cos. 3 t.$$

Simili modo ex altera aequatione huius ordinis colligimus :

$$- 3 \mathfrak{P} Q = -\frac{1}{2} \sin. t - \frac{1}{2} \sin. 3 t$$

$$- 3 \mathfrak{P} \Omega = -\frac{1}{2} \sin. t + \frac{1}{2} \sin. 3 t$$

$$+ 6 \mathfrak{P}^2 P = - 3 \sin. t - 3 \sin. 3 t$$

$$- \frac{1}{2} \mathfrak{P}^3 = + \frac{9 \sin. t - 3 \sin. 3 t}{2} \quad \text{ergo pro } \mathfrak{M}$$

$$+ \frac{1}{2} \sin. t - \frac{1}{2} \sin. 3 t.$$

Hinc igitur pro priore angulo t , est $\mu = 1$, $\mathfrak{M} = ?$

et $M = ?$ vnde fit $\mathfrak{M} = \frac{\frac{1}{2} - \frac{1}{2}}{0} = ?$ sicque hic valor

foret indefinitus, quia autem iam supra termino $\cos. t$ debitus coëfficiens est tributus, hic poni oportet $\mathfrak{M} = 0$, ex quo fit $N = +\frac{1}{2}$. Pro altero autem angulo $3 t$ seu $\mu = 3$, habemus $\mathfrak{M} = -\frac{1}{2}$ et $M = -\frac{1}{2}$ vnde deducimus $\mathfrak{N} = -\frac{1}{2}$ et $N = -\frac{1}{2}$ quocirca pro tertio ordine erimus.

$$\mathfrak{N} = + 0 \cos. t - \frac{1}{2} \cos. 3 t; R = + \frac{1}{2} \sin. t - \frac{1}{2} \sin. 3 t.$$

15. Ordini quarto hic non immoramur quoniam hanc inuestigationem iam alibi fusius docuimus atque ad praesens institutum sufficit, motum regula-

rem

rem proxime tantum nouisse, cui quidem instituto solus primus ordo abunde sufficeret, collectis autem his tribus ordinibus, binae coordinatae nostrae x et y pro motu regulari ita sunt expressae

$$x = -\frac{1}{2}K^2 + K \cos. t + \frac{1}{2}K^2 \cos. 2t - \frac{1}{24}K^3 \cos. 3t \\ y = -(2K - \frac{1}{2}K^2) \sin. t + \frac{1}{2}K^2 \sin. 2t - \frac{1}{24}K^3 \sin. 3t.$$

Euolutio nostrarum formularum accedente actione Veneris.

16. Propter actionem Veneris valores isti pro x et y inuenti exigua quaedam incrementa accipient coefficiente minimo λ affecta, quo igitur haec incrementa inueniamus, veros valores coordinatarum x et y sequenti modo repraesentemus.

$$x = X + \lambda X^1 \text{ et } y = Y + \lambda Y^1$$

ipsae autem coordinatae pro loco terrae erunt

$$\odot x = a(r + x) = a(r + X + \lambda X^1) \text{ et}$$

$$\odot y = ay = aY + a\lambda Y^1$$

vbi X et Y denotant valores modo ante inuentos scilicet

$$X = -\frac{1}{2}K^2 + K \cos. t + \frac{1}{2}K^2 \cos. 2t - \frac{1}{24}K^3 \cos. 3t$$

$$Y = -(2K - \frac{1}{2}K^2) \sin. t + \frac{1}{2}K^2 \sin. 2t - \frac{1}{24}K^3 \sin. 3t$$

partes autem annexae λX^1 et λY^1 sunt eae ipsae quantitates, quas inuestigari oportet, et quas manifestum est fore quam minimas, ita vt prae X et Y quasi pro evanescentibus haberi queant. Ceterum hic

monendum has litteras X et Y non esse confunden-
das cum iis quibus supra sumus vñ.

17. Binae autem aequationes ex quibus hae
determinationes elici debent, ita sunt expressae

$$\text{I. } \frac{d^2 x}{dt^2} - \frac{1}{2} \frac{dy}{dt} - 3x + 3xy - \frac{1}{2} y^2, \dots + \frac{\lambda a a}{v v} \cos.(\Phi - t) + \frac{\lambda a^2 (1 + x - \frac{v}{a} \cos.(\Phi - t))}{w^2} = 0$$

$$\text{II. } \frac{d^2 y}{dt^2} + \frac{1}{2} \frac{dx}{dt}, - 3xy \dots + \frac{\lambda a a}{v v} \sin.(\Phi - t) + \frac{\lambda a a}{w^2} (ay - v \sin.(\Phi - t)) = 0$$

vbi vltimi termini littera λ affecti prae reliquis
manifesto sunt quam minimi, deinde vero etiam
membra quae supra annexa vocauimus prae membris
principalibus etiam pro valde paruis sunt habenda,
quandoquidem ipsae quantitates x et y prae vnitatis
sunt satis exiguae, hanc ob causam si hic velimus
loco x et y valores modo indicatos $X + \lambda X'$ et
 $Y + \lambda Y'$ substituere, in membris annexis atque
multo magis in postremis sufficiet tantum partes
principales X et Y adhibere, vnde quum per
hypothesin membra annexa destruantur a valoribus
 X et Y loco x et y substitutis aequationes quas ad-
huc resolui oportet diuisione per λ facta ita erunt
comparatae:

$$\text{I. } \frac{d^2 X'}{dt^2} - \frac{1}{2} \frac{dY'}{dt} - 3X' + \frac{a a}{v v} \cos.(\Phi - t) + \frac{a a}{w^2} (a(1 + X) - v \cos.(\Phi - t)) = 0.$$

$$\text{II. } \frac{d^2 Y'}{dt^2} + \frac{1}{2} \frac{dX'}{dt}, \quad + \frac{a a}{v v} \sin.(\Phi - t) + \frac{a a}{w^2} (aY - v \sin.(\Phi - t)) = 0$$

18. Quia hic termini postremi solas quantita-
tes cognitae complectuntur, quas ad quoduis tempus
facile assignare licet, statuamus breuitatis gratia

$$U = \frac{a a}{v v} \cos.(\Phi - t) + \frac{a a}{w^2} (a(1 + X) - v \cos.(\Phi - t))$$

et

et

$$V = \frac{a^2}{v^2} \sin. (\Phi - t) + \frac{a^2}{v^2} (a Y - v \sin. (\Phi - t))$$

et posterior aequatio ducta in dt et integrata statim praebet :

$$\frac{dY}{dt} + 2 X' + \int V dt = 0$$

unde fit

$$\frac{dY}{dt} = - 2 X' - \int V dt$$

qui valor in priori substitutus dat

$$\frac{d^2 X'}{dt^2} + X' + 2 \int V dt + U = 0$$

quam igitur integrari oportet.

19. Euadet autem haec aequatio integrabilis , multiplicando eam per $dt \cos. t$, quippe integrale reperitur :

$$\frac{dX'}{dt} \cos. t + X' \sin. t + 2 \int dt \cos. t \int V dt + \int U dt \cos. t = 0$$

quae expressio facile reducitur ad hanc :

$$\frac{dX'}{dt} \cos. t + X' \sin. t + 2 \sin. t \int V dt - 2 \int V dt \sin. t + \int U dt \cos. t = 0$$

quae diuisa per $\cos. t$ denuo redditur integrabilis. Sed multo facilius scopum attingemus si ipsam aequationem differentialem secundi gradus in $dt \sin. t$ ducamus , tum enim integrale deprehenditur fore

$$\frac{dX'}{dt} \sin. t - X' \cos. t + 2 \int dt \sin. t \int V dt + \int U dt \sin. t = 0$$

quae pari modo reducitur ad hanc formam :

$$\frac{dX'}{dt} \sin. t - X' \cos. t - 2 \cos. t \int V dt + 2 \int V dt \cos. t + \int U dt \sin. t = 0$$

20.

20. Ex his duabus aequationibus differentiali-
bus primi gradus elidamus differentiale dX' , quod
fit dum prima in $\sin. t$ altera vero in $-\cos. t$ du-
citur, tum enim prodit

$$X' + 2 \int V dt - 2 \sin. t \int V dt. \sin. t + \sin. t \int U dt. \cos. t \\ - 2 \cos. t \int V dt. \cos. t - \cos. t \int U dt. \sin. t = 0$$

sicque hinc impetramus

$$X' = -2 \int V dt + 2 \sin. t \int V dt. \sin. t - \sin. t \int U dt. \cos. t \\ + 2 \cos. t \int V dt. \cos. t + \cos. t \int U dt. \sin. t$$

Quo autem hinc facilius etiam alteram coordinatam
 y eruamus, vtamur formula iam supra inuenta

$$dY' = -2 X' dt - dt \int V dt, \text{ hoc est}$$

$$dY' = +3 dt \int V dt - 4 dt. \sin. t \int V dt. \sin. t + 2 dt \sin. t \int U dt. \cos. t \\ - 4 dt. \cos. t \int V dt. \cos. t - 2 dt. \cos. t \int U dt. \sin. t$$

quas singulas partes sequenti modo integramus

$$\int dt \int V dt = \int V dt - \int V t dt$$

quae reductio autem nihil iuuat:

$$\int dt \sin. t \int V dt. \sin. t = -\cos. t \int V dt. \sin. t + \int V dt. \sin. t \cos. t$$

$$\int dt \cos. t \int V dt. \cos. t = +\sin. t \int V dt. \cos. t - \int V dt. \sin. t \cos. t$$

$$\int dt \sin. t \int U dt. \cos. t = -\cos. t \int U dt. \cos. t + \int U dt. \cos. t^2$$

$$\int dt \cos. t \int U dt. \sin. t = +\sin. t \int U dt. \sin. t - \int U dt. \sin. t^2$$

vnde colligimus sequentem valorem:

$$Y' = +3 \int dt \int V dt + 4 \cos. t \int V dt. \sin. t - 2 \cos. t \int U dt. \cos. t + 2 \int U dt \\ - 4 \sin. t \int V dt. \cos. t - 2 \sin. t \int U dt. \sin. t.$$

21. Ad quoduis ergo tempus valores utriusque quantitatis X' et Y' elicimus, quos conueniunt adhuc sequenti modo repraesentare licet.

$$X' = -2fV dt + \cos. t (f dt (2V \cos. t + U \sin. t)) \\ + \sin. t (f dt (2V \sin. t - U \cos. t))$$

$$Y' = +3f dt f V dt + 2f U dt + 2 \cos. t (f dt 2V \sin. t - U \cos. t) \\ - 2 \sin. t (f dt (2V \cos. t + U \sin. t))$$

quemadmodum autem quouis casu has formulas tractari conueniat, in sequentibus fusius sumus explicaturi.

22. Quod autem ad constantes attinet, quae his integrationibus inuehuntur, eas his quatuor formis complecti licet:

I°. A; II°. B t; III°. C cos. t et IV°. D sin. t

quarum prima locum medium respicit, secunda ad ipsum motum medium pertinet, duae autem postremae formulae ad locum aphelii reducuntur. Quare si iam supra haec elementa rite constituta esse assumimus, has quoque constantes in sequentibus praetermittere poterimus. Verum quo melius has formulas expedire queamus, imprimis attendi oportet, actionem Veneris duobus contineri partibus, quarum prior denominatorem habet $v v$, posterior vero w^2 , illam quoniam ad Solem refertur partem Solarem vocemus, alteram vero qua Venus immediate in terram agit partem terrestrem atque omnino conueniet has duas partes a se inuicem distingui.

23. Denique circa formulas $\cos t$ et $\sin t$, quae in haec integralia sunt ingressae obseruandum est, angulum t eatenus tantum esse introductum, quatenus eius differentiale est dt , neque idcirco terminum a quo istum angulum computari oportet, esse praescriptum, siquidem eadem integralia prodire deberent, si loco t scriberetur $t + \alpha$, scilicet ista constans α in ipsa euolutione iterum ex calculo elidetur, quemadmodum mox clarius apparebit. Hoc ideo monendum duximus, ne quis putet hunc angulum t perinde atque illum qui supra est introductus a loco Aphelii esse computandum.

De parte priore actionis Veneris Solari dicta.

24. Hic igitur littera U denotabit formulam:

$$\frac{e^2}{v^2} \cos(\Phi - t)$$

pro priori aequatione, littera autem

$$V = \frac{e^2}{v^2} \sin(\Phi - t)$$

pro aequatione posteriori. Hasque formulas iterum subdiuidere licet, quatenus vel ad solum motum medium spectamus, vel etiam excentricitatis Veneris rationem habere velimus, quod posterius superfluum videri potest, quum orbita Veneris minimam habeat excentricitatem, vnde vix vllus effectus in perturbationem Terrae oriri potest.

25. Denotet igitur b distantiam mediam Veneris a Sole et quia excentricitatem negligimus, habebimus $v = b$, tum vero angulus Φ longitudinem Vene-

Veneris mediam designabit, ideoque angulus $\Phi - s$ elongationem mediam Veneris a Terra e Sole spectatam. Designemus igitur hanc elongationem angulo $= p$, qui quum tempori sit proportionalis, ponamus $\frac{dp}{dt} = m$ hinc igitur erit

$$U = \frac{aa}{bb} \cos. p \quad \text{et} \quad V = \frac{aa}{bb} \sin. p.$$

Vnde colligimus

$$2 V \cos. t + U \sin. t = \frac{aa}{bb} \left(\frac{1}{2} \sin. (p-t) + \frac{1}{2} \sin. (p+t) \right)$$

$$2 V \sin. t - U \cos. t = \frac{aa}{bb} \left(+ \frac{1}{2} \cos. (p-t) - \frac{1}{2} \cos. (p+t) \right).$$

26. His igitur notatis singulae formulae integrales, quae valores X' et Y' constituunt sequenti modo se habebunt:

$$\int V dt = \frac{aa}{bb} \int \sin. p. dt = -\frac{aa}{bb} \cdot \frac{\cos. p}{m}$$

$$\begin{aligned} \int dt (2 V \cos. t + U \sin. t) &= \frac{aa}{bb} \int dt \left(\frac{1}{2} \sin. (p-t) + \frac{1}{2} \sin. (p+t) \right) \\ &= -\frac{aa}{bb} \left(\frac{\cos. (p-t)}{2(m-1)} + \frac{1}{2} \frac{\cos. (p+t)}{(m+1)} \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int dt (2 V \sin. t - U \cos. t) &= \frac{aa}{bb} \int dt \left(\frac{1}{2} \cos. (p-t) - \frac{1}{2} \cos. (p+t) \right) \\ &= \frac{aa}{bb} \left(\frac{\sin. (p-t)}{2(m-1)} - \frac{1}{2} \frac{\sin. (p+t)}{(m+1)} \right) \end{aligned}$$

$$\int dt \int V dt = -\frac{aa}{bb} \cdot \frac{\sin. p}{m}; \quad \int U dt = \frac{aa}{bb} \cdot \frac{\sin. p}{m}$$

vnde colligimus ipsas quantitates X' et Y'

$$X = \frac{aa}{bb} \left(\frac{1}{2} \frac{\cos. p}{m} - \frac{\cos. p}{2(m-1)} - \frac{1}{2} \frac{\cos. p}{(m+1)} \right) = \frac{aa}{bb} \cdot \frac{m-2}{m(m-1)}$$

$$Y' = \frac{aa}{bb} \left(-\frac{1}{2} \frac{\sin. p}{m} + \frac{1}{2} \frac{\sin. p}{(m-1)} + \frac{1}{2} \frac{\sin. p}{(m+1)} \right) = \frac{aa}{bb} \left(\frac{m^2-2m+1}{m(m^2-1)} \right) \sin. p.$$

27. Omnino hic insigne dubium occurrit, quod casu $m = 1$ utraque haec quantitas abeat in infinitum,

K k k 2

tum, quod utique maxime esset absurdum, verum perpendendum est, hoc casu angulum p , abire in t et quia iam supra vidimus ob constantes integrationum, ingredi talem formam indefinitam $A + Bt + C \cos. t + D \sin. t$, manifestum est illud infinitum constantibus C vel D tolli posse. Ceterum hic ipse casus $m = 1$ peculiarem meretur resolutionem, tum enim erit angulus $p - t$ constans qui sit α , unde integrando erit

$$\int dt (2V \cos. t + U \sin. t) = \frac{a^2}{b^2} \left(\frac{1}{2} t \sin. \alpha - \frac{1}{2} \cos. (p + t) \right)$$

$$\int dt (2V \sin. t - U \cos. t) = \frac{a^2}{b^2} \left(\frac{1}{2} t \cos. \alpha - \frac{1}{2} \sin. (p + t) \right)$$

quamobrem hoc casu consequimur

$$X' = \frac{a^2}{b^2} (2 \cos. p + \frac{1}{2} t \sin. (t + \alpha) - \frac{1}{2} \cos. p) = \frac{a^2}{b^2} \left(\frac{1}{2} \cos. p + \frac{1}{2} t \sin. (t + \alpha) \right)$$

$$Y' = \frac{a^2}{b^2} (-\sin. p + t \cos. (t + \alpha) - \frac{1}{2} \sin. p) = \frac{a^2}{b^2} \left(-\frac{1}{2} \sin. p + t \cos. (t + \alpha) \right)$$

Vbi notandum his formulis

$$\frac{1}{2} t \sin. (t + \alpha) \text{ et } t \cos. (t + \alpha)$$

motum aphelii terrae innui.

28. Hactenus tantum ad motum medium Veneris respeximus neglecta excentricitate, interim tamen operae pretium est etiam huius rationem habere, sit igitur x ista excentricitas et angulus q anomalia media Veneris fiatque $dq = ndt$, quo posito habebimus uti constat

$$v = b (1 + x \cos. q) \text{ et } \Phi = \zeta - 2x \sin. q,$$

denotante ζ longitudinem mediam, ita ut sit $\zeta - t = p$, quum ergo iam sit

$$\Phi - t = p - 2x \sin. q$$

erit

erit

$$\sin.(\Phi - t) = \sin.p - 2\kappa \sin.q \cos.p \text{ et } \cos.(\Phi - t) = \cos.p + 2\kappa \sin.p. \sin.q.$$

Ergo quia

$$\frac{1}{\sin.p} = \frac{1}{\sin.p} (1 - 2\kappa \cos.q),$$

hinc colligemus :

$$U = \frac{a^2}{b^2} (\cos.p - 2\kappa \cos.(p+q)) \text{ et } V = \frac{a^2}{b^2} (\sin.p - 2\kappa \sin.(p+q)).$$

29. Quoniam autem ea quae a partibus posterioribus oriuntur iam expiduiimus, sumamus tantum

$$U = + \frac{a^2}{b^2} (-2 \cos.(p+q)) \text{ et } V = \frac{a^2}{b^2} (-2 \sin.(p+q))$$

hincque porro

$$2V \cos.t + U \sin.t = \frac{a^2}{b^2} (-\sin.(p+q-t) - 3 \sin.(p+q+t))$$

$$2V \sin.t - U \cos.t = \frac{a^2}{b^2} (-\cos.(p+q-t) + 3 \cos.(p+q+t))$$

atque hinc deducimus integralia nostra

$$\int V dt = \frac{a^2}{b^2} \left(\frac{\cos.(p+q)}{m+n} \right)$$

$$\int dt (2V \cos.t + U \sin.t) = \frac{a^2}{b^2} \left(+ \frac{\cos.(p+q-t)}{m+n-1} + \frac{3 \cos.(p+q+t)}{m+n+1} \right)$$

$$\int dt (2V \sin.t - U \cos.t) = \frac{a^2}{b^2} \left(- \frac{\sin.(p+q-t)}{m+n-1} + \frac{3 \sin.(p+q+t)}{m+n+1} \right)$$

$$\int dt \int V dt = \frac{a^2}{b^2} \left(\frac{\sin.(p+q)}{(m+n)^2} \right); \int U dt = \frac{a^2}{b^2} \left(- \frac{\sin.(p+q)}{m+n} \right).$$

30. Ex his itaque colligimus quaecumque valores pro X' et Y' uti sequuntur :

$$X' = \frac{a^2}{b^2} \left(- \frac{\cos.(p+q)}{m+n} + \frac{\cos.(p+q)}{m+n-1} + \frac{3 \cos.(p+q)}{m+n+1} \right)$$

$$= \frac{a^2}{b^2} \left(\frac{-1(m+n-1)}{(m+n)^2(m+n-1)} \right) \cos.(p+q)$$

$$Y' = \frac{a^2}{b^2} \left(+ \frac{\sin.(p+q)}{(m+n)^2} - \frac{\sin.(p+q)}{m+n-1} - \frac{3 \sin.(p+q)}{m+n+1} + \frac{6 \sin.(p+q)}{m+n+1} \right)$$

$$= \frac{a^2}{b^2} \left(\frac{(m+n)^2 - 1(m+n-1)}{(m+n)^2(m+n-1)} \right) \sin.(p+q).$$

K k k 3

Omnino

Omnino igitur ex parte Solari actionis Veneris oriuntur sequentes valores pro nostris X' et Y'

$$X' = \frac{a^2}{b^2} \cdot \frac{m^2-1}{m(m^2-1)} \cos.p - \frac{2 \kappa a^2}{b^2} \cdot \frac{m+n-1}{(m+n)((m+n)^2-1)} \cos.(p+q)$$

$$Y' = \frac{a^2}{b^2} \cdot \frac{(m^2-1)(m+1)}{m(m^2-1)} \sin.p - \frac{2 \kappa a^2}{b^2} \cdot \frac{(m+n)^2-1-(m+n)+1}{(m+n)^2((m+n)^2-1)} \sin.(p+q)$$

quas formulas quum in genere euoluere licerit, manifestum est easdem etiam ad actionem, cuiusuis alius Planetæ in terram agentis accommodari posse, quin etiam loco Terræ quemlibet alium Planetam primarium substituere licebit, ita vt ea quæ hæcenus sunt tradita ad motum cuiusuis Planetæ ab aliquocunque perturbatum transferri queant.

De parte altera terrestri actionis Veneris.

31. Hic igitur habemus:

$$U = \frac{a^2}{w^2} (a(x+X) - v \cos.(\Phi-t)) \text{ et } V = \frac{a^2}{w^2} (aY - v \sin.(\Phi-t))$$

quas formulas gemino modo tractari conueniet, primo scilicet tam pro terra, quam pro Venere ad solum motum medium respiciemus, quæ tractatio tamquam fundamentum constituet perturbationis totalis, quandoquidem perturbatio hinc enata, neque ab excentricitate terræ neque Veneris pendebit, sed pro omnibus reuolutionibus easdem inæqualitates exhibebit a sola elongatione Veneris a terra pendentes, dum contra si excentricitatis ratio habeatur, quaelibet reuolutio peculiarem euolutionem requiret, prouti scilicet rectæ $\odot \frac{1}{2}$ et $\odot \frac{2}{2}$ respectu vtriusque lineæ apsidum fuerint dispositæ.

32. Primum igitur ad motum medium tantum attendentes, habebimus i° . $X = 0$ et $Y = 0$, tum vero erit $v = b$ et angulus $\Phi - t = p$, cui respondet numerus $m = \frac{d p}{d t}$ hinc autem deducitur distantia

$$\varphi \delta = w = V(a a - 2 b b \cos. p + b b)$$

atque hinc pro nostris formulis integrandis, fiet

$$U = \frac{a^2 (a - b \cos. p)}{(a a - 2 a b \cos. p + b b)^{3/2}} \text{ et } V = -\frac{a a}{w} b. \sin. p$$

unde porro deducimus

$$2 V \cos. t + U \sin. t = \frac{a a}{w} (a \sin. t - b \sin. (p - t) - b \sin. (p + t))$$

$$2 V \sin. t - U \cos. t = \frac{a a}{w} (-a \cos. t - b \cos. (p - t) + b \cos. (p + t))$$

ubi in subsidium calculi notasse iuvabit fore

$$w^2 = (a - b \cos. p)^2 + b b \sin. p^2.$$

33. Tabulas autem Astronomicas motuum terrae et Veneris consulentes, summa distantia terrae media $= 1$, reperimus distantiam mediam Veneris $b = 0,72340$, deinde quum motus medius Solis per 30 dies $29^\circ. 34'. 10'' = 106450''$, Veneris autem per idem intervallum $48^\circ. 3'. 54'' = 173034$ erit motus Veneris a terra $= 18^\circ. 29'. 44'' = 66584$ hincque definitur numerus noster $m = \frac{d p}{d t} = \frac{66584}{106450} = 0,62549$, sicque angulo $t = 10^\circ$, respondet angulus $p = 6^\circ. 15'. 18''$ ideoque angulo $t = 5^\circ$, respondebit $p = 3^\circ. 7'. 39''$.

34. Hic autem statim maxima difficultas occurrit in formula irrationali

$$w = \sqrt{a^2 - 2ab \cos p + b^2}$$

quam nullo modo in seriem conuergentem resolvere licet, id quod integratio more praecedente instituenda requireret, quam ob causam integralia nostra, mechanice tantum definire cogimur, id quod sequenti modo praestari poterit. Incipiamus ab eiusmodi situ, quo terra et Venus erant in coniunctione veluti terra in T et Venus in V, a quo situ motum utrinque per exigua intervalla usque ad coniunctionem sequentem prosequamur. Haec autem intervalla aequalia faciamus, quibus angulus $p = 5^\circ$ respondeat, ita ut integra revolutio in 72 momenta diuidatur, pro singulis autem fiet angulus $t = \frac{1}{m} \cdot 5^\circ = 7^\circ 59' 37''$ pro quo commode 8° usurpare liceret.

Pro ipso ergo hoc initio ob $a = 1$, et $b = 0,72340$ et $p = 0$ reperitur $w = a - b = 0,27660$, hincque

$$U = 13,07060; \text{ et } V = 0$$

hinc ob $t = 0$

$$2V \cos t + U \sin t = 0 \text{ et}$$

$$2V \sin t - U \cos t = -13,07060.$$

Pro sequentibus momentis calculus ita commodissime instituetur: sumtis valoribus $a - b \cos p$ et $b \sin p$, quaeratur angulus A ut sit $\tan A = \frac{b \sin p}{a - b \cos p}$ facili-
cet erit $A = 0^\circ 5' 9''$, vnde statim deducitur

$$2b \sin \frac{1}{m} p = (a - b \cos p) \sec A$$

Deinde

p	t.	Log. w	Log. U
0	0.	9, 4418522	1, 1162956
5	7°. 59'. 37"	9, 4569345	1, 0753452
10	15. 59.	9, 4967064	0, 9686546
15	23. 59.	9, 5498767	0, 8292970
20	31. 58.	9, 6070652	0, 6842664
25	39. 58.	9, 6632535	0, 5472774
30	47. 58.	9, 7159907	0, 4243418
35	55. 57.	9, 7645091	0, 3165150
40	63. 57.	9, 8089831	0, 2222297
45	71. 56.	9, 8495749	0, 1402221
50	79. 56.	9, 8865906	0, 0685901
55	87. 56.	9, 9205273	0, 0056333
60	95. 55.	9, 9515346	9, 9504210
65	103. 55.	9, 9800156	9, 9014878
70	111. 55.	0, 0060488	9, 8584063
75	119. 54.	0, 0301129	9, 8196290
80	127. 54.	0, 0522237	9, 7850291
85	135. 53.	0, 0726427	9, 7537930
90	143. 53.	0, 0914012	9, 7257964
95	151. 53.	0, 1086588	9, 7005732
100	159. 52.	0, 1245604	9, 6777106
105	167. 52.	0, 1391401	9, 6571146
110	175. 52.	0, 1524578	9, 6386393
115	183. 51.	0, 1646910	9, 6217770
120	191. 51.	0, 1757526	9, 6068236

TERRAE AB ACTIONE VENERIS. 451

Log. V.	L. P. I.	Log. P. II.
— ∞	— ∞	— 1,1162956
0,4288710	+0,8434623	— 1,0426259
0,6089295	1,0159197	— 0,8264993
0,6227446	1,0174272	— 0,4404008
0,5722346	0,9490722	— 9,1687130
0,4955663	0,8490539	+0,1205327
0,4103764	0,7337769	+0,3099703
0,3244425	0,6107520	+0,3686832
0,2404967	0,4809425	+0,3789528
0,1602388	0,3444499	+0,3659349
0,0838607	0,1978678	+0,3392659
0,0111601	0,0359778	+0,3039294
9,9423053	9,8493453	+0,2632829
9,8766074	9,6144753	+0,2182427
9,8142179	9,2622612	+0,1699952
9,7539836	+7,8124342	+0,1182556
9,6960589	— 9,1114274	+0,0638452
9,6397946	9,3644290	+0,0062803
9,5851749	9,4887634	+9,9460757
9,5317463	9,5604947	+9,8826492
9,4790488	9,6043823	+9,8159294
9,4269020	9,6305167	+9,7452747
9,3749909	9,6451575	+9,6704380
9,3225812	9,6507382	+9,5904115
9,2696513	— 9,6505104	+9,5043127

p	II 12.	Log. ω	Log. U
125	199. 50.	0, 1858533	9, 5931719
130	207. 50.	0, 1948645	9, 5812410
135	215. 50.	0, 2029675	9, 5705114
140	223. 49.	0, 2100971	9, 5612044
145	231. 49.	0, 2163564	9, 5530321
150	239. 49.	0, 2217224	9, 5460806
155	247. 48.	0, 2260475	9, 5408172
160	255. 48.	0, 2299155	9, 5355035
165	263. 47.	0, 2327592	9, 5318569
170	271. 47.	0, 2347756	9, 5292808
175	279. 47.	0, 2359843	9, 5277396
180	287. 46.	0, 2363861	9, 5272278

Log. V.	L. P. I.	Log. P. II.
9, 2151831	-9,6451785	+9,4104024
9, 1590389	-9,6366590	+9,3063203
9, 0999610	-9,6246353	+9,1915869
9, 0371547	-9,6120469	+9,0486173
8, 5689006	-9,5975991	+8,8725635
8, 8931813	-9,5827465	+8,6187154
8, 8071843	-9,5683258	+8,0966748
8, 7036837	-9,5532548	-8,1410493
8, 5740971	-9,5395963	-8,5767402
8, 3948218	-9,5270811	-8,7792723
8, 0917220	-9,5158652	-8,9115587
-∞	-9,5060048	-9,0117288

36. Repraesententur haec momenta more Geo- Tab. X.
 metrico, super axe A O per intervalla aequalia Fig. 3.
 A B, B C, C D etc. et in his singulis punctis ap-
 plicatae erigantur A a, B b, C c etc. referentes eas
 quantitates U vel V; vel $2 V \cos. t + U \sin. t$ vel
 $2 V \sin. t - U \cos. t$ quas integrari oportet, ita vt areae
 huius lineae, curvae exhibeant integralia quaesita, at-
 que iam manifestum est; si inuenta fuerit area A a k K,
 sequentem A a/L facile inueniri si ad illam addatur
 trapezium K k/L, cuius area proxime est $\frac{1}{2} K L (K k + L l)$,
 verum quia hoc intervallum K L quasi esset $= d t$
 est $= 7^{\circ}. 59'. 37''$ eius valor in partibus radii ex-
 pressus erit c, 1394835 cuius log. est 9, 1438047
 singula autem integralia ita capiamus, vt in ipso ini-
 tio A euanescent, hos igitur calculos sequens Ta-
 bula exhibebit:

L 11 3

p

p	$\int U dt$	$\int V dt$
0	+ 0	+ 0
Incr.	1,7383	c, 1869
5.	1,7383	0, 1869
Incr.	1,4760	c, 4698
10.	3,2143	c, 6567
Incr.	1,1178	c, 5750
15.	4,3321	1,2317
Incr.	c, 8066	c, 5522
20.	5,1387	1,7839
Incr.	c, 5815	c, 4780
25.	5,7202	2,2619
Incr.	c, 4299	c, 3970
30.	6,1501	2,6589
Incr.	c, 3292	c, 3260
35.	6,4793	2,9849
Incr.	0,2604	0,2680
40.	6,7397	3,2529
Incr.	0,2122	0,2218
45.	6,9519	3,4847
Incr.	c, 1776	c, 1852
50.	7,1295	3,6699
Incr.	0,1520	0,1559
55.	7,2815	3,8258
Incr.	0,1324	0,1324
60.	7,4139	3,9582
Incr.	0,1176	0,1134
65.	+ 7,5315	+ 4,0716

$\int dt \int V dt$	$\int dt (2V \cos t + U \sin t)$	$\int dt (2V \sin t - U \cos t)$
+ 0	+ 0	- 0
0,0130	0,4855	- 1,6782
0,0130	0,4855	- 1,6782
0,0588	1,2077	- 1,2351
0,0718	1,6932	- 2,9133
0,1317	1,4470	- 0,6589
0,2035	3,1402	- 3,5722
0,2101	1,3440	- 0,2022
0,4136	4,4842	- 3,7744
0,2817	1,1110	+ 0,0816
0,6953	5,5952	- 3,6928
0,3426	0,8690	+ 0,2340
1,0379	6,4642	- 3,4588
0,3937	0,6612	+ 0,3648
1,4316	7,1254	- 3,1540
0,4390	0,4948	+ 0,1293
1,8706	7,6202	- 2,8247
0,4701	0,3646	+ 0,3283
2,3407	7,9848	- 2,4964
0,4991	0,2637	+ 0,3137
2,8398	8,2485	- 2,1827
0,5214	0,1854	+ 0,2922
3,3612	8,4339	- 1,8905
0,5454	0,1249	+ 0,2678
3,9066	8,5588	- 1,6227
0,5591	+ 0,0780	+ 0,2427
+ 4,4657	+ 8,6368	- 1,3800

<i>p</i>	<i>fV dt</i>	<i>fV dt</i>
65.	+7,5315	+4,0716
Incr.	0,1058	0,0977
70.	7,6373	4,1693
Incr.	0,0963	0,0848
75.	7,7336	4,2541
Incr.	0,0884	0,0741
80.	7,8220	4,3282
Incr.	0,0819	0,0650
85.	7,9039	4,3932
Incr.	0,0765	0,0572
90.	7,9804	4,4504
Incr.	0,0719	0,0505
95.	8,0523	4,5009
Incr.	0,0680	0,0447
100.	8,1203	4,5456
Incr.	0,0647	0,0396
105.	8,1850	4,5852
Incr.	0,0619	0,0351
110.	8,2469	4,6203
Incr.	0,0595	0,0311
115.	8,3064	4,6514
Incr.	0,0574	0,0270
120.	8,3638	4,6784
Incr.	0,0556	0,0244
125.	8,4194	4,7028
Incr.	0,0541	0,0214
130.	+8,4635	+4,7242

fV dt

TERRAE AB ACTIONE VENERIS. 457

$fV dt$	$f dt (2V \cos. + U \sin. t)$	$f dt (2V \sin. t - U \cos. t)$
+ 4,4657	+ 8,6368	- 1,3800
0,5738	+ 0,0415	+ 0,2181
5,0395	+ 8,6783	- 1,1619
0,5865	+ 0,0132	+ 0,1944
5,6260	+ 8,6915	- 0,9675
0,5976	- 0,0086	+ 0,1721
6,2236	+ 8,6829	- 0,7954
0,6073	- 0,0251	+ 0,1514
6,8309	+ 8,6578	- 0,6440
0,6158	- 0,0376	+ 0,1322
7,4467	+ 8,6202	- 0,5118
0,6232	- 0,0467	+ 0,1146
8,0699	+ 8,5735	- 0,3972
0,6299	- 0,0533	+ 0,0987
8,6998	+ 8,5202	- 0,2985
0,6357	- 0,0578	+ 0,0843
9,3355	+ 8,4624	- 0,2142
0,6409	- 0,0605	+ 0,0713
9,9764	+ 8,4019	- 0,1429
0,6456	- 0,0618	+ 0,0598
10,6220	+ 8,3401	- 0,0831
0,6497	- 0,0622	+ 0,0495
11,2717	+ 8,2779	- 0,0326
0,6531	- 0,0618	+ 0,0401
11,9248	+ 8,2161	+ 0,0075
0,6563	- 0,0608	+ 0,0320
+ 12,5811	+ 8,1553	+ 0,0395

Tom. XVI. Nou. Comm.

M m m

<i>p</i>	<i>fU dt</i>	<i>fV dt</i>
130.	+ 8,4635	+ 4,7242
Incr.	0,0525	0,0188
135.	8,5160	4,7430
Incr.	0,0512	0,0163
140.	8,5672	4,7593
Incr.	0,0501	0,0140
145.	8,6173	4,7733
Incr.	0,0493	0,0119
150.	8,6666	4,7852
Incr.	0,0487	0,0099
155.	8,7153	4,7951
Incr.	0,0481	0,0080
160.	8,7634	4,8031
Incr.	0,0476	0,0061
165.	8,8110	4,8092
Incr.	0,0473	0,0043
170.	8,8583	4,8135
Incr.	0,0471	0,0026
175.	8,9054	4,8161
Incr.	0,0469	0,0009
180.	+ 8,9523	+ 4,8170

37. Hinc iam facile colliguntur valores tam ipsius X' quam Y' , ope formularum traditarum §. 21. quos in sequente Tabula exhibebimus, iis autem insuper adiungemus, perturbationis priores illas partes ex actione Solari oriundas, neglecta scilicet excen-

$\int dt \int V dt$	$\int dt(2V \cos t + U \sin t)$	$\int dt(2V \sin t - U \cos t)$
+12,5811	+8,1553	+0,0395
+0,6591	-0,0594	+0,0249
+13,2402	+8,0959	+0,0644
+0,6616	-0,0578	+0,0186
+13,9018	+8,0381	+0,0830
+0,6638	-0,0560	+0,0130
+14,5656	+7,9821	+0,0960
+0,6656	-0,0541	+0,0082
+15,2312	+7,9280	+0,1042
+0,6670	-0,0524	+0,0038
+15,8982	+7,8756	+0,1080
+0,6682	-0,0507	+0,0000
+16,5664	+7,8249	+0,1080
+0,6692	-0,0490	-0,0035
+17,2356	+7,7759	+0,1045
+0,6699	-0,0475	-0,0068
+17,9055	+7,7284	+0,0977
+0,6704	-0,0462	-0,0099
+18,5759	+7,6822	+0,0888
+0,6707	-0,0451	-0,0130
+19,2466	+7,6371	+0,0758

excentricitate Veneris, inuenimus autem supra istam partem priorem pro angulo p

$$X' = \frac{a a}{b b} \frac{m-1}{m(m-1)} \cos. p = + 6,8960. \cos. p$$

coefficientis Logarithmo existente +0,8387228

$$Y' = \frac{a a}{b b} \frac{m^2-1}{m(m-1)} \sin. p = - 17,17201. \sin. p$$

coefficientis Logarithmo existente = - 1,2348211.

M m m 2

Tabu-

Tabula pro X et Y

pro X.

	pars I.	pars II.	totum
$p = 0$	+6,8980	0	+6,8980
5°	+6,8717	-c,1266	+6,7451
10	+6,7932	-c,4879	+6,3053
15	+6,6629	-1,0463	+5,6166
20	+6,4820	-1,7619	+4,7201
25	+6,2517	-2,6075	+3,6442
30	+5,9738	-3,5586	+2,4152
35	+5,6505	-4,5935	+1,0570
40	+5,2841	-5,6971	-c,4130
45	+4,8776	-6,8664	-1,9888
50	+4,4339	-8,0471	-3,6132
55	+3,9565	-9,2368	-5,2803
60	+3,4490	-10,4127	-6,9637
65	+2,9152	-11,5599	-8,6447
70	+2,3593	-12,6624	-10,3031
75	+1,7853	-13,6795	-11,8942
80	+1,1978	-14,6178	-13,4200
85	+0,6012	-15,4503	-14,8491
90	+0,0000	-16,1661	-16,1661
95	-0,6012	-16,7507	-17,3519
100	-1,1978	-17,1934	-18,3912
105	-1,7853	-17,4888	-19,2741
110	-2,3593	-17,6309	-19,9902
115	-2,9152	-17,6185	-20,5337
120	-3,4490	-17,4516	-20,9006
125	-3,9565	-17,1369	-21,0934

TERRAE AB ACTIONE VENERIS. 461

Tabula pro X et Y
pro Y

pars I.	pro II.	totum
0	0	0
- 1, 4966 +	0, 0570 -	1, 4396
- 2, 9819 +	0, 1104 -	2, 8715
- 4, 4444 +	0, 1943 -	4, 2501
- 5, 8732 +	0, 3650 -	5, 5082
- 7, 2571 +	0, 6679 -	6, 5892
- 8, 5861 +	1, 1795 -	7, 4066
- 9, 8495 +	1, 1940 -	7, 9355
- 11, 0379 +	2, 9180 -	8, 1199
- 12, 1424 +	4, 1953 -	7, 9471
- 13, 1545 +	5, 7724 -	7, 3821
- 14, 0665 +	7, 6534 -	6, 4131
- 14, 8716 +	9, 8556 -	5, 0160
- 15, 5631 +	12, 3567 -	3, 2064
- 16, 1364 +	15, 1637 -	0, 9727
- 16, 5869 +	18, 2406 +	1, 6537
- 16, 9111 +	21, 4890 +	4, 5779
- 17, 1067 +	25, 1991 +	8, 0924
- 17, 1720 +	28, 9657 +	11, 7937
- 17, 1067 +	32, 9341 +	15, 8274
- 16, 9111 +	37, 0350 +	20, 1239
- 16, 5869 +	41, 2379 +	24, 6510
- 16, 1364 +	45, 4968 +	29, 3604
- 15, 5631 +	49, 7646 +	34, 2015
- 14, 8716 +	54, 0061 +	39, 1345
- 14, 0665 +	58, 1742 +	44, 1077

M m m 3

Tabula

Tabula pro X et Y

pro X

p = 0	pars I.	pars II.	totum
130	-4, 4339	-16, 6785	-21, 1124
135	-4, 8776	-15, 9972	-20, 8748
140	-5, 2841	-15, 3761	-20, 6602
145	-5, 6505	-14, 5564	-20, 2069
150	-5, 9738	-13, 6464	-19, 6202
155	-6, 2517	-12, 6658	-18, 9175
160	-6, 4820	-11, 6304	-18, 1124
165	-6, 6629	-10, 5642	-17, 2271
170	-6, 7932	-9, 4742	-16, 2674
175	-6, 8717	-8, 4145	-15, 2862
180	-6, 8980	-7, 3758	-14, 2738

Tabula pro X et Y

pro Y

pars I.	pars II.	totum
-13, 1545	+62, 2157	+49, 0612
-12, 1424	+66, 1272	+53, 9848
-11, 0379	+69, 8504	+58, 8125
-9, 8495	+73, 3614	+63, 5119
-8, 5861	+76, 6282	+68, 0421
-7, 2571	+69, 6272	+72, 3701
-5, 8732	+82, 3446	+76, 4714
-4, 4444	+84, 7664	+80, 3220
-2, 9819	+86, 8883	+83, 9064
-1, 4966	+88, 7097	+87, 2131
-0	+90, 2364	+90, 2364

38. Quo autem, facilius, has determinationes ad vsum Astronomicum accommodemus, notandum est totum negotium ad valorem litterae Y' redire, ex quo facile statim effectum perturbationis cognoscere licet, quippe qui angulo perexiguo constat quem ad locum terrae ex Tabulis solitis desumptum siue addere siue inde auferre oportet. Quum enim defini-ri debeat angulus $M\odot\delta$ ad longitudinem terrae mediam addendus eius tangens est $\frac{Y}{1+X} = \frac{Y+\lambda Y'}{1+X+\lambda X'}$ quem ergo angulum hic in duas partes distribui conuenit, quarum altera principalis ex solo motu regulari est petenda, cuius ergo tangens est $X \frac{Y}{1+X}$, quem angulum Tabulae Solares consuetae exhibent, quem littera η indicemus, altera vero pars, ipsam perturbationem continens notetur littera ω , ita vt ad locum Terrae medium addi oporteat angulum $\eta + \omega$.

39. Quum igitur habeamus $\text{Tang.}(\eta + \omega) = \frac{Y+\lambda Y'}{1+X+\lambda X'} = \text{Tang.} \eta + \frac{\omega}{\cos \eta}$; quoniam angulus ω prae η est vehementer paruus; tum vero sit $\text{Tang.} \eta = \frac{Y}{1+X}$, hinc colligimus $\frac{\omega}{\cos \eta} = \frac{\lambda Y'}{(1+X)}$ propterea quod quantitates $\lambda X'$ et $\lambda X''$ sunt quasi euanescentes. Praeterea vero quia angulus η est valde paruus eiusque cosinus vix ab unitate differt tum vero etiam loco $1+X$ tuto scribere licet 1, habebimus simpliciter $\omega = \lambda Y'$. Interim si etiam harum postremarum conditionum rationem habere velimus, reperitur $\omega = \frac{\lambda Y'}{(1+X)^2 + Y^2}$, quae

quae expressio a praecedente vix particula sensibili discrepabit.

40. Quoniam igitur tota perturbatio ω , quam hic quaerimus per solam quantitatem Y' determinatur, cuius valores modo ante vsque ad 180° exhibuimus, nunc accuratius nobis ostendere incumbit, quemadmodum hi valores ad praxin accommodari queant. Supra autem iam innuimus, constantes per integrationes ingressas, ita capi debere ut post singulas reuolutiones, hae perturbationes iterum evanescant, quod etiam de dimidiis reuolutionibus est tenendum. Quare quum pro 180° valor ipsius Y' prodierit $+90,0264$, ob constantes illas memoratas a quolibet valore ipsius Y' pro angulo $\varphi \odot \xi$ subtrahi debet numerus proportionalis, scilicet

$$\frac{\varphi \odot \xi}{180}. 90,0264 = \varphi \odot \xi. 0,50014$$

vnde facile erit has correctiones in Tabulam superiorem introducere.

41. Denique superest, ut valorem litterae λ consideremus qui a ratione massae Veneris ad massam solarem pendet quae autem ratio adhuc plane est ignota. Satis probabile autem videtur Veneris massam vix a massa terrae discrepare propterea quod eius magnitudo non multum a terrae deficit, densitas vero aliquanto maior censetur, quandoquidem planetae quo Soli sunt propiores eo etiam densiores aestimantur. Statuamus ergo Veneris massam ipsi massae terrae aequalem quam ex nouissimis paral-

Tom. XVI. Nou. Comm. N n n laxis


laxis Solis obseruationibus, colligimus $= \frac{1}{1000000}$ dum
 massa Solis unitate referatur, hinc igitur habebimus
 $\lambda = \frac{1}{1000000}$ atque ex hoc valore singulos angulos ω ,
 qui perturbationem continent supputemus: Si forte
 massa Veneris aliquanto maior vel minor esset, quan-
 titates in sequenti Tabula occurrentes in eadem ratione
 sunt augendae vel minuendae. Praeterea notandum
 est argumentum p aequari angulo $\Phi - t$ seu de-
 signare elongationem mediam Veneris a Terra e
 Sole spectatam.

Tabula ostendens perturbaciones motus terrae, ab actione Veneris ortas: *Supplementum novissimum* a. 1764

<i>p</i>	Sig.	I. Sig.	II. Sig.	III. Sig.	IV. Sig.	V. Sig.	<i>p</i>
—	—	—	—	—	—	—	—
0	0,0	13,8	21,6	20,6	13,0	4,4	30
1	0,5	14,2	21,7	20,4	12,7	4,1	29
2	1,0	14,6	21,8	20,2	12,4	3,9	28
3	1,5	15,0	21,9	20,0	12,1	3,7	27
4	2,0	15,4	22,0	19,8	11,8	3,5	26
5	2,4	15,7	22,1	19,6	11,5	3,3	25
6	2,9	16,1	22,2	19,4	11,2	3,1	24
7	3,4	16,5	22,2	19,2	10,9	2,9	23
8	3,9	16,8	22,3	19,0	10,6	2,7	22
9	4,4	17,1	22,3	18,8	10,3	2,5	21
10	4,8	17,4	22,3	18,5	10,0	2,3	20
11	5,3	17,8	22,3	18,3	9,7	2,1	19
12	5,8	18,1	22,3	18,1	9,4	1,9	18
13	6,3	18,4	22,3	17,9	9,1	1,7	17
14	6,8	18,7	22,2	17,6	8,8	1,6	16
15	7,3	18,9	22,2	17,3	8,5	1,5	15
16	7,8	19,2	22,2	17,1	8,2	1,3	14
17	8,3	19,5	22,1	16,8	7,9	1,1	13
18	8,8	19,7	22,1	16,5	7,6	1,0	12
19	9,2	19,9	22,0	16,2	7,3	0,9	11
20	9,6	20,1	21,9	15,9	7,0	0,8	10
21	10,1	20,3	21,8	15,7	6,7	0,6	9
22	10,6	20,5	21,7	15,4	6,4	0,5	8
23	11,0	20,7	21,6	15,1	6,1	0,4	7
24	11,4	20,9	21,5	14,8	5,9	0,3	6
25	11,8	21,0	21,3	14,5	5,7	0,2	5
26	12,2	21,2	21,2	14,2	5,4	0,2	4
27	12,6	21,3	21,1	13,9	5,1	0,1	3
28	13,0	21,4	21,0	13,6	4,8	0,1	2
29	13,4	21,5	20,8	13,3	4,6	0,0	1
30	13,8	21,6	20,6	13,0	4,4	0,0	0
	+	+	+	+	+	+	
<i>p</i>	XL Sig.	X. Sig.	IX. Sig.	VIII. Sig.	VII. Sig.	VI. Sig.	<i>p</i>

№ 2

PHYSI-



PHYSICA.

NON 3

DE

A 3127 H 9

DE CORDE LEONIS.

Auctore

C. F. WOLF.

Quae circa musculos et nervos in leone singularia reperi, in praecedenti Commentariorum tomo exposui. Inter viscera maxime cor notabile est ob multa singularia attributa. Eius itaque descriptionem nunc tradam, postquam effectus cuiusdam morborum mentionem fecerim, quem causam mortis huius animalis existimo.

Quum venae axillaris ortum ex thorace rimarem, laesa fortuito pleura, magna copia sanguinis ex thorace effluxit. Deinde quum hunc aperissem, multum non modo iidem sanguinis, tum fluidi, tum etiam coagulati in cavitate thoracis reperi, sed pericardium quoque miro modo distentum et renitens inveniatur, adeo, ut totam fere thoracis cavitatem repleret, pulmonibus ad postremam partem repulsis. Pericardio inciso, sanguis cum vi erupit coagulatus et niger; frustra quoque cruoris ad oui gallinaei magnitudinem exprimebantur. Cor, quod ex enormi volumine pericardii maximum fore iudicaui, nihil, quoad magnitudinem in soliti habebat,

Causa mortis huius animalis.

bebat, et decimam vix partem pericardii occupabat, reliqua capitate cruore nigro repleta. Caeterum cor flaccidum, ventriculis auriculisque collapsis, et sanguine plane vacuis, facie anteriori, quae in aliis animalibus gibba esse solet, plana, rugis quae minimis transuersalibus notatu. Sanguinem cordis omnem et vasorum in pericardio et thorace fuisse, unde illa vacua essent, facile intelligebatur. Rupturam autem vasis cuiusdam nusquam reperi. In superficie cordis quidem prope basin, tum maxime in aorta, qua parte intra pericardium continetur ex crescentiae obseruabantur figurae fere conicae, quarum maiores pollicem et ultra ad basin latae et aequae longae erant. At haec in sola tunica externa, quae a lamina interna pericardii continuatur, existerent, a materia quadam tenui, ibi deposita, productae, nec ullam communicationem cum cavitate interna harum partium habebant. Verisimile igitur est, sanguinem per vasa exhalantia pleurae et pericardii penetrasse, quae, praecipue in pericardio, naturaliter etiam, ita comparata esse constat, ut ferum, notabili rubedine tinctum, permittant, cuius semper aliqua portio in pericardio, post mortem reperiri solet. An etiam ex ipsis ventriculis, tempore systoles, per parietes cordis, quos in leone mire tenuis esse in subsequentibus dicam, sanguis transsudauit? Exemplum in vesicula fellea habemus, quae, nullis vasis, viam praebentibus, bilem perspirare sinit. Caeterum hanc ipsam extrauasionem sanguinis causam proximam mortis fuisse, dubium non

non est, siquidem cor non modo in sua actione adeo impeditum inde fuit, vt dilatari non potuerit, sed vasa quoque et cor ipsum sanguine omni priuata, cerebro nihil suppeditare potuerunt, vnde debilitatem primo, tandemque lipothymiam perpetuam, vel, si mauis, apoplexiae speciem, oriri necesse fuit.

Pericardium, pro situ cordis, aliter atque in ^{Pericardium.} homine, figura, ouo gallinaceo simili, gaudet, cuius vertex inferior, versus diaphragma respiciens, ^{Tab. XI.} acutior, superior magis obtusus est. In vertice inferiori pericardium diaphragmati non adhaeret, sed ^{Fig. 1.} mobile est, membranisque longis (g. g) a mediastino productis, tenuissimis, pellucidis et reticularibus, omento similibus, ad diaphragma modo adligatur. Ad verticem superiorem in parte anteriori processus notabilis (e) a pericardio producitur, quo aorta eiusque rami complectuntur. Vena autem caua superior, arteriae venaeque pulmonales et caua inferior seorsim singulae prodeunt lateraliter et versus partem posteriorem, pericardium simpliciter perforando.

In hoc pericardio, in media fere eius parte, ^{Situs cor-} cor situm erat, adeo, vt processum (Fig. 1. e.) ^{dis.} arteria innominata, subclauia sinistra et superior ^{Tab. XI.} arcus aortae pars (fig. 2.) qua versus dorsum curvari incipit, aliamque longitudinis pericardii partem, processui dicto aequalem, bulbus aortae adscendens (fig. 2. i.) occuparet, et in ea regione, ^{Fig. 1. 2.}

Tom. XVI. Nou. Comm.

O o o

vbi

vbi vena pulmonalis (fig. 1. u.) pericardio exit, cor sua basi inciperet et quantum longum est, (fig. 2. c. b.) deorsum se extenderet in parte pericardii posteriori; unde locus cordis in pericardio ex comparatione figurarum 1 et 2 facile intelligi poterit. Situs autem cordis in eo pericardii loco talis est, qualis in animalibus esse solet. Basi nempe sursum et apice recta deorsum respicit. Superficies, quae in homine superior est, anterior ob hunc situm, et quae inferior in homine, posterior in leone, ut in reliquis animalibus quadrupedibus, euadit.

Figura
cordis.
Tab. XL
Fig. 2.

Sed figurae respectu cor leonis tam ab humano quam ab aliorum animalium cordibus differt. Et haec figura, non modo, quod singularis est, sed ideo maxime notari meretur, quia ab interiori structura cordis pendet, quae itidem in leone a reliquis animalibus differt, et in oeconomiam vitalem influxum sibi vindicat. Vti in homine superior cordis facies, ita in animalibus anterior eiusdem, quae illi respondet, semper notabili conuexitate gaudet. In homine quidem haec facies maxime prominet versus basin, in eo loco, vbi arteria pulmonalis exoritur, et in media sui parte. Inde versus anteriora maxime, paulo minus versus posteriora, decliuus in margines abit, quorum anterior acutior tenuiorque, posterior obtusior et crassus est. In animalibus ea maxime differentia est, ut nullibi peculiariter haec facies promineat, sed aequali modo conuexa sit, neque margines proprie producat sed cor potius teres seu conoidcum efficiat, eo magis, cum

cum facies posterior, cuius respondens inferior in homine plana est, itidem aliqua conuexitate gaudeat. Praeterea in ipsa hac superficie ventriculi cordis in animalibus aequae ac in homine manifesto distinguuntur, et ventriculus dexter sinistro notabili parte altior situs est, adeo ut sinister deorsum prominens solus apicem cordis efficiat, dexterque ad eundem nil conferat. Hinc apex cordis acutus et tota figura conoidea, vel in homine semiconoidea, oritur; cum, si ambo ventriculi aequali iure ad extremitatem usque cordis producerentur, nullus apex angustior inde, nec figura conoidea cordi, sed ouata, vel subrotunda potius suboriretur. In felle ventriculus dexter vix ad dimidiam longitudinem cordis descendit; dimidia huius pars inferior una cum apice a solo sinistro efficitur. Apex in illa multo quam in homine acutior est, et figura cordis longe maiori iure conoidea vocari potest. Horum omnium in leone nihil obseruatur. Superficies anterior plana est aequae ac posterior, et margines utrinque formantur aequales, obtusi, sed minus crassi. Ventriculi in exteriori superficie cordis nullo modo distinguuntur. Fibrae enim, quae parietem ventriculi dextri exteriorem constituunt, quaeque in homine, in felle, in cane, in vitulo a parte septi anteriori oriuntur, ibique a fibris sinistri ventriculi per rimam adipis et vasis repletam, distinguuntur; hae fibrae in leone potius continuationes esse videntur fibrarum transversarum ventriculi sinistri, adeo, ut uterque ventriculus uno communi strato fibrarum, transversarum

lium in superficie exteriori tegatur; unde singularis habitus cordi leonis conciliatur. Porro autem ventriculus dexter aequae ac sinister ad extremitatem usque inferiorem cordis se extendit. Inde apex angustior et acutior deficit, et totum cor leonis figuram nanciscitur subrotundam et planam, cum in reliquis, quantum scio, animalibus quadrupedibus, saltem in vitulo, cane et felle aequae ac in homine, cor crassum teres et conoideum existat.

Auriculae
Tab. XI.
Fig. 2. e. d.

Auriculae minimae sunt in corde leonis, in specie dextra (e.) quae tanquam tuberculum crenatum basi venae cauae superioris adsidet, nec nisi ob analogiam cum aliis animalibus tanquam peculiaris pars cordis in hoc animali considerari potest. Hoc certum est, sanguinis portiunculam, quae tempore systoles cordis in ea recipi potest, nullius plane momenti esse. Idemque valet de auricula sinistra (d.).

Vasorum
maiorum
distributio.
Fig. 2.

Vasorum maiorum distributio parum a structura felina differt. Subclavia arteria sinistra in felle non quidem ex eodem trunci communis apice, unde carotides et dextra subclavia exsurgunt, sed neque tamen seorsum ex arcu aortae, sed potius ex facie posteriori huius trunci communis prope basin eiusdem oritur. Eadem in leone distincta ex arcu aortae prodit (o.) cum in homine solam dextram cum carotide dextra ex trunco communi, carotidem sinistram vero et subclaviam sinistram seorsum ex arcu aortae prodire notum sit.

Inter

Inter omnia vero, quae in corde leonis et in systemate vasorum sanguineorum notavi, maxime, et quasi sola, memorabilis mihi visa est magna inter ventriculos et reliqua vasa, et porro inter truncos vasorum et ramos ratio luminum, quae ita comparata est, ut neque anxia mensura neque subtiliori acumine ad eam observandam opus sit. Iam, quam nervos extremitatis superioris evoluerem, insignem mirabar parvitatem vasorum brachialium proportionem muscularum et animalis (vid. Diss. priorem fig. 3. e.) Suspicabar, totum systema vasorum ad similitudinem nervorum in hoc animali exiguum esse. Quo magis autem in detegendis vasis ad cor accedebam, eo magis quoque haec vasa incrementum videbam, donec ventriculi cordis aperti veram proprietatem systematis sanguinei huius animalis docerent. Hi enim, uti vasa extremitatum et carotides, earumque rami proportionem animalis omnino parva putanda sunt, respectu eodem merito magni dici possunt.

Neque haec magnitudo ventriculorum in corde leonis alios observatores fugit. Parisinos enim apud *Valentium* in theatro Zootornico sequentia verba de illis tradidisse lego: "*Substantia insua* (cor-
dis) *mollis apparuit, priusquam aperiretur, cognitum*
vero est postea, ex eo id esse, quod parum haberet
carnis, et contra potius totum esset cavum. Ventri-
culi enim tam erant amplæ, ut sinister, qui ad cu-
ssidem usque protenditur, (monui vero idem valere
de dextro,) latitudinem pro carne baud maiorem re-
linqu-

De magnitudine ventriculorum cordis.

Aliorum Auctorum de ventriculis cordis et de corde leonis sententiae.

„linqueret, quae eo in loco ipsum tegit, quam duarum „linearum. Versus basin non plures habebat quam „septem, quot etiam praeditum erat septum fere.„ Ex his igitur patet, in aliis leonum subiectis respectu ventriculorum cordis eadem, quae proposui, observata esse. Aliqua tamen sunt, in quibus hi auctores a meis observatis dissentiant. Figuram nempe cordi attribuunt oblongam, et „*cuspidem valde acuminatam*„. In meo certe subiecto cor et planum fuit ob ipsam carnis tenuitatem et ventriculorum amplitudinem, et subrotundum, cuspideque potius priuatum, cuius rei quoque ipsius causam adsignavi. Denique cor leonis „*multo maius quoque iuxta proportionem*„ laudatis Auctoribus visum est, „*quam in vlllo alio animali.*„ Sed de magnitudine huius visceris in subsequendis ex instituto dicam.

Ventriculi
dextri fi-
gura.
Tab. XII.
Fig. 3.

Ventriculus dexter in leone primo intuitu oblongior quam in aliis animalibus esse videtur. Accuratori tamen examine instituto pater, latitudine illum multo magis, quam longitudine superare ventriculum felinum, humanum et vitulinum. Totus enim ventriculus in duas quasi partes secundum longitudinem in leone diuisus est, in anteriorem, quae ante septum sita est, et in posteriorem, quae retro septum absconditur et anteriori magnitudine vix cedit. Aperto igitur ventriculo sola anterior eius pars apparet, quae totam ventriculi longitudinem, dimidiam vero tantummodo latitudinem refert, vnde primo intuitu iste ventriculus omnino multo quam

quam in homine aliisque animalibus oblongior videri debet. Si vero ventriculus vna cum septo in planitiem extenderetur, haud multo ille minorem, quam cor ipsum, latitudinem haberet, tandemque fere figuram exprimeret.

Septum scilicet in ventriculo dextro valde ^{Septum.} conuexum est, sed alio modo, quam esse solet in ^{Tab. XII.} aliis animalibus et in homine. In his enim con- ^{Fig. 3 m.} vexitas haec septi maxime a crassitie carnis pendet; facies siquidem septi in ventriculum sinistrum respiciens haud tanta concauitate praedita est, quantum conuexa est in ventriculo dextro, sed potius plana est. In leone contra concauitas septi in ventriculo sinistro conuexitati qua in dextrum spectat aequalis est, et tota haec conuexitas a septi complicatione pendet; neque in plurimis locis hoc septum crassitiem 5 vel 6 linearum excedit. In sola parte infima ubi cum parietibus ventriculorum coniungitur crassitie 10 linearum est. Adeoque septum in corde leonis nonnisi lamina carnea est, ita complicata, vt concaua facies versus sinistrum, conuexa versus dextrum ventriculum respiciat. In aliis animalibus vti in homine, densa massa carnea utriusque ventriculo cordis recta interposita est. Caeterum haec septi facies dextra aequalis est, neque lacertis carneis, neque fissuris aut foveis, vt esse solet in aliis animalibus, praedita est; vnde omnino aliquod augmentum capacitati ventriculi accedit. In parte inferiori aliquot foraminula coeca exigua dantur. In parte superiori filamentum exoritur (o. B.) in valvulae venosae partem

partem anteriorem insertum, quod ipsum in fele non modo sed etiam in homine inueniri solet.

Paries ventriculi dextri.

Tab. XII.

Fig. 3.

a. b. c. a.

a. d.

Paries ventriculi dextri externus, tenuis est et laxus et amplior, quam qui requiritur ad septum tegendum; adeo, vt notabile spatium inter concavitate huius parietis et septi convexitatem intercedat. Firmior duriorque contra in aliis animalibus caro, quae hunc parietem constituit, contigua septo incumbere solet. Crassities carnis huius parietis in parte superiori prope basin remota adipe, quae illam in hoc loco tegit, 4 lineis aequalis est. Versus apicem sensim tenuior illa euadit. In corde humano in quo ventriculus longe minor est, eandem crassitiem inueni. In fele et in vitulo proportionem cordis crassities etiam quam in homine multo maior est.

Lacerti musculosi

Tab. XII.

Fig. 3.

p. q. r.

Neque huic parieti multi lacerti musculosi, quibus ventriculi cavitates occuparetur, adnati sunt. Maximus eorum est, qui parti parietis anteriori adhaeret (*p. q. r.*). Ille bifurcatus est et apice suo in extremitatem dextram valvulae tricuspidalis dictae anterioris inseritur, quam totam solus hic fasciculus sustinet. Alter, priori vicinus, (*p. p.*) cum eiusque crure altero connexus simplicior est, et in valvulam posteriorem interitur. Praeter hos in parte huius parietis suprema quaedam columnae ramificatae dantur (*s.*). Valvulae venosae pars inferior, quae septi faciei posteriori adhaeret, meris filamentis sustinetur. Generatim omnes hi fasciculi, quos enumeraui, adeo plani et tenues sunt vt vix quid-

quidquam in imminuenda cavitatē ventriculi possint; neque villo modo comparari possunt cum validis crassis columnis, papillis lacertisque, quibus ventriculi longe minores, in corde humano et in aliorum animalium cordibus fere repleti sunt.

In valvulis orificiorum nihil occurrit, quod notatu dignum sit, vel quod aliquem influxum in oeconomiam vitalem leonis habere posset.

Magnitudinem vero huius ventriculi ut recte aestimeamus, necesse est, ut comparetur non modo cum ventriculo cordis humani et felini, sed magnitudo quoque cordis totius horum animalium in considerationem venire debet, ut non modo quantum ventriculus ille in vno animali maior quam in altero, sed etiam, quantum proportionē cordis maior sit appareat. Longitudo igitur cordis in leone a principio aortae usque ad apicem cordis in superficie anteriori, quae plana est, invenitur 5 poll. 3 lin. Circumferentia eiusdem in parte media inter basin et apicem, ubi cor leonis maximam latitudinem habet, aequalis inventa fuit. 11 poll. 4 lin. Ad determinandam magnitudinem cordis humani mensuras cepi ex duobus subiectis diversis adultis, virilibus, mediocris staturae et habitus. In altero horum hominum, qui vitam sibi sclopeto sustulerat, cor mediocris magnitudinis erat aspectu, et veluti in adultis esse solet. Id tamen habebat singulare ut ad basin latius quam in parte media esset, indeque latera continuo et sub rectis lineis fere in apicem

Magnitudo
ventriculi
dextri cum
eodem
ventriculo
cordis hu-
mani com-
parati.

apicem paulo acutiorem conuergerent, adeoque figuram efficerent, paulo magis triangularem quam solitum est. In altero, qui mortem laqueo sibi intulerat, cor aequè ac vasa paulo magis dilatata videbantur, adeo, ut cor hoc inter maiora referri posset, figurae caeterum frequentissimae. In priori igitur homine longitudo cordis, simili modo uti in leone, in superficie superiori sumta, ab ortu arteriae aortae et pulmonalis usque ad apicem aequalis fuit 4 poll. 10 lin. Circumferentia autem in eo loco, ubi cor maximam latitudinem et crassitiem habebat, i. e. in hoc subiecto circa ipsam basin, aequalis erat 10 poll. 1 lin. In homine posteriori longitudo cordis, simili modo sumta, 5 poll. circumferentia autem in parte, inter basin et apicem sita, basi propiori, ubi cor hoc maximam latitudinem habuit, 9 poll. 10 lin. aequalis erat. Ex his, et iis, quae prius monui, longitudinem cordis humani mediam sumendam esse colligo 4 poll. 10 lin. vel 58 lin. Circumferentiam autem 10 poll. vel 120 lin. Adeoque longitudo cordis humani ad longitudinem cordis leonis erit, ut 58:63. circumferentia autem ut 120:136 vel 15:17. Vnde nunc porro constabit, qua ratione inter se ventriculi cordis esse deberent, si leoni ventriculi cordis essent, humanis proportionati, et quantum maiores leonini humanis censendi sunt, id est, quantum proportionè cordis maiores sunt. In homine priori longitudo ventriculi dextri a basi valvularum semilunarium usque in apicem ventriculi, quae

nampe longitudo ventriculi maxima est, filo super septum conuexum ducto, aequalis inuenta fuit 3 poll. 8 lin. In homine posteriori eadem longitudo simili modo sumta, aequalis erat 3 poll. 9 lin. Adeoque longitudo ventriculi dextri hominis media putari potest 3 poll. 8 lin. vel 44 lin. Circumferentia transuersalis eiusdem ventriculi interna vel ambitus internus in eo loco, vbi ventriculus amplissimus est, filo vbique super parietes internos ventriculi, adeoque et super septum conuexum, et retro latertos musculosos ducto, in homine priori 5 poll. 7½ lin. in posteriori 5 poll. 6 lin. inuenitur; quorum ambituum internorum mensuram mediam sumendam esse puto 5 poll. 4 lin. vel 64 lin. Quodsi igitur magnitudo ventriculi cordis in leone ad magnitudinem cordis totius in eadem ratione esset, uti est in homine, longitudinem eiusdem esse oporteret 3 poll. 10½ lin. ambitum autem 6 poll. ½ lin. Iam vero longitudo ventriculi dextri in corde leonis simili prorsus modo sumta ut in hominibus 4 poll. 7 lin. et ambitus eiusdem 9 poll. 6 lin. aequalis est. Ad iustam igitur proportionem, quam in homine obseruamus, longitudo ventriculi leonis erit ut 55:46½. ambitus autem eiusdem ut 114:72½. Proinde *ventriculus ille fere (non prorsus) una quinta parte iusto longior, et multo plus quam una tertia parte iusto amplior est.*

Ne vero haec differentia, quae inter magnitudinem ventriculi dextri cordis leonini et humani interest, paruitati potius ventriculi humani, quam

Magnitudo
ventriculi
dextri cor-
dis humani

ad cor felinum et vitulinum comparati.

magnitudinē leonini adscribenda esse videatur, felinum quoque et vitulinum cor metitus sum. Illud quidem in catulo iuniori. Longitudo cordis felini, (hac ita, ut omnibus reliquis quæsuris simili modo sumpta, uti in hominibus et in leone sumi), æqualis erat 15½ lin. Circumferentia ejusdem maxima 29½ lin. Pro hac magnitudine cordis ventriculus dexter, si eius magnitudo ad magnitudinem cordis in eadem ratione, uti in homine, esset, (longitudine prope ventriculi ad longitudinem cordis, amplitudine ejusdem ad circumferentiam cordis relata,) esse deberet longitudine 12 hncarum, non penitus quidem, sed nonnisi minus vigesima lineæ parte quæ nullius momenti est. Amplitudo autem huius ventriculi esse deberet 15½ lin. Iam vero summa longitudo ventriculi dextri in hoc corculo felino nonnisi 10 lin. examissim et amplitudo 11¼ lin. inventa fuit. Unde patet ventriculum dextrum cordis felini multo etiam humano ventriculo proportionē cordis minorem esse. Cor vitulinum longitudine erat 4 poll. Circumferentia maxima prope basin 8 poll. Ventriculus dexter igitur secundum proportionem humanam esse deberet 3 poll. et ½ lin. Circumferentia autem 4 poll. 3½ lin. Iam vero longitudo huius ventriculi nonnisi 2 poll. 1 lin. et circumferentia 3 poll. 10 lin. fuit. Unde patet, etiam in vitulino corde ventriculum dextrum proportionē totius cordis multo quam in humano minorem esse. Differentia igitur, quæ inter humanum et leoninum ventriculum inventa fuit, non paritati humani, sed

lin-

2 9 9

singulari magnitudini ventriculi leonis adscribenda erit; siquidem et feli et vitulo ventriculus humano potius minor existit, nec verisimile adeo est, vel caeteris praeter leonem quadrupedibus ventriculum hunc dextrum cordis multo maiorem humano facile inventum iri.

Ventriculus sinister, qui, uti in homine, ita in reliquis quoque quadrupedibus non modo angustior et figurae oblongae, sed apice quoque valde acuto terminatus esse solet, in leone multo latior est et sine inferiori gaudet valde obtuso et dilatato. Adeoque figura eiusdem aequae ac dextri ventriculi subrotunda est et figuram cordis imitatur.

Septum, quae parte in hunc ventriculum spectat, concavum est et laeve, excepta eius parte inferiori, quae foveis nonnullis maioribus (*m. m.*) iisque satis profundis praedita est. Lacertis autem musculosis fere caret, qui in aliis animalibus totam internam huius ventriculi superficiem occupare ventriculumque fere replere solent. Ad eum locum, ubi paries ventriculi cum septo coniungitur, fasciculus ramificatus est (*j. k.*) sed planus et parieti agglutinatus. Notabilis autem est, similis eiusmodi fasciculus (*l.*) qui proxime sub valvulis semilunariibus orificium arteriosum circumdat, cuiusque adeo officium esse videtur, tempore systoles sphincteris modo hoc orificium constringere.

Paries externus huius ventriculi latus, mollis et proportionem aliorum animalium, certe tenui substantia carnea compositus est. Siquidem in parte

Ventriculi
sinistri fi-
gura
Tab. XIII.
Fig. 4.

Septum
Fig. 4. A.

Paries ex-
ternus
Fig. 4.
a. b. B. et
supe-

lacerti
musculosi.

superiori, non computata adipe nonnisi lineas quinque in inferiori nonnisi tres lineas crassus est. Sed lacertis carnis, non multis quidem, sed eo validioribus hic paries omnino instructus est. Omnes tamen filamentis suis tendineis in valvulam orificii venosi inferuntur; nec ulla datur, ut in homine et in aliis animalibus, eiusmodi columnarum, quae ortae ex vno loco ventriculi in alterum se inferunt vel papillarum, quae tendinibus suis in parietes ventriculi inferuntur. Et praeterea plani sunt illi lacerti et dimidia sui parte parieti cordis adnati. Quatuor eiusmodi lacertos musculosos numeravi, quorum alter (a. p.) ob magnitudinem suam praecipue notabilis est. Iste ex variis quasi, sed plane in vnum concretis componitur, maximamque partem parietis externi occupat. Ortus a parte parietis infima, indeque porro usque ad mediam fere partem eidem adnatus versus valvulam venosam ascendit, dispersusque in filamenta, minus longe numerosa, quam in homine, in eam valvulam, maxime in partem eius posteriorem, se inferit; excepto filamentulo unico, quod ramosè in septum dispergitur. Prope hunc alius minor, nec debilis tamen fasciculus est (w) qui filamenta sua in eandem valvulam, in eius partem anteriorem mittit. Deinde duo minores dantur, a prioribus texti, qui filamenta sua partibus valvulae anteriori et posteriori promiscue reddunt.

Valvulae
ventriculi
sinistri.
Tab. XIII.
Fig. 4.

Caeterum valvula venosa ventriculi sinistri integro membrana est et minus etiam quam in homine in duas valvulas divisa. Filamenta recipit pau-

pauciora sed crassiora a lacertis carnis, nec vllum *E. G. H. I.*
eorum, vt fieri solet in homine, in superficiem
eius exteriorem inferitur, sed omnia in ipsum eius
marginem fluitantem se immittunt; vnde valvulae
alienus habitus oritur. In semilunaribus nihil est,
quod notari meretur.

Quod magnitudinem autem attinet ventriculi
sinistri, ea tantundem non modo, quantum dextri
ventriculi magnitudo, sed magis etiam magnitudi-
nem humani et felini ventriculi superat, adeo, vt
singularitas haec in ventriculo sinistro magis eluceat,
quam in dextro. Sed vna tamen in eo ordine pro-
cedendi, quo vsus sum in aestimando ventriculo dex-
tro, et quem ad sinistrum nunc applicabo, occurrit
obseruatio, quam forte vna mecum haud expectas-
ses. Ea est ventriculi cordis vitulini circumferentia
interna, quae quidem nullo modo aequalis est cir-
cumferentiae ventriculi leonis, neque comparari cum
ea potest; sed tamen humani ventriculi circumfe-
rentiam proportionem superat, quod eo magis mira-
tus sum, cum crassities parietis huius ventriculi in
vitulo enormis sit et illam in homine multo supe-
ret. Exponam autem obseruationes ipsas et compa-
rationes, quo ordine easdem de ventriculo dextro
proposui.

In homine priori igitur longitudo ventriculi
sinistri eodem huc vsque visitato modo sumpta a basi
valvularum semilunarium vsque ad apicem ventri-
culi aequalis inuenta fuit. 3 poll. 4 lin. In homi-
ne parati

De magni-
tudine
ventriculi
sinistri.

Magnitudo
huius ven-
triculi ad
cor huma-
num com-

parati

ne posteriori 3 poll. 5 lin. Mediam igitur longitudinem ventriculi humani aequalem supposui 3 poll. 4 lin. vel 40 lin. Secundum hanc normam ventriculus sinister in corde leonis proportionem totius cordis esse deberet longitudine 3 poll. 7 et fere 1 lin. Est autem longitudine 5 poll. Circumferentia ventriculi sinistri in homine priori 3 poll. 6 lin. in posteriori, cuius cor magnum et dilatatum videbatur, 4 poll. 2 lin. fuit. Mediam circumferentiam tamen 3 poll. 10 lin. vel 46 lin. posui. Ergo circumferentia ventriculi sinistri in corde leonis secundum proportionem humanam esse deberet 4 poll. 4 lin. et invenitur 3 poll. 2 lin.

Magnitudo ventriculi sinistri cordis humani ad cor felinum et vitulinum comparati. Secundum eandem proportionem humanam longitudo ventriculi sinistri in corculo illo felino, in quo dextrum ventriculum metitus sum, esse deberet 10 1/2 lin. et inventa est 9 linearum. Circumferentia eiusdem esse deberet 11 et fere 1/2 linearum et aequalis fuit 10 1/2 lineis. In corde vitulino ventriculus sinister longus esse deberet 2 poll. 9 1/2 lin. Longus est 2 poll. 9 lin. Circumferentia huius ventriculi esse deberet 3 poll. 1/2 lin. quae aequalis inventa fuit 3 poll. 6 lin.

Magnitudo ventriculorum cordis leonis de qua pro sinistro ventriculo institutae, ostendunt ventriculos cordis humani non parvos censendos, sed inter maiores potius referendos esse; proinde magnitudinem ventriculorum cordis in leone non plus, quam

quam aequum est, extendi, si ventriculi cordis humani iustae magnitudinis et solitae plerisque animalibus censentur, et tanquam norma considerantur, ad quam leonis ventriculos comparare et diiudicare oporteat. Quod si igitur ventriculus in leone sinister cuius longitudo secundum proportionem humanam 3 poll. $7\frac{1}{2}$ lin. et circumferentia 4 poll. $4\frac{1}{2}$ lin. esse deberet, longitudine gaudeat 5 poll. et circumferentia 8. poll. 2 lin. et ventriculus dexter, qui secundum humanam proportionem 3 poll. $10\frac{1}{2}$ lin. longus et in ambitu suo 6 poll. $\frac{1}{2}$ lin. esse deberet, longus sit 4. poll. 7 lin. et ambitu gaudeat 9 poll. 6 lin.; *longitudo ventriculi sinistri in leone ad iustam et solitam plerisque animalibus longitudinem erit ut 60:43 $\frac{1}{2}$ et maior quam 4:3. Circumferentia ut 98:52 $\frac{1}{2}$ vel 24 $\frac{1}{2}$:13 $\frac{1}{2}$ et fere ut 2:1. Longitudo ventriculi dextri fere ut 11:9 eiusdemque circumferentia ut 114:72 $\frac{1}{2}$. Proinde ventriculus sinister plus quam quarta parte solito longior et duplo fere amplior, dexter quinta fere longior et plus quam tertia amplior est. Ventriculus dexter multo solito maior, sed sinister ipso dextro multo maior est.*

Extremam quoque tenuitatem carnis, qua ventriculi et cor totum efficiuntur, ad diiudicandam ventriculorum magnitudinem paucis expendere iuabit. Sufficiet autem solam crassitiem parietis ventriculi sinistri, cuius mensura ob molem maiorem facilior et certior est, exempli loco producere, ex qua cognita etiam tenuiorum partium dimensiones diiudicari aliqua ratione poterunt. In homine prio-

De crassitie carnis, qua ventriculi cordis componentur.

ri crassities parietis ventriculi sinistri maxima, quae prope basin est, aequalis erat $8\frac{1}{2}$ lin. In posteriori crassitiem parietum non metitus sum. Proportione illius crassitiei, ad circumferentiam cordis relatae, eadem in vitulo $6\frac{1}{2}$ lin. in felle $2\frac{1}{2}$ lin. esse deberet. Est in vitulo pollicis totius vel 12 lin. in felle $3\frac{1}{2}$ lin. Vnde patet, vel enormis crassitiei hos parietes ventriculorum sinistrorum cordis vitulini et felini dicendos esse, qui quippe duplo fere humano crassiores sunt, vel valde tenuem putandum illum in corde humano. Et secundum hanc tenuem normam humanam, qui esse deberet 9 et fere $\frac{2}{3}$ lin. paries ventriculi sinistri in corde leonis, ubi maximam crassitiem habet, nonnisi 5 linearum est. Si igitur cor leonis cum cordibus felis et vituli compararetur, parum abesset, quin caro, qua haec efficiuntur, quadruplo crassior sit illa, qua cor leonis efficitur.

De structu-
ra cordis
generatim.

Vnde paulo aliter, quam in reliquis animalibus cor leonis constructum et comparatum esse videtur. Si enim singularem hanc tenuitatem parietum cordis et septi, et mollitiem, simulque enormem magnitudinem ventriculorum consideraueris, cor leonis marsupio simile videtur, septo tenui, molli, complicabili in duas partes diuiso. Sed eiusmodi idea minime conuenit vel humano vel reliquorum animalium cordibus, quae tanquam durae crassaeque massae carnae potius considerari debent, paruis, pro mole carnis, cauitatibus intus instructae.

Magni-

Magnitudo autem cordis, quam determinare in superioribus pollicitus sum, pro mole corporis parua esse videtur. Longitudinem cordis vidimus esse 5 poll. 3 lin. Longitudo corporis a symphyfi maxillae inferioris, capite erecto, vsque ad symphyfin ossium pubis, vel etiam a naribus vsque ad principium caudae erat pedum 5 et 11 poll. Mediocre cor humanum longitudine gaudet 4 poll. et 10 lin. ergo homo mediocris staturae, si cor leonis proportionatum esset cordi humano, mensura sumta a vertice capitis vsque ad ossa pubis, vel ad principium ossis coccygis esse deberet 5 pedum et 5 pollicum. Iam pars corporis humani a vertice capitis vsque ad ossa pubis dimidiam circiter totius hominis longitudinem efficit. Ergo homo mediocris si cor leonis humano proportionatum esset, longitudine esse deberet 10 pedum et 10 poll. quam gyganteam magnitudinem, cum vix quisquam mortalium habeat, patet, cor leonis pro mole corporis insigniter paruum esse.

De magnitudine cordis.

Verum enim quantumvis magni sint ventriculi cordis in leone, si lumina vasorum tum inter se tum ad ventriculos cordis in eadem ratione essent, vti sunt in homine vel in aliis animalibus; nihil esset in his, quod ullam mutationem in functionibus cordis et vasorum efficere posset. Sed aliter haec se habent omnino, et vti magni sunt ventriculi respectu cordis, ita magni iidem quoque sunt respectu vasorum et magni porro in his trunci sunt respectu ramorum.

De ratione arteriarum ad ventriculos cordis.

Q 99 2

Aorta,

Aortae ratio ad ventriculum sinistrum, vti se habeat ad eandem rationem in homine.

Aorta, vbi primum ex corde emergit, ambitu gaudet externo (nam tunicas vasorum sine errore proportionatas supponi posse existimo,) in homine priori 3 poll. $1\frac{1}{2}$ lin. in posteriori, cui ambitus ventriculi sinistri maior, 3 poll. 5 lin. Medium ponamus 3 poll. 3 lin. Ambitus igitur radicis aortae in leone proportionem ambitus ventriculi sinistri secundum hanc normam esse deberet 6 poll. $11\frac{1}{2}$ lin. ergo fere 7 poll. sed inuenitur $3\frac{1}{2}$ poll. Duplo ergo fere aorta in homine proportionem ventriculi sui ex quo oritur, quam in leone amplior est.

Rationes vasorum ad ventriculos cordis in vitulo et in fele, vti se habeant ad rationem humanam. Scholion.

Nunc verum quidem est, rationem aortae ad ventriculum suum in vitulo ob insignem huius ventriculi circumferentiam, quam notaui, itidem minorem esse quam in homine, sed multo tamen magis haec ratio vitulina maior leonina est, quam minor humana. Nimirum ambitus aortae orientis in vitulo est 2 poll. 5 lin. et esse deberet, si aequalis homini et vitulo ratio esset, 2 poll. $11\frac{1}{2}$ lin. Sexta igitur parte vna quam in homine minor est, sed tribus quintis partibus quam in leone maior. In fele eadem fere quam in homine est. Secundum humanam proportionem ambitus aortae esse deberet $9\frac{1}{2}$ lin. et inuenitur 9 lin. Similique modo comparatum esse reperi, cum continuatione aortae eiusque ramis. Nimirum vbique hi rami proportionem ventriculi sui paulo angustiores sunt in vitulo quam in homine, vt tamen cum mira illa angustia, quae in ramis similibus leonis obseruatur, nullo modo comparari

parari possint, et vbique iidem aequales fere proportione ventriculi humanis inueniuntur in fele.

Subclauia dextra in homine priori 1 poll. 3 lin. in posteriori 1 poll. 6½ lin. erat. Medium subclauiae dextrae.
mamus 1 poll. 5 lin. Subclauia dextra igitur in leone proportione ventriculi sinistri esse deberet 3 poll. ½ lin. Est autem 1 poll. 5 lin.

Carotidum, quarum dextram sinistram, in hominibus aequae ac in leone, aequalem reperi, circumferentia in homine utroque prope basin erat 1 poll. Adeoque carotides in leone proportionem ventriculi sinistri esse deberent 1 poll. 11½ lin. ergo fere 2 poll. vel 24 lin. Sunt autem circumferentia 8 linearum, et triplo igitur humanae ampliores sunt.

Subclauia sinistra in homine priori 1 poll. 1 lin. in posteriori 1 poll. 2 lin. Medium igitur subclauiae sinistreae.
poll. 1½ lin. Subclauia sinistra ergo in leone esse deberet 2 poll. 3½ lin. Est tantummodo 1 poll.

Aorta, postquam ramos maiores edidit, proxime post subclauiam sinistram in homine priori est 2 poll. 8 lin. in posteriori 2 poll. 11 lin. Medium 2 poll. 9½ lin. In leone igitur aorta in hoc loco esse deberet 5 poll. 11½ lin. ergo fere 6 poll. Est tantummodo 3 poll. 1 lin.

Aorta ubi perfecto arcu ad corpora vertebrarum dorsum se applicat et verticaliter descendere incipit, in homine priori 2 poll. 8 lin. in posteriori 2 poll. 11 lin. Medium 2 poll. 9½ lin. In leone igitur aorta in hoc loco esse deberet 5 poll. 11½ lin. ergo fere 6 poll. Est tantummodo 3 poll. 1 lin.

Q q q 3

2 poll.

2 poll. 6 lin. et circumferentia media igitur 2 poll. 7 lin. est. In leone igitur proportione ventriculi esse deberet 5 poll. $6\frac{1}{3}$ lin. Est 2 poll.

Aortae
prope dia-
phragma.

Aorta denique thoracica prope transitum per diaphragma in homine priori 2 poll. 6 lin. in posteriori nonnisi 2 poll. 2 lin. et circumferentia media 2 poll. 4 lin. est. Eadem ergo in leone esse deberet 4 poll. $11\frac{1}{2}$ lin. Ergo fere 5 poll. Et nonnisi 1 poll. 9 lin. inuenitur.

Et partis
prioris ar-
cus aortae
ad ventr.
fin. ratio-
nes ut sint
ad huma-
nas.

Cacterum Aortae in media parte inter cor et egressum maiorum ramorum, ubi in leone, uti in homine, amplior est, nec non proxime ante egressum eorundem, ubi iterum angustior redditur eandem fere erga ventriculum rationem habet, quam in ipso principio et proxime post edita vasa maiora. Nimirum in parte media inter cor et egressum vasorum circumferentiam aortae mediam in hominibus reperi 3 poll. 4 lin. In leone igitur esse deberet 7 poll. $1\frac{5}{3}$ lin. et inuenitur 3 poll. 10 lin. Proxime autem ante vasa maiora in hominibus circumferentia aortae est 3 poll. 1 lin. In leone esse deberet 6 poll. $6\frac{1}{2}$ lin. et inuenitur 3 poll. $6\frac{1}{2}$ lin.

Arteriae
pulmona-
lis trunci.

Denique arteria pulmonalis in homine priori 2 poll. 10 lin. est. In leone igitur, si in eadem, quam in homine priori erga ventriculum dextrum ratione esset, esse deberet 5 poll. $3\frac{1}{4}$ lin. Est 3 poll. 4 lin.

Arteriae
pul. dex-
trae.

Arteria pulmonalis dextra in homine priori 2 poll. 2 lin. In leone proportionem ventriculi dextri esse deberet 4 poll. $\frac{1}{2}$ lin. Est 2 poll.

Arte-

Arteria pulmonalis sinistra in homine priori
 2 poll. 4 lin. In leone ad hanc normam esse
 deberet 4 poll. 3 $\frac{1}{2}$ lin. Est 1 poll. 10. lin.

et sinistrae
 ad ventri-
 cul. dextr.
 rationes
 vti sint ad
 humanas.
 Arteriae
 proportio-
 ne ventri-
 culorum
 et rami
 proportio-
 ne trunco-
 rum in
 leone mi-
 nores sunt
 quam in
 homine.

Ex his igitur patet, truncos arteriarum, in
 comparatione ad humanam structuram, proportionem
 ventriculorum suorum valde paruos, sed ramos ipsis
 truncis tamen minores esse respectu eodem, et sic
 continuo decrescere. Aorta in leone primo quidem,
 et eo usque, donec maiores ramos dedit, in eadem
 fere continuo ratione manet erga aortam humanam.
 Nimirum dimidio fere illa proportionem ventriculi
 sui, quam in homine minor est. Tum vero ab
 hoc termino eius ratio erga humanam aortam evi-
 denter decrescit, tam in sui ipsius continuatione,
 quam etiam in ramis a se editis. Quum enim hacten-
 us aorta leonis ad humanam proportionem ventriculi
 sui fuerit paulo maior quam 1:2; nimirum in
 primo principio ut 1:(2 - $\frac{1}{12}$) in media inter prin-
 cipium et ramos maiores parte ut 1:(2 - $\frac{1}{6}$) proxime
 ante ramos maiores ut 1:(2 - $\frac{1}{3}$) et proxime post
 ramos maiores editos ut 1:(2 - $\frac{1}{4}$); nunc incipit
 plus quam dimidio aortam humanam minor esse. Nam
 ubi ad columnam vertebrarum primum se applicat,
 est uti 1:2 $\frac{1}{2}$. prope diaphragma autem ut 1:2 $\frac{1}{2}$.
 Atque idem de ramis aortae proximis quoque
 valet, qui itidem dimidio humanorum minores
 sunt. Nam subclavia dextra ad eandem arteriam
 hominis est ut 1:2 $\frac{1}{2}$; subclavia sinistra ut 1:2 $\frac{1}{2}$; et
 carotides adeo fere sunt ut 1:3. Arteria autem
 pulmo-

pulmonalis truncus, ad eandem arteriam in homine proportionem ventriculi sui dextri est uti 1:1 $\frac{1}{2}$. Sed eius ramus dexter ut 1:2 et sinister adeo ut 1:2 $\frac{1}{2}$. Probabile igitur est, idem vasorum decrementum continuatum iri porro per succedentes ramificationes adeo, ut in ordinibus ultimis, in decimo quinto, decimo sexto vel septimo, nam usque ad viginti et triginta eiusmodi ramorum diuisiones in homine numerari solent, vascula decuplo quoque, vel partibus decimis nouem quam in homine proportionem ventriculi sinistri minora sint. Quum autem ultima vascula in animalibus nonnisi vnus globuli sanguinis capacia esse soleant; necesse est, ut pauciores in leone, quam in homine et in aliis animalibus, ramorum diuisiones dentur, et citius itaque a corde ad ultima vasa perueniatur.

Celeritas
motus san-
guinis in
leone
comparata
cum cele-
ritate, qua
sanguis in
homine
mouetur.

Si ita igitur arteriae in leone inter se et ad ventriculos suos se habent, necesse est, ut celeritas, qua sanguis per arterias mouetur, longe maior sit in leone quam in homine et in aliis animalibus. Nam si ad solam circumferentiam ventriculi sinistri respicias cuius proportionem circumferentia primae aortae in leone dimidio fere quam in homine minor est; lumen primae aortae proportionem luminis ventriculi quadruplo in leone minus erit quam in homine. Consequenter eadem sanguinis, quem ventriculus continet, portio, quae certam aortae partem occupat in homine, quatuor eiusmodi partes occupabit in leone, adeoque per spatium quadruplo longius movebitur tempore eodem, et quadruplo igitur celerius moue-

mouebitur. Iam vero longitudo quoque ventriculi in considerationem venire debet, quae aequae ac circumferentia in leone maior quam in homine est. Nam ventriculus qualibet sui contractione systolica, quae quidem momentanea est, et in leone igitur, quamuis ventriculus longior sit non plus temporis requirit, quam in homine, omnem suum sanguinem in aortam expellit. Adeoque ad celeritatem sanguinis in leone comparandam cum celeritate sanguinis in homine requiretur, ut lumina vasorum non ex sui ad lumen ventriculi, sed ad capacitatem eiusdem ratione aestimentur. Et celeritates in utroque animali erunt in ratione inversa luminum arteriarum, divisorum per capacitates ventriculorum suorum. Quibus pro his celeritatibus ratio efficitur $5 \frac{1}{2} : 1$, et sexcuplo igitur fere celerius sanguis in leone quam in homine movebitur per priorem aortam. Vnde haec modo colligo, non nimium esse, si dixerim, quadruplo celerius in leone quam in homine et in aliis animalibus sanguinem moveri in aorta priori, in ea nempe eius parte, quae citra ramos est; noncuplo vero celerius in ramis secundi vel tertii ordinis, quorum, veluti carotidum peripheriae triplo et lumina igitur noncuplo quam in homine minora sunt; denique centuplo celerius sanguinem meare, ubi ad ramos decimos quintos pervenerit, quorum peripheriae decuplo et lumina centuplo in leone quam in homine minora sunt, et quos ultimos esse posuimus, quamuis in homine ad viginti et triginta usque eiusmodi divisiones facile numerentur.

Torn. XVI. Nou. Comm.

R r r

Hinc

Metus sanguinis qui in arteriis continuo retardatur in homine, in leone potius accelerari videtur.

Hinc sequitur porro, cum sanguis in homine quo magis in systemate vasorum progreditur, eo magis quoque in suo motu retardetur, ob lumina ramorum, qui ex trunco quouis oriuntur, coniuncta, semper maiora lumine trunci; in leone hanc, retardationem vel longe minorem, vel plane nullam esse. Prius quam menturam instituimus, monere oportet, aortam proxime post ramos maiores editos, ubi incipit una cum subclaviis et carotidibus ramum aortae prioris referre primo ampliorem esse deinde successive angustiores fieri sine novis ramis productis; veluti ex mensuris supra datis apparet, quae docent, prope subclaviam hanc aortam esse in ambitu suo 3 poll 1 lin. prope vertebrae autem ante editam primam intercostalem 2 poll. Non oportet in colligendis luminibus ramorum metiri hanc aortam prope subclaviam, ut facere solent in homine, ubi arteriae plerumque cylindricae, vel vix tamen conoideae sunt, sed prope intercostalem primam, ubi angustissima est. Nam quantum sub singulis divisionibus vel post singulas divisiones arteriae vel dilatentur vel angustentur, id scire nostra interest; siue hoc fiat ilico in ipso ramorum principio, siue sensim et ad finem eorundem usque, ubi in alios ramos diuidi incipiunt, hoc nihil refert. His itaque praemonitis, aortae primae, trunci, peripheria cum sit 3 poll. 6 lin. lumen erit 147 lin. Lumen subclaviae dextrae est 24 $\frac{1}{17}$ lin. carotidis dextrae 5 $\frac{1}{2}$, carotidis sinistrae 5 $\frac{1}{2}$, subclaviae sinistrae 12, et aortae dorsalis priusquam inter costalem primam edit 48 lin.

Summa

circumferentia arteriae innominatae nonnisi 18 lin. est. Lumen igitur 27 lin. idemque coniunctum cum luminibus subclaviae sinistrae et aortae dorsalis 87 lin. ad lumen trunci aortae erit ut 87:147. vel 1:(1 $\frac{1}{2}$ + $\frac{1}{11}$) Ergo neque hoc exemplum prioribus contrarium est. Quodsi eadem igitur ramorum ad truncos ratio in sequentibus quoque arteriarum divisionibus, quas non metitus sum, obtineret, quod autem non probabile, quin potius impossibile videretur, acceleratio inde enormis eveniret, et celeritas vix imaginabilis in ultimis ramis. Interim hoc modo colligamus sanguinem in leone non retardari sed accelerari potius, saltem in ramis, qui non ad minimos pertinent. Quod variationes attingit, quae in variis leonum subiectis obtinere possunt, uti in subiectis humanis obtinent, eas non negaverim. Sed eo usque se extendere posse has variationes, ut qui rami in vno leone ad suum truncum sunt uti 1:1 $\frac{1}{2}$ in altero maiores sint hoc trunco, id minime credibile est; cum eiusmodi variationes in homine, ubi experimenta reiterata exstant, nunquam inventae sint, neque natura animalis eadem maneret, si structura corporis adeo usque variaret. Neque quidquam contra hanc accelerationem posse, quae inter causas retardantes a physiologis numerari solent, affricum sanguinis, resistantiam arteriarum etc. facile intelligitur. Nam dummodo rami coniuncti suo trunco minores sunt, absolute necessarium est, ut, quanto minores sunt, tanto in iis fluidum celerius moueatur, aut omnis motus plane supprimatur.

Cac-

27

Caeterum nullum dubium est, quin enormis celeritas, qua sanguis in leone mouetur, magnum influxum sibi vindicet in oeconomiam vitalem huius animalis, in eiusque naturam et attributa. Inter multos effectus, qui motui sanguinis debentur, paucorum tantummodo mentionem faciam, qui magis ad scopum nostrum spectant.

De effectibus, quos haec celeritas sanguinis in leone producit.

Communis experientia docet, tempore aestivo, quin vasa corporis nostri, praecipue quae exterioriorem eius superficiem occupant, a calore dilatantur, adeoque motus sanguinis retardatur, lassitudinem non modo in corpore et ineptitudinem ad motus exercendos, sed veram quoque debilitatem sentiri; cum contra vel modico frigore constrictis cute et vasis, vel spirituosius assumptis, vel alia quacunque causa, qua sanguinis motus expeditior et celerior redditur, admissa, agilitas in corpore oritur et alacritas. Denique vinculo arteria artus constricta, quominus sanguis ad artum affluere possit, artus primum debilitatur, deinde vera paralyssis eiusdem consequitur. Patet igitur, a celeriori et expeditiori affluxu sanguinis robur partibus et agilitatem, alacritatemque toti corpori conciliari. Haec agilitas in leone, uti in felle observatur. Simili cum impetu ille in praedam insilit, et dum incedit, dum se movet, facilitas in motibus producendis ubique elucet.

Robur corporis, agilitas, alacritas.

Deinde in ipsas animi virtutes haec celeritas sanguinis influxum habere videtur. Praeterquam

Audacia et atrocitas leonis.

R r r 3

quod

quod agilitatem illam et lenitatem corporis confidentiam aliquam in nobis producere experiamur, immo quandoque audaciam; in febribus acutis quoque deliria, furores et saepe immensum robur oriuntur a nulla alia causa, nisi a nimia rapiditate, qua sanguis in partes corporis, praecipue in cerebrum impellitur. Nam coercito sanguinis impetu per venae sectionem, vel deriuato tantummodo sanguine a cerebro, diliria et furores cessant. Audaciam itaque leonis, qua non mediocri gaudet, et ferocitatem atrocitatemque ex parte a celeri hoc sanguinis motu pendere existimo; et memorabile omnino est, ipsas carotides, primarias arterias cerebri, adeo insigniter et prae aliis arteriis angustas esse.

Tab. XI.

Fig. 1.

- a. b. c. d. e.* Pericardium sanguine distentum.
a. Vertex inferior acutior.
b. Vertex superior obtusior.
c. Pars anterior, sterni contigua.
d. Pars posterior, vertebrae incumbens.
e. Appendix pericardii, qua prima aorta et pars arteriae innominatae inuoluuntur.
f. f. Adeps sub tunica exteriori laxa collectus.
g. g. Membrana tenuis, reticularis, qua pericardium diaphragmati adnectitur.
h. Arteria innominata.
i. Arteria subclauia dextra.
k. Carotis dextra. *l.* Sinistra.

m. Sub-

- m.* Subclauia sinistra.
- n.* Aorta dorsalis, ab inflato pericardio antrorsum protracta.
- o.* Vena caua superior.
- p.* Vena subclauia dextra. *q.* Sinistra.
- r.* Iugularis sinistra.
- s.* Axillaris sinistra.
- t.* Arteria pulmonalis sinistra.
- u.* Vena pulmonalis sinistra.
- v. w.* Rami arteriae pulmonalis sinistrae.
- x. z.* Rami venae pulmonalis sinistrae.
- A. B. C.* Pulmo sinister. *A.* Lobus medius.
- B.* Pars lobi superioris, deorsum flexi.
- C.* Lobus inferior.
- D.* Pulmo dexter. *E.* Diuisio carotidis sinistrae.
- F — N.* Larynx. *F. G. H. I. K.* Cartilago thyreoidea.
- F.* Pars, quae refert alam sinistram cartilaginis humanae.
- G.* Pars, quae refert cornu inferius, cricoideam complectens.
- H.* Alae dextrae pars.
- I.* Cornu superius sinistrum.
- K.* Apex huius cartilaginis.
- L. L.* Interstitia repleta a musculis cricothyreoideis.
- M.* Ligamentum cricothyreoideum.
- N.* Cartilago cricoidea.
- O. P. Q.* Aspera arteria.
- O.* Annuli cartilaginei, (qui non integri sunt) exteriores.

P. In-

- P. Interiores, quibus exteriores squamatim incumbunt, ut vix inter annulos interstitium membranaceum in parte tracheae anteriori detegatur.
- Q. Extremitates annulorum latiores, et quae saepe connatae sunt

Tab. XII.

Fig. 2.

- a. Cor. Eius superficies anterior plana rugis transversalibus; distinctione ventriculorum nulla conspicua.
- b. Apex obtusus.
- c. Excrescentia praeternaturalis.
- d. Auricula sinistra. e. Dextra. Utraque minima.
- f. Vena caua superior.
- g. Vena subclauia dextra. h. Sinistra.
- i. Aorta prima, quae bulbum efficit.
- k. Arteria innominata, f. truncus communis.
- l. Arteria subclauia dextra.
- m. Carotis dextra. n. Sinistra.
- o. Subclauia sinistra.
- p. Aorta descendens.
- q. Aorta prope diaphragma resecta.
- r. Lobus pulmonis dextri superior.
- s. t. Medius in duos subdivisus. v. Inferior.
- w. Pulmonis sinistri lobus superior.
- x. Medius. y. Inferior.
- z. Truncus arteriae pulmonalis.
- A. Arteria pulmonalis sinistra.
- B. C. Eius rami.

D. Ar-

- D.* Arteria pulmonalis dextra. *E. F.* Eius rami.
G. H. Venae pulmonales dextri lateris.
I. Vena pulmonalis sinistra.
K. vsque ad *Q.* Larynx. *K. N.* Cartilago thyreoidea.
K. Pars, quae alae sinistrae respondet.
L. Eadem pars dextri lateris.
M. Apex, in quo partes laterales coniunguntur.
N. Pars, quae cornu inferius refert.
O. Cornu superius sinistri lateris.
P. Foraminulum pro vasis nutrientibus.
Q. Cartilago cricoidea.
R. Ligamentum cricothyreoideum.
S. S. Interstitia a musculis cricothyreoideis in statu integro repleta.
T. T. Annuli asperae arteriae cartilaginei exteriores, qui aliis interioribus, praecipue in extremitatibus suis incumbunt.
V. Interiores semitecti.
W. Extremitates annulorum latiores.
X. Eadem concretae.
Z. Divisio carotidis.

Fig. 3.

Tab. XII.

Ventriculus cordis dexter apertus.

- a. b. c. d. e.* Ventriculus apertus. *a. b. c.* Pars parietis, ventriculi dextri, dissecti anterior reflexa.
a. d. e. Huius parietis dissecti pars posterior reflexa.
 Tom. XVI. Nou. Comm. S s s a. c.

- a. c.* Linea, qua paries in parte anteriori septo adhaeret.
- f.* Ventriculus cordis sinister integer.
- g. g.* Adeps, parieti, versus basin cordis externe adhaerens, vna cum pariete dissectus.
- b. b.* Paries carnosus ventriculi dextri dissectus, vbi crassior est.
- i. i. a.* Idem paries, vbi tenuior est.
- k. l.* Fasciculi musculares, a septo in parietem transeuntes.
- m.* Septum, eiusque pars anterior.
- n.* Foraminula caeca.
- o.* Papilla carnea septi, ex qua filamentum in valuulam venosam ducitur.
- p.* Lacertus carneus, qui in partem valuulae anteriorem transit, totumque huius partis latus dextrum occupat.
- p. p.* Alter eiusmodi fasciculus carnosus, qui in partem valuulae venosae posteriorem transit.
- q. q. q.* Radices horum fasciculorum, quibus ex pariete ventriculi oriuntur.
- r.* Anastomosis horum fasciculorum.
- s. s. s.* Columnae carnosae planiores et debiliores.
- t. t.* Foucolae.
- v.* Pars valuulae orificii venosi anterior, sursum flexa, vt orificium venosum et pars posterior huius valuulae *D.* appareat. Pars eiusdem valuulae sinisterior retro septum latet.
- w. w.* Filamenta huius partis valuulae, a musculo *p.* producta.

x. In-

- x. Interstitia inter haec filamenta, quasi foramina valvulae.
- z. Minora ejusmodi foraminula.
- A. Foraminula triangularia.
- B. Filamentum a papilla o. productum.
- C. C. Filamenta retro septum orta.
- D. Pars valvulae venosae posterior.
- E. Pars valvulae huius, fere annularis, media inter portionem anteriorem et posteriorem.
- F. Filamenta huius partis posterioris a musculo p p. producta.
- G. Pars valvulae venosae, quae carni cordis adhaeret, et orificium venosum inuestit.
- G. H. Orificium venosum. H. Aditus in auriculam dextram.
- I. K. Valvula semilunaris anterior dissecta.
- L. Valvula semilunaris in orificii arteriosi parte dextra sita.
- M. Valvula parti sinistrae huius orificii adhaerens.
- N. N. N. Bases harum valvularum vel latera convexa, quibus parieti orificii adhaerent.
- O. O. Margines earum liberi.
- P. P. Sinus inter valvulas et arteriae parietem intercepti, quo loco arteria etiam paulo amplior est, vnde sinus augentur.
- Q. Q. In hoc loco arteria paulo constrictior est, et externe primum ex corde emergit.
- R. R. R. Tubercula siue noduli callosi, in quibus extremitates valvularum conueniunt.
- S. Truncus arteriae pulmonalis dissectus.

T. Arteria pulmonalis dextra.

V. Sinistra.

Tab. XIII.

Fig. 4.

Ventriculus cordis sinister apertus.

- a. b. Linea, qua paries ventriculi sinistri cum septe coniungitur.
- a. b. d. Pariet cordis posterior seu ventriculi sinistri.
- a. b. c. Septum vna cum ventriculo dextro reflexum.
- c. d. Adeps, qui parieti ventriculi sinistri versus basin externe incumbit, dissectus.
- e. e. Carnosa substantia ventriculi sinistri, vbi minus crassa.
- f. f. Eadem vbi crassior est.
- g. g. Eadem vbi tenuior.
- h. Septum cordis concavum.
- i. k. Fasciculi musculosi planiores, septe adnati.
- l. Crassior fasciculus musculosus, sed planior itidem, quo ventriculi orificium arteriosum, tanquam sphinctere constringi potest.
- m. n. Foramina caeca.
- o. p. p. Crassus musculus, qui solus fere totam partem posteriorem valvulae venosae suis filamentis occupat, compositus ex duabus partibus o et p p, connatis.

q. q.

- q. q.* Fasciculi , parieti ventriculi immissi.
- r.* Filamentum singulare huius musculi ramosum septo immissum.
- s. s. t. v.* Filamenta huius musculi in partem posteriorem valvulae venosae inserta.
- w.* Alius musculus valvulae venosae.
- x. z.* Eius filamenta in partem anteriorem valvulae inserta.
- A. B.* Tertius valvulae musculus filamentis suis partim in anteriorem partim in posteriorem valvulae partem insertus.
- C. C.* Filamenta eius in partem anteriorem.
- D.* Filamenta in partem posteriorem.
- E.* Valvula orificiū venosū, eius quidem pars anterior.
- F.* Pars posterior; quae partes valvulae mitrales vocari solent.
- G. G.* Valvula semilunaris sinisterior dissecta.
- H.* Valvula semilunaris, quae anterior et dexterior est.
- I.* Valvula semilunaris posterior.
- K. K. K.* Bases valvularum semilunarium, quibus cordi adhaerent.
- L. L.* Margines earundem liberi.
- M. M.* Sinus inter valvulas et parietem aortae intercepti.

N. Orificium arteriae coronariae dextrae.

O. Orificium arteriae coronariae sinistrum.

P. P. Locus, ubi aorta intus prominet, et quasi paulum constricta est.

Q. Tubercula, in quibus extremitates valvularum coniunguntur.

R. Cavitās aortae apertae.

S. Truncus aortae.

T. Arteria innominata.

V. Subclavia sinistra.

W. Aorta descendens.

• Adiunxi pollicem, quo in mensuris usus sum.

OBSERVATIONES
 SPLANCHNOLOGICAE,
 AD ACIPENSERIS RUTHENI LINN. ANA-
 TOMEN SPECTANTES.

Auctore

I. T. KOELREYTER.

Cum Petropoli olim in Acipenseris Russici anatomia essem occupatus, structuram variorum eius organorum ac viscerum non modo plane singularem ac mirabilem, sed non paucis etiam momentis a consuetis aliorum piscium conformatione multum diuersam esse, euidenter cognoui; quae, cum digna mihi visa fuerint, vt orbi literato communi-centur, in praesenti dissertatione observationes istas splanchnologicas qualescunque, Anatomiae, quam comparatam vocant, amplificandae causa potissimum institutas, *Illustrissimae* offerre *Academiae*, easque partim copiosiori sermone, partim mera ac succincta figuram explicatione, prosequi, nunc mihi constitutum est.

Anatome

Acipenseris Rutheni, die 15 Ian. MDCCCLIX,
 Petropoli instituta.

Hepar griseum, punctis obscurioribus conspersum, in duodecim lobos erat diuisum quorum septem
 dextra

quinque sinistram eius portionem constituebant. Illorum primus infra summitatem dextrae portionis oblongam et subacutam occurrit parallelogramus fere, planiusculus, latere exteriori, quo fellis vesiculam lambit, concavo carinatus, ac, quamvis eidem nulli adhaereat, flauo tamen bilis colore tinctus. Continuatur vterius infra hunc hepatis substantia, ac incumbentem ventriculi summitatem excipit. Facie exteriori eadem portio lateri vesiculae interno arcte adnata est, cum e contrario continuata pariter, illique aduersa hepatis substantiae portio externum eius latus interna seu concava sua facie, absque omni nexu, cingat, colore flauo pariter imbuta. Secundus lobus, subtriangularis, superficie sua interna in duas quasi laminas diuisus, quarum superior, angustior, inferum vesiculae latus tangit, flauedine iade etiam tincta, inferior autem, latior, exterioris ventriculi lateris partem lambit, coloris hepatis naturalis. Tertius planiusculus, antecae pylori regioni libere incumbit, ipsumque inferius excipit. Quartus subulatus, tenuis, duodeni principio, et quidem lateri eius externo, absque nexu, applicatus. Quintus et infimus situ, satis magnus, longus, suberiquetrus ac leuiter acuminatus, partim sub externo, partim sub postico duodeni latere collocatus. Duo adhuc supersunt dextrae portionis lobi, piscis dorsum respicientes, ac oesophago substrati; quorum inferior sextus, maior, tenuis, figura irregularis; septimus denique, sub sexto fere totus reconditur; eodemque situ parum superior, minimus, ac fere subulatus est.

est. Inter eos lobos, qui ad sinistram hepatis portionem pertinent, primus, summitatis huius visceris oblongae pariter et subacutae continuatio, e lato sensim angustior factus, illorumque primo, sibi adverso ex altero latere, longe maior, super oesophagi ventriculum subeuntis, portionem superiorem, ipsamque ventriculi summitatem in transuersum maxime extenditur. Secundus, longe infra hunc, acumina-
tus, extremitate sua pancreas sic dictum attingit. Tertius, et quartus sub secundo, oesophagi curuaturae interpositi, parui: ille quidem acutus, planiusculus et brevis, hic vero planus, fere circularis, obtusus, istoque maior. Quintus tandem, ac omnium vltimus, duplex, irregularis formae, anterieus inter pancreas, ventriculi latus internum et oesophagi finem, in transuersum situs est. Sunt equidem praeter hos omnes pauci adhuc lobuli, inter posticam summitatis duodeni faciem et oesophagi curuaturam reconditi, quos vero, quia minores sunt momenti, sicco pede nunc transibimus. Id tamen praeterire nolumus, quod eodem curuaturae huic membrana mediante duplicata, qua plurima vasa sanguine turgida, tam ex infimis hepatis lobis, quam ex oesophagi, lienis, pancreatis, ventriculique superficie prouenientia, sustentantur, annexos viderimus. Aperto horum communi maiori, interno duodeni lateri, infra pancreas, adnato, experti sumus, aere sursum inflato non tantum omnia mox dicta vasa, sed ipsum etiam hepar intumuisse. Vasa haec, pro arteriis procul dubio habenda, per paria

fere semper incedunt, venulaeque ramulum, ex lienali vena ortum, singula eorum includunt. Latus ventriculi internum, conuexaque inprimis pancreatis facies utroque horum vasorum genere satis copiose instruuntur, eorumque ope arctissimo cum hepate nexu coniunguntur.

Vesicula fellea oblonga, bile repleta, substantiae solito crassioris, *ductum cysticum* manifestum ex inferiore sua extremitate oblique deorsum ac sinistrorsum emittit, in concava seu interna hepatis superficie, et quidem inter ipsum huius visceris corpus ac secundum dextri lateris lobum, nudum fere decurrentem, et ventriculi faciei posticae obuersum. Oesophagi tractus ascendens, ventriculum tandem subiens, ligamenti lati ope, e diaphragmate ac concava, eaque media hepatis superficie producti, ipsi hepati adhaeret, ventriculus vero nusquam, nisi circa posticam et lateralem pylori faciem, eidem arcte, affigitur.

Si *oesophagus* quoad externam faciem a ventriculo, qui ovatus, crassus, ac auium graniuorum ventriculo similis est, dignoscere velimus: omnem illum tractum, tam a diaphragmate, pone hepatis posticam, eamque conuexam partem, descendentem, quam etiam ascendentem, qui iuxta duodenum et pancreas est, illius nomine insignire debemus. Sin vero eius limites ex interna facie, eoque ad aliorum piscium analogiam, determinare nobis placeat: eiusdem tractus, et quidem descendentis

dentis superiorem et plusquam dimidiam partem, ob diversam omnino tam a reliqua ipsius portione, quam ab ascendente structuram, priorem oesophagum posteriorem vero ventriculum vocare oportet. Illius enim, superioris sc. partis interior superficies papillis planiusculis, subtriangularibus, magnis, deorsumque dependentibus, vndique instructa, huius vero omnis glaberrima, rugisque longitudinalibus, plus minusve eudentibus notata est; qua in re cum aliorum piscium ventriculo convenire quodammodo videtur, cum ista, oesophagi sc. proprie sic dicti portio, terminis suis ab insequente optime distinguenda, ob papillas partim etiam, quod prior et ab altera diversae omnino sit structurae, oesophagi nomen potius mereatur. At enim vero, si quis hanc admittere velit distinctionem, non videmus, quo nomine ovata ista et musculosa valde pars, quam ventriculum supra diximus, vocari possit. Mallemus itaque omnem illum a faucibus inde ad ovatam usque et carnosam partem protensum canalem, structura quamlibet diversum, oesophagum, ovatam vero ventriculum nuncupare. Posset etiam papillata et albida huius canalis pars ingluvies, lacuis vero proprio oesophagus dici. Papillae istae, e lata basi in acumen abeunt, quo summitati propiores, eo minores sunt interdum etiam, praesertim maiores, vno alterove denticulo quasi incisae et auctae vidimus. Infimas earum, ad quinque circiter lineas usque, rugae comitantur longitudinales, illis alterius portionis longe minores ac copiosiores. Lacuis oesophagi descendente portio,

portio, fere in medio, summitatem tamen suam propius aliquantum, quam curvaturam, *duffum aereum* spatulo ore recipit. Longitudo oesophagi descendens tractus 6" erat, eorumque papillata portio 3" lacus 2½" absoluebat; tractus ascendens, lacus vero 4" exaequabat. Interior huius superficies exalbida est, rugisque prominentioribus, imprimis curvaturam versus, minusque interruptis, longitudinalibus distincta angustior quoque parum descendente tractu. Ceterum annotari meretur, externam oesophagi, ventriculi, duodeni ac pancreatis superficiem colore e pallide purpureo nigricante, qualem etiam in Polypo octopodio Arist. olim vidimus, fuisse tinctam.

Ventriculus tactu durus, musculosus valde, tam quoad formam, quam quoad substantiam, ut supra iam monuimus, cum auium graniuorum ventriculo satis conuenit. Hoc secundum longitudinem, mediamque conuexae faciei partem dissecto, crassitiem substantiae eius musculosae maximam, in medio, septem circiter exaequare lineas, ac oesophagum versus magis, duodenum versus minus deoescere sensim, ipsamque substantiam fibrillis tendiosis, albicantibus, tenuissimis, ac ut plurimum longitudinalibus, omnique per textam esse vidimus. Interior ventriculi tunica, musculosae substrata, albicans, 1/3" crassa et lacis, sinus tres notabiles longitudinales, duosque aggeres quasi, superius diuisos, inferius coniunctos, eiusdemque cum sinibus directionis, alternatim efformat. Ipsa ventriculi cavitae

valde

valde mediocris. Pylorum interior eius tunica parum prolongata constituit.

Duodenum teres atque durum, si secundum longitudinem dissectetur, duplicem potissimum substantiam exhibet, exteriorem musculosam (an vasculosam potius vocare convenit?) diametri 2¹/₂''; fibrillisque tendinosis, minus licet, quam in ventriculo manifestis, tenuissimis, albicantibus, hinc et inde varioque modo in transversum excurrentibus distinctam; interiorem glandulosam, crassitie paulo inferiorem et ex ruffo albicantem. Ipsa autem interior huius intestini superficies innumeris foveis, quarum maiores reliquis proxime sub pyloro occurrant, expressa et reticulata veluti apparet. Foveae hae in substantiae glandulosae profundum ducunt, ac persilatu singulae; cellularum sub specie, intumescunt.

Pancreatis glandula, figurae quodammodo reniformis, antica facie plana, postica convexa, marginis arcuato libero, octo circiter crenis inaequalibus, obtusis, leuiter inciso, interiore rectiore, ad dimidiam, eamque inferiorem partem, libero, ad alteram superiorem duodeni summitati, eiusdemque sinistro lateri arte adnato. Longitudo eius 1¹/₂'' 8¹/₂''; latitudo 1¹/₂'' 1¹/₂''; crassities autem maxima, ab exteriore, sc. crenato margine interiorem versus sensim aucta, 7¹/₂'' aequabat. Ad detegendam interiorem huius glandulae conformationem, sectione per arcuati marginis medium facta, eam in duo quasi hemisphaeria diuidebamus, eodem modo, quo alias, ad

monstrandos ductus vrilarios, renes solent incidere anatomici, et ecce, compaſſunt quoque ſtructuræ, præter opinionem renum ſimillima. Subſtantia enim exterior, quaſi corticalis, firma, vaſculoſa, coloris e ſurſuo cineritii, a duodeni exteriori non multum abludens, ac ad ſingulos crenarum angulos, e peripheria centrum verſus, in clauos quaſi alternatim longiores, linea in medio albicante notatos, ac inferius inter ſe inuicem convergentes producta; interior autem, omnisque ea, quæ inter clauos erat interpoſita, arcuatam pancreatis marginem verſus compreſſior, rectiorem verſus ſpongioſa magis, reticulata, ſoueoſisque ac cellulis eiſusmodi, quales in duodeno vidimus, prædita erat. In conſpectum inſimul quoque veniebant inter craſſiores clauorum extremitates ductus ſex ſeptemue pancreatici parciales, ſuccum ipſorum breuiſſima via in receptaculum commune, ſiſis anguſtum, quod proxime iſis ſubiacer, effundentes. Tota autem tam receptaculi, quam ductuum horum, qui non niſi illius veluti ſtatibula ſunt, interior ſuperſicies reticulata pariter, ſoueoſisque ac celluſis apertis, inſtructa. Inde tandem liquor pancreaticus, a ductu excretorio communis breuiſſimo & ampliſſimo exceptus, ad pylori valvulam, in ſiniſtrum principii duodeni ſatus pronotus effluit. Ex modo data pancreatis huius deſcriptione patebit, falli eos vehementer, qui illud pro glandula conglomerata velint agnoſcere; nec conglomerata melius diceretur, quod plures vno habeat ductus in cavitare ſua excretorios. Glandulae

vero

vero vicibus illud fungi, nemo inficiabitur, licet structuram eius aliarum glandularum structurae minus convenientem videat. Pari etiam ratione de flurionis duodeno iudicandum esse censemus, cuius interior substantia humorem quendam, pancreatico analogum secernit, quamvis glandulae distinctae in ea nusquam appareant. Non admodum rara est haec structura, sed pluribus certe piscibus communis.

Quod ad *vasa biliaria* attinet; ductus notabilis hepaticus, substantia hepatis vndique obiectus, sub lobi dextri primi basi, versus posticam, eamque mediam, felleae vesiculae faciem flectitur, inde vero cum eadem tunicarum ope arcte coniunctus, cursu descendit parallelo, tandemque trium linearum distantia ab eiusdem collo cystico ductui inferitur. Iunguntur eidem, proxime ad ipsius insertionem, duo alii, directe fere sibi inuicem oppositi, alter, e continuata sub primo dextri lateris lobo substantia ortus, descendens, alter ex imo ascendens, anguloque acutissimo ac communi cum priori ostio cysticum subeunt. Praeter hos duo alii adhuc adsunt hepatici ductus, quorum vnus, e dextrae hepatis portionis summitate ortus, satis amplus, et hepatica substantia vndique pariter obiectus, median-tibus tunicis, cholidocho communi sub angulo valde acuto adnectitur, eique decem linearum distantia a pyloro immittitur; alter vero, praecedenti brevior et angustior, e sinistra hepatis portione proveniens, cholidocho, iuxta ingressum eius in intestinum, inferitur. Ductus hic ipse communis mox infra

infra quinti huius hepatici insertionem, facta prius aliqua inflexione, inter pylori valvulam summumque duodeni marginem, idem intrat, illiusque ad oram posticam sub papillae albicansis specie, orificioque angustissimo, intus prominet. Ceterum internam omnem vasorum horum biliariorum superficiem laevem atque politam, nec nisi ad ductus hepatici quinti ostium foraminula nonnulla caeca, quae valvularum forte vices genere possunt, observavimus. Ductus hepatico-cystici omnino nulli. Reliqua, quae ad aliorum organorum structuram spectant, ex sequenti figurarum explicatione petenda.

Explicatio Figurarum
naturali magnitudine delineatarum.

Tab. XIV. Fig. I.

Cor, cum annexis sibi partibus, postica facie expositum.

A. Cor.

B. Bulbus Aortae, obscure rubens, non albicans ut alias esse solet, nec aortae continuatus, sed propriis limitibus circumscriptus, ac tam substantia, quam colore cordi succenturiato externe similis.

C. C. C. Auricula cordis triloba.

D. Trun-

- D. Truncus venosus, ex venae cauae superioris ac inferioris coniunctione ortus. *d.* Auriculae species, ei adnexa; an sanguinis recessus aut diueticulum?
- E. Ostium canalis, diaphragma perforantis, venosum, trunci venosi ostio angustius.
- F. Ostium canalis venosi, diaphragma perforantis, maius.
- G. Sinus venosus, siue receptaculum Verneianum, confluxu trunci D, canaliumque venosorum E et F oriundum.
- H. Aorta.
- a. Lobulus oblongus, membranaceus, tenuior, bulbo adnatus.
- β. Lobulus duriusculus, ex altero latere bulbi basi affixus, minor, bulbo ipso parum pallidior.
- γ. Lobulus duriusculus, alterius lateris, bulbi basi affixus, maior, eiusdem coloris, ac prior.
- δ. Sacculus auriculae trilobae.
- ε—ε. Lobuli vel prominentiores, vel cordi profundius immersi.
- ζ. ζ. ζ. Venulae, diaphragmate in cor abeuntes.
Obs. Aere, siue per aortam, siue per venarum atrium impulsio, tam auricula et cor, quam aorta etiam, semper simul intumescunt; valularum itaque praesentia effectum hunc impedire nequit.

Fig. 2.

Truncus venosus (Fig. 1. D.) cum auricula sua (Fig. 1. d.) et canalis venosus, angustior (Fig. 1. E.) diaphragmaticus, dissecti, ut Receptaculi Verneiani interiora appareant.

- A. Ostium in Auriculam cordis patens.
- B. B. B. Trunci venosi et canalis diaphragmatici partes dissectae.
- C. Auriculae minoris, trunco venoso, sub sacculi specie, appensae, facies interior, reticulata, tendinosisque trabeculis instructa.
- E. F. G Auricula cordis triloba; ubi G sacculum Fig. 1. sub lit. δ insignitum, denotat.

Obs. Ad venae cauae superioris coniunctionem cum inferiore valvulae duae, sibi invicem oppositae, conspicuae occurrunt.

Fig. 3.

Trium auriculae cordis loborum facies interior.

- A. A. Ostium amplum, ex Auricula in cor.
- B. Vnus auriculae lobus (vid. Fig. 2. E.).
- C. Alter lobus sacciformis.
- D. Tertius lobus.

Fig. 4.

Cor secundum longitudinem dissectum, ut ventriculi interiora in conspectum veniant.

A. Pars

- A. Pars auriculae inferior, resecta.
- B. Cordis (quod inter corda vnius duorumque ventriculorum ambigit) cavitās C. ventriculi
- C. C. Substantiae cordis sectiones.
- D. Valvula cordis maior.
- E. Minor.
- F. Minima.
- G. G. Lobuli cordis dissecti facies interior, musculosa, reticulis hinc et inde lacertosis, lacunisque cordis instar, distincta.
- H. Locus, ad quem aditus e cordis cavitāte anteriore in posteriorem patet.

Fig. 5.

Cor (iterata sectione longitudinali, per alterum ipsius latus, sub angulo cum priore sectione acuto, et quidem secundum viam, e ventriculo in bulbum ducentem, facta) vna cum aortae bulbo et ipsa aorta apertum.

- A. Pars ventriculi alterius lateris, in Fig. 4. potissimum visa.
- B. Pars ventriculi huius lateris.
- C. C. Septum cordis dimidiatum, e columnis carneis constans.
- D. E. Substantiae cordis sectiones.
- F. Sectio substantiae cordis mediae ad E pertinentis.
- G. G. Lobulorum cordis dissectorum facies interior.

- H. Lobulus bulbi aortae minor (vid. Fig. 1. β).
- I. Valvularum quatuor, primaeque magnitudinis, ad bulbi insertionem siue basin occurrentium, infima series.
- K. Valvularum quatuor, secundae magnitudinis, media series.
- L. Valvularum quinque, tertiae magnitudinis, M. Bulbi aortae facies interior, laevis.
- N. Valvulae tres femilunares, ad aortae initium.
- O. Aortae facies interior:

Obs. Ex apparatu omnium harum valvularum tam singulari, quam artificioso euidenter patet, cor et aortam, non, vt in quadrupedibus vel aliis etiam piscibus alias fieri solet, contractione alterna, sed simultanea agi, ita, vt, si v. g. auricula et bulbus aortae in diastole versentur, systolem exercent synchronam, et vice versa.

DE
HERMAPHRODITO
AD SEXVM VIRILEM PERTINENTE.

Auctore

I. L E P E C H I N.

Casus obtulit, Illustres Academici observationem, quamvis non omnino novam, omni tamen attentione, ut mihi videtur, dignam: addit enim momentum ad supplendas quasdam observationes, et ad euertenda exinde deducta erronea placita (a).

Inter militiae designatos colonos venit iuuenis xx. annorum ex districtu Werchowafschesny (Сверховажеской уѣзды) qui lubenter conscribi cupiebat. Erat ille facie formosa, corpore procero et bene constituto. Ast dum ex institutis milites conscribendi nudus inspiciebatur, primo feriebat oculos mammae muliebres sat turgidae et duriusculae, papillae magis protuberantes, quam constitutio virilis postulabat et areoli amplior rubella. Hae notae, facies imberbis et vox feminea iam aliquid inconstueti portendebant: Bene reliquis partibus corporis consideratis, partes genitales producuntur in scenam. Coles curtus, imperforatus, scrotum supra basin membri-

V v v 3.

fir-

(a) Vid. Ephemerid. N. C. Att. 3. Obseruat. 27.

firmatum, et perinaeum quodammodo cauum facile persuadent chirurgis, virum illum et feminam esse. Ipsorum testimonio absolvitur forte militiam exercendi et remittitur ad penates.

Interim Illustrissimus *Georgius Andreaes de Goloffzyn*, Praetor militaris, Eques St. Annae et gubernator Archangelopolitanus, audita hac minus solita partium conformatione, iussit iuvenem ad me adduci, quam ego occasionem nactus, paucis externam partium descriptionem, addita ad vinum depicta icone absoluo.

Regio pubis erat turgida et eleuata vt in sexu femineo fieri solet; coles flaccidus duos pollices et tres lineas longus, sine coeco terminatus; praeputium ob defectum frenuli glandem non tegebat. Orificium vrethrae (A A) imperuium et incisura quasi notatum (a) inde secundum totam longitudinem colis inferiorem, vbi Natura vrethrae designauit locum, exaratus erat sulcus vsque ad basin colis. Hunc viae vrinariae defectum, adimplebat foraminulum, quo vrina emitti possit, loco prorsus inconstituto, nimirum ad superiorem perinaei partem (B), quod rimulae instar hiabat. Torus perinaei decursus erat cauus, quae cauitas adhaerente parte laterali scroti (d d) augebatur, ita vt obiter spectata imaginem partium naturalium foeminearum prae se ferret. Scrotum ipsum supra basin colis firmatum, nulloque septo intermedio distinctum duos succulos efformabat, qui praesentibus testiculis homineque erecto

erecto anteriora spectabant et ad latera disposita videbantur. Hic testiculorum lateralis situs aberrantis quoque Naturae industriam commonstrat; si enim scrotum saccum ad perpendicularum dependentem et continuum formaret, subiaceret omnino effluenti urinae, et ab ipsius acrimonia arroderetur.

Praemissa hac succincta partium naturalium enarratione non incommode, ut mihi videtur, tangi potest illa multoties agitata Philosophorum quaestio, unde *primordia novi animalis proveniant? num scil. ab utroque parente? an omnia ad patrem, an ad matrem referenda?* Ardua sane haec est quaestio, et an vsquam liquido demonstrari possit dubito; quamvis non est inficiendum probabilius videri veritatem a partibus prioris stare: nullum enim animal perfectum sine utriusque sexus commercio productum, et semper foetum mox patri, mox matri, mox utrique parenti similem procreatum constat; perpendamus interim et reliquarum sententiarum quaedam pondera. Ex illo tempore, quo vermiculi feminales per microscopiorum auxilia in semine masculo innotuerunt, omnia ad patrem referebantur; sed lepidam hanc observationem vermiculorum, et exinde deductam sententiam, multis argumentis eversam esse aliunde constat. Qui vero praerogativam hanc soli matri tribuunt sententiam suam propugnant praepriis istis viarum angustiis, quae ab utero per tubas fallopianas ad ovaria ducunt, et per quas semen masculinum utpote pigrum peruenire haud valet. Non minus

minus ponderis quoque se habere in exemplis a paritate penis prauaque ipsius cōformatione desumptis confidunt, quorsum et noster casus referendus esse videtur; impediretur enim iter semini ob aperturam loco minus idoneo factam, et in coitu per attritum ad parietes vaginae obturaretur omnino, nisi Natura in aberrationibus suis miraculum faceret, quod non sine magna animi voluptate hoc in casu cognoui. Non enim huic soli partium genitalium prauam formam induit Natura, sed et duo ipsius fratres par passu cum ipso ambularunt.

Hi itidem iussu Excellentissimi Domini Gubernatoris de *Golffzin* adducuntur in orbem. Alter ipsorum erat xxx. annos natus, et per decennium iam matrimonio iunctus, alter vero annum XXII agebat, et aute quinque annos vxorem duxit. Maior natu quatuor iam genuit perfectos liberos, quorum duo inter viuos, duo inter mortuos numerantur. Ex lumbis vero natu minoris, ob vxorem decrepitam nulli prodierunt liberi. Ceterum vterque erat simillimus fratri minimo natu. Nulla ipsis aderat barba, vbera, vox et facies muliebres. Partes genitales ad assem referebant iconem adpositam, hoc solo cum discrimine, quod omnia fuerunt flaccidiora prouti in castris veneris exercitatis contingere solet. Ex his iam miram illam ad procreandos liberos intellexi potentiam; illis enim dum erigitur coles, intumescit simul et apertura vrethrae (B), expandit que se secundum sulcum colis inferiorem vsque ad inci-

incisuram glandis (*a*), sic libera et commoda aperitur via semini eiaculato, quod eo fortius erumpit, quo magis per hanc elongationem orificium vrethrae ad extremitatem angustatur. His sub conditionibus facile attingit, orificium vteri, in coituque foecundo sua peragit officia. Vana igitur mihi videntur argumenta a mala conformatione penis deprompta, quibus sententiam suam defendere conantur illi, quibus omnia patri in formatione foetus denegare placet. Nullus enim dubito huius generis observationes non ex amussim enarratas, mirumque illum in observationibus Naturae mechanismum neglectum esse. Nostra porro observatione fretus et a paruitate penis deducta argumenta non magni momenti existimo; quid enim vetat et in his supponere validioris constitutionis musculos, quibus eiaculatio feminis adiuuatur, et vrethram ad orificium magis angustatam, ut mirum illum vteri descensum claris viris observatum taceam.

Seminis eruptio nostris non sine voluptate contingit, et cum quadam amoena pulsatione in glande. Praeterea sunt valde salaces et celerius ipsis excitatur voluptas; ast tempore pluvioso et lurido friget Venus; testiculi enim tunc retrahuntur in inguina, dolent et totum fatigant corpus, tempore vero sereno iterum in sacculos scroti delabuntur, pristinumque corpori reddunt vigorem. Vrina cito colligitur, citoque ob brevitatem vrethrae elabitur. Vires ipsis non femineae, sed masculae et ad exercendos colonorum labores aptae.

Tom. XVI. Nou. Comm.

X x x

Haec

Haec sunt illa, quae de nostris volui, potui. Non enim mihi introspicere licet internam partium structuram, mirumque illum in coitu mechanismum. Neque diuinare possum vnde vox, facies ac mammae muliebres, defectusque barbae proueniant. Non casu haec fiunt, sed ex praeternaturali partium genitalium conformatione deriuanda. Illam denique quaestionem, vnde tanta in tribus fratribus partium genitalium a via consueta aberratio, non meam facio; suppleant ipsam, si lubet, illi, quibus imaginatio felix omnia diuinare permittit. Id tandem monendum habeo parentes ipsorum bene formatos esse, produxisseque alios liberos vtriusque sexus, nullo defectu, nullaque peruerfa conformatione laborantes.

SALMO LEVCICHTHYS
ET
CYPRINVS CHALCOIDES.
DESCRIPTI.

Auctore

A. I. GVELDENSTAEDT.

Mare Caspium piscium quantitate omnino abundans, magis indiuiduorum copia, quam specierum varietate superbit; haec enim ad decades quatuor vix accedunt. Plurimae harum *Europaeae* et aquarum dulcium sunt. Ex *Cyprinorum* genere inueniuntur: *Barbus*, *Carpio*, *Gobio*, *Tinca*, *Carassius*, *Rutilus*, *Idus*, *Orfus*, *Erytrobthalmus*, *Ieses*, *Nasus*, *Aspius*, *Alburnus*, *Vimba*, *Brama*, *Cultratus*, *Bioerkna*, *Fareus*, *Ballerus*; quibus accedunt *Esox Lucius*, *Salmo Salar*, *Silurus Glanis*, *Cobitis Taenia* et *Barbatula*, *Percà Cernua*, et *Fluviatilis* et *Lucioperca*, *Gadus Lota* (quae nomina ex Edit. XII. Syst. Nat. Illustr. Equ. avr. a LINNE intelligenda). Agmini huic iungitur generosa *Acipenserum* gens, cum vulgo piscibus adnumeranda, corporis mole speciosa, indiuiduorum copia immensa, specierum numero minus nota.

X x x 2

Nam

Nam praeter *Hufonem*, *Sturionem* et *Sterletum Rufforum*, quae *Acipenser ruthenus LINNAEI*, concurrunt duae ab his diuersae species, quarum una *Seuruga*, altera *Schypa*, et a *Ruffis* et a nobis trivialiter appellatur; quae certe omnes inter se valde affines et aegre, a numero partium vix unquam, distinguendae. Numerus enim radiorum pinnarum vix differt in huius generis naturalissimi speciebus, et, si differat, nunquam cum certitudine determines; et cirrorum numerus in omnibus quaternus; numerus autem squamarum maiorum tuberculorum in lineis ordinarum equidem diuersus, sed minime constans est, quae insuper in omnibus aetate perfectis obsoletae euadunt, ita ut nec praesentia vel absentia tuberculorum species distinguat. Capitis partes notas differentiales haud infrequentes et constantissimas largiuntur. Quaeuimus igitur, *III. KRAMERI*, de animalibus *Austriacis* meritissimi, vestigia prementes, notas specificas. Primarias ex rostri figura, eiusdemque ad oris diametrum proportionem, secundarias ex labiorum figura et situ cirrorum ad rostri apicem et oris rictum relatiue; exinde nobis.

Huso: *Acipenser* rostro obtusissimo, oris diametro longitudine cedente; cirris ori propioribus; labiis integris.

Sturio: *Acipenser* rostro obtuso, oris diametro transuerso longitudine aequali; cirris rostri apici propioribus; labiis bifidis.

Schuba:

Schypa: *Acipenser* rostro obtuso, oris diametro quoad vnam tertiam partem longiore; cirris rostri apici propioribus; labiis bifidis.

Sterleta: *Acipenser* rostro subulato, recto, diametro oris quadruplo longiore; cirris vix ori propioribus; labiis integris.

Seuruga: *Acipenser* rostro spatulato, sub recuruo, diametro oris trans-verso sextuplo longiore; cirris ori propioribus; labiis integris.

Quorum magnitudine *Huso* primus, non raro nouempedalis; *Sturio* secundus, plerumque sexpedalis; *Schypa* et *Seuruga* subaequales, vix quinque pedales; *Sterleta* tandem raro tripedalis. Sufficiant specifica haec *Acipenserum* nomina, donec plenariam horum historiam loco opportuniore communicauerimus.

Denominandi restant duo Maris *Caspii* ciues, plane indigeni et Ichthyologis minus noti, qui nobis, altero *Salmonibus*, altero *Cyprinis*, secundum principia *Illustr. Equitis aurati a LINNE in Systemate Naturae* stabilita, adfociato, audiunt: *Salmo Leucichthys* et *Cyprinus Chakoides*; vtrumque rite describamus.

SALMO LEVCICHTHYS.

Statura et Magnitudo Salmonis Salaris LINNEI seu *Salmonis primi ARTEDII*, qui *Salmo vulgaris*

X x x 3

garis

garis omnium auctorum, ita ut huius icones etiam *Leucichthydis* ideam fac claram fistant.

Caput et *Corpus* oblongum, parum compressum, extensione ab apice rostri ad caudam vsque recta, plane non adscendente; hinc omnis latitudo piscis ab abdomine modice deorsum arcuato; *habitus* squamosus et malacopterygius.

Rostrum obtusissimum: *mandibula superior* latissima, integra, recta; *inferior* adscendens, subconica, apice tuberculoso ante superiorem prominens; utraque edentula, *riktus* terminalis, amplissimus, quadratus; *lingua* triangularis, soluta, subaspera; *oris* cavitates alba immaculatae; *palatum* latum, planum, antrosum utrinque subasperum *denticulis* minimis, tactu, non visu, percipiendis; *nares* medium inter rostrum et oculum occupantes, apertura utrinque gemina, angusta; *oculi* laterales, liberi, ampli, iride argentea, punctulis nigris irrorata.

Vertex fornicatus, nudus, glaberrimus, subdianthus, hyalino-fuscus et nigro punctatus.

Branchiarum opercula ex quatuor laminis offe confecta, compressa, argentea et punctis nigris irrorata; *Membrana branchiostega* alba, decem radiata, offe distinetissimis, latis, parum arcuatis.

Branchiae utrinque quinque; *radii* in angulum valde acutum geniculati; in parte conuexa quatuor anteriorum *plumae* duplices et laxissimae, quinto in ipsis faucibus obuius, nudo; in parte concava primus secundus

secundus et quintus *apophysum* laeuium longissimarum vnico, tertius et quartus duplici ordine instructi, posterioribus in tertio obsoletissimis, in quarto sat eminentibus.

Dorsum latissimum, vbique conuexum; *venter* a branchiarum foramine ad pinnas ventrales planiusculus, ab hinc ad eandem sat conuexus; *latera* plano conuexa, *linea lateralis* recta, dorso aliquantum propior quam ventri, dorsoque parallela; *squamae* pro mole piscis haud adeo magnae, subrotundae, imbricatae, laeues, vbique argenteo splendore nitentes, in dorso a muco cutaneo sub squamis nigro canescentes, punctis nigris vbique irroratae, sed in ventre immaculatae; *anus* caudae multo propior, quam capiti, proxime ante pinnam ani, apertura duplici.

Pinnae dorsales duae, *prima* vera in medio corporis sita, pinnis ventralibus tantillum anterior, ex albicanti punctis nigris fuscescens, radiis quindecim, quorum quatuor primi integri, reliqui apice ramosi, primus minimus; *secunda* spuria, adiposa, crassa, subdiaphana, hyalina, punctis nigris adpersa, integra, parua, pinnae ani opposita.

Pinnae pectorales acuminatae, albae, pone branchiarum foramen sitae, radiis quatuordecim, primo integro, reliquis ramosis.

Pinnae ventrales in medio abdomine, pone pectorales sitae, rotundatae, albae antrorsum fusco punctatae, radiis vndecim, primo integro; accedit supra

supra basin harum pinnarum *apophysis* triquetra acuminata, cartilaginea.

Pinna ani decrescens, rubicunda, fusco-maculata, radiis quatuordecim, primo brevi, subadiposo, simul cum secundo, longissimo et integro, reliquis ramosis.

Cauda perpendicularis, semilunata, subadiposa hinc radii aegerrime numerandi, qui insuper ramosissimi ad basin fere vsque, ni fallimur, viginti septem, a longissimis extimis numerandi.

Magnitudo tripedalis vulgo, non raro ultra.

Diversiones partium externarum secundum pedem *Londinensem* ita:

Longitudo ab apice maxillae inferioris ad	poll.	lin.
superiorem	—	4.
— ab apice maxillae superioris ad nares	1.	—
— — — — — ad oculum	2.	—
— — — — — ad foramen branchiarum	6.	—
— — — — — ad pinnae dorf. 1 ^{ae} initium	19.	6.
— — — — — ad pinnae dorf. 1 ^{ae} extremum	23.	6.
— — — — — ad pinnae dorf. 2 ^{ae} initium	32.	8.
— — — — — ad pinnae dorf. 2 ^{ae} extremum	34.	—
— — — — — ad caudae radicem	37.	6.
— — — — — ad caudae cruris super. apicem	43.	9.
— ab apice maxillae inferioris ad pinna-		
rum pectoral. radicem	9.	—
— — — — — ad pinnarum pector. apicem	14.	—
— — — — — ad pinnarum ventral. radicem	20.	6.

Longi-

	poll.	lin.
Longitudo ad pinnarum ventr. apicem	25.	—
— — — ad anum - - - - -	31.	—
— — — ad pinnae ani initium	31	4.
— — — ad pinnae ani extremum	35	10
— — — ad caudae radicem	39.	4.
— ad cruris inferior. caudae apicem	45.	—
Diameter rictus oris aperti perpendicularis	3	4.
— — — transuersalis - -	2.	8.
— inter nares - - - - -	1.	4.
— capitis perpendicularis inter nares -	2.	—
— inter oculos - - - - -	2.	—
— capitis perpendicularis inter oculos -	3.	—
— oculorum - - - - -	—	10.
— inter lineas laterales ad branchiarum foramen	3.	6.
— corporis perpendicularis ibidem - -	5.	6.
— inter lineas laterales ad pinnas ventrales	3.	—
— corporis perpendicularis ibidem - -	6.	—
— inter lineas laterales ad anum - -	2.	8.
— corporis perpendicularis ibidem - -	4	8.
— inter lineas laterales ad caudam - -	1.	2.
— corporis perpendicularis ibidem - -	2.	6.
— corporis perpend. maximus inter pin- nas Pect. et Ventr.	6.	6.
— — — transuersalis maximus ibidem -	4.	—

Pondus Piscis dimensu adaequat octodecim
libras medicinales.

Cor sat magnum, exacte pyramidem trique-
tram referens, carnosum et strictum, basi antrorsum

Tom. XVI. Nou. Comm.

Y y y

scu

feu sursum spectante, sinistrorsum aorta Bullata, dextrorsum auricula amplissima aucta.

Diaphragma membranaceo-tendineum, *peritoncum* album.

Hepar latum, quadrangulum, integrum, bruno-lutescens, diaphragmati adiacens, angulo sinistro aliquantum descendens; *vesicula fellea* amplissima, superficie inferiori hepatis adhaerens et ad marginem anteriorem prominens, bile atro-virente scatens, viscera adiacentia inquinans.

Lien triangularis, latus, vix hepati minor, aterrimus, in medio fere ventris, ventriculi flexurae adnexus, extremitate superiore subfida.

Oesophagus sat amplus diaphragmate perforato continuat in ventriculum nec cardia distinctum, nec ampliorem, qui recta per 9. pollices ad medium fere abdominis descensus recurvatur, et per 5. pollices iterum adscensus spinctere pylori constringitur et abit in *intestinum*, quod dum longitudine 5. pollicum absoluta ad hepar peruenerit iterum reflectitur et per 16. pollices ad anum vsque recta procedit, diametro vbique aequali, ventriculo dimidio angustiore *processus vermicales* caeci, numerosissimi, adipe intricati, omnem intestini peripheriam a pyloro vsque ad flexuram obidentes, post flexuram in parte descendente rariores et in vno tantum latere intestini nec ultra regionem pyloro respondentem obuii, interne in intestinum hiantes; quod interne a luminibus hinc approximatis quasi cribratum et mucotenuis-

tenuissimo albido scatens, abhinc obsolete longitudinaliter et tandem aliquot pollices ante anum transversaliter rugosum; ventriculus interne longitudinaliter rugosus, valuulis eminentissimis rectis atque annulo parum eminenti ad pylorum terminatus.

Ovaria duo, simplicia, per totum abdomen ad latera vesicae aëreae vtrique decurrentia, obscure rubra; *vesiculae spermaticae* his analogae, albae.

Vesica aërea oblonga, amplissima, simplex, per totum abdomen ad spinam dorsii decurrens; *ductu pneumatico* breui, sed amplo ab oesophago ad extremitatem superiorem vesicae abeunte.

Renale viscus sanguinolentum, ad spinam dorsii latissimum.

Caro cruda rubicunda, cocta alba omnino, oleoso-pinguis, sapidissima, praesertim fumo indurata et tunc *salmonem* vulgarem et gratitudine et dulcedine multoties exsuperans, hinc merito in summis per *Russiam* deliciis, mensis principum dicatis.

Coitum celebraturus adscendit e Mare *Caspio* *Volgam* mensibus hiemalibus; reliqua mare hoc petentium fluuiorum ostia omnino praetereuns, excepto laico seu Rhymno.

Per *Russiam* appellatur Belaia Rybyza (белая рыба) i. e. albus piscis; inde nomen triviale nostrum, naturae piscis convenientissimum.

Neminem dubitaturum fore confidimus , quod piscis nunc sat fule descriptus *Salmonibus* LINNAEI iure adsociatus sit , qui ad *Coregonos* ARTEDII pertinet, atque propter maxillas edentulas et inferiorem pro *Coregono primo* ARTEDII et *Salmone Albulæ* LINNAEI haberi posset , nisi magnitudo et reliqua non pauca aduersarentur. Ad remouendam hanc ambiguitatem notis hisce specificis , radiorum membranae branchiostegae numerus addendus est ; sit igitur.

Leucichtys: *Salmo* maxillis edentulis, inferiore longiore ; radiis membranae branchiostegae decem.

Albulæ: *Salmo* maxillis edentulis, inferiore longiore ; radiis membranae branchiostegae septem.

Synonyma cum veri specie nulla ex ARTEDIO, qui vnicus Ichthyologorum instar omnium in peregrinatione ad manus est , *Leucichtydis* vindicare possumus: hinc pro pisce nouo Mari *Cassio* proprio habemus.

Accedamus ad socium , qui.

CYPRINVS CHALCOIDES.

Statura Clupeae Harengi, cuius clariorem ideam icon magnitudinem naturalem exprimens sistit.

Corpus compresso - oblongum , squamosum et malacopterygium.

Caput compressum , acuminatum ; *mandibula superior* subrecta , obsolete emarginata , vaginata ;
inferior

inferior ante superiorem prominens apice tuberculoso, sursum eleuato, sinui mandibulae super-oris respondente; vtraque edentula; *viscus* terminalis, rotundatus, vix indicis apicem recipiens; *Lingua* oblonga adnata, cartilaginea, alba, laevis, *Oris* cauitas alba, spatio apicem mandibulae inferioris inter et linguam punctulis fuscis irrorato, *palatum* subconcauum, laeue; *fauces* *officula* plano, albo, exaspero munitae; *nares* verticales, medium rostrum et oculos inter occupantes, apertura vtrique gemina, valvula inter media posticam obtegente distincta; *oculi* laterales, liberi, ori propiores, quam branchiarum foramini; iride argentea, superne subaurata et punctulis nigris irrorata, inferne plerumque macula sanguinea notata; pupilla circulari, atra.

Frons et *Vertex*, fusco-virens, rotundato-planus, linea recta a rostro procedens; *gula* deorsum arcuata.

Branchiarum opercula plana, laevis, nitidissime argentea; *membrana branchioflega* triradiata, alba; *branchiae* vtrique quinque; radii arcuati; in parte convexa quatuor anteriorum plumae duplices, quinto in ipsis faucibus obuio nudo; in parte concava apophyses dentiformes, laeues, in quatuor anterioribus duplici ordine, quorum exterior primi radii reliquis sub aequalibus multo longior, in quinto simpliciter dispositae.

Dorsum parum convexum, modice adscendens; *venter* deorsum arcuatus, vt exinde latitudo piscis

Y y 3

a gula

a gula ad pinnas ventrales planiusculus, ab hinc ad anum in carinam acutam contractus, caudam versus rotundatus; *latera* conuexo-plana; *linea lateralis* deorsum arcuata, ventri propior et parallela, punctis eleuatis albidis circiter 70. *Squamae* omne corpus obtegentes, rotundatae, imbricatae, striatae, in dorso ex canescenti et virescenti argenteae et punctis fuscis irroratae, ad latera splendide argenteae, in ventre lacteae; *anus* caudae multo propior, quam capiti, proxime ante pinnam ani, apertura duplici.]

Pinna dorsalis medium fere dorsi occupans, sub quadratica, fuscescens, radiis duodecim, quorum primus secundo dimidio breuior, secundus longissimus, ambo integri, reliqui decrescetes et ramosi.]

Pinnae Pectorales pone branchiarum foramen, oblongo-acuminatae, albae, radiis vulgo sexdecim, rarius quindecim vel septemdecim, quorum primus maximus, reliquis robustior, fuscus et simplex, reliqui subramosi, vltimi minimi et proximi.

Pinnae ventrales pone pectorales, parum ante dorsalem, in medio abdomine sitae, rotundatae, albae, radiis nouem, quorum primus longior et simplex, reliqui decrescetes et valde ramosi; accedit superius ad pinnarum harum radicem apophysis squamosa, lanceolata, alba.

Pinna ani medium inter pinnas ventrales et caudam occupans, decrescens, radiis vulgo nouemdecim, variantibus inter 17 vsque ad 20, quorum primus breuissimus, secundus duplo longior, tertius lon-

longissimus, omnes tres simplices, reliqui decrescen-
tes et ramosi.

Cauda perpendicularis; bifurca, fusca, radiis
nouemdecim, exceptis quatuor vtrinque breuissimis
extimis, quorum longissimi exteriores simplices,
reliqui ramosi.

Magnitudo vix pedalis.

Dimensiones partium externarum secundum pe-
dem londinentem ita:

Longitudo ab apice maxillae inferioris ad su-				poll.	lin.
			periozem	—	2.
—	—	—	ab apice maxillae superioris ad nares	—	5.
—	—	—	ad oculum	—	7.
—	—	—	ad branchiarum foram.	1.	10.
—	—	—	ad pinnae dorsalis ini-		
			tium	4.	9.
—	—	—	ad pinnae dorsalis ex-		
			tremum	5.	11.
—	—	—	ad caudae radicem	9.	3.
—	—	—	ad caudae cruris sup.		
			apicem	11.	6.
—	—	—	ab apice maxillae inferioris ad radicem		
			P. pectoralis	2.	2.
—	—	—	ad pinnae pector. apic.	3.	6.
—	—	—	ad P. ventralium ra-		
			dicem	4.	8.
—	—	—	ad anum	6.	6.
—	—	—	ad P. ani initium	6.	7.
—	—	—	ad P. ani extremum	8.	2.

Lon-

	poll	lin.
Longitudo ad caudae radicem - - -	5.	7.
— — — — — ad caudae cruris int.		
apicem	11.	10.
Diameter rictus oris aperti perpendicularis	—	8.
— — — — — transversalis -	—	6.
— inter nares - - - - -	—	5.
— capitis perpendicularis inter oculos -	1.	1.
— inter oculos - - - - -	—	11.
— oculorum - - - - -	—	6.
— inter lineas laterales ad branchias -	1.	1.
— corporis perpendicularis ibidem -	1.	10.
— inter lineas laterales ad pinnas ventrales	1.	1.
— corporis perpendicularis ibidem -	2.	4.
— corporis perpendicularis ad anum -	2.	—
— inter lineas laterales ad caudam -	—	3.
— corporis perpendicularis ibidem -	1.	—
— corporis perpendicularis maximus ad P.		
dorsalem	2.	5.
— corporis transversalis maximus ibidem	1.	3.

Cor subrotundum, pisco vix maius, corpore dextrorsum, auricula sinistrorsum spectante, pericardio argenteo, tendineo, diaphragmati adnexo inclusum.

Diaphragma tendineum, strictum; *peritonaeum* argenteum, punctis nigris irroratum.

Hepar corpore lato, plano, diaphragmati succumbente, e quo procedunt lobi tres, tenuissimi, longi; quorum medius reliquis longior, ad pinnas ventra-

ventrales vsque extensus, abdomini parallelus; dexter longitudine medius, in hypochondrio dextro spinam dorsi versus situs et *vesicula fellea* parua auctus; sinister breuissimus; omnes intestino arctissimo adnexi et adipe inuoluti.

Lien atro-rubens, tenuis, linearis, extremitati lobi sinistri hepatis adnexus et inter hunc et ventriculum processum longum diaphragma versus emittens.

Ventriculus ab intestino non distinctus, nisi quod aliquantum amplior sit; *intestinum* primo ad anum descendit, tunc iterum ad diaphragma retrogreditur et tandem ad anum redit; latitudinis ubique aequalis, pennam anterinam vix excedentis; longitudinis a gula ad anum eiusdem cum pisce toto; interne laeue, muco albedo repletum et *Fasciolas intestinales* fouens.

Ovaria duo, linearia, ad latera vesicae aereae sita, per totum abdomen decurrentia, albida, ouulis minimis foeta, hinc *vesiculae spermaticae* his analogis aegre distinguenda.

Vesica aerea a diaphragmate ad anum extensa, spinae adiacens, medio constricta; *ductu pneumatico* longo, tenui, ex faucibus ad partem inferiorem vesicae procedente.

Renae viscus sanguinolentum, spinae dorsi pone vesicam aeream adhaerens.

Caro cruda et cocta alba; adeps oleosa, inter abdominis tunicas et viscerum plexum abundans.

Tom. XVI. Nou. Comm.

Z z z

Costae

Costae vtrinq; quindecim; vertebrae quadraginta quatuor; ossicula setacea musculis interposita plurima.

Coitum celebraturus adscendit gregatim e mare *Caspio* per Nouembrem, Decembrem et Ianuarius. *Terek* fluuium et *Cyrum* seu *Kur* Persarum, a *Wolga* et *Iaico* omnino abhorrens, nec non *Suluk* fluuii ostium, vix semigradum a *Terek* fluuio distans, et huic maximopere analogum, praetereuns.

A Persis et Tataris appellatur noster *Schamahi* seu contracte *Schumai* i. e. princeps piscium, quia caro omnium sapidissima, praesertim assata seu fumo cocta; a Cosacis Terekienibus russice *dšbirnaja ryba* (мирная рыба) i. e. pinguis piscis, ob adipem largissimam; a Germanis in Russiam obuiis propter locum natalem et corporis habitum *Harengo* non absimilem, *Kuzlarischer Hering*, i. e. Kislariensis Harengus; inde etiam nostrum triuiale nomen a Graecis, quibus Harengus chalcois audiebat, mutuatum.

Nominis generici ratio ex descriptione nunc tradita satis superque patet. Inter congeneres proxime accedit ad *Aspium*, a quo attamen plurimis et euidenter magnitudine diversissimus; nomine specifico igitur *Chalcoides* optime denominandus.

Cyprinus pedalis; radiis pinnae ani nouemdecim; maxilla inferiore longiore, incurua.

Synonyma pro chalcoide nulla inuenimus; nam *cyprinum americanum* LINNAEI, quanquam huic quaedam

dam cum *Chalcoide* communia sint, huc referre ne quimus, quia ea, quae de hoc pisce ex *Systemate Naturae* nota sunt, nimis laconica, vt exinde aliquid certi concludi possit; nec corpus nostri sat latum est, vt cum *Rutilo* conferri possit, hinc eo magis dubitamus.

Hi sunt igitur noti, cum minus notis, maris *Caspii* ciues e piscium gente; quibus adfociantur *Phoca vitulina* et *mustela lutra* ad ripas maris et insularum sat frequentes. Ex *Cetaceorum*, *Molluscorum*, *Conchyliorum* et *Piscium Chondropterygiorum*, *Acipenseribus* exceptis, familiis, nemo, quantum nobis equidem constat, mare hocce inhabitat, cuius maturiorem et consummatam descriptionem ab *Illustr. GMELINO* nostro, totas quantas hasce aquas a septentrione ad meridiem vsque industria et sagacitate summa inuestigante, expectat orbis litteratus. Liceat interim ichthyologis per vos *ACADEMICI*, spoliis hisce maris *Caspii*, ad *Wolgae* et *Terek* fluuii ostia iussu *IMPERATRICIS* et *ACADEMIAE* ad inquirendum concedita, collectis vti.

KRASCHENINNIKOVIA, NOVVM PLANTARVM GENVS.

Auctore

A. I. GVELDENSTAEDT.

Corpora omnia viua et organica arctissimo affinitatis vinculo inter se coniunxisse summum rerum conditorem, satis superque patet naturae consultis, omne in eo conuertentibus, vt singula elegantissimae huius concatenationis membra perspiciant. Horum industria, quae intermediam Zoophytorum naturam rite determinauit, factum est, vt alienissima, animalia nimirum et plantae, fratres germani euaserint. Sed dantur adhuc hiatus sat ampli inter ordines classium et ampliores inter genera ordinum, non culpa naturae, saltum facere nesciae, sed cognitionis nostrae, temporis beneficio amplificandae, tenuitate, qua in tanta rerum naturalium copia et inuestigatorum inopia non possumus non hucusque laborare. Hinc Historici naturales, praesertim Botanici, systemati naturali indulgentes, nonnisi fragmenta ordinum proposuerunt, quae saepius manca sunt, saepius nimis diuersa coniungunt, ob deficientem specierum notitiam; quarum si plures notae euadunt, ordines saepe coalescunt et genera, quae antea fere diuersi ordinis dixisses, intermediis nouis sat arcte combinantur.

Veritas

Veritas dicti elucet, si, ut reliqua taceamus, ad ordinem XII. systematis naturalis, quod *III. Eques auratus* a LINNE in *Editione sexta Generum plantarum* proposuit, attendere velis. Conuenies equidem nobiscum *Laurum* et *Callitrichen* toto coelo, ut aiunt, differre; attamen quaedam communia habent, ut non absque ratione eidem ordini inferantur, et forsân dies sero veniens, plantis intermediis detectis, maiorem affinitatem reuelabit. *Chenopodii*, *Atriplicis* et *Ceratocarpi* facies externa vix repugnat, quo minus eiusdem ordinis naturalis haec genera habeas, quibus *Vrtica* non inepte adfociari possit. Sed eadem haec facies et partium structura indicat gnaris, plantas alias adhuc latere, quae ad integritatem affinitatis scalae requiruntur.

Ad hiatum hunc aliquomodo implendum inseruit planta hucusque minus cognita, quae nobis per campos *Tanaicenses* et *Wolgentes* peregrinantibus obuiam iuit; *Ceratoidem orientalem fruticosam*, *Elaeagni folio* TOVRNEFORTII (vid. *corollar.* p. 52.) volumus, cuius partium fructificationis cognitione et descriptione omnino carent Botanici; hinc factum est, ut ab illis vage huc inde relata sit.

TOVRNEFORTIVS, qui omnium primus plantam in *Oriente* lectam proposuit, cum *Ceratoidi orientali maiori* et *minori*, *annua*, *Psyllii folio*, seu cum *Ceratocarpo* BVXBAVMII et LINNEI eiusdem generis esse putauit; STELLERVS, qui eam in campis *Sibiricis* inuenit, nunc ad *Blitum*, nunc ad *Cam-*

phoratam retulit; LINNEVS prius *Vrticae*, nunc *Axyridi* adnumeravit; GMELINVS tandem, monitis *Linneanis* sequens, pariter *Axyridi* adsociavit in *Florae Sibiricae* Tom. III. p. 18. est semper dubitantes; hinc *L. c.* ait: "quouis modo in structuram partium ad florum et fructuum formationem spectantium, diligenter inquisuimus, sed; quod candide fatemur, nihil distincti, oculis licet armatis ventres, eliciuimus, ut de charactere generico certi, quid proferre nondum liceat. B. STELLERVS nihil quidquam seminum detexit, tria tantum statmina in singulis floribus sibi vidisse visus est; dubitat autem, an non imaginatione tantum eiusmodi illi fors contigerit,,"

Planta viua in solo natali florente a nobis examinata, certo certius constat, quod non solum STELLERVS, sed et omnes reliqui Botanici, huius plantae mentionem facientes, errauerint, cui cum *Axyride* vix vlla, cum *Atriplice* et *Vrtica* haud pauca et cum *Ceratocarpo* adhuc plura communia sunt. Flores plantae nostrae cum characteribus horum generum, quos *Ill. Eques a LINNE* in *editione sexta generum plantarum* dedit, conferenti, statim patet, quod nullam horum intrare possit, sed potius genus proprium constituat, omnino intermedium inter *Atriplicem*, *Vrticam* et *Ceratocarpum*, cum his simul in ordine supra citato naturali *Holoracearum* militandum.

Genus

Genus hocce nouum salutatur a nobis: *Krascheninnikouia*. Sacrum enim esse optamus manibus STEPHANI KRASCHENINNIKOVII, membri *Illustrissimae Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae* quondam dignissimi, Botanici e *Russica* gente primi, improbo itinere *Kamtschatico*, quod historiae naturalis gratia iniit, sedula *Florae ingrica* conscriptione, quam *Perill. de GORTER*, ceu opus posthumum edidit, atque eruditis variis dissertationibus quas *Commentarii Petropolitani* continent, orbi literato satis superque noti atque de nobilissima nostra scientia, quam professus est et egregie auxit, meritiissimi; aequum igitur esse putauimus, vt haec ipsa memoriae *Viri optimi*, praecaci tato deflorati, monumenta ponat, licet non aerea, sed lignea, iis tamen perenniora.

Krascheninnikouiae characterem genericum ad naturae nutum concinnauius sequentem:

Masculi flores subamentacei;

CALYX: *Periantium* tetraphyllum, persistens; *foliis* aequalibus, obtusis, concavis, in globulum conniuentibus.

COROLL: nulla.

STAMINA: *filamenta* quatuor, capillaria, thalamo inserta, foliolis calycinis opposita, eorumque longitudine; *antherae* subrotundae, didymae.

Feminei flores in eadem cum masculis planta;

CALYX:

CALYX: *Perianthium* monophyllum, vrceolato-compressum, sulco utrinque carinatum, subbifidum; *laciniis* cornuto-erectis, parallelis, tubuloso-concavis; *fauce* inter laciniarum finem angustissima, perforata.

COROLLA nulla.

PISTILLUM: *germen* ovatum, superum; *stylus* simplex, per faucem perianthii transeuns; *stigmata* duo, capillaria, reflexa.

PERICARPIMUM: *Calyx* dilatatus, amplificatus, semen in sinu fouens et undique tegens.

SEMEN unicum; ovato-compressum, *arillo* laxiusculo vestitum, quo detracto extremitates duae deorsum flexae et approximatae secedunt, una acuminata et integra, altera obtusa in duobus labiis dehiscente.

Krascheninskouia igitur systematis *Linneani* Monoeciae Tetrandriae, post *Urticam*; systematis *Gleditschiani* Thalamostemonibus Tetratheris, floribus simplicibus, apetalis, hypocarpis, post *Urticam*; systematis *Ludwigiani* Relatiuis Monophytis, apetalis, post *Ceratocarpum*, systematis *Tournefortiani* herbis et suffruticibus stamineis, quorum pistillum ab ipso semine calyce obvolutum, post *Atriplicem*; et sic reliquis auctorum systematibus plantarum inferenda est.

Mirabuntur forsitan lectores, quod tanta inter *Krascheninnikowiam* et *Ceratocarpum* antea praedicata sit

sit affinitas, quam vix inuenient conferentes characterem *Ceratocarpi*, ab *Ill. Equite a* LINNE l. c. traditum, cum *Krascheninnikouiae* characterem nunc exhibito; sed desinent mirari certiores facti, characterem *Ceratocarpi* huc vsque notum minus naturae consentaneum esse. En! reformatum:

Ceratocarpi masculi flores solitarii, sparsi;

CALYX: *perianthium* monophyllum, cordato-tubulosum; *limbo* postice acuminato, antice semilunato, integerrimo.

COROLLA nulla.

STAMEN: *filamentum* vnicum, capillare, vix tuboperianthii longius, thalamo insertum et fundo calycis adglutinatum; *anthera* didyma, erecta, ultra calycis limbum prominens.

Feminei flores in eadem cum masculis planta;

CALYX: *Perianthium* monophyllum, cordato-compressum, neruo vtrinque eminenti carinatum, subbidum; laciniis subulatis, diuergentibus; *fauce* inter laciniarum sinum angustissima, rimam referente.

COROLLA nulla.

Tom. XVI. Nou. Comm.

A 1 1 1

PIS-

PISTILLVM : *germen* oblongum, superum; *stylus* et *stigmata* duo, capillaria, per faucem calycis transeuntia, patentia.

PERICARPIVM : *Calyx* maior, figura immutata, semen in sinu fouens et vndique tegens.

SEMEN oblongo-compressum, inferne angustius, fundo calycis adhaerens, alias liberum, arillo laxiusculo vestitum; quo detracto extremitates duae deorsum flexae et approximatae sedcunt, vna acuminata et integra, altera obtusa in duo labia dehiscende.

Ita partes fructificationis *Ceratocarpi* **BXB-BAVMII** in solo natali arenoso-argilloso camporum apricorum *tanaicensium*, *volgensium* et *terekiensium* a 54 ad 43. gradum latitudinis frequenter crescentem et haere per aestatem florentem vidimus, multoties examinauimus, sedulo descripsimus et pingere curauimus.

Patet nunc sole meridiano clarius ex hoc genuino *Ceratocarpi* caractere, summa affinitas *Krascheninnikouiae*; propter partes feminæas simillimas. Floribus autem masculis genera hæc duo diuersissima sunt; his enim accedit *Krascheninnikouia* ad *Atriplicem* et propter numeri partium conuenientiam magis adhuc ad *Vriticam*, a quibus attamen propter florum femineorum structuram necessario separanda.

— 2 — PLANTA Planta,

Planta, quæ nouum nunc sat ample determinatum genus constituit, nobis audit trialiter:

Krascheninnikouia Ceratoides; cuius synonyma sunt sequentia:

Ceratoides orientalis, fruticosa, *Elæagni folio*.
TOYRNEFORTII *corall.* p. 52.

Vrtica foliis lanceolatis, *femminis hirsutis* ROYER-
NI *Lugdb.* 210.

Axyris foliis lanceolatis tomentosis, *floribus femineis lanatis* LINNEI *Spec. Plant. edis.* 24.
p. 1389.

Axyris fruticosa, *floribus femineis lanatis* GMELINI *Flor. Sibir. Tom. III.* p. 17.

Blitum arborescens incanum, *Lauerdulæ folio* STELLERI *Flor. Treci.* 767. secundum
GMELINVM *l. c.*

Campborata, *species alia hirsuta et lanuginosa*
Id. l. c. 1150. secundum GMEL. *l. c.*

Restat, vt tradatur concisa *Krascheninnikouia*
Ceratoidis

DESCRIPTIO.

RADIX lignosa, ramosa, pollice crassior, pede profundius descendens, perennis, pro plantae ratione sat magna.

CAVLES plures, diffusi, subprocumbentes, suffruticosi, teretes, penna anserina tenuiores, vix tripedales; seniores corticæ sordide cinereo et fisco obducti, ramosi, ramis virgatis; iuniores simplices, inferne glabri, pallide nitentes, a foliorum lapsu cicatrifati, superne subuilloso - incani.

FOLIA alternatim conferta, lanceolata, vtrinque attenuata, floralia fere linearia, integra, margine subreflexa, nonnunquam leuiter undulata, supra obsolete trineruia, infra a costa prominente parum carinata, vtrinque, sed inferne magis, incana, subpetiolata; *petiolo* basi dilatato fasciculum foliorum axillarem saepius amplexante.

FLORES axillares, sessiles, in spica interrupta terminali, vel simplici, vel spiculis brevibus lateralibus subracemosa dispositi, monoici.

MASCVLI flores in caulis et spicularum extremo confertissimi, minimi, fere granulati, quorum *perianthium* tetraphyllum, persistens, emarcidum, foliolis minimis, concavis, obtusis, in globulum conniuentibus, externe interneque tomento brevissimo

vissimo substellato seu radiato obstitis; *filamenta* quatuor, capillaria, brevissima, vix ultra calycem prominentia, thalamo foliolis calycinis opposita inserta; *antherae* subrotundae, didymae, lutescentes, polline globuloso factae; *pistilli* rudimentum nullum.

FEMINEI flores infra masculos, rariores et maiusculi; horum *perianthium* monophyllum, vrceolato - compressum, subbidum; laciniis cornuto-erectis, parallelis, tubuloso - concavis; fauce inter laciniarum sinum angustissima, perforata; superficie interna laevi, externa tota tomento brevissimo, stellato obrita et praeterea ad fundum villis capillaribus, quadrifarie ad angulos positis et perianthio longitudine aequalibus ornata; sutura utrinque ad plana perianthii conspicua, sulcata, duo quasi foliola calycis mutuo coniungente, sed adeo firmiter, ut neutriquam absque dilaceratione secedant, hinc calyx omnino monophyllus; germen ovatum, villosum, superum, et totum a perianthio tectum, sed undique liberum et non nisi fundo seu potius thalamo adhaerens; *stylus* unicus, rubens, per faucem perianthii transeuns; *stigmata* duo, capillaria, reflexa, rubentia, ipso apice lutea et pubescentia; *pericarpis* vicibus fungitur calyx quadruplo maior, subinflatus, fauce vix peruia et villis fundi valde elongatis; hinc spicae in planta fructificante villosissimae, sericeo-nitentes; *semen* ovato - compressum, extremitate tenuiore thalamo adhaerens, ceterum in calyce

A a a a 3

omnino

omnino liberum nec ullibi adnatum, *arillo* laxiusculo et villoso vestitum, quo detracto extremitates duae, quae deorsum flexae et approximatae erant, secedunt, una acuminata et integra, altera obtusa in duo labia delascente. [Structura seminis accedit ad *Salsolam*; tunica enim communis, quae semen spiritaliter contortum continet et innoluit, rectius pro arillo, ac pro capsula habetur in *Salsola*, qua detracta tunica, amplius nulla et extremitas altera obtusiuscula pariter in duo labia, cū in duos cotyledones dehiscit; et dantur praeterea *Salsolae* species; quarum semen semel tantummodo inflexum et *Krascheninikoviae* et *Ceratocarpi* semini simillimum est].

ODOR florum et foliorum plane nullus.

SAPOR foliorum subausterus, herbaceus; radicis ligneus, iners.

FLORET per Augustum ad medium vsque Septembris; per Septembrem et Octobrem fructificans; semina vento calycem villosissimum apprehendente disperguntur.

HABITAT in solo arenoso argilloso, loca elata aprica amans; ad *Tanaï* ante ostia fluvii *Bufulae* et ad *Wolgam* ante ostia rituli *Mesobotnae* circa urbem *Zarizyn* a nobis; in *Sibiria* ad *Icniseam* et *Baicalem* lacum a GMELINO et STELLERO; in oriente a TOVRNEFORTIO lecta.

Suffi-

Sufficiant haec de *Krascheninnikouia Ceratoide*, quibus ea, quae in *Florae Sibiricae* Tom. III. pag. 17. seqq. de planta nostra praedicata sunt, conferre non iniucundum erit.

Addamus coronidis loco iconum explicationem :

Fig. 1. Flos masculus *Krascheninnikouiae*.

Tab. XVII.

Fig. 2. Flos femineus *Krascheninnikouiae*.

Fig. 3. Pistillum eiusdem c. calyce exemptum.

Fig. 4. Calyx *Krascheninnikouiae* fructum maturum continens, villis ad fundum quadrifarie positis et elongatis.

Fig. 5. Semen maturum *Krascheninnikouiae*, c. calyce exemptum, arillo villoso vestitum.

Fig. 6. Semen idem nudum, arillo detracto in duas extremitates et ad harum alteram in duo labia secessum.

Fig. 7. Flos masculus *Ceratocarpi* a parte antica, ut pateat, quod limbus sit semilunatus et filamentum ultra tubum promineat.

Fig. 8. Flos idem a parte postica, ut pateat, quod limbus ibidem acuminatus sit et anthera promineat.

Fig. 9. Flos femineus *Ceratocarpi*.

Fig.

Fig. 10. Calyx *Ceratocarpi* semen maturum continens.

Fig. 11. Semen *Ceratocarpi* e calyce exemptum, arillo vestitum.

Fig. 12. Semen idem nudum, arillo detracto in duas extremitates et ad harum alteram in duo labia secessum.

Fig. 13. *Krascheninnikovia Ceratoides* florens et fructificans.

Figurae omnes naturalem partium, quas referunt, magnitudinem sistunt, exceptis 7 et 8. quae aliquoties microscopio auctae sunt, quia flos masculus *Ceratocarpi* adeo exiguus est, ut vix nudis oculis eum perspicere, multo minus distincte pingere liceat.

K O E L R E V T E R I A PANICVLATA

NOVVM PLANTARVM GENVS.

Auctore

E. L A X M A N N.

Etiamſi iam per vicennium et quod excurrit in hybernaculis horti academici haec viget arbuſcula, attamen ad amuſſim illam determinare hucusque nemini licuit deficiens quotannis fructificatio. Prior pars proxime praeterlapſae aeſtatis, meſes dico Maium Iuniumque, qui adeo ſudi erant adeoque florae ſauebant, vt Arachis hypogaea aliique Zonae torridae proprii ſtirpes in fenestris muſei mei non tantum laete floruerint ſed et fructus maturauerint, hanc quoque arbuſculam, cuius lectum genialem, per plures annos fruſtra exoptare noſtri botanici, in area horti, floribus ornarunt. Contigit itaque mihi, nec ſine delectatione perquam eximia, rariſſimarum harum nuptiarum ſpectatorem eſſe, qui viſis floribus, arbuſculam hanc proprium genus conſtituentem, ad viuum delineare curauit, et vt Viro, et de re herbaria et de horto noſtro botanico, optime merito Celeberrimo *Koelreutero*, qualecunque pignus exiſtimationis meae, regnique vegetabilis cultorum, erga ipſum darem, KOEL-
Tom. XVI. Nou. Comm. B b b b REV

REVTERIAM nominaui, cuius characterem genericum et descriptionem sequentibus trado.

CALYCIS *perianthium* pentaphyllum, inferum, foliolis ovatis, obtusis, concavis, membranaceis, inaequalibus, versus latus superius ascendentibus, versus inferius vero aperturam relinquentibus.

COROLLA tetrapetala, petalis flavis, aequalibus, versus superius latus ascendentibus; *unguibus* linearibus, teretiusculis, pilosis, erectis, longitudine foliorum perianthii illorumque basi affixis; *laminis* ovato lanceolatis, planis, apicibus revolutis, ab unguibus ad angulum rectum distantibus.

NECTARIVM squama undulata, erecta, purpureo cinnabarina, ad basin singulae laminae unica, suavem coronatam quasi sistens anthemasque cingens.

STAMINVM *filamenta* octo, subulata, erecta, unguibus petalorum paulo breviora, corpusculo cylindrico, quod est receptaculum genitalem, affixa: *Anthemas* oblongae, obtusae bivalves.

PISTILLI *germen* oblongum, triquetrum, *Stylus* simplex, ascendens, longitudine laminarum, *Stigma* trifidum, paruum, lacinijs patentibus.

PERICARPII *capsula* trilocularis, oblonga, corpusculo cylindrico receptaculi analogo affixa.

SEMINA nulla ob continuas pluvias per totum Iulium maturavere.

Consistit itaque character *Koelreuteræ* nostræ cuius mihi nomen triuiale, ob flores paniculatos, *paniculata* audit, in *calyce* pentaphyllo, infero, foliolis inaequalibus; in *corolla* tetrapetala petalis aequalibus, versus latus superius adscendentibus; in *nectariis* petaloideis squama scilicet undulata ad basin singulae laminae vnica; inque demum corpusculo receptaculi analogo, genitalia tantum sustinente.

Examinatis sic quæ ad characterem genericum pertinent, sequatur descriptio reliquarum partium.

RADIX ramosa, ob angustiam forte vasis varie tortuosa et in fibras plurimas capillares diuisa.

TRVN CVS arboreus, erectus, teres, tunicatus, laeuis, ramosus, altitudinem humanam superans.

RAMI sparsi, patentes, tortuosi, ætate proVectiores trunciformes, iuniores glandulis punctatis adspersi, foliati.

GEMMAE ex axillis foliorum valde resinosa, squamis imbricatis coniformes.

PETIOLI sparsi, patentissimi, basi clauati, versus apicem canaliculati, longissimi.

FOLIA pinnata, pinnis plerumque sexiugis cum impari, ouatis, laciniatis, ferratis, acutis, glabris, planis.

PEDVN CVLI terminales, sparsi, patentes, plurimis pedicellis ramosi.

B b b b 2

FLO-

FLORES paniculati in singulo pedicello tres vel plures.

De loco natali nihil certi conflat. Hospitatur in tepidario.

Floruit circa initium Iulii.

T. XVIII.

Explicatio Figurarum.

Fig. 1. Icon KOELREVTERAE *paniculatae* florentis magnitudine naturali.

Reliquae figurae per Microscopium delineatae sunt.

Fig. 2. flos.

Fig. 3. calyx.

Fig. 4. pistillum.

Fig. 5. stamen.

Fig. 6. petalum cum nectario.

Fig. 7. Receptaculum cum staminibus, pistillo et uno petalo.

ASTRO-

ASTRONOMICA.

Bbbb 3

EXPE-

1918

1918

EXPERIMENTA

CIRCA LONGITVDINEM PENDVLI SIMPLICIS MINVTA SECVNDA KOLAE ET ARCHANGELOPOLI OSCILLANTIS.

Auctore

STEPHANO RYMOVSKI.

In dissertatione, in qua exposui observationem Transitus Veneris per discum Solis Kolae institutam, mentionem inieci experimentorum, circa Longitudinem penduli ibidem a me habitorem. Rationem igitur eorum, pro ut promisi, Academiae Scientiarum redditurus, ordiar a tentaminibus authomato, pendulo inuariabili instructo, institutis.

Authomaton hoc idem ipsum fuit, quod vsus est *Grisebomius* ad definiendam Longitudinem penduli simplicis Petropoli, Oeseliae aliisque in locis, et cuius descriptio legi potest in Nov. Comm. Tom. VII.

Quo securius iudicium de experimentis his lectores ferre queant, maioremque fiduciam consequentiae inde deductae mereantur, longior, aliquantum ero in referendis circumstantiis, quae illi concomitabantur; in primis igitur sisto observationes, ex quibus perspiciatur motus horologii astronomici

565 EXPERIMENTA CIRCA LONGIT.

mici a *le Paise* elaborati, cum quo motum authomati pendulo inuariabili instructi comparauit.

<i>Merid. verus ex altit.</i>		<i>Retardatio</i>	
<i>Oris correspondensibus</i>		<i>Horologii</i>	
Die	30. April 11. Mai	11 ^h . 59 ^m . 1 ^s , 4 ^t 6 ^m , 7
7.	Maii	11. 58. 15, 8 6, 5
14.	Maii	11. 57. 57, 0 6, 4
21.	Maii	11. 57. 55, 4 6, 4
28.	Maii	11. 57. 57, 8	... 9, 8
30.	Maii	11. 57. 56, 5 11, 1
31.	Maii 1. Iunii	11. 57. 54, 3 11, 0
31.	Maii 1. Iunii	11. 57. 52, 5 11, 0
31.	Maii 1. Iunii	11. 57. 21, 0 12, 8.
31.	Maii 1. Iunii	11. 57. 45, 3	

Conferenti observationes meteorogicas Kolae hoc mense habitas, in Comm. Tom. XIV. relatas, patet temperiem aeris fuisse in causa, quod horologium astronomicum a die 30. April ad 19 Maii diuerso motu ac sequentibus incesserit.

Primum tentamen comparationum penduli astronomici cum authomato pendulo inuariabili gaudente institui die 7. Maii. Quoniam vero in hoc experimento non contentus fui statu authomati, super sedeo referendis hoc die institutis comparationibus; id solum addo, numerum oscillationum spatio diei solaris modii in temperie 2° supra 0 therm. Resum.

Reum. a pendulo inuariabili confectarum ex iis sequi 98995 quam proxime. Die sequenti nullum non moui lapidem, ut automaton hoc in eadem statum, qui mihi optimus videretur, redigerem, et postquam id multiplicibus tentaminibus fuerim affectus, die 6. Maii sequentes institui observationes.

EXPERIMENTVM I.

	Horologium Astronom.	Thermom. Reaum.	Pendul. Inuariab.	Num. osc. spat. diei Sol. med. confectar.
I.	10 ^b . 57 ⁱ . 7 ^m .		73 osc.	I. V. 98994,0
II.	54. 55	4 ⁱ supra 0	128	II. VI. 98994,0
III.	56. 24		230	III. XII. 98993,0
IV.	10. 59. 43		450	IV. XIV. 98992,8
V.	11. 31. 29	4 ⁱ	2642	V. XIII. 98992,8
VI.	33. 5		2752	VI. XII. 98992,9
VII.	0. 2. 28. v.		4772	VII. XI. 98993,2
VIII.	3. 9	5	4819	VIII. XIII. 98993,0
IX.	0. 4. 52		4937	IX. X. 98993,3
X.	4. 43. 49	6	24115	X. I. 98992,9
XI.	4 45. 32		24223	XI. XIV. 98993,0
XII.	7. 46. 26		36670	XII. X. 98993,2
XIII.	— 40. 52	4 ⁱ	36906	XIII. II. 98992,8
XIV.	8. 10. 33		38328	XIV. I. 98992,9
Medium				98993,1

In comparatione harum et sequentium observationum id solum pro norma habui, ne combinationes observationes minori quam vnus horae intervallo a se inuicem distarent: caeterum promiscue in computum ductae sunt.

Abbas *de la Caille* Parisiis institutis experimentis reperit idem ipsum aethomaton in temperie aeris $6\frac{1}{2}^{\circ}$ supra 0 therm. Reaum. spatio diei Solaris medii conficere 98908 oscill. at cum per experimenta *Griseboui* eodem aethomato Petropoli instituta constet variationem vnus gradus thermometri Reaumuriani producere variationem vnus quam proxime oscillationis in motu penduli inuariabilis, numerus oscillationum supra inuentus minuendus erit vna oscillatione, vt experimenta nostra ad eandem temperiem, in qua Parisiis instituta sunt, reducantur. Quare numerus oscillationum spatio diei Solaris medii Kolae confectorum statui poterit rotunde 98692.

EXPERIMENTVM II.

Die II. Maii retardatione horologii astronomici existente $6\frac{1}{2}^{\circ}$ concursus illius cum pendulo inuariabilis sequentes sunt obseruati.

Horol.

	Horolog. Astronom.	Thermom. Reaum.	Pendulum Inuariab.	Num. ofc. spat. diei Sol. med. confectar.
I.	9 ^o . 32'. 9" m.		295 ofc.	I. XI. 98995,8
II.	— 33. 52	5 ¹ / ₂ supra 0	413	II. X. 98995,9
III.	9. 35. 35		531	III. V. 98997,0
IV.	10. 59. 13	6.	6281	IV. VI. 98995,7
V.	11. 1. 16		6422	V. II. 98996,6
VI.	0. 5. 36 v.		10845	VI. II. 98995,7
VII.	— 7. 5	7 ¹ / ₂ .	10947	VII. V. 98994,8
VIII.	0. 8. 27		11041	VIII. X. 98995,9
IX.	8. 29. 21		45479	IX. III. 98995,9
X.	— 30. 57	6.	45589	X. IV. 98996,0
XI.	8. 32. 33		45699	XI. VI. 98995,9

Hinc fumendo medium prodit 98995,9 siue rotunde 98996. Numerus hic nulla correctione indigere videtur, quippe qui in experimento hoc eadem quam proxime fuit temperies, quae et Parisiis.

EXPERIMENTVM III.

Die 10 Maii retardatione horologii a die Solari medio posita 9", 8 siue 10" concursus illius cum pendulo inuariabili obseruati sunt, vt sequitur.

C c c c a

Horolog.

572 EXPERIMENTA CIRCA LONGIT.

	Horolog. Astronom.	Therm. Reaum.	Pendul. Inuariab.	Num. oscil. spat. diei Sol. med. confectar.
I.	0 ^h 9 ^m 16 ^s		78080	I. XVII. 98992,9
II.	— 10. 18	10 ^h 4 ^m 10 ^s sup. o	78151	II. XVI. 98992,0
III.	— 12. 8		78277	III. XVII. 98992,3
IV.	1. 44. 6		84600	IV. X. 98992,2
V.	— 45. 8	13.	84671	V. XI. 98993,0
VI.	1. 46. 30		84765	VI. XII. 98992,4
VII.	2. 31. 31		87869	VII. XI. 98992,5
VIII.	— 33. 14	12.	87978	VIII. XIII. 98992,0
IX.	2. 34. 29		88064	IX. XI. 98992,0
X.	3. 28. 59	13.	91811	X. I. 98992,0
XI.	3. 30. 28		92913	XI. XV. 98991,3
XII.	4. 15. 29		95008	XII. X. 98992,4
XIII.	— 16. 38	14.	95087	XIII. VII. 98991,8
XIV.	4. 18. 0		95181	XIV. I. 98991,7
XV.	6. 5. 38		102581	XV. IV. 98991,7
XVI.	— 9. 24	13.	102840	XVI. VI. 98992,0
XVII.	6. 20. 22		103594	XVII. VI. 98992,0

Medium

Vt reducatur ad temperiem Parifinam

98992,1
+ 6,0

Numerus oscillationum quæfitus

98998,1.

EXPERIMENTVM IV.

Retardatione horologii Astronomici diurna existente 12^h pro vt patet ex supra relatis obseruationibus, die 7^{to} Maii sequentes comparationes institutæ sunt.

Horolog.

	Horolog. Astronom.	Therm. Reaum.	Pendulum Inuarib.	Num. osc. spat. diei Sol. med. confectar.
I.	9 ^b . 51'. 25 ^m . m.		103 osc.	I. XV. 98990,6
II.	54. 19.	14. sup. o	291	II. XI. 98989,5
III.	9. 56. 6.		425	III. X. 98989,7
IV.	10. 32. 33.		2931	IV. VIII. 98991,2
V.	— 37. 14.	14 ^f .	3253	V. X. 98989,7
VI.	12. 3. 17.		5044	VI. I. 98990,7
VII.	— 5. 41.	15 ^f .	5209	VII. XIV. 98991,0
VIII.	11. 34. 49.		7212	VIII. I. 98991,0
IX.	— 39. 3.	15 ^f .	7503	IX. V. 98991,1
X.	0. 15. 37. v.		10017	X. XV. 98991,3
XI.	— 18. 35.	16.	10221	XI. IV. 98991,8
XII.	1. 42. 54.		16018	XII. X. 98991,8
XIII.	— 48. 50.	17.	16426	XIII. II. 98990,5
XIV.	3. 7. 47.		21854	XIV. II. 98990,6
XV.	— 10. 32.	16 ^f .	22043	XV. VIII. 98990,5

Sumto hinc medio prodit 98990 $\frac{1}{2}$ et pro ratione temperiei aucto 8 $\frac{1}{2}$ oscil. fit numerus oscillationum quaesitus 98999.

EXPERIMENTVM V.

Die $\frac{22}{3}$ ^{Maii} _{Iunii} posita eadem retardatione horologii diurna post meridiem sequentes comparationes institui

C c c c 3

Hor.

574 EXPERIMENTA CIRCA LONGIT.

	Horolog. Astronom.	Therm. Reaum.	Pendul. Inuariab.	Num. oscil. spat diei Sol. med. confectar.
I.	2 ^b . 22'. 30 ^u		155 osc.	I. XI. 98990,3
II.	— 24. 27	12½ sup. 0	289	II. XIII 98990,5
III.	2. 25. 42		375	III. XII. 98990,4
IV.	4. 49. 40		10273	IV. XI. 98990,5
V.	— 51. 50	12½	10422	V. XIV. 98990,2
VI.	4. 53. 33		10540	VI. XII. 98990,5
VII.	5. 26. 7		12779	VII. I. 98990,2
VIII.	27. 43	14½	12889	VIII. II. 98990,6
IX.	5. 54. 41		14743	IX. III. 98990,1
X.	56. 3	14½	14837	X. XIII. 98990,0
XI.	5. 57. 39		14947	XI. IV. 98990,4
XII.	7. 16. 36		20375	XII. VII. 98990,9
XIII.	— 18. 26	13½	20501	XIII. VIII. 98990,4
XIV.	7. 19. 48		20595	XIV. IX. 98991,2
			Medium	98990,5

Id quod pro ratione temperiei 7½ osc. auctum dat numerum oscillationum quesitum 98998.

Ex observationibus itaque die 6 Maii institutis numerus oscillationum spatio diei Solaris medii in temperie aëris 6½° supra 0 Therm. Reaum. a pendulo inuariabili Kolae confectarum est - - - - 98992.

Die 13. Maii - - - - 98996,
 — 19. — - - - 98998,
 — 20. — - - - 68999,
 — 22. — - - - 98998.

Omniam

Omnium medium dat 98996½. Idem vero pendulum in eadem temperie aëris eodemque temporis spatio Parisiis conficit 98908. Quare vis grauitatis Parisiis ad vim grauitatis Kolae erit = 100000 : 100179, et cum Longitudo penduli simplicis Parisiis per Experimenta abbatis *de la Caille* sit 440,55 lin. Longitudo penduli oscillationibus suis minuta secunda Kolae sub Latitudine 68° 52½ indicantis erit = $\frac{440,55 \times (98996\frac{1}{2})^2}{(98908)^2} = 441,34$ lin.

Cl. *Malletus* in Ponoï sub latitudine 67°, 4½ Longitudinem penduli simplicis minuta secunda oscillantis reperit 441,22 lin. posita Longitudine penduli Parisina 441,57, qualis a *de Mairan* inuenta est; quodsi nos eandem in calculo adhibere velimus, prodibit Longitudo penduli minuta secunda Kolae oscillantis 441,36 lin.

In eandem rem alio modo beneficio sc. penduli simplicis inquisiturus, aliud horologium ab eodem artifice elaboratum data opera ita adaptabam, vt a tempore medio retardaret 4½ circiter. Apparatus ad haec experimenta adhibitus idem ipse fuit, quali *Selenginski* vsus sum, et qui descriptus a *Griseboui* legitur in Tom. VII. Nov. Comm. sc. virga ferrea et pondusculum biconicum ab abbate *de la Caille* ad *Griseboui* transmissa, filum aloes, forceps cui filum pondusculo onustum inferitur, et machina ad sustinendam virgam ferream a *Griseboui*

exco-

576 EXPERIMENTA CIRCA LONGIT.

excogitata, qua virga prehensa ope cochlearum sursum et deorsum, prorsum et antrorsum, dextrorsum et sinistrorsum mouetur, ita ut mediante hoc triplici motu commodissime virga pendulo applicari, et num longitudo fili aequalis sit longitudini illius microscopio examinari possit.

EXPERIMENTVM. I.

Die 16. Maii retardatione diurna horologii Astronomici a die Solari medio existente 4'. 39", barometro monstrante 29 dig. 4 lin. mens. Lond. in temperie aeris thermometri Reaumuriani 3° supra 0, comparando oscillationes penduli simplicis cum motu horologii Astronomici primus pendulorum concursus ad eandem partem obseruatus est horologio monstante 5^b. 27'. 0", dein pendulum simplex prae horologio Astronomico lucrari videbatur concurrendo.

	ad eandem partem		ad diuersas
0. osc.	5 ^b . 17'. 0"	1. osc.	5 ^b . 20'. 17"
2.	5. 23. 55.	3.	5. 27. 18.
4.	5. 30. 45.	5.	5. 33. 50.
6.	5. 37. 27.	7.	5. 40. 40.
8.	5. 43. 51.	—	— — —
10.	5. 50. 48.	11.	5. 53. 59.
12.	5. 57. 27.	13.	6. 0. 34.
14.	6. 3. 52.		

In difficultate concursus observandi origo sita est, quod concursibus aequae a se invicem distantibus raro respondeant aequalia temporis intervalla. Disparitatem hanc cum cernerem in reliquis quoque experimentis, et in certis haererem, quibusnam concursibus maior fides habenda sit, cum omnes pari cura observati esse viderentur, in computando intervallo temporis, quo pendulum simplex lucretur unam oscillationem ad sequentem methodum confugi.

Sit momentum horologii, quo primus pendulorum concursus obseruatus est $= t$, et interval-
lum temporis, quo pendulum simplex prae horolo-
gio Astronomico lucratur vnā oscillationem $= x$,
horologio monstrante $t + x$ pendula concurrent, et
simplex prae pendulo horologii lucrabitur vnā
oscillationem. Post modum horologio indicante

$t+2x$	pendulum simplex	lucrabitur	2. oscill.
$t+3x$	-	-	3. oscill.
$t+4x$	-	-	4. oscill.

et ita porro vsque dum pendulum simplex ad quietem fuerit redactum aut experimentum fuerit continuatum. Ponamus illud finitum fuisse postquam pendulum simplex lucratum fuerit n oscillationes, et observatos esse m concursus, summa omnium momentorum, quibus concursus: euenire debebant, erit $m \cdot \frac{1}{2} (1 + 2 + 3 \dots + n) x$, et cum summa momentorum, quibus concursus actu sunt observati,

Tom. XVI. Nou. Comm. D d d d detur

578. EXPERIMENTA CIRCA LONGIT.

detur ex ipso experimento, quae sit $= s$, habebitur
 $mt + (1 + 2 + 3 \dots + n)x = s$. Hinc $x = \frac{s - mt}{1 + 2 + \dots + n}$
 vel si continuo omnes concursus fuerint observati
 erit $m = n + 1$, et $x = \frac{s - (n + 1)t}{\frac{1}{2}n(n + 1)}$.

Facta applicatione ad experimentum fit $s = 79^b$.
 $21^l. 43''$, $m = 14$, $mt = 73^b. 58^s. 0''$ et diuisor,
 quia nonus concursus deficit, hoc modo exprimi po-
 terit $\frac{1}{2}n(n + 1) = 9$, ac erit ille $= 96$; unde inter-
 vallum temporis, quo pendulum simplex prae ho-
 rologio Astronomico lucratur vnā oscillationem,
 prodit $= 3^l. 22''$, 3, et numerus oscillationum spatio
 diei Solaris medii in temperie aeris 3° supra 0 a
 pendulo simplici Kolae confectarum 86546, 7.

Per multiplicia vero *Griseboui* experimenta
 constat variationem trium graduum thermometri
 Reaumuriani producere variationem vnus quam pro-
 xime oscillationis in motu penduli simplicis spatio
 diei Solaris medii; quare vt experimenta nostra ad
 eandem temperiem, in qua Parisiis eodem pendulo
 ab abbate *de la Caille* instituta sunt nempe 12° su-
 pra 0, reducantur, a numero inuento subtrahi de-
 bent 3 oscillationes, et prodit numerus oscillatio-
 num quaesitus 86543, 7.

EXPERIMENTVM II.

Die $\frac{6}{17}$. Iulii retardatione horologii Astronomi-
 ci a die solari medio existente $4^l. 41''$, 2 in tempe-
 rie

rie aeris 13° supra 0, barometro monstrante 29 dig. 7 lin. mensurae Lond. incitabam ad motum pendulum simplex; peractis aliquot oscillationibus pendula concurrando ad eandem partem concordare visa sunt horologio monstrante $4^b. 46'. 20''$, sequentes vero concursus sequentem in modum sunt obseruati.

	ad eandem partem		ad diuerfas
0. oscil.	$4^b. 46'. 20''$	1. osc.	$4^b. 49'. 45''$
2 —	$4. 53. 22.$	3.	$4. 56. 36.$
4 —	$5. 0. 0.$	5.	$5. 3. 23.$
6.	$5. 6. 56.$	7.	$5. 10. 26.$
8.	$5. 13. 40.$	9.	$5. 16. 55.$
10.	$5. 20. 20.$	11.	$5. 23. 27.$
12.	$5. 26. 56.$	13.	$5. 30. 21.$
14.	$5. 33. 36.$	15.	$5. 37. 0.$
16.	$5. 40. 16.$	—	—

Vnde fit $s = 88^b. 48'. 49''$, $(n + 1)t = 81^b. 7'. 40''$ et $\frac{1}{2}n(n + 1) = 136$; quare intervallum temporis, quo pendulum simplex prae horologio Astronomico lucrabatur vnā oscillationem, est $3'. 23''$, 4, et numerus oscillationum spatio diei Solaris medii a pendulo simplici confectarum erit $= 86542, 2$. Numerus hic nulla correctione indigere videtur, quippe qui temperies aeris in hoc experimento eadem fere fuit, in qua Parisiis experimenta eodem pendulo sunt capta.

D d d d a

EXPE-

EXPERIMENTVM III.

Die 17. Iulii retardatione horologii Astronomici diurna existente $4^h.43^m$, barometro monstrante 29 dig. 9 lin. mens. Lond. in temperie aeris 12° supra 0 ante meridiem incitato ad motum pendulo simplici primus pendulorum concursus ad eandem partem euenire visus est horologio monstrante $10^h.19^m.40^s$, dein pendulum simplex prae horologio Astronomico lucratum est concurrente.

	ad eandem partem		ad diuerfas
0. ofc.	$10^h.19^m.40^s$	1. ofc.	$10^h.23^m.5^s$
2.	10. 26. 34.	3.	10. 29. 52.
4.	10. 33. 12.	5.	10. 36. 34.
6.	10. 39. 56.	—	— — —
8.	10. 46. 22.	9.	10. 49. 26.
10.	10. 52. 48.	11.	10. 55. 42.
12.	10. 59. 26.	—	— — —

In hoc experimento concursus ad eandem partem praecipue sunt obseruati, quare si illorum tantum in computo ratio habeatur, prodibit $x=3^h.20^m$, et numerus oscillationum spatio diei Solaris medii in temperie aeris 12° supra 0 a pendulo simplici confectarum prodibit 86546.

EXPERIMENTVM IV.

Die 17. Iulii retardatione horologii diurna existente $4^h.43^m$, barometro monstrante 29 dig. 5 lin. mens.

mens. Lond. in temperie aeris 17° supra 0 post meridiem pendula concurrebant ad eandem partem horologio monstrante $3^b. 18'. 20''$. Dein reliqui concursus sequentem in modum fuere obseruati.

	ad eandem partem		ad diuersas
0. ofc.	$3^b. 18'. 20''$.	1. ofc.	$3^b. 21'. 32''$.
2.	3. 25. 5.	3.	3. 28. 21.
4.	3. 31. 35.	5.	3. 34. 57.
6.	3. 38. 30.	7.	3. 41. 36.
8.	3. 45. 20.	9.	3. 48. 35.
10.	3. 52. 2.	11.	3. 55. 18.
12.	3. 58. 43.	13.	3. 2. 0.
14.	4. 5. 28.	15.	4. 8. 57.
16.	4. 12. 12.	—	— — —

Hinc obtinebitur $s = 63^b. 48'. 21''$, $(n + 1)s = 56^b. 11'. 40''$ et $\frac{1}{2}n(n + 1) = 136$, quare $x = 3'. 21''$ et numerus oscillationum a pendulo simplici spatio diei Solaris medii confectarum = 86543, 8, qui pro ratione temperiei auctus 1, 7 oscill. prodit 86543½.

EXPERIMENTVM V.

Die 17. Iulii retardatio horologii Astronomici a die Solari medio inuenta est $4'. 41''$, barometro monstrante 29 dig. 2 lin. mens. Lond. in temperie aeris 8° supra 0 post meridiem incitabam ad motum pendulum simplex, ac sequentes concursus obseruabam.

D d d d 3

ad

	ad eandem parten		ad diversas
0.	4 ^b . 57'. 58"	1.	5 ^b . 1'. 15"
2.	5. 4. 42.	3.	5. 7. 57.
4.	5. 11. 40.	5.	5. 14. 59.
6.	5. 18. 27.	7.	5. 21. 47.
8.	5. 25. 8.	9.	5. 28. 22.
10.	5. 31. 50.	—	— — —
12.	5. 38. 38.	13.	5. 42. 0.
14.	5. 45. 26.	15.	5. 48. 54.
16.	5. 52. 10.	17.	5. 55. 37.
18.	5. 58. 52.	—	— — —

Facta applicatione methodi supra memoratae fit $m = 18$, $r = 98^b. 25'. 52''$ $mt = 89^b. 23'. 24''$, et quia undecimus concursus deficit $n(n+1)-11=160$; hinc $x = 3'. 23'', 4$ et numerus oscillationum spatio diei Solaris medii in temperie aeris 8° supra ϕ pendulo simplici confectarum prodit $86541\frac{1}{2}$ vel demum x ; oscill. pro ratione temperiei fit 86540 .

Numerus itaque oscillationum Kolae in temperie aeris 12 supra ϕ spatio diei Solaris medii a pendulo simplici confectarum est per

Exper. I.	- - - - -	86543,7
II.	- - - - -	86542,2
III.	- - - - -	86546,0
IV.	- - - - -	86545,5
V.	- - - - -	86540,0

Medium 86543,5
Idem

Idem vero pendulum in eadem temperie aeris Parisiis iuxta experimenta abbatis *de la Caille* spatio diei Solaris medii conficit 86454 osc. et longitudo penduli ibidem est 440,55 lin. Quare Longitudo penduli Kolae minuta secunda indicantis erit

$$\frac{440,55 \times (86543)}{(86454)} = 441,46 \text{ lin. quae a prius}$$

innenta differt $\frac{1}{13}$ lin. Cum vero experimenta pendulo simplici instituenda maioribus difficultatibus sint obnoxia, quam quae pendulo invariabili peraguntur, longitudinem penduli supra inuentam veritati magis esse consentaneam existimo.

Kola naui vectus Archangelopolin perueni die 15 Augusti. Animus ibi fuit a *De l'Isle de la Croyere* Longitudinem penduli simplicis anno 1728 inuentam propriis experimentis comprobare; verum negotium hoc ea qua par est certitudine perficere non potui. Motum horologii astronomici cognoscere cupiens, spatio duarum hebdomadarum nullum praetermisi diem, quin caperem ante meridiem altitudines Solis, verum post meridiem die 28 Aug. tantum correspondentes, et sequenti mane easdem capere licuit, ita vt ex iis meridiem verum et mediam noctem elicere, indeque motum horologii stabilire fuerit in potestate. En ipsas altitudinum obseruationes.

Die

Die 20. Aug.
7. Sept.

ante meridiem	altit. Solis	Post. merid.	Meridies
8 ^b . 45 ⁱ . 24 ^u	24 ^o . 20 ⁱ	2 ^b . 22 ⁱ . 8 ^u	11 ^o . 34 ⁱ . 16 ^u
— 46. 21		— 21. 13	— — 17
— 50. 45	24. 40	— 17. 50 ⁱ	— — 17 ⁱ
— 51. 40		— 16. 50	— — 15
— 55. 7 ⁱ	25. 0	— 13. 28	— — 17 ⁱ
— 56. 4		— 12. 31	— — 17 ⁱ
8. 59. 34 ⁱ	25. 20	— 9. 0	— — 17 ⁱ
9. 0. 37.		2. 7. 58	11. 34. 17 ⁱ

Meridies medius 11. 34. 16, 7

Correctio meridiei + 31, 8

Meridies verus 11. 34. 48, 5.

Die 20. Aug. 7. Sept.	Altit. Solis	Die 20. Aug. 7. Sept.	Media nox	Correctio med. noctis	Mediam nox vera
Post. merid.		Ante merid.			
2 ^b . 22 ⁱ . 8 ^u	24 ^o . 20 ⁱ	8 ^b . 50 ⁱ . 14 ^u	11 ^b . 36 ⁱ . 11 ^u	— 1. 47 ^u , 2	11 ^b . 34 ⁱ . 23 ^u , 8
— 21. 13		51. 7	— — 10 ⁱ	— 1. 47, 7	— — 22, 5
— 17. 50 ⁱ	24. 40	54. 38	— — 14 ⁱ	— 1. 50, 4	— — 23, 2
— 16. 50		55. 37	— — 13 ⁱ	— 1. 50, 1	— — 22, 4
— 13. 28	25 0	8. 59. 7 ⁱ	— — 17 ⁱ	— 1. 53, 7	— — 24, 0
— 12. 31		9. 0. 7	— — 19	— 1. 54, 5	— — 24, 5
— 9. 0	25. 20	— 3. 46	— — 22	— 1. 57, 4	— — 24, 6
2. 7. 58		9. 4. 48.	11. 36. 23	— 1. 58, 4	11. 34. 24, 6

Media nox vera 11. 34. 23, 8.

Vnde colligitur retardatio horologii spatio dimidii diei solaris medii 14ⁱ et retardatio diurna 29^u.

Tcm.

Temperies aëris intra hos binos dies iuxta thermometrum Reaumurianum ante meridiem 9 graduum post meridiem vero ad 13 vsque gradus ascendere est obseruata, eadem scilicet quam proxime fuit quae et Kolae, dum idem horologium spatio diei solaris medii retardaret 10^h. Et cum longitudo penduli minuta secunda Kolae indicantis par praecedentia experimenta sit 441, 34 lin. habebitur longitudo penduli singula minuta secunda Archangelopoli sub latitudine 64°. 33' oscillantis = $\frac{441, 34 \times \frac{(26171)^2}{(16190)^2}}{1} = 441, 15$ lin. parif.

De *l'Islius* ibidem diuersam ab hac reperit penduli longitudinem nempe 440, 70 lin. parif. Penes lectores iudicium sit, vtra determinatio veritati magis sit censentanea. Comparatio vero longitudinum penduli Kolae 441, 35; in Ponoï 441, 22; in Pello 441, 17 et Petropoli 441, 02 inuentarum monstrare videtur determinationem De *l'Islianam* huic esse postponendam.

DE
PARALLAXI SOLIS
CONCLVSA EX TRANSITV VENERIS PER
SOLEM A. 1769 IN INSVLA REGIS
GEORGII OBSERVATO.

Auctore

AND. IOH. LEXELL.

I.

Dum ex observationibus Transitus Veneris per Solem, quantitas parallaxeos Solaris investigari debet, maxime e re est, vt eiusmodi observationum inter se fiat comparatio, pro quibus effectus Parallaxis insigni afficitur diuersitate, ne alioquin ipsi errores in observationibus commissi omnem effectum Parallaxis vel plane absorbeant, vel saltem qua potiore partem imminuant. Hinc igitur liquet ex observationibus nouissimi Transitus A. 1769. in variis Europae regionibus institutis, dum inter se comparantur, nihil certi de Parallaxi Solis statui posse; contra vero harum observationum comparisonem cum iis quae in America institutae fuerunt, eo certiores pro Parallaxi Solis praebere conclusiones, quo magis fuerit diuersus effectus Parallaxeos pro observationibus Americanis, ab eo qui pro Europeis

ropeicis obtinuit. In Parte II^{da} Tom. XIV. horum Commentariorum fusc iam explicatum est, qualem praebeant Parallaxin observationes ad Sinum Hudsonis et in fortalitio St. Iosephi Californiae institutae si cum Europeicis comparentur; quum igitur valores pro Parallaxi tum inuenti egregie inter se consenserint, iisdem omnino acquiescere siceret, praesertim quia certissime nobis habemus persuasum, quantitatem Parallaxis tum inuentam ultra partem quintam vnus minuti secundi a veritate discrepaturam non fore. Verum enim vero quum observationes in insula Regis Georgii ab Astronomis Anglis institutae, ita sint comparatae, vt pro iis effectus Parallaxeos non modo sit insignis, sed etiam plane contrarius illi, quo observationes in Europae factae erant affectae, facile perspicitur istas observationes ad parallaxin Solis determinandam censerit debere aptissimas, ideoque omnino operae pretium fuisse, vt inquireretur quatenam prodeat quantitas parallaxeos Solis, si harum observationum instituaturs comparatio cum iis, quae in variis Europae regionibus fuerunt factae. Certissimam enim nobis facere possumus spem, valorem Parallaxeos inde inuentum, vix ultra partem decimam vnus minuti secundi a iusto aberraturum esse. Huiusmodi igitur disquisitionem dum hac occasione suscipere in animum induxi, id tantum praemonere necessum duco, methodum a me hoc in negotio adhibitam, eandem esse, quam Illustr. Eulerus in supra memorata Part. II. Tom. XIV. Nouor. Comment. tradidit ad cuius praecepta, reli-

E e e e 2

quae

quae huius Transitus observationes a me computatae fuerunt.

2. Antequam ipsum computum observationum in Insula Regis Georgii institutarum adgrediamur, haud abs re esse iudicauimus, breuem heic adponere recensitionem harum observationum, talem scilicet, qualis ab Illustr. Societate Scientiarum Londinensi cum Illustr. Academia Scientiarum nostra communicata fuit :

Observationes contactuum Veneris cum Sole.

Nomen	pro ingressu		pro egressu		Temp. vero
	cont.	extern.	cont.	intern.	
Green	21 ^b . 25 ^t . 40 ^u	21 ^b . 43 ^t . 55 ^u	3 ^b . 14 ^t	3 ^u . 32 ^t . 14 ^u	
Cook	25. 45	44. 15 ¹ / ₂	14. 13	32. 2	
Solander	- - -	44. 2 ¹ / ₂	- - -	32. 13	

Distantia minima centrorum Solis et Veneris 10^t. 25^u, 4. Latitudo stationis ubi observatio peracta 17°. 28^t. 55^u Austr. Longitudo huius loci Occident. a Grenouico 149°. 26^t. 0^u, seu in tempore 9^b. 57^t. 44^u adeoque a Lutetia Parisiorum 10^b. 7^t. 0^u.

Circa has observationes annotasse iuuabit, momenta contactuum a Cel. *Green* assignata a nobis in usum vocata fuisse, observatione tantum contactus interni pro ingressu excepta, ubi quum momenta huius contactus a binis obseruatoribus Dnis *Green* et *Cook* assignata 20^u inter se discrepent, proxime nos ad veritatem accessuros existimauimus, si nomen-

mentum a Dno Doct. *Solander* pro hoc contactu assignatum feligeremus, siquidem medium quasi teneat inter bina reliqua. Postmodum autem occasio dabitur inquirendi, qualem ipsa Parallaxis patiatur mutationem, ex discrepantiâ horum momentorum.

Calculus observationum in Insula Regis Georgii institutarum.

3. Quum elevatio Poli pro loco ubi observatio peracta, inuenta sit $17^{\circ}.28'.55''$ Austr., erit distantia Poli Australis a Zenith huius loci apparente $72^{\circ}.31'.5''$, ideoque distantia inter Zenith verum et apparens $9'.41''$, ita ut sit distantia Zenith veri a Polo Australi $= Pz = 72^{\circ}.40'.50''$ circiter. Porro quum longitudo huius loci a meridiano Parisino assignata sit $10^{\circ}.7'.0''$ statuamus eam reuera esse $10^{\circ}.7' - 0''$.

I. Observatio contactus externi circa ingressum.

Facta est d. 2. Iunii $21^{\circ}.25'.40''$ Temp. vero, unde habetur angulus $\odot Pz = 38^{\circ}.35'.0''$. Quum vero tempus Parisinum huius observationis sit d. 3. Iunii $7^{\circ}.32'.40''$, erit $t = 2^{\circ}.37'.13'' = 2,620277$, ex quo sequens instituatur calculus:

Tab. XIX.

Fig. 1.

$$L. s = 0,4183473$$

$$L. (a + \beta) = 2,3756636$$

$$L. \gamma = 1,5492486$$

$$\gamma t = 92,8$$

$$L. \odot V = 2,7940109$$

$$l = 613,4$$

$$L. \gamma t = 1,9675959$$

$$\varphi V = 706,2$$

$$L. \text{Tang } \sigma = 2,8489277$$

$$L. \varphi V = 2,8489277$$

$$L. \odot V = 2,7940109$$

$$L. \sin \sigma = 9,8752128$$

$$L. \text{Tang } \sigma = 10,0549168$$

$$L. s = 2,9737149$$

$$\sigma = 48^{\circ} 36'. 47''$$

$$s = 941,27.$$

Pro tempore autem observationis habetur angulus $A \odot P = 82^{\circ} 54'. 30''$ et $\odot P = 112^{\circ} 25'. 50''$ circiter, unde triangulum $\odot P z$ sic resolvetur.

Fig. 2.

$$L. \sin. Pz = 9,9798486$$

$$L. \text{tang } Pz = 10,5060715$$

$$L. \sin. \odot Pz = 9,7949425$$

$$L. \cos. \odot Pz = 9,8930412$$

$$L. \sin. zQ = 9,7747911$$

$$L. \text{tang. } PQ = 10,3991127$$

$$PQ = 68^{\circ} 15'. 10''$$

$$\odot P = 112^{\circ} 25'. 50''$$

$$\odot Q = 44. 10. 40$$

$$L. \cos. zQ = 9,9049804$$

$$L. \text{tang. } zQ = 9,8698252$$

$$L. \cos. \odot Q = 9,8556287$$

$$L. \sin. \odot Q = 9,8431624$$

$$L. \cos. \odot z = 9,7605891$$

$$L. \text{tang. } P\odot z = 10,0266628$$

$$\odot z = 54^{\circ} 48'. 50''$$

$$P\odot z = 46^{\circ} 45'. 30''$$

$$A \odot P = 82. 54. 30$$

$$A \odot z = 36. 9. 0$$

$$A \odot \varphi = 131. 23. 10^{\text{circ.}}$$

$$z \odot \varphi = 167. 32. 10$$

Quum

CONCLVSA EX TRANSIT. VENERIS. 591

Quum igitur sit $\odot \varphi v = z \odot \varphi + \frac{1}{2} \omega$ habebimus :

$$\begin{aligned} L s &= 2,9737149 & L s &= 2,9737149 \\ L. \cos. z \odot \varphi &= 9,9596421 (-) & L. \sin. z \odot \varphi &= 9,3341002 \\ L. \odot R &= 2,9633570 & L. \cot. \odot z &= 9,8482257 \\ \odot R &= 919'' = 15'. 19'' & L. \omega &= 2,1560408 \\ z \varphi &= 55^\circ. 4'. 10'' & \omega &= 143''; \frac{1}{2} \omega = 3'. 20'' \\ \odot \varphi v &= 167^\circ. 35'. 30'' \end{aligned}$$

Pro calculo parallactico erit :

$$\begin{aligned} L. \sin. z \varphi &= 9,9137326 & L. \frac{\varphi v}{H} &= 0,3135793 \text{ Tab. XIX.} \\ L. \left(\frac{\varphi}{b} - 1 \right) &= 0,3998467 & L. \sin. \odot \varphi v &= 9,3321907 \text{ Fig. 3.} \\ L. \frac{\varphi v}{H} &= 0,3135793 & L. \frac{v \omega}{H} &= 9,6457700 \\ L. \cos. \odot \varphi v &= 9,9897350 (-) & L. v \omega &= 0,6457700 \\ L. \frac{\varphi \omega}{H} &= 0,3033143 & L. s &= 2,9737149 \\ \varphi \omega &= -2,0105. \pi \text{ hinc} & L. T. \varphi \odot v &= 7,6720558 \\ \odot v &= 941,27 + 2,0105. \pi & \odot \varphi v &= 0^\circ. 16'. 9'' \\ & & B \odot \varphi &= 48. 36. 47 \\ & & B \odot v &= 48. 20. 38 \end{aligned}$$

Iam propter augmentum ex $v X$ oriundum Fig. 4. habebitur correctio $+0,6647. x + 0,0443 \theta$, augmentum autem $v Y$ dabit correctionem $+0,7472. y + 0,0071. \theta$, vnde coniunctim prodibit correctio $+0,6647. x + 0,7472. y + 0,0514 \theta$, valor igitur correctus distantiae centrorum Solis et Veneris erit :
 $941,27 + 2,0105. \pi + 0,6647. x + 0,7472. y + 0,0514. \theta$
 qui

qui quum aequalis esse debeat $9764''$, inde haec elicietur aequatio :

$$\mu = -34,73 + 2,0105 \cdot \pi + 0,6647 \cdot x + 0,7472 \cdot y + 0,0514 \cdot \theta.$$

II. Contactus internus pro ingressu.

Contigit $21^b.44^l.2''$ vnde deducitur ang. $\odot Pz = 33^\circ.59'.22''$. Tempus autem Parisinum huius observationis est $7^h.51'.2''$ ex quo habetur $t = 2^h.18'.50'' = 2,314027$.

$$L. t = 0,3643686$$

$$L. (\alpha + \beta) = 2,3756636$$

$$L. \gamma = 1,5492486$$

$$L. \odot V = 2,7400322$$

$$L. \gamma t = 1,9136172$$

Tab. XIX.

Fig. 1.

$$L. \varphi V = 2,8422347$$

$$L. \odot V = 2,7400322$$

$$L. \tan. \sigma = 10,1022025$$

$$L. \sigma = 51^\circ.40'.49''$$

$$\gamma t = 82,0$$

$$l = 613,4$$

$$\varphi V = 695,4$$

$$L. \varphi V = 2,8422347$$

$$L. \sin. \sigma = 9,8946278$$

$$L. s = 2,9475069$$

$$s = 886,35.$$

Pro tempore observationis est $A \odot P = 82^\circ.$

$$54'.50'' \text{ et } \odot P = 112^\circ.25'.50''.$$

Fig. 2.

$$L. \sin. Pz = 9,9798486 \quad L. \tan. Pz = 10,5060715$$

$$L. \sin. \odot Pz = 9,7474445 \quad L. \cos. \odot Pz = 9,9186275$$

$$L. \sin. zQ = 9,7272931 \quad L. \tan. PQ = 10,4246990$$

$$PQ = 69^\circ.23'.20''$$

$$\odot P = 112.25.50$$

$$\odot Q = 43.2.30$$

$$L. \cos$$

CONCLVSA EX TRANSIT. VENERIS. 593

$$L. \cos. zQ = 9,9272040 \quad L. \tan. zQ = 9,8000903$$

$$L. \cos. \odot Q = 9,8628327 \quad L. \sin. \odot Q = 9,8341218$$

$$L. \cos. \odot z = 9,7910367 \quad L. \tan. P \odot z = 9,9659685$$

$$\odot z = 51^{\circ}.49'.30'' \quad P \odot z = 42^{\circ}.45'.30''$$

$$A \odot P = 82.54.50$$

$$A \odot z = 40.19.20$$

$$A \odot \varphi = 128.19.10$$

$$z \odot \varphi = 168.28.30$$

$$Ob. \odot \varphi v = z \odot \varphi + \omega \text{ fict.}$$

$$L. s = 2,9476069 \quad L. t = 2,9476069$$

$$L. \cos. z \odot \varphi = 9,9911541 (-) \quad L. \sin. z \odot \varphi = 9,3005857$$

$$L. \odot R = 2,9387610 \quad L. \cos. \odot z = 9,8955419$$

$$\odot R = 868'' = 14''.28'' \quad L. \omega = 2,1437345$$

$$z \varphi = 52^{\circ}.4'.0'' \quad \omega = 139'', \omega = 3'.15''$$

$$\odot \varphi v = 168^{\circ}.31'.40''$$

$$\text{Sequitur calculus parallacticus}$$

$$L. \sin. z \varphi = 9,8969265 \quad L. \frac{v}{H} = 0,2967732$$

$$L. (\frac{v}{H} - 1) = 0,3998467 \quad L. \sin. \odot \varphi v = 9,2986191$$

$$L. \frac{v}{H} = 0,2967732 \quad L. \frac{v}{H} = 9,5953923$$

$$L. \cos. \odot \varphi v = 9,9912355 (-) \quad L. v \omega = 0,5953923$$

$$L. \frac{v}{H} = 0,2880087 \quad L. s = 2,9476069$$

$$L. T. \varphi \odot v = 7,6477854$$

$$\varphi \odot v = 0^{\circ}.15'.17''$$

$$\varphi \omega = -1,9409. \pi \text{ hinc} \quad B \odot \varphi = 51.40.49$$

$$\odot v = 886,35 + 1,9409. \pi \quad B \odot v = 51.25.32$$

$$\text{Tem. XVI. Nou. Comm.} \quad F f f f \quad \text{Hinc}$$

Tab. XIX.
Fig. 3.

Hinc ergo deducetur distantia eentrorum correcta:
 $886,35 + 1,9409 \cdot \pi + 0,6235 \cdot x + 0,7818 \cdot y + 0,0490 \cdot z$
 $= 918 + v$
 ex quo sequens emergit aequatio:
 $v = -31,65 + 1,9409 \cdot \pi + 0,6235 \cdot x + 0,7818 \cdot y + 0,0490 \cdot z$

III. Contactus internus pro egressu.

5. Obseruatus est d. 3 Iun. $3^h. 14'. 3''$, vnde habetur ang. $\odot Pz = 48^\circ. 30'. 45''$, atque ob tempus Parisinum huius obseruationis $= 13^h. 21'. 3''$ erit $t = 3^h. 11'. 10'' = 3,186111$.

Tab. XIX. L. $t = 0,5032609$

Fig. 1. L. $(\alpha + \beta) = 2,3756636$

L. $\gamma = 1,5492486$

$\gamma t = 112,8$

$l = 613,4$

L. $\odot V = 2,8789245$

L. $\gamma t = 2,0525095$

$\odot V = 500,6$

L. $\odot V = 2,6994908$

L. $\odot V = 2,8789245$

L. $\odot V = 2,8789245$

L. $\cos. \sigma = 9,9211721$

L. $\tan. \sigma = 9,8205663$

L. $s = 2,9577524$

$\sigma = 33^\circ. 29'. 13''$

$s = 907,30$

Pro momento obseruationis est $A \odot P = 83^\circ.$

$0'. 10''$ et $P \odot = 112^\circ. 27'. 30''$.

Tab. XIX. L. $\sin. Pz = 9,9798486$ L. $\tan. Pz = 10,5060715$

Fig. 5. L. $\sin. \odot Pz = 9,8745399$ L. $\cos. \odot Pz = 9,8211575$

L. $\sin. zQ = 9,8543885$ L. $\tan. PQ = 10,3272290$

$PQ = 64^\circ. 47'. 30''$

$\odot P = 112. 27. 30$

$\odot Q = 47. 40. 0$

L. $\cos.$

CONCLVSA EX TRANSIT. VENERIS. 595

$$L. \text{ cof. } zQ = 9,8444587 \quad L. \text{ tang. } zQ = 10,0099389$$

$$L. \text{ cof. } \odot Q = 9,8283006 \quad L. \text{ fin. } \odot Q = 9,8687851$$

$$L. \text{ cof. } \odot z = 9,6727593 \quad L. \text{ tang. } P\odot z = 10,1411538$$

$$\odot z = 61^{\circ}. 55'. 10'' \quad P\odot z = 54^{\circ}. 9'. 0''$$

$$A\odot P = 83. 0. 10$$

$$A\odot z = 137. 9. 10$$

$$A\odot \varphi = 23. 29. 10$$

$$z\odot \varphi = 170. 38. 20$$

$$\text{Ob } \odot \varphi v = z\odot \varphi + \frac{1}{2} \omega \text{ erit:}$$

$$L. s = 2,9577524 \quad L. s = 2,9577524$$

$$L. \text{ cof. } z\odot \varphi = 9,9941776 (-) \quad L. \text{ fin. } z\odot \varphi = 9,2112709$$

$$L. \odot R = 2,9519300 \quad L. \text{ cor. } \odot z = 9,7271460$$

$$\odot R = 895'' = 14'. 55'' \quad L. \omega = 1,8961693$$

$$z\varphi = 62^{\circ}. 10'. 0'' \quad \omega = 79''; \frac{1}{2}\omega = 1'. 50''$$

$$\odot \varphi v = 170^{\circ}. 40'. 10''$$

Pro calculo parallactico habebimus

Tab. XIX.

$$L. \text{ fin. } z\varphi = 9,9466043 \quad L. \frac{s}{H} = 0,3464510 \quad \text{Fig. 6.}$$

$$L. (\frac{s}{\phi} - 1) = 0,3998467 \quad L. \text{ fin. } \odot \varphi v = 9,2098636$$

$$L. \frac{s}{H} = 0,3464510 \quad L. \frac{v}{H} = 9,5563146$$

$$L. \text{ cof. } \odot \varphi v = 9,9942157 (-) \quad L. \psi \omega = 0,5563146$$

$$L. \frac{s}{H} = 0,3406667 \quad L. s = 2,9577524$$

$$\varphi \omega = -2,1911. \pi \text{ hinc } L. \text{ tang. } \varphi \odot v = 7,5985622$$

$$\odot v = 907,30 + 2,1911. \pi \quad \varphi \odot v = 0^{\circ}. 13'. 58''$$

$$A\odot \varphi = 33. 29. 13$$

$$A\odot v = 33. 42. 51$$

Ffff 2

Ex

Tab. XIX. Ex particula ψX iam nascitur decrementum -0 ,

Fig. 7. $8318 x - 0,0554. \theta$ et ex particula ψY incrementum $+0,5550.y + 0,0053. \theta$, consequenter erit distantia centrorum correcta:

$$907,30 + 2,1911. \pi - 0,8318.x + 0,5550.y - 0,0501. \theta = 918 + v$$

ex quo haec deducitur aequatio finalis:

$$v = -10,70 + 2,1911. \pi - 0,8318.x + 0,5550.y - 0,0501. \theta$$

At contactus internus circa ingressum praebuit

$$v = 31,65 + 1,9409. \pi + 0,6235.x + 0,7818.y + 0,0490. \theta$$

multiplicata igitur hac posteriori aequatione per $\frac{1}{11}$ obtinebimus:

$$1,022v = -32,36 + 1,9845. \pi + 0,6375.x + 0,7994.y + 0,0501. \theta$$

Ex hac autem aequatione cum superiori comparata deducitur sequens valor ipsius v , incognitam θ non inuoluens:

$$v = -21,29 + 2,0647. \pi - 0,0961.x + 0,6697.y$$

IV. Contactus externus pro egressu.

6. Obseruatus est $3^b. 32'. 14''$ ex quo fit ang. $\odot Pz = 53^\circ. 3'. 30''$. Quum vero tempus Parisinum huius obseruationis sit $13^b. 39'. 14''$, habebitur $t = 3^b. 29'. 21'' = 3,489166$:

Tab. XIX. $L. t = 0,5427217$

Fig. 1. $L. (\alpha + \beta) = 2,3756636$

$L. \gamma = 1,5492486$

$L. \odot V = 2,9183853$

$L. \gamma t = 2,0919703$

$\gamma t = 123,6$

$l = 613,4$

$\varphi V = 489,8$

$L. \varphi V$

CONCLVSA EX TRANSIT. VENERIS 597

$$L. \varphi V = 2, 6900188$$

$$L. \odot V = 2, 9183853$$

$$L. \odot V = 2, 9183853$$

$$L. \text{cof. } \sigma = 9, 9349365$$

$$L. \text{Tang. } \sigma = 9, 7716335$$

$$L. s = 2, 9834488$$

$$\sigma = 30^{\circ}. 35'. 9''$$

$$s = 962, 61.$$

Pro tempore observationis est $A \odot P = 83^{\circ}. 0'. 30''$

$$\text{et } \odot P = 112^{\circ}. 27'. 30''.$$

$$L. \text{fin. } Pz = 9, 9798486 \quad L. \text{Tang. } Pz = 10, 5060715 \quad \text{Tab. XIX.}$$

$$L. \text{fin. } \odot Pz = 9, 9026815 \quad L. \text{cof. } \odot Pz = 9, 7788756 \quad \text{Fig. 51}$$

$$L. \text{fin. } zQ = 9, 8825301 \quad L. \text{Tang. } PQ = 10, 2849471$$

$$PQ = 62^{\circ}. 34'. 40''$$

$$\odot P = 112. 27. 30$$

$$\odot Q = 49. 52. 50$$

$$L. \text{cof. } zQ = 9, 8104899 \quad L. \text{Tang. } zQ = 10, 0720421$$

$$L. \text{cof. } \odot Q = 9, 8091442 \quad L. \text{fin. } \odot Q = 9, 8834927$$

$$L. \text{cof. } \odot z = 9, 6196341 \quad L. \text{Tang. } P \odot z = 10, 1885494$$

$$\odot z = 65^{\circ}. 23'. 10'' \quad P \odot z = 57^{\circ}. 3'. 50''$$

$$A \odot P = 83. 0. 30$$

$$A \odot z = 140. 4. 20$$

$$A \odot \varphi = 30. 35. 10$$

$$z \odot \varphi = 170. 39. 30$$

$$L. s = 2, 9834488$$

$$L. s = 2, 9834488$$

$$L. \text{cof. } z \odot \varphi = 9, 9942018$$

$$L. \text{fin. } z \odot \varphi = 9, 2103759$$

$$L. \odot R = 2, 9776506$$

$$L. \text{cot. } \odot z = 9, 6609878$$

$$\odot R = 950'' = 15'. 50''$$

$$L. \omega = 1, 8548125$$

$$z \varphi = 65^{\circ}. 39'. 0''$$

$$\omega = 72''; \frac{1}{2}\omega = 1'. 40''$$

$$\odot \varphi v = 170^{\circ}. 41'. 10''.$$

F f f f 3

Pro

Pro calculo Parallaſtico habemus :

Tab. XIX

Fig. 6.

$$\begin{array}{ll}
 \text{L. fin. } z \varphi = 9,9595393 & \text{L. } \frac{\varphi}{\pi} = 0,3593860 \\
 \text{L. } (\frac{\varphi}{\pi} - 1) = 0,3998467 & \text{L. fin. } \odot \varphi v = 9,2090940 \\
 \text{L. } \frac{\varphi}{\pi} = 0,3593860 & \text{L. } \frac{v}{\pi} = 9,5684800 \\
 \text{L. cof. } \odot \varphi v = 9,9942364 \text{ (-)} & \text{L. } v \omega = 0,5684800 \\
 \text{L. } \frac{\varphi}{\pi} \omega = 0,3536224 & \text{L. } s = 2,9834488 \\
 \varphi \omega = -2,2575. \pi & \text{L. Tang. } \varphi \odot v = 7,5850312 \\
 \odot v = 962,61 + 2,2575. \pi & \varphi \odot v = 0^{\circ}. 13'. 14'' \\
 & A \odot \varphi = 30. 35. 9 \\
 & A \odot v = 30. 48. 23.
 \end{array}$$

Hinc fit diſtantia centrorum correcta.

$$962,61 + 2,2575. \pi - 0,8589. x + 0,5121. y - 0,0523. \theta = 976 + \mu$$

vnde deducitur

$$\mu = -13,39 + 2,2575. \pi - 0,8589. x + 0,5121. y - 0,0523. \theta$$

Contactus vero externus pro ingreſſu quum prae-
buerit :

$$\mu = -34,73 + 2,0105. \pi + 0,6647. x + 0,7472. y + 0,0514. \theta$$

multiplicando poſtერიorem hanc aequationem per $\frac{572}{112}$
prohibet

$$1,017. \mu = -35,34 + 2,0457. \pi + 0,6763. x + 0,7602. y + 0,0523. \theta$$

quam

CONCLVSA EX TRANSIT. VENERIS. 599

quam aequationem cum superiori combinando, eliciemus sequentem valorem ipsius μ a θ liberum:

$$\mu = -24, 15 + 2, 1329. \pi - 0, 0905. x + 0, 6306. y$$

quum vero esset

$$\nu = -21, 29 + 2, 0647. \pi - 0, 0961. x + 0, 6697. y$$

hinc quoque deducitur

$$\mu + \nu = -45, 44 + 4, 1976. \pi - 0, 1866. x + 1, 3003. y \text{ et}$$

$$\mu - \nu = -2, 86 + 0, 0682. \pi + 0, 0056. x - 0, 0391. y.$$

Comparatio formularum pro insula Regis Georgii inuentarum, cum iis quae ex observationibus in Europa institutis deducuntur.

7. Si valores ipsorum μ et ν modo inuenti, iis aequentur qui ex observationibus in Europa factis elicti sunt, et qui in P. II. Tom. XIV. Nov. Comment. p.p. 531 et 534. recensentur, inde valores ipsius x facili negotio deduci poterunt, qui in duas classes distribui debent, quarum prima eos complectetur, qui ex observationibus circa ingressum Veneris institutis eruuntur, posterior vero illos, quos observationes circa egressum Veneris suppeditarunt.

Classis I.

ex contactu externo circa ingressum

$$x = -36, 09 + 5, 957. \pi - 0, 125. y \text{ pro Grenouico}$$

ex

ex contactu interno circa ingressum

$$x = -35,42 + 6,138 \pi - 0,124 y \text{ pro Grenouica}$$

$$x = -34,17 + 6,066 \pi - 0,119 y \text{ Holmia}$$

$$x = -33,57 + 5,956 \pi - 0,119 y \text{ Caianeburg}$$

$$x = -33,22 + 5,838 \pi - 0,115 y \text{ Wardhus.}$$

$$x = -33,03 + 5,852 \pi - 0,115 y \text{ Kola}$$

Classis II.

ex contactu interno circa egressum

$$x = 63,12 - 5,115 \pi - 0,214 y \text{ pro Petropoli}$$

$$x = 59,36 - 4,787 \pi - 0,212 y \text{ Wardhus}$$

$$x = 58,78 - 4,860 \pi - 0,211 y \text{ Kola}$$

$$x = 65,92 - 5,685 \pi - 0,208 y \text{ Gurjef}$$

ex contactu externo circa egressum

$$x = 59,34 - 4,816 \pi - 0,206 y \text{ pro Caianeburg}$$

$$x = 65,88 - 5,518 \pi - 0,202 y \text{ Gurjef}$$

$$x = 52,96 - 4,064 \pi - 0,197 y \text{ Iakutsk.}$$

8. Iam si omnes valores ipsius x ex observationibus ingressus deducti in vnam colligantur summam, habebimus:

$$6x = -205,50 + 35,807 \pi - 0,717 y.$$

Simili ratione omnes valores ipsius x ex observationibus circa egressum inuentos addendo, obtinebimus:

$$7x = +425,36 - 34,845 \pi - 1,450 y.$$

Ex priori aequatione medium sumendo deducitur:

$$x = -34,25 + 5,968 \pi - 0,119 y$$

ex posteriori autem

$$x = +60,77 - 4,978. \pi - 0,207. y$$

hos igitur valores iam inter se aequando, sequens resultabit aequatio

$$0 = 95,02 - 10,946. \pi - 0,088. y$$

ex qua colligitur $\pi = 8,68 - 0,0080. y$, qui valor ipsius π praeter numerum absolutum, aliquantulam partem ipsius y inuoluit. Quum autem certo constet, tum valorem ipsius y esse positium, cum infra $10''$ subsistere, maxima incertitudo, quae propter hunc terminum coefficiente y affectum in determinationem Parallaxeos redundare posset, nequidem ad decimam partem vnius minuti secundi asurget. Si valor pro π inuentus in alterutro valorum ipsius x introducatur, prodibit

$$x = 17,56 - 0,167. y.$$

9. Valor ipsius π modo inuentus, cum iis quos obseruationes ad Sinum Hudsonis et in California factae, praebuerunt, adeo egregie consentit, vt nullum sit dubium, quin idem valor ad veritatem quam proxime accedat. Quum enim obseruationes ad Sinum Hudsonis factae dedissent $\pi = 8,69 - 0,0034. y$, Californientes autem $\pi = 8,70 - 0,0070. y$, tantilla discrepantia, quae inter has conclusiones adhuc superest, ex minutissimis erroribus obseruationum facile deriuari potest. Nihilominus infra operam dabimus, vt si fieri possit adhuc exactiores valores

Tom. XVI. Nou. Comm.

G g g

pro

pro Parallaxi ex singulis observationibus Americanis deducamus.

10. Quamvis ex formulis nostris valor ipsius y deduci non possit, nisi semidiametrum Solis tamquam perfecte cognitum consideremus; hoc tamen loco multum conducet, examinare quinam valores pro correctionibus semidiametrorum tam Solis quam Veneris ex observationibus in Insula Regis Georgii factis prodire debeant, siquidem hinc infallibile deduci potest criterium, ex quo de exactitudine harum observationum iudicare licebit. Si igitur in valore ipsius $\mu + \nu$ §. 6 inuento, loco π et x valores ipsorum supra traditi introducantur, prodibit

$$\mu + \nu = 12, 29 + 1, 2976. y,$$

hincque posito

$$\mu + \nu = 2\lambda, \text{ erit } y = 9, 47 + 1, 541. \lambda.$$

Valor autem hic ipsius λ , iam satis differre videtur ab eo, quem observationes pro Sinu Hudsonis dedissent, ex iis enim inuenimus

$$2\lambda = -11, 51 + 1, 2788. y.$$

Grauis igitur hinc suboritur suspicio in observationes insulae Regis Georgii haud leues irrepsisse errores, ad quam suspicionem ulterius confirmandam, quaeramus quoque valorem ipsius

$$\mu - \nu = -2, 86 + 0, 0682. \pi + 0, 0056. x - 0, 0391. y.$$

Si nimirum heic pro π et x valores inuenti substituantur, prodibit

$$\mu - \nu = -2, 18 - 0, 0406. y,$$

de

CONCLVSA EX TRANSIT. VENERIS. 603

de qua expressione iam nullum quidem est dubium, quin eadem a veritate multum aberret. Praeterquam enim quod observationes ad Sinum Hudsonis dederint

$$\mu - \nu = - 0,328 - 0,0388. \gamma,$$

menturae diametri Veneris exactissimae, unanimi fere consensu probant eandem $57''$ non multo maiorem esse. Hinc igitur iam liquet, non modo, quod ex observationibus super insula Regis Georgii institutis dum scorsim considerantur, nulla deduci queat certa determinatio latitudinis Veneris Geocentricae vel semidiametri huius planetae, sed etiam quod in his observationibus insignes lateant errores. Intra autem euidenter probabimus momenta contactuum externorum ad minimum $30''$ erroribus obnoxia esse, contactum scilicet externum in ingressu iusto tardius esse observatum, contactum vero externum pro egressu multo citius, quam reapse contigit.

11. Quoniam itaque in contactibus externis adeo insignes deprehenduntur errores, videtur inde haud sine verisimilitudine inferri posse, valorem ipsius μ ex his contactibus conclusum ad erroneos quoque valores Parallaxeos peraucere, adeo ut nostra determinatio supra allata pro satis certa haberi non debet. Quod autem erroribus observationum modo memoratis non obstantibus, valor Parallaxeos prodierit veritati satis conformis; ratio est, partim quod valores ipsius x ex contactibus externis deducti, cum iis quos ex internis eruimus, in unam

G g g 2

fuerint

fuerint collecti summam, partim quoque quod coef-
ficiens ipsius π adeo sit insignis, ut nisi errores
obseruationum fuerint enormes, conclusiones pro Pa-
rallaxi inde vix sensibilem patiantur mutationem.
Quo autem euentius haec pateant, exclusis valori-
bus ipsius x ex contactibus externis deductis, in
vnam summam colligamus valores x vtriusque clas-
sis ex contactibus tantum internis deriuatos, vnde
inueniemus:

$$5x = -169,41 + 29,850. \pi - 0,592.y \text{ et}$$

$$4x = +247,18 - 20,447. \pi - 0,845.y$$

vnde mediis sumtis, fit

$$x = -33,88 + 5,970. \pi - 0,118.y \text{ et}$$

$$x = +61,79 - 5,112. \pi - 0,211.y.$$

Hinc autem deducitur

$$0 = 95,67 - 11,082. \pi - 0,093.y$$

ideoque

$$\pi = 8'',63 - 0,0084.y,$$

qui valor ipsius π a prius inuento non nisi vicesi-
ma parte minuti secundi differt, valor autem ipsius
 x hinc resultans est

$$x = 17,66 - 0,168.y.$$

Accuratiores determinatio Parallaxeos et Ele-
mentorum Astronomicorum.

12. Quoniam vis Methodi a nobis adhibitae,
in eo imprimis consistit, quod valores ipsorum μ
et

et ν ex observationibus Americanis elicitī aequantur
 iis harum quantitatum valoribus, quos observationes
 in Europa factae praebuerunt, indeque duplicis ge-
 neris aequationes eruantur pro valore ipsius x de-
 terminando, quarum aequationum dum medium su-
 mitur, bini oriuntur valores ipsius x , qui inter se
 aequati, aequationem suppeditant ex qua quantitas
 Parallaxis definiri potest; hinc facile perspicitur con-
 clusionem ex huiusmodi operatione deductam eo ma-
 iorem sibi vindicare certitudinis gradum, quo ma-
 ior fuerit numerus observationum, cum quibus illae
 in America institutae hoc modo combinantur, si-
 quidem ea ratione erroribus in observando commissis
 tutissima adfertur medela. Quum vero praeter eas
 observationes, ex quibus valores ipsorum μ et ν
 elicitī fuerunt in Part. II. Tom. XIV. Nou. Com-
 ment. plures quoque aliae calculo subiectae fuerunt,
 operae omnino pretium esse iudicauimus ex iisdem
 valores ipsorum μ et ν inuestigare, vt deinceps ha-
 rum observationum comparatio cum Americanis in-
 stitui quoque posset. Enimvero quia in calculo
 harum observationum, non solum certus valor pa-
 rallaxis iam pro vero assumptus sit, sed etiam cor-
 rectionum quibus reliqua elementa Astronomica in-
 digent ratio sit habita; pro hisce correctionibus va-
 lores ipsorum tum adhibitos restituendo, inuestigan-
 dum erat quomodo numeri absoluti valores ipsius μ
 vel ν ingredientēs se essent habituri, tum vero quia
 ob elementa Astronomica correctā ipsi quoque coef-
 ficientes correctionum x et y fuerint immutati, ne-

G g g g 3 cessum

cessum quoque fuit inquirere, quid his coefficientibus addi deberet, ut ad eam redirent formam, quae locum habet pro hypothefi, qua hae correctiones x et y plane supponuntur incognitae. Denique et id non reticendum est, pro nonnullis harum observationum, numeros absolutos valores ipsorum μ et ν ingredientes ex eo capite insignem subiisse mutationem, quod Longitudinibus Geographicis Excorum, ubi hae observationes erant factae, eae a plicatae sint correctiones, quae in P. II. Tom. XIV. pag. 520. et sequ. fuerunt stabilitae. Neque tamen hoc pro circulo vitioso in argumentando habendum est, quod hae Longitudines quasi ex ipsa determinatione Parallaxis fuerint deriuatae, ut enim taceam valorem Parallaxis tum inuentum, ad veritatem proximè accedere, pleraeque harum Longitudinum ex obseruatis contactibus Veneris cum Sole alia ratione confirmari possunt, qua omnino perinde erit, quam quis adhibere voluerit parallaxin, ne modo in eius valore assumendo enormis committatur error. Sic ex. gratia nulla habita ratione correctae Longitudinis Geographicae, contactus internus pro ingressu ad Promontorium Lezard obseruatus hanc praebet aequationem :

$$\nu = 3,70 - 2,484 \cdot \pi + 0,644 \cdot x + 0,764 \cdot y + 0,051 \cdot \theta$$

quae si subtrahatur a Grenouicensi etiam ex obseruato contactu interno circa ingressum deducta :

$$\nu = 5,06 - 2,501 \cdot \pi + 0,648 \cdot x + 0,762 \cdot y \text{ remanebit}$$

$$0 = 1,36 - 0,017 \cdot \pi + 0,004 \cdot x - 0,002 \cdot y - 0,051 \cdot \theta.$$

Haec

CONCLVSA EX TRANSIT. VENERIS. 607

Hæc autem æquatio substituendo pro x , $+16$ et y , $+8$, quod saltem sine sensibili errore fieri potest, transmutabitur in sequentem:

$$0 = 1,40 - 0,017. \pi - 0,051. \theta.$$

Supponamus iam primo parallaxin $8''$, atque habebimus $0,051. \theta = 1,26$ ideoque $\theta = 25''$, deinde statueris $\pi = 9$ eritque $0,051. \theta = 1,25$ unde $\theta = 25''$ perinde ut antea. In Parte II. Tom. XIV. Comment. autem supposita erat $\theta = 21''$, qui valor a modo inuento quam minimum discrepat. Caeterum de Longitudine Promontorii Lezard consuli quoque potest Tom. XV. Nou. Comment. p. 638.

13. Hac igitur ratione sequentes adepti sumus valores ipsorum μ et ν , quos more recepto in binas displicere licebit classis, prouti scilicet observationes vel circa ingressum Veneris, vel circa eiusdem egressum in computum venerunt:

Classis I.

ex contactu externo circa ingressum.

- I. $\mu = 2,82 - 2,449. \pi + 0,684. x + 0,729. y$ Caua
- II. $\mu = 3,01 - 2,471. \pi + 0,683. x + 0,729. y$ Promont. Lezard
- III. $\mu = 1,31 - 2,455. \pi + 0,687. x + 0,726. y$ Holmia
- IV. $\mu = 1,68 - 2,278. \pi + 0,690. x + 0,723. y$ Ponoï

ex contactu interno circa ingressum.

- I. $\nu = 4,76 - 2,505. \pi + 0,647. x + 0,762. y$ Lutetia Parisior.
- II. $\nu = 4,72 - 2,470. \pi + 0,645. x + 0,764. y$ Caua
- III. $\nu = 4,71 - 2,484. \pi + 0,644. x + 0,764. y$ Promont. Lezard
- IV. $\nu = 2,79 - 2,307. \pi + 0,654. x + 0,756. y$ Ponoï.

Classis

Classis II.

ex contactu interno circa ingressum.

I. $\nu = 28,10 - 2,209. \pi - 0,859. x + 0,512. y$ Orenburg

II. $\nu = 27,70 - 2,223. \pi - 0,859. x + 0,512. y$ Orsk

ex contactu externo circa egressum.

I. $\mu = 22,52 - 1,567. \pi - c, 883. x + 0,469. y$ Wardhus

II. $\mu = 25,88 - 1,845. \pi - 0,883. x + 0,469. y$ Petropoli,

III. $\mu = 27,96 - 2,157. \pi - c, 881. x + 0,471. y$ Orenburg

IV. $\mu = 27,71 - 2,278. \pi - 0,881. x + 0,471. y$ Orsk.

Numerum autem huiusmodi aequationum, facile adhuc augere poruissimus, si non solum observationes in aliis locis pro ingressu institutas, de quibus in P. II. Tom. XIV. nulla facta est mentio, calculo subicere voluissimus, sed etiam pro singulis locis ad momenta in singulis observatoribus assignata attentionem fecissemus. Existimauimus autem nos eo tutius huic labori superfedere posse, quod valor Parallaxis infra stabiliendus vix ultra partem vicesimam minuti secundi a veritate discrepare possit, an vero maior exactitudo hoc in negotio sperari queat, plures sane adfuerunt dubitandi rationes.

14. Valoribus ipsorum μ et ν iam allatis, aequales ponantur ii, quos pro insula Regis Georgii inuenimus, atque ex aequationibus inde resultantibus quaerantur valores pro x , qui ita se habebunt:

Classis

Classis I.

ex contactu externo circa ingressum

- I. $x = -34, 80 + 5, 912. \pi - 0, 126. y$
- II. $x = -35, 09 + 5, 948. \pi - 0, 127. y$
- III. $x = -32, 72 + 5, 897. \pi - 0, 122. y$
- IV. $x = -33, 06 + 5, 648. \pi - 0, 118. y$

ex contactu interno circa ingressum

- I. $x = -35, 06 + 6, 151. \pi - 0, 123. y$
- II. $x = -35, 10 + 6, 120. \pi - 0, 127. y$
- III. $x = -35, 13 + 6, 147. \pi - 0, 127. y$
- IV. $x = -32, 10 + 5, 829. \pi - 0, 115. y$

Classis II.

ex contactu interno circa egressum

- I. $x = +64, 73 - 5, 601. \pi - 0, 207. y$
- II. $x = +64, 20 - 5, 620. \pi - 0, 207. y$

ex contactu externo circa egressum

- I. $x = +58, 92 - 4, 671. \pi - 0, 205. y$
- II. $x = +63, 17 - 5, 022. \pi - 0, 205. y$
- III. $x = +65, 96 - 5, 430. \pi - 0, 203. y$
- IV. $x = +65, 65 - 5, 584. \pi - 0, 203. y$

15. Si iam omnes valores ipsius x ex observationibus introitus conclusi addantur, prodibit:

$$8x = -273, 06 + 47, 652. \pi - 0, 985. y$$

Tom. XVI. Nou. Comm.

H h h h

con-

coniunctim igitur cum aequatione §. 8. inuenta:

$$6x = -205,50 + 35,807. \pi - 0,717.y, \text{ erit}$$

$$14x = -478,56 + 83,459. \pi - 1,702.y$$

ex quo medio sumto colligitur

$$x = -34,18 + 5,961. \pi - 0,121.y.$$

Eodem modo omnibus valoribus ipsius x ad posteriorem classam pertinentibus, in vnā summam collectis, fiet

$$6x = +382,63 - 31,928. \pi - 1,230.y$$

et huic addendo aequationem §. 8. inuentam

$$7x = +425,36 - 34,845. \pi - 1,450.y \text{ prodibit}$$

$$13x = +807,99 - 66,773. \pi - 2,680.y$$

ex quo medio sumto deducitur

$$x = 62,15 - 5,136. \pi - 0,206.y.$$

Valores igitur ipsius x medios inter se aequando, obtinebimus

$$0 = 96,33 - 11,097. \pi - 0,085.y$$

ex qua deducitur:

$$\pi = 8^h, 68 - 0,0077.y \text{ et } x = 17^h, 57 - 0,167.y.$$

16. Quoniam vt supra obseruauimus, momenta contactuum externorum super insula Regis Georgii obseruata pro vsque adeo certis haberi nequeant; haud inutile erit examinare, qui valor prodeat pro parallaxi, si sola momenta contactuum internorum in computum ducantur, collectis igitur valoribus x prioris

CONCLVSA EX TRANSIT. VENERIS. 611

prioris classis ex contactu interno deductis, habebimus:

$$4x = -137, 39 + 24, 247. \pi - 0, 492. y$$

At supra §. 11. inuenimus

$$5x = -169, 41 + 29, 850. \pi - 0, 592. y$$

quorum summa dat

$$9x = -306, 80 + 54, 097. \pi - 1, 084. y$$

vnde medium sumendo prodit

$$x = -34, 09 + 6, 011. \pi - 0, 120. y$$

Porro si valores x posterioris classis ex contactu interno deriuati inuicem addantur prodit:

$$2x = +128, 93 - 11, 221. \pi - 0, 414. y$$

quum igitur §. 11. haberemus:

$$4x = +247, 18 - 20, 447. \pi - 0, 845. y, \text{ inde fiet}$$

$$6x = +376, 11 - 31, 668. \pi - 1, 259. y$$

ideoque medio capto

$$x = 62, 69 - 5, 278. \pi - 0, 210. y$$

Binos igitur valores medios quantitatis x inter se æquando obtinebimus

$$0 = 96, 78 - 11, 289. \pi - 0, 090. y,$$

ex qua æquatione deducitur

$$\pi = 8, 58 - 0, 0080. y$$

rum vero hunc valorem in alterutra æquatione valorem ipsius x exhibente substituendo, fiet

$$x = 17, 44 - 0, 168. y.$$

H h h h 2

17.

17. De valore parallaxis iam inuento omnino certissimam fouere licet spem, quod a veritate non admodum discrepaturus sit, quia coefficientis ipsius π , in aequationibus parallaxi determinandae inferuentibus sit praemagnus, quippe qui ad 11 vsque unitates assurgit. Qui autem singulos valores ipsius π vtriusque classis seorsum inter se comparare voluerit, inueniet valores pro parallaxi inde orituros sat arctis limitibus contineri, imprimis autem si rationem tantum habere voluerit contactuum internorum, deprehendet in expressione pro Parallaxi numerum absolutum nec vltra 8,80 assurgere, neque infra 8,41 deprimi, medium autem horum numerorum 8,60 vix differt a numero absoluto expressionem parallaxis supra inuentam ingrediente. Quum itaque quantitas parallaxis ex huiusmodi comparatione inuestiganda tam arctis includatur limitibus, nullum est dubium, quin hac ratione errores observationum, cum quibus eae super insula Regis Georgii factae comparantur, quam proxime destructae sint, vnicum igitur dubium quo praecedens determinatio premitur, originem repetit ex iis erroribus, quibus ipsae observationes insulae Regis Georgii affectae esse possint. De contactibus externis iam quidem quid sentiamus, diximus, quod vero internos attinet, infra inquiremus, quid tantilli errores circa ipsos commissi, ad valorem parallaxis immutandum valeant. In antecessum tamen monere iuuabit, incertitudinem hinc oriundam ad sextam partem minuti secundi non assurgere.

CONCLVSA EX TRANSIT. VENERIS. 613

18. Quo certiores quoque euadamus de valoribus parallaxis, quos observationes ad finem Hydronis et in California factae praebent, valores ipsorum μ et γ pro his locis inuentos, iam aequemus iis, quos §. 13 adduximus, hinc autem pro priori quidem loco sequentes obtinebimus valores ipsius λ .

Classis I.

ex contactu externo circa ingressum.

- I. $x = -3, 13 + 2, 455. \pi - 0, 163. \gamma$
- II. $x = -3, 38 + 2, 487. \pi - 0, 163. \gamma$
- III. $x = -1, 17 + 2, 453. \pi - 0, 158. \gamma$
- IV. $x = -1, 64 + 2, 216. \pi - 0, 154. \gamma$

ex contactu interno circa ingressum

- I. $x = -4, 30 + 2, 519. \pi - 0, 163. \gamma$
- II. $x = -4, 26 + 2, 478. \pi - 0, 166. \gamma$
- III. $x = -4, 26 + 2, 507. \pi - 0, 167. \gamma$
- IV. $x = -1, 63 + 2, 231. \pi - 0, 154. \gamma$

Classis II.

ex contactu interno circa egressum

- I. $x = +34, 49 + 2, 045. \pi - 0, 168. \gamma$
- II. $x = +33, 97 - 2, 063. \pi - 0, 168. \gamma$

ex contactu externo circa egressum

- I. $x = +27, 90 - 1, 284. \pi - 0, 169. \gamma$
- II. $x = +32, 13 - 1, 634. \pi - 0, 169. \gamma$
- III. $x = +34, 84 - 2, 032. \pi - 0, 167. \gamma$
- IV. $x = +34, 53 - 2, 186. \pi - 0, 167. \gamma$

H h h h 3

19.

19. Omnes valores ipsius x prioris classis in unam colligendo summam obtinebimus:

$$8x = -23, 77 + 19, 346. \pi - 1, 288. y$$

cui aequationi si addatur ista p. 477. P. II. Tom. XIV. Nov. Comment. tradita

$$6x = -21, 23 + 14, 331. \pi - 0, 942. y$$

prodit

$$14x = -45, 00 + 33, 677. \pi - 2, 230. y$$

hincque medium sumendo

$$x = -3, 21 + 2, 405. \pi - 0, 160. y$$

Addantur nunc quoque singuli valores x e posteriori classe, quo facto habebitur:

$$6x = 197, 86 - 11, 244. \pi - 1, 008. y$$

at loco citato Tom. XIV. Comment. erat

$$7x = 212, 27 - 10, 544. \pi - 1, 193. y$$

horum igitur summa praebet:

$$13x = 410, 13 - 21, 788. \pi - 2, 201. y$$

hincque medio capto

$$x = 31, 55 - 1, 676. \pi - 0, 170. y$$

His valoribus ipsius x inter se aequatis, erit

$$0 = 34, 76 - 4, 081. \pi - 0, 010. y$$

ex qua deducitur

$$\pi = 8, 52 - 0, 0019. y, \text{ hincque } x = 17, 62 - 0, 167. y$$

Si valores ipsius x ex contactibus internis derivatos felige-

CONCLVSA EX TRANSIT. VENERIS. 615

feligere vellemus, ii prioris classis collectim sumti dabunt

$$9x = -31, 22 + 21, 563. \pi - 1, 432. \gamma$$

vnde valor medius

$$x = -3, 47 + 2, 396. \pi - 0, 159. \gamma$$

valores autem posterioris classis coniunctim praebent:

$$6x = +195, 92 - 10, 424. \pi - 1, 029. \gamma$$

ex qua fit

$$x = 32, 65 - 1, 737. \pi - 0, 171. \gamma$$

priorem autem valorem a posteriori subtrahendo oritur:

$$0 = 36, 12 - 4, 133. \pi - 0, 012. \gamma$$

ex qua aequatione colligitur

$$\pi = 8, 74 - 0, 0029. \gamma \text{ et } x = 17, 47 - 0, 166. \gamma$$

20. Eodem modo ex valore ipsius γ pro fortalitia *Sii Iosephi* in California inuento, sequentes deriuntur valores quantitatis x .

Classis I.

ex contactu interno circa ingressum

I. $x = -20, 32 + 4, 413. \pi - 0, 145. \gamma$

II. $x = -20, 32 + 4, 378. \pi - 0, 148. \gamma$

III. $x = -20, 34 + 4, 403. \pi - 0, 148. \gamma$

IV. $x = -17, 51 + 4, 109. \pi - 0, 136. \gamma$

Classis

Classis II.

ex contactu interno circa egressum

I. $x = +50, 57 - 3, 932. \pi - 0, 186. y$

II. $x = +50, 04 - 3, 950. \pi - 0, 186. y$

Dum hi valores coniunctim sumuntur cum iis, qui p. 533 P. II. Tom. XIV. Nouor. Comment. occurrunt, pro priori classe consequemur:

$9x = -174, 86 + 38, 538. \pi - 1, 266. y$

pro posteriori autem

$6x = +291, 25 - 21, 666. \pi - 1, 138. y$

hincque mediis sumtis

$x = -19, 43 + 4, 282. \pi - 0, 141. y$ et

$x = +48, 54 - 3, 611. \pi - 0, 190. y$ unde

$0 = 67, 97 - 7, 893. \pi - 0, 049. y$

ex qua æquatione deducitur

$\pi = 8, 61 - 0, 0062. y$ hincque $x = 17, 44 - 0, 168. y$.

31. Nunc igitur determinationem veræ parallaxos Solis tuto suscipere poterimus, dum nimirum ex valoribus modo inuentis, medium quandam eligamus. Quum vero singulæ æquationes ex quibus parallaxis determinatur, quoad certitudinem eodem loco haberi nequeant, siquidem illis sine dubio maior tribui debeat fides, pro quibus coefficientis ipsius π maiorem habuerit valorem; tutissimum nobis visum est, unicuique conclusioni eam assignare probabilitatem, quæ coefficienti ipsius π proportionalis est.

Pro-

Proinde probabilitas valoris pro π ex obseruationibus super insula Regis Georgii deducti numero 11 haberi debet proportionalis, probabilitas vero valoris ipsius π ex obseruationibus ad sinum Hudsonis eliciti, numero 4 statuendus est proportionalis et denique probabilitas determinationis, quam obseruationes in California institutae praebent, numero 8 proportionalis censenda est. Breuitatis autem gratia valores ipsius π pro tribus locis Americanis inuentos, respectiue litteris A, B, C designemus, vbi sedulo obseruandum est valores duarum priorum litterarum, duplices haberi, prouti scilicet vel momenta omnium contactuum adhibentur, vel tantum ea contactuum internorum in usum vocantur.

22. Quodsi nunc sine discrimine tam contactuum externorum quam internorum rationem habere velimus, valor ipsius π medius inuenietur, si multiplicetur A per .11, B per 4 et C itidem per 4, tum vero summa productorum diuidatur per 19, quum enim in California binos tantum contactus internos obseruare licuit, determinationi C dimidius tantum valor respectu reliquarum A et B tribuendus est. Hinc igitur obtinebimus:

$$19\pi = 11(8,68-0,0077.y) + 4(8,52-0,0019.y) \\ + 4(8,61-0,0062.y)$$

ideoque

$$\pi = 8,63-0,0062.y.$$

Porro si pro insula Regis Georgii, tantum contactuum internorum respectum habere velimus, inuenietur

Tom. XVI. Nou. Comm. Iiii valor

valor ipsius π medius, multiplicando A per 11, B per 8 et C per 8 et dividendo summam productorum per 27, tum scilicet erit

$$27\pi = 11(8, 58 - 0, 0080.y) + 8(8, 52 - 0, 0019.y) + 8(8, 61 - 0, 0062.y)$$

vnde

$$\pi = 8, 57 - 0, 0057.y.$$

Denique si pro sinu Hudsonis quoque momenta contactuum externorum penitus excludantur, valor medius ipsius π habebitur multiplicando A per 11, B per 4 et C per 8 summamque productorum dividendo per 23, erit enim

$$23.\pi = 11(8, 58 - 0, 0080.y) + 4(8, 74 - 0, 0029.y) + 8(8, 61 - 0, 0062.y)$$

proinde

$$\pi = 8, 62 - 0, 0065.y,$$

qui valor ab illo pro prima hypothesi inuento vix differt, ex quo medio quasi sumto inter binas ultimas determinaciones, tuto statuere licebit valorem Parallaxis esse

$$\pi = 8, 60 - 0, 006.y$$

nulla enim sufficiens adesse videtur ratio, cur observationes contactuum externorum ad sinum Hudsonis factae in dubium reuocari deberent. Hoc valore autem pro π assumpto reperietur

$$x = 17, 47 - 0, 168.y.$$

13. Quoniam dum observationes Americanas, cum iis in Europa institutis comparauimus, certas suppo-

supposuimus longitudes locorum, vbi hae obseruationes fuerunt factae, quae si multum essent erroneae, nullum sane est dubium, quin ipsa Parallaxeos determinatio inde maxime redderetur dubia; vt igitur plenior nobis acquiramus conuictionem, valorem parallaxis iam inuentum veritati consentaneum esse, eas obseruationes seorsim considerare placet, quas in eodem loco tam circa egressum, quam ingressum instituere licuit, quales sunt illae Wardhusii, Caienburgi et Kolae factae. Si enim huiusmodi obseruationum instituatur comparatio, cum obseruationibus totius transitus in America factis, valor Parallaxis inde deducendus ob errores in Longitudinibus horum locorum commissos sensibili non adficietur variatione. Modo autem consucto valores ipsius x in binas distribuamus classes, sicque ex comparatione obseruationum in Lapponia habitatum, cum illis ad insulam Regis Georgii, sequentes obtinebimus valores ipsius x :

Classis I.

ex contactu interno circa ingressum

$$x = -33,57 + 5,956 \pi - 0,119.y \text{ Caienburg}$$

$$x = -33,22 + 5,838 \pi - 0,115.y \text{ Wardhus}$$

$$x = -33,03 + 5,852 \pi - 0,115.y \text{ Kola}$$

Classis II.

ex contactu interno circa egressum

$$x = +59,36 - 4,787 \pi - 0,212.y \text{ Wardhus}$$

$$x = 58,78 - 4,860 \pi - 0,211.y \text{ Kola}$$

Iiii 2

ex

ex contactu externo circa egressum

$$x = 58, 92 - 4, 671. \pi - 0, 207. y \text{ Wardhus}$$

$$x = 59, 34 - 4, 816. \pi - 0, 206. y \text{ Caieneburg.}$$

Summa omnium valorum x prioris classis est

$$3x = -99, 82 + 17, 646. \pi - 0, 349. y$$

ex quo medio sumto fit

$$x = -33, 27 + 5, 882. \pi - 0, 116. y$$

omnes autem valores x posterioris classis in unam summam collecti praebent

$$4x = 236, 40 - 19, 134. \pi - 0, 836. y \text{ ideoque}$$

$$x = 59, 10 - 4, 784. \pi - 0, 209. y$$

ex quibus valoribus ipsius x inter se aequatis colligitur

$$\pi = 8, 66 - 0, 0087. y \text{ et } x = 17, 67 - 0, 167. y.$$

Sin pro egressu tantum contactus internos adhibere placuerit, fiet

$$x = 59, 07 - 4, 823. \pi - 0, 211. y$$

unde deducitur

$$\pi = 8, 62 - 0, 0089. y \text{ et } x = 17, 47 - 0, 168. y.$$

24. Ex comparatione observationum ad Sinum Hudsonis cum Lapponicis sequentes deducuntur valores ipsius x :

Classis I.

ex contactu interno

$$x = -3, 08 + 2, 356. \pi - 0, 155. y \text{ Caieneburg}$$

$$x = -2, 79 + 2, 245. \pi - 0, 153. y \text{ Wardhus}$$

$$x = -2, 61 + 2, 259. \pi - 0, 153. y \text{ Kola}$$

Classis

CONCLVSA EX TRANSIT. VENERIS. 621

Classis II.

ex contactu interno

$$x = +29, 45 - 1, 257. \pi - 0, 174. y \text{ Wardhus}$$

$$x = 28, 86 - 1, 329. \pi - 0, 174. y \text{ Kola}$$

ex contactu externo

$$x = 28, 39 - 1, 434. \pi - 0, 171. y \text{ Caianeburg}$$

$$x = 27, 90 - 1, 284. \pi - 0, 169. y \text{ Wardhus.}$$

Si ex valoribus prioris classis medium sumatur, prodit

$$x = -2, 83 + 2, 287. \pi - 0, 154. y$$

ex valoribus vero posterioris classis deducitur

$$x = 28, 65 - 1, 326. \pi - 0, 172. y$$

et contactus externis exclusis

$$x = 28, 14 - 1, 359. \pi - 0, 170. y.$$

Prior suppositio praebet

$$\pi = 8, 71 - 0, 0050. y \text{ et } x = 17, 10 - 0, 166. y$$

posterior autem

$$\pi = 8, 50 - 0, 0044. y \text{ et } x = 16, 60 - 0, 166. y.$$

25. Denique comparatione facta observationum in California institutarum cum Lapponicis, sequentes prodeunt valores ipsius x .

I. Classis.

$$x = -18, 97 + 4, 235. \pi - 0, 136. y \text{ Caianeburg}$$

$$x = -18, 66 + 4, 121. \pi - 0, 135. y \text{ Wardhus}$$

$$x = -18, 47 + 4, 135. \pi - 0, 135. y \text{ Kola}$$

IIII 3

II.

unde medium

$$x = -18, 69 + 4, 164. \pi - 0, 135. y.$$

II. Classis.

$$x = 45, 23 - 3, 122. \pi - 0, 192. y \text{ Wardhus}$$

$$x = 44, 64 - 3, 194. \pi - 0, 192. y \text{ Kola}$$

hincque medio sumto

$$x = 44, 93 - 3, 158. \pi - 0, 192. y.$$

Valoribus ipsius x iam inter se aequatis, ex aequatione inde resultante deducitur

$$\pi = 8, 69 - 0, 0078. y \text{ et } x = 17, 49 - 0, 167. y.$$

26. Si nunc tres valores pro parallaxi ex singulis obseruationibus Americanis deducti, litteris A, B, C designentur, tumque tres vt supra formentur hypotheses, quarum

$$\text{I. } 19. \pi = 11 A + 4 B + 4 C$$

$$\text{II. } 27. \pi = 11. A + 8 B + 8 C$$

$$\text{III. } 23. \pi = 11. A + 4 B + 8 C$$

sequentes inde deducuntur valores medii ipsius π

$$\text{I. } \pi = 8, 68 - 0, 0076. y$$

$$\text{II. } \pi = 8, 67 - 0, 0074. y$$

$$\text{III. } \pi = 8, 62 - 0, 0077. y$$

qui valores certe non magis differunt ab iis, quos supra inuenimus, quam vt huius discrepantiae ratio a leuibus obseruationum erroribus facile deduci possit.

CONCLVSA EX TRANSIT. VENERIS. 623

27. Nunc quoque iniucundum non fore arbitramur, inquirere quales inueniantur pro parallaxi valores, si obseruationum Americanarum inter se instituatür comparatio. Quum igitur obseruationes ad sinum Hudsonis factae praebuerint

$$v = 1, 57 - 0, 636. \pi - 0, 095. x + 0, 641. y$$

ex obseruationibus autem in insula Regis Georgii factis prodeat:

$$v = -2, 29 + 2, 065. \pi - 0, 096. x + 0, 670. y$$

horum valorum differentia dat:

$$0 = 22, 86 - 2, 701. \pi + 0, 001. x - 0, 029. y$$

ex qua deducitur

$$\pi = 8, 46 + 0, 0004. x - 0, 011. y$$

seu pro x substituto eius valore

$$x = 17, 47 - 0, 168. y,$$

$$\pi = 8, 47 - 0, 011. y.$$

Simili modo ex contactibus externis habetur pro Sinu Hudsonis

$$\mu = +0, 40 - 0, 549. \pi - 0, 090. x + 0, 603. x$$

et pro insula Regis Georgii

$$\mu = -24, 15 + 2, 133. \pi - 0, 091. x + 0, 631. x$$

ex quibus fit

$$0 = 24, 55 - 2, 682. \pi + 0, 001 x - 0, 028 y$$

vnde

$$\pi = 9, 15 + 0, 0004 x - 0, 011. y$$

seu

seu pro x eius valore substituto

$$\pi = 9, 16 - 0, 011. y.$$

Porro quia observationes contactuum internorum pro California dederunt

$$y = -10, 38 + 0, 783. \pi - 0, 098. x + 0, 654. y$$

hoc valore isti aequato, qui pro insula Regis Georgii inuentus est, habebitur

$$0 = 10, 91 - 1, 282. \pi - 0, 002. x - 0, 016. y$$

hincque

$$\pi = 8, 51 - 0, 0016. x - 0, 0125. y$$

et pro x valore substituto

$$\pi = 8, 48 - 0, 012. y$$

Demum si valores ipsius y ex observationibus ad Sinum Hudsonis et Californiae institutis deductae inter se aequentur, obtinebitur haec aequatio:

$$0 = 11, 95 - 1, 419. \pi + 0, 003. x - 0, 013. y$$

unde

$$\pi = 8, 42 + 0, 0021. x - 0, 0092. y$$

et pro x valore eius introducto

$$\pi = 8, 46 - 0, 0096. y.$$

Medium autem ex his quatuor determinationibus $\pi = 8, 64 - 0, 11. y$, cum supra inuentis satis bene conuenit. Nihilominus tamen nullum est dubium, quin determinatio ex contactibus externis deducta plus iusto a veritate discrepet. Quod autem e contra com-

comparatio contactuum internorum iusto minores praebeant valores Parallaxis, propter leuissimos errores obseruationum fieri potest, quum in aequationibus vnde π inuestigari debet, eius coëfficiens sit admodum exiguus. Sic ex. gratia si supponatur durationem transitus inter binos contactus internos pro insula Regis Georgii $10''$ esse minuendam, pro Fortalizio autem Principis Walliae tantundem augendam, inde numerus absolutus in aequatione ex qua π eruitur, $+0,50$ augebitur, ita vt habeatur

$$0 = 23,36 - 2,701. \pi + 0,001. x - 0,029. y,$$

ex quo fiet

$$\pi = 8,66 - 0,011. y.$$

28. Propter incertitudinem contactuum externorum in Insula Regis Georgii obseruatorum, ex istis obseruationibus de vera quantitate diametrorum Solis et Veneris, nec non de correctione y , vix quicquam certi iudicare licebit, interim notasse iuvabit, si in aequationibus ipsorum $\mu + \nu$ et $\mu - \nu$ valores pro hoc loco exhibentibus, substituantur valores pro π et x inuenti prodire:

$$\mu + \nu = 2\lambda = -12,60 + 1,3065. y \text{ et}$$

$$\mu - \nu = -2,17 - 0,0404. y.$$

Combinemus vero potius valorem ipsius μ pro Sinu Hudsonis inuentum, cum valore ipsius ν pro Insula Regis Georgii, ex quo emerget:

$$\mu + \nu = -20,89 + 1,5154. \pi - 0,1861. x + 1,2729. y$$

$$\mu - \nu = +21,69 - 2,6140. \pi + 0,0061. x - 0,0665. y$$

Tom. XVI. Nou. Comm.

K k k k

quae

quae expressiones introductis pro π et x ipsorum valoribus in sequentes transformantur:

$$\mu + \nu = -11, 11 + 1, 2951. y$$

$$\mu - \nu = -0, 68 - 0, 0518. y$$

ex priori fit

$$y = 8, 58 + 1, 55. \lambda$$

ex posteriori autem

$$\mu - \nu = -1, 12 - \frac{1}{12} \lambda$$

Quum autem ex observationibus ad Sinum Hudsonis et Californiae inventum sit esse:

$$y = 9, 00 + 1, 56. \lambda; \mu - \nu = -0, 68 - \frac{1}{12} \lambda$$

$$y = 8, 71 + 1, 55. \lambda; \mu - \nu = -0, 94 - \frac{1}{12} \lambda$$

medio inter has tres determinationes sumto, statui poterit

$$y = 8, 76 + 1, 55. \lambda \text{ et } \mu - \nu = -0, 91 - \frac{1}{12} \lambda$$

29. Hinc quidem adhuc de vera latitudine Veneris Geocentrica nec non diametro Veneris, nihil concludi posse videtur, nisi valor litterae λ , seu correctionis, qua semidiameter Solis indiget, fuerit determinatus. Quum autem inter mensuras exactissimas diametri Solis in apogeo a Celeb. Viris *de la Lande* et *Short* institutas, nonnisi $2\frac{1}{2}''$ discrepantia sit, medio inter utriusque mensuras capto, diametrum Solis $1\frac{1}{4}''$ diminuere licebit, ex quo habebitur $\lambda = -0, 62$. Hoc autem valore pro λ in aequationibus supra allatis substituto, prodit $y = 7''$, 8 et

$$\mu - \nu = -0, 91 - \frac{1}{12} \lambda$$

$\frac{u}{z} = -0'', 43$, tum vero fiet $\mu = -1,05$ et $v = -0,19$. Quum igitur semidiameter Veneris sit $= 29'', 0 + \frac{u-v}{2}$ verus valor huius semidiametri erit $= 28'', 57$ ideoque totius diametri $= 57'', 14$ quod omnino concordare deprehenditur, cum mensuris huius diametri Micrometro obiectiuo a variis obseruatoribus institutis.

30. Quod autem correctionem attinet, quam pro latitudine Veneris inuenimus, non reticendum est, eam multo magis dubiam videri, quam variae obseruationes ad distantiam minimam centrorum Solis et Veneris determinandam institutae, probare videantur, correctionem latitudinis aliquanto minorem statuendam esse. Ad Sinum scilicet Hudsonis haec distantia inuenta est $9', 54''$, vnde prodit vera distantia minima $10', 5'', 7$, ideoque correctio latitudinis $+1'', 4$. Noritoni in Pensyluania eadem distantia inuenta fuit $10', 3'', 1$, vnde vera distantia minima $10', 10'', 4$ et correctio latitudinis $+6'', 1$. Nouae Angliae a Celeb. *Winbory* obseruata fuit distantia minima $9', 59'', 7$; vnde colligitur vera distantia minima $10', 7'', 8$ et correctio Latitudinis $+3'', 5$. Denique super Insula Regis Georgii distantia minima inuenta est $10', 25'', 4$, quae effectu Parallaxis correctâ praebet veram distantiam minimam $10', 11'', 6$ ideoque correctionem Latitudinis $+7'', 3$. Caeterum insignis discrepantia harum determinationum, ad earum certitudinem infringendam non parum valet, praepriis quum aliae obseruationes ad distantias centro-

K k k k 2

rum

rum Solis et Veneris explorandas institutae, indicare videantur distantiam minimam centrorum proxime statui posse $10'. 11''$, ideoque correctionem Latitudinis fere $7''$, quae tantum unico secundo differt ab ea, quam observationes contactuum praebent. Hoc saltem audacter affirmare non dubitamus, nequaquam fieri posse, ut correctio Latitudinis infra $5''$ deprimatur.

31. Si iam in formula pro parallaxi inventa $\pi = 8,60 - 0,00.6.y$ loco y eius valor $+ 7,8$ introducatur, prodibit verus valor *Parallaxeos Solis horizontalis* tempore Transitus Veneris per Solem $= 8'', 55$, correctio autem Longitudinis geocentricae hinc deducetur $= 16'', 15$, ex quo sequitur tempus coniunctionis Solis et Veneris $4'. 5''$ tardius incidere, quam in calculis nostris suppositum fuit.

Elementa igitur Astronomica correcta iam ita se habebunt:

Coniunctio vera Solis et Veneris contigit

1769. d. 3. Iunii $10^h. 11'. 44''$ Temp. Parif. medio
seu $10. 13. 57$ Temp. vero

pro quo momento erat:

- I. Longitudo Solis et Veneris $2^c. 13^c. 27'. 20''$
- II. Latitudo Veneris Borealis $10'. 18'', 8$
- III. Parallaxis Solis horizontalis $8'', 55$

pro distantia igitur Solis media habetur parallaxis eius horizontalis $= 8'', 68$, unde distantia Solis media

CONCLVSA EX TRANSIT. VENERIS. 629

dia 23753 semidiametris aequatoris terrestris, proxime aequalis haberi potest. Notandum denique est, si correctio Latitudinis statuatur tantum 5" parallaxin Solis inueniri 8", 57, id est $\frac{1}{10}$ sec. diuersam ab ea, quam adoptauimus, vnde tanto magis credere fas est, nostram determinationem pro parallaxi vix vicefima parte vnus minuti secundi a veritate alienam esse.

32. Vnicum elementum, cuius verificationem adhuc suscipere licet, est ipsa longitudo geographica loci super insula Regis Georgii, vbi obseruatio perfecta est, si enim ea qualis a nobis assumpta fuit, multum a vera aberraret, ipsa quoque determinatio parallaxis ipsi superstructa aliquantum dubia redderetur. Vt autem veram longitudinem eruamus, valores ipsius y pro hoc loco inuentos a se inuicem subtrahamus, quo facto prodibit haec aequatio:

$$0 = -20,95 - 0,2502 \cdot \pi + 1,4553 \cdot x + 0,2268 \cdot y + 0,0991 \cdot \theta.$$

In hac aequatione iam quidem statim pro π , x et y valores absolutos in §. praecedenti stabilitos introducere liceret, consultius tamen duximus pro π et x valores ipsorum quantitate y adhuc adfectos substituere, vt appareat incertitudinem veri valoris pro y hoc negotium minime turbare. Hoc autem facto prodibit

$$0 = 2,32 - 0,0162 \cdot y + 0,0991 \cdot \theta$$

quum vero iam sine vilo errandi periculo pro y
K k k k 3 sub-

substituere liceat $+7''$, 8, fiet: $0 = 2, 19 + 0, 0991 \theta$,
 unde habetur $\theta = -22''$, ideoque vera Longitudo
 loci super insula Regis Georgii in quo observatio
 facta, statuenda est a meridiano Parisino $10^{\text{h}}. 7'. 22''$
 seu in Gradibus $151^{\circ}. 50' 30''$ Occid. Si valores
 ipsorum μ simili ratione a se inuicem subtrahantur,
 sequens orietur aequatio:

$$0 = -21, 34 - 0, 2470. \pi + 1, 5236 x + 0, 2351 y \\ + 0, 1037 \theta$$

unde pro π et x substituendo valores §. 22, fiet

$$0 = 3, 15 - 0, 0193 y + 0, 1037 y,$$

atque posito iam $y = +7''$, 8; $0 = 3, 00 + 0, 1037 \theta$,
 unde $\theta = -29''$. Medio igitur inter utramque de-
 terminationem assumto statuere liceret $\theta = -25''$,
 quum vero observationes contactuum externorum, iis
 internorum multo incertiores sint, priori conclusioni
 merito acquiescimus cuius facti rationem, infra plu-
 ribus argumentis confirmare licebit.

Examen ulterius et verificatio conclusionum supra inuentarum.

33. Quum inter momenta contactuum inter-
 norum super insula Regis Georgii a tribus obser-
 vatoribus assignata, insignis se prodatur differentia,
 haud abs re erit disquirere, quomodo parallaxis
 fuisset immutanda, si alia momenta contactuum in-
 ternorum, quam quae in calculo adhibuimus; ad-
 optare voluissimus. Quoniam vero momentum con-
 tactus

factus interni a nobis in vsum vocatum sit illud a Cel. *Solander* assignatum; quod medium quasi tenet locum inter bina reliqua, dum momentum a Cel. *Green* notantum istud 7" praecedere, momentum vero Cl. *Cook* 13" sequi inuenitur, liquet numerum absolutum in aequatione pro v , hinc eas subire mutationes, vt dum obseruationi D. *Green* satisfaciendum sit, is numerus $-31,31$ statui debeat, pro obseruatione autem D. *Cook* $-32,29$. Pro contactu interno circa egressum obseruatio Cel. *Green* ab ea Cl. *Cook* 10" differt, vt igitur posteriori satisfiat, numerus absolutus in aequatione pro v statui debet $-10,20$. Constituamus iam duas hypotheses, quarum prima erit, si obseruatio contactus interni D. *Green* pro ingressu combinetur, cum obseruatione similis contactus D. *Cook* pro egressu, altera, vero si vice mutata obseruatio D. *Cook* pro ingressu, cum obseruatione D. *Green* pro egressu comparetur. Ex priori igitur fiet.

$$v = -20,87 + 2,0647 \cdot \pi - 0,0961 \cdot x + 0,6697 \cdot y$$

ex posteriori autem

$$v = -21,62 + 2,0647 \cdot \pi - 0,0961 \cdot x + 0,6697 \cdot y$$

leues enim variationes, quae hinc in coefficientem ipsius y redundant omnino negligere licet. Si iam modo consueto, hinc quaerantur valores ipsius x , facile patet pro priori hypothesi omnes valores x I. Classis numero $-0,56$, classis autem II^{dae} numero $+0,55$ diminuendos esse, contra vero pro posteriori hypothesi valores x I. Classis numero $-0,44$ et

II^{dae}

II^{dae} Classis numero + 0,43 augendos esse, vnde
haec resultabunt aequationes finales:

$$0 = 95,67 - 11,289. \pi - 0,090.y$$

$$0 = 97,65 - 11,289. \pi - 0,090.y$$

ex quibus deducuntur

$$\pi = 8,48 - 0,0050.y \text{ et } \pi = 8,65 - 0,0080.y$$

quarum determinationum media

$$\pi = 8,57 - 0,0080$$

bene conuenit cum ea, quae ex obseruationibus a nobis in vsum vocatis sequitur. Hinc iam tuto inferri posse videtur, nostrum valorem pro parallaxi inuentum eo magis pro certo habendum esse, quo certius liquet, quod dissensus obseruationum ad insulam Regis Georgii vix incertitudinem $\frac{1}{2}$ min. sec. pro parallaxi producere valeat.

24. Proximum iam est, vt in certitudinem momentorum pro contactibus externalis assignatorum inquiramus, de quibus iam supra monuimus, quod erroribus haud contemnendis videantur obnoxia. Enimvero generatim quidem patet, si moram inter binos contactus internum et externum, tam pro ingressu quam egressu super insula Regis Georgii obseruatam consideremus eam, iusto minorem esse, quoniam non solum calculus ostendat, sed omnes quoque melioris potae obseruationes comprobent, durationem inter binos contactus pro ipso centro telluris 18'. 40" minorem statui non debere. Quum igitur pro insula modo dicta effectus parallaxeos fuerit negatiuus, ideoque
totus

totus transitus propius ad coniunctionem ibi sit observatus quam ad centrum telluris, manifestum redditur pro hoc loco moram Veneris inter duos contactus internum et externum, saltem $18', 40''$ fuisse debere aequalem, quum tamen pro egressu non nisi ad $18'. 11''$ assurgat. Ex hoc tamen ratiocinio nondum inferre licet, vtrum principalis error in observationibus contactuum externorum, an forsitan potius internorum lateat? Quum vero observationes contactuum internorum, egregie conueniant cum illis ad sinum Hudsonis institutis, suspicandi omnino rationem habemus, in contactibus externis errorum fontem potissimum quaeri debere.

35. Vt id ipsum nunc magis directe ostendamus, comparationem instituamus, binorum valorum pro ν ex contactibus internis inuentorum, cum iis, quos pro binis aliis locis ex observatione ingressus et egressus eliciuimus, et inde quaeramus valorem ipsius θ , quodsi enim iste valor ex singulis his comparationibus proxime idem prodierit, id manifesto haberi debet indicio, momentis contactuum internorum, graues errores inesse non posse. Ex observatione contactus interni Grenouici a Ccl. *Maskehne* facta, hanc eliciuimus aequationem:

$$\nu = 5, 06 - 2, 5008. \pi + 0, 6477. x + 0, 7619. y$$

cum qua si valores ipsius ν pro insula Regis Georgii inuenti combinentur, hae duae prodibunt aequationes:

$$\begin{aligned} 0 &= +36, 71 - 4, 4417. \pi + 0, 0242. x - 0, 0259. y \\ &\quad - 0, 0490. \theta \end{aligned}$$

$$0 = +15, 76 - 4, 6919. \pi + 1, 4795. x + 0, 2069. y + 0, 0501. \theta$$

In utraque pro π et x introducantur valores §. 22. assignati, unde in has transformabuntur:

$$0 = -1, 07 - 0, 0034. y - 0, 0490. \theta$$

$$0 = +1, 35 - 0, 0136. y + 0, 0501. \theta$$

tum vero posito $y = +8''$, erit

$$0 = -1, 10 - 0, 0490. \theta \text{ et } 0 = +1, 24 + 0, 0501. \theta$$

ex priori fit $\theta = -22''$, ex posteriori autem $\theta = -25''$, adeo ut vix maior consensus expectari potuerit. Observatio contactus interni pro egressu a Ccl. Prof. *Lowiss* in Gurief facta hanc praebet aequationem:

$$v = 29, 29 - 2, 2752. \pi - 0, 8595. x + 0, 5110. y$$

ubi notandum est, numerum absolutum huius aequationis p. 442. P. II. Tom. XIV. Nov. Comment. allatum, in praecedentem esse immutatum, quum probabile sit Longitudinem oppidi Gurief a Parisiis esse paulo minorem ea, quae ibi assumpta fuit. conf. Tom. XV. Nov. Comment. p. 638. Combinatis nunc valoribus v pro insula Regis Georgii cum Guriefuensi, hae prodibunt aequationes:

$$0 = 60, 94 - 4, 2161. \pi - 1, 4830. x - 0, 2768. y - 0, 0490. \theta$$

$$0 = 39, 99 - 4, 4663. \pi - 0, 0277. x - 0, 0440. y + 0, 0501. \theta$$

ex quibus dum pro π et x valores substituuntur, prodit:

$$0 = -$$

CONCLVSA EX TRANSIT. VENERIS. 635

$$0 = -1, 23 - 0, 0008. y - 0, 049. \theta \text{ seu}$$

$$0, 049 \theta = -1, 24 \text{ et}$$

$$0 = +1, 10 - 0, 0126. y + 0, 050. \theta \text{ ideoque}$$

$$0, 050 \theta = -1, 00$$

ex priori deducitur $\theta = -25''$ ex posteriori vero $\theta = -20''$, quae conclusiones optime quoque inter se consentiunt. Hoc autem ratiocinio, non solum certitudo obseruationum in insula Regis Georgii factarum comprobatur, sed valor quoque parallaxis a nobis assumtus haud mediocriter stabilitur, vt taceam correctionem Longitudinis Geographicae pro hoc loco inuentam eodem argumento quasi extra omne dubium poni.

36. Ad simile examen obseruationes contactuum externorum iam quoque reuocaturi sumus, quum autem ex iisdem si veritati supponantur congruae aliquanto maior sequatur parallaxis ea, quam pro vera assumimus; ne proinde nobis obiici queat vim ratiocinii nostri plane corruere, si alia supponatur parallaxis, inter valores ipsius x ex contactibus externis §. 7 et 14. deductos, destinato consilio binos elegimus, qui inter se combinati maximum praebere-
rent valorem parallaxis. Tum vero inuenimus pro
parallaxi

$$\pi = 9, 04 - 0, 0073. y \text{ indeque}$$

$$x = 17, 77 - 0, 168. y.$$

His igitur valoribus tantisper pro veris assumtis, quaeramus qualis statui debeat correctio Longitudinis

LIII 2

Geogra-

Geographicae pro insula Regis Georgii, quum vero ex contactibus externis supra §. 32. inuenerimus

$$0 = -21, 34 - 0, 2470. \pi + 1. 5236. x + 0, 2351. y + 0, 1037. \theta$$

si heic pro π et x valores supra traditi substituantur, prodibit :

$$0 = +8, 50 - 0, 0191. y + 0, 1037. \theta,$$

ideoque pro y ponendo $+8; 3, 35 = -0, 1037. \theta$, unde habetur $\theta = -32''$.

Facta iam combinatione valorum μ pro insula saepius dicta inuentorum cum eo, quem ex observatione Grenouicensi deduximus, utroque modo obtinebimus $\theta = -32''$, quod autem eam imprimis ob causam fieri debet, quia valor x prioris classis, unde quantitatem parallaxeos determinauimus ex ipsa observatione Grenouicensi erat deductus. Combinemus igitur valores μ pro insula Regis Georgii cum valore huius litterae deducto ex contactu externo Wardhusii obseruato, quoniam longitudo Geographica pro Wardhus fatis exacte videtur esse determinata. Quum igitur obseruatio R. Pat. Hell praeberit :

$$\mu = 22, 52 - 1, 567. \pi - 0, 883. x + 0, 469. y$$

inde haec binae eliciuntur aequationes :

$$\begin{aligned} 0 &= 57, 25 - 3, 578. \pi - 1, 548. x - 0, 278. y - 0, 0514. \theta \text{ et} \\ 0 &= 35, 91 - 3, 824. \pi - 0, 024. x - 0, 043. y + 0, 0523. \theta \end{aligned}$$

CONCLVSA EX TRANSIT. VENERIS. 637

ex priori sit

$$0 = -2,60 + 0,009. \tau - 0,0514. \theta, \text{ seu}$$

$$0 = -2,53 - 0,0514. \theta$$

ex posteriori autem

$$0 = +0,91 - 0,011. \tau + 0,0523. \theta \text{ siue}$$

$$0 = +0,82 + 0,0523. \theta$$

prior igitur dabit $\theta = -49''$, posterior vero $\theta = -16''$, quorum valorum dissensus omnino tantus est, ut eius rationem nullo modo reddere valeamus, nisi supponere velimus in momentis contactuum ad infulam Regis Georgii obseruatis, insignes latere errores.

27. Nunc itaque quum elementa a nobis §. 31 stabilita, satis extra dubium collocata esse videantur, si eorum fiat substitutio in valoribus pro μ et ν inuentis, singularum obseruationum aberrationes, saltem quam maxime probabiles assignare poterimus. Si enim verum tempus vniuscuiusque contactus ponatur aequale momento obseruato $-\tau''$, valor ipsius τ facile determinari potest, quippe quum litteris θ et τ idem conueniat coëfficiens. Quadruplicis autem generis obseruationes, numeris maioribus I. II. III. IV. inter se distinguentes, quemadmodum in P. II. Tom. XIV. Nov. Comment: p. 483 factum est, sequentes adepti sumus valores ipsorum τ .

I. Pro Infula Regis Georgii longitudine supposita $10^b. 7'. 22''$ versus Occid. a Parisiis.

	Moment. obseru.	Moment. ver.
I. $\tau = +21$	$21^b. 25'. 40''$	$21^b. 25'. 19''$
II. $\tau = -5$	$44. 2'$	$44. 7$
III. $\tau = +4$	$3^b. 14. 3$	$3^b. 13. 59$
IV. $\tau = -34$	$32. 14$	$32. 48$

II. Pro arce Principis Walliae ad Sinum Hudsonis longitudine supposita $6^b. 26'. 20''$

	Moment. obseru.	Moment. ver.
I. $\tau = +1$	$0^b. 57'. 3''$	$0^b. 57'. 12''$
II. $\tau = +7$	$1. 15. 24$	$1. 15. 17$
III. $\tau = -2$	$7. 0. 47$	$7. 0. 49$
IV. $\tau = -1$	$19. 21$	$19. 22$

III. Pro castello Sti Iosephi in California supposita Longitudine $7^b. 28'. 8''$.

	Moment. obseru.	Moment. ver.
I. $\tau = +1$	$0^b. 17'. 27''$	$0^b. 17'. 26''$
II. $\tau = -4$	$5. 54. 50$	$5. 54. 54$

38. Vt de exactitudine et præcisione valoris, quem pro parallaxi Solis adoptauimus, eo accuratius ferri queat iudicium, inquirendum erit quales errores in variis obseruationibus supponi deberent, vt parallaxis data aliqua quantitate fieret maior. Si enim

CONCLVSA EX TRANSIT. VENERIS 639

enim hi errores euadant praegrandes, inde certo inferre licebit, parallaxin ad eum valorem increfcere non poffe. Quum igitur aequatio ex qua pro infula Regis Georgii contactibus internis adhibitis, valorem ipsius π deriuauimus ita fe haberet:

$$0 = 96,78 - 11,289.\pi - 0,090.y$$

liquet pro parallaxi $9''$, numero absoluto huius aequationis augmentum circiter 4,86 tribuendum effe, vnde fi haec correctio per valores x vtriusque classis aequaliter diftribuat. patet numeris absolutis prioris classis addi debere $-2,43$ posterioris vero $+2,43$. Quodfi nunc rationem errorum folum in obferuationibus infulae Regis Georgii quaerere vallemus, numerus abfolutus in aequatione valorem litterae y pro hoc loco exhibente, augeri deberet in ratione $\frac{2}{3}$ numeri $-2,43$, id eft incrementum caperet $= -1,82$, quam ob rem fi denuo hic error aequaliter per vtrumque contactum internum diftribuat, habebimus pro contactu interno in ingreffu $-1,82 = 0,049.\tau$ feu $\tau = -37''$, pro contactu vero interno in egressu $+1,82 = +0,050.\tau$ feu $\tau = +36''$, qui errores omni deftituuntur verifimilitudine. Sin vero parallaxis adeo fupponeretur effe $10''$, vnde correctio numeri abfoluti prodiret $= 16,11$, fi ea correctio tantum ex erroribus obferuationum fuper infula Regis Georgii deriuanda effet, ad valorem litterae y addi deberet $-6,04$, ex quo haberentur pro erroribus obferuationum hi valores II. $\tau = -2'.5''$ et III. $\tau = +2'$, quod
nom

non solum non probabile, sed ne possibile quidem esse quis facile agnosceret. Si vero sub hypothesi parallaxis $9''$, errorum distributio aequaliter fieri deberet, per omnes observationes, tum pro observationibus quidem in Europa factis, hos statuere necessum est errores II. $\tau = +18''$ et III. $\tau = -18''$ pro observationibus autem insulae Regis Georgii II. $\tau = -18''$ et III. $\tau = +18''$. Sensus autem huius nostri asserti non is est, quasi inde sequeretur, singulis observationibus Europeicis tales errores tribuendos esse, quum ex ipsa rei natura perspicuum sit, alias plus alias vero minus a veritate deficere posse, sed ita interpretandus est, quod summa omnium errorum, quibus hae observationes afficiuntur, tanta sit, ut si omnes aequae aberrassent, singula momenta contactuum internorum pro ingressu $18''$ accelerari debuissent, momenta autem contactuum internorum pro egressu tantundem retardari. Quum autem observationum Europeicarum insignem satis numerum consuluerimus, in omnes probabilis regulas impingeret, qui credere vellet tantam aberrationem harum observationum possibilem esse. Maxima vero absurda quae ex hypothesi parallaxis $10''$ sequerentur, inutile est ut commemorem.

39. Id quod iam generatim quidem ostendi, exemplis quoque specialibus confirmare haud pigebit. Supra vidimus ex combinatione valorum ν pro Grenouico et insula Regis Georgii, hanc deduci aequationem:

$$0 = 36,$$

CONCLVSA EX TRANSIT. VENERIS. 641

$$0 = 36,71 - 4,4417 \cdot \pi + 0,0242 \cdot x - 0,0259 \cdot y - 0,049 \\ (\tau + \theta)$$

vbi si pro θ substituaturs valor inuentus $-22''$, aequationi inde resultanti

$$0 = 37,79 - 4,4417 \cdot \pi + 0,0242 \cdot x - 0,0259 \cdot y - 0,049 \cdot \tau$$

proxime satisfiet adhibitis pro π, x et y valoribus a nobis stabilitis, ita vt sit τ quam proxime $= 0$. Si nunc supponamus parallaxin statuendam esse $9''$, inuenietur correctionem numeri absoluti poni debere $= 2,00$, ita vt prodeat $-0,049 \cdot \tau = 2,00$, ideoque $\tau = -41''$, designat autem τ summam correctionum pro binis momentis obseruatis. Pro parallaxi vero $10''$ numerus absolutus aequationi nostrae addendus, esset $= 6,44$ vnde $\tau = -132'' = -2' 12''$. Similis combinatio si instituaturs cum valore ν deducto ex obseruatione Cel. *Messier* Parisiis facta, haec orieturs aequatio:

$$0 = 37,49 - 4,446 \cdot \pi + 0,024 \cdot x - 0,020 \cdot y - 0,049 \cdot \tau$$

pro qua valores nostros litterarum π, x et y in vsum vocando inueniemus $\tau = -6''$. Posita nunc parallaxi $9''$, euidentis est numero absoluto adhuc addi debere $2,00$ ideoque ex hoc capite prodire $\tau = -41''$, vnde totus valor ipsius τ ad $-47''$ affurget, pro parallaxi autem $10''$, summa errorum vsque ad $-2' 18''$ increfceret. Consideremus nunc etiam obseruationem quandam contactus interni pro egressu et Gurjesuensi in vsum vocata habebimus vt supra §. 35.

$$0 = 39,99 - 4,4663 \cdot \pi - 0,0277 \cdot x - 0,0440 \cdot y + 0,0501 \cdot (\theta + \tau)$$

vel posito $\theta = -22''$.

$$0 = 38,89 - 4,4663 \cdot \pi - 0,0277 \cdot x - 0,0440 \cdot y + 0,0501 \cdot \tau$$

cui aequationi valores nostri pro π , x et y certe satisfacient, supposito tantum $\tau = -3$; at si parallaxis esset $9''$, ad numerum absolutum denuo 2, or essent addenda, ex quo iam fieret $\tau = +40''$, ideoque iunctim $\tau = +37''$. Sed quid opus est plura huiusmodi exempla cumulare, quum haec abunde sufficere queant, ad euincendum, quod quantitas parallaxis Solaris nullo modo vsque ad $9''$ augeri possit.

40. Quum uti supra notauimus Astronomi Angli super insula Regis Georgii, distantiam quoque minimam centrorum Solis et Veneris obseruauerint, occasio hinc nobis datur examinandi, quo in pretio huiusmodi obseruationes haberi debeant ad parallaxin Solis determinandam. Primum igitur videamus, qualem obseruatio modo memorata praebet parallaxin, si cum distantis minimis, ad Sinum Hudsonis, Noritoni et nouae Angliae captis conferatur. Expressiones autem verae distantiae minimae pro his locis ita erunt comparatae:

	Distantia minima	pro
9 ^l .	$54'' + 1,361 \cdot \pi$	Hudsons Bay
10 ^l .	$3'' + 0,857 \cdot \pi$	Noriton
9.	$59,7 + 0,946 \cdot \pi$	Neu-England
10.	$25,4 - 1,627 \cdot \pi$	King Georg Eyland.

Ex

Ex comparatione autem ultimae cum reliquis deducitur $\pi = 10,51$ vel $\pi = 8,98$ vel $\pi = 9,97$. Insignis dissensus, qui inter has determinaciones se prodat, eas iam admodum quidem dubias reddit, ne autem nimis praecipitanter iudicium tulisse videamur, considerare tantum placet, quid error vnus minuti secundi, ad has conclusiones immutandas valeat. Supponamus igitur pro ultimo loco distantiam minimam observatam vno minuto secundo imminui debere, inueniemus autem tum pro π sequentes valores $+10,17$, $+8,58$ et $+9,57$. Quid autem si haec distantia duobus vel tribus secundis diminuenda sit vel potius quod probabilius videtur eae pro Hudsons Bay et noua Anglia tantundem augendae? Huiusmodi autem errores dum de mensuris distantiarum quaestio est, vix euitari posse contendo, quamuis lubenter concedam micrometris obiectiuis, omnem quae desiderari potest tribuendam esse exactitudinem. Hoc enim in negotio, quum difficillimum omnino esset, instrumento eam conciliare positionem, in qua recta per centra Veneris et Solis transiens etiam per contactum imaginum transiret, fieri omnino potuit vt distantia limbi Veneris a limbo Solis iusto maior sit inuenta. Hoc saltem ex pluribus obseruationibus super distantis marginum Solis et Veneris factis edoctus sum, in iisdem capiendis, errores 3, 4 quin et adeo 5^u committi posse, cur autem huiusmodi operatio pro distantia minima marginum mensuranda ab omni errandi periculo esse deberet immunis nullam per-

M m m m 2

spice-

spicere valeo rationem. De his autem alia occasione fusius agere forsitan licebit, postquam plures distantiarum mensuras calculo subiecerimus. Interim si fuerint, qui ex observationibus distantiarum minimarum, parallaxin $9''$ maiorem deriuare sategerint, ab illis merito postulare licebit, ut sufficientem sequentis quaestionis solutionem reddant: *cur probabilius sit in observationibus contactuum internorum a quinquaginta vel pluribus observatoribus institutis, errores ad $20''$ vel adeo ad $30''$ assurgentes statuendos esse, quam in binis observationibus distantiarum minimarum micrometro captis errores 3 vel 4 secundorum inesse posse?*

41. Quoniam compertum habemus plurimos in ea esse sententia, atmosphaeram Veneris, aliquid efficere valuisse, ad durationem transitus imminuendam, necessariam quoque duximus, quid ea de re cogitemus breuiter exponere. Primum vero observamus de hoc effectu nihil tuto iudicari posse, nisi tam correctio latitudinis pro Venere quam Semidiametri Solis exacte fuerit determinata. Ut autem hypothesein eligamus effectui atmosphaerae fauentem, ponamus correctionem latitudinis esse tantum $3''$, adeo ut sit valor litterae $y = 5$, quum igitur inventum sit esse

$$y = 8,76 + 1,55. \lambda \text{ et } \mu - \nu = -0,91 - \frac{1}{2}\lambda,$$

hinc

CONCLVSA EX TRANSIT. VENERIS. 645

hinc deducitur

$$\lambda = \frac{\mu + \nu}{2} = -2,43 \text{ et } \frac{\mu - \nu}{2} = -0,37,$$

vnde

$$\mu = -2,80 \text{ et } \nu = -2,06.$$

Ponamus iam semidiametrum Solis esse $= 947''$ vt ex mensuris Cel. *de la Lande* sequitur, semidiametrum autem Veneris $= 28'',6$ et pro contactu externo habebimus distantiam centrorum $975'',6$, pro contactu autem interno $= 918'',4$, quum autem ex calculis nostris pro contactu externo sit $= 976'' + \mu = 973'',20$, et pro interno $918'' + \nu = 915'',94$; euident hinc sit effectum refractionis sub hac hypothesi pro contactu externo esse $-2;4$ et pro interno $-2,5$ circiter. Hinc autem deduceretur, ob effectum refractionis, contactum externum $46''$, internum vero $50''$ ad tempus coniunctionis appropinquari. Si vero magis placuerit cum Astronomis Anglis diametrum Solis statuere tantum $= 945'',5$ effectus refractionis pro contactu externo erit $= -0,90$ et pro contactu interno $= -0,96$, ideoque contactus externus hinc $27''$, internus vero $19''$ versus tempus coniunctionis promouebitur. Ex his igitur liquet adhuc dum nihil certè de effectu atmosphaerae Veneris pronuntiari posse, imprimis quum nondum sufficientes praesto sint rationes, ex quibus concludere possemus valorem litterae γ multum infra $7\frac{1}{2}, 8$ deprimi debere. Per se autem patet valores a nobis assumptos litterarum γ, μ et ν ita esse

M m m m 3 compa

comparatos, ut effectui ex atmosphaera Veneris orituro nullus relinquatur locus, nisi forsitan valor semidiametri Solis aliquantum immutandus esset. Negare quidem non volumus Venerem atmosphaera praeditam esse, vtrum vero haec atmosphaera sensibilem exferere valeat effectum, ad ipsam durationem transitus imminuendam, quaestio est, de qua nimis praeceps fertur iudicium, antequam certissimis rationibus evictum sit, quinam valores latitudini Veneris Geocentricae atque diametris Solis et Veneris reapse competerunt.

med. 4^{ta} 64

42. Quisquis argumenta nostra, quibus induci parallaxin Solis horizontalem pro tempore transitus A. 1769, 8'', 55 esse collegimus, rite examinare et ponderare voluerit, facile nobis concedet hanc determinationem a veritate multum deflectere non posse. Quamvis igitur diffiteri nolim, hunc valorem correctionem vnus vel alterius partis centesimae secundi admittere posse, pro certo tamen persuasum mihi habeo, veram quantitatem parallaxeos Solis horizontalis pro tempore transitus, intra limites 8'', 4 et 8'', 6 contineri, adeo ut vtrunque res deciderit, nostra determinatio ultra partem decimam minuti secundi a veritate aberrare nequeat. Quicquid vero de hac incertitudine sit, euidenter satis patet, eam vllis defectibus Methodi a nobis in usum vocatae adscribi non posse, quum in-excellentissima hac Methodo, ad omnes correctiones latitudinis et longitudinis Veneris Geocentricae, nec non diame-

CONCLVSA EX TRANSIT. VENERIS. 647

diametrorum vtriusque aſtri, ſcrupuloſe attentio facta ſit, ſecus omnino ac fieri ſolet in Methodis ab Aſtronomis communiter receptis, dum ex duarum eiusdem nominis obſervationum comparatione parallaxi Solis eruere conantur, correctionibus modo dictis plane neglectis. Ne autem haec gratis affirmari videamur, combinemus inter ſe valores pro v deductos ex contactu interno pro ingreſſu Stockholmiae et ſuper inſula Regis Georgii obſervato.

Pro priori loco habetur

$$v = 4, 25 - 2, 4700. \pi + 0, 6514. x + 0, 7587. y$$

pro poſteriori autem

$$v = -32, 73 + 1, 9409. \pi + 0, 6235. x + 0, 7818. y$$

ſubtracto igitur hoc ab illo oritur

$$0 = 36, 98 - 4, 4109. \pi + 0, 0279. x - 0, 0231. y$$

Si nunc methodo apud Aſtronomos conſueta, valores correctionibus x et y affectos plane negligamus, habebitur $\pi = 8'', 38$, quum tamen valoribus ipſorum x et y in uſum vocatis prodire deberet $= 8'', 45$. Multo autem maiores diſſenſus metuendi ſunt, cum coeſſiciens ipſius π non adeo fuerit inſignis ac in exemplo allato. Sic facta comparatione valorum v ex contactu interno circa egreſſum ad ſinum Hudſonis et ſuper dicta inſula Regis Georgii obſervato, haec inuenietur aequatio:

$$0 = 17, 13 - 1, 9496. \pi - 0, 0267. x - 0, 0423. y$$

unde

vnde neglectis x et y oritur $\pi = 8'', 79$, iis vero in computum ductis $\pi = 8'', 40$. Quamvis vero neuter horum valorum veritati exacte congruat, inde minime tamen inferre licebit, sine vilo errore quantitates correctionibus x et y affectos negligi posse, quum errores observationum in causa sint, cur genuina etiam Methodo adhibita valor inueniatur parallaxeos, a veritate nonnihil discrepans.

ELEMENTA ASTRONOMICA
 THEORIAE VENERIS
 DEDUCTA EX OBSERVATIONE TRANSITVS
 VENERIS SVB SOLE AD SINVM HUDSONIS,
 CALIFORNIAE ET IN INSVLA REGIS
 GEORGII INSTITVTA.

Auctore

W. L. KRAFFT.

§. I.

Observationes conjunctionum eclipticarum Veneris cum Sole, praeter principalem suum in definienda parallaxi Solis horizontali usum, etiam cognitionem motuum huius planetae insigniter perficiunt. Summi enim in Veneris theoria momenti elementa astronomica, tempus verum conjunctionis, longitudo et latitudo Veneris geocentrica, distantia centrorum minima, locus nodi lineaeque nodorum motus annuus, ex iis summa cum praecisione deriuantur, diametri quoque Veneris adparentis vera quantitas per ingressus in discum solarem vel ex eodem egressus moram tanta cum exactitudine potest definiri, quantam ex dimensionibus micrometro vulgari capitis obtinere vix licet. Inprimis autem his disquisitionibus idoneae sunt observationes illorum locorum, ubi totam transitus durationem conspicere licuit,

Tom. XVI. Nou. Comm. N n n ex

ex quibus quippe subtensae a Venere in Solis disco percuriae tota longitudo immediate innotescit. Cum itaque Veneris anno 1769 in Sole visae tres istiusmodi completae observationes ad Academiam sint transmissae; eas pro stabiliendis istis elementis hinc examen reuocare placuit.

§ 2. Ante omnia haec inuestigatio summam in assignandis motibus Veneris horariis praecisionem postulat, quandoquidem ex iis orbitae apparentis inclinatio definitur. Cum itaque ad tempus coniunctionis sit Veneris anomalia media $10^{\circ}.4'.42''.15''$; excentrica $10^{\circ}.5'.1'.54''$; vera $10^{\circ}.5'.21'.30''$; motus Veneris horarius medius ex eius reuolutionibus cognitus $4'.6''.32$; motus denique horarius Solis $2'.23''.50$; isti motus secundum methodum a Cel. *La Lande* in Comment. Acad. Parisinae anni 1761. expositam computati ita deprehenduntur expressi:

Motus Veneris horarius heliocentricus.

in orbita . . .	$3'.58''.40.$	Inclinatio orbitae Veneris
in ecliptica . .	$3'.57''.98$	relatiuae $8^{\circ}28'.54''$ Mo-
in latitud. . . .	$14''.09.$	tus ♀ horar. in orbita ap-
a Sole	$94''.48.$	parente $95''.52.$

Ex his motibus in ratione distantiarum Veneris a terra et sole auctis colliguntur

Motus horarii geocentrici.

in ecliptica	$3'.57''.54$
in orbita relativa	$4'.0''.16$
in latitudinem	$35''.42.$

§. 3.

§. 3. Constitutis his, pro singulis observationum momentis effectus parallaxis solis in accelerando vel retardando contactu viso ab eo, qui pro spectatore in centro telluris constituto locum haberet, sunt indagandi; quos in hypothesi parallaxis solis horizontalis = $8''.55$ una cum temporibus veris singularum observationum subiuncta tabula repraesentat.

I. Ad Sinum Hudsonis.

	Temp. ver.	Effectus parall.	ergo pro centro terrae
Cont. I.	$0^b. 57'. 1''$	$3'. 46''. 8$ Accel.	mora ingressus $18'. 50''$
... II.	$1^b. 15'. 25''$	$4'. 12''. 9$ —	— egressus $18'. 43''$
... III.	$7^b. 0'. 49''$	$0'. 39''. 4$ —	duratio totius transitus
... IV.	$7^b. 19'. 21''$	$0'. 50''. 9$ —	inter contactus internos $5^b. 41'. 50''$.

II. Pro California.

Cont. II.	$0^b. 17'. 27''$	$0'. 17''. 2$ Accel.	duratio transitus
... III.	$5^b. 54'. 50''$	$4'. 49''. 9$ —	$5^b. 41'. 55'', 7$

III. Pro Infula Regis Georgii.

Cont. I.	$21^b. 25'. 40''$	$5'. 33''. 4$ Retard.	mora ingressus $18'. 19''$
... II.	$21^b. 44'. 2''$	$5'. 36''. 4$ —	— egressus $18'. 5''$
... III.	$3^b. 14'. 3''$	$6'. 17''. 5$ Accel.	duratio transitus
... IV.	$3^b. 32'. 14''$	$6'. 11''. 7$ —	$5^b. 41'. 58''$

§. 4. Principio igitur ut ex his observationibus semidiameter Veneris adparens, in sequentibus visui futura, innotescat; statuatur centrorum Veneris

N n n n 2

et

et Solis distantia minima $\equiv 607''$, qualis ex tabulis Halleianis reperitur. Hac assumpta, et posita Veneris semidiametro $\equiv 32''$, quae est maxima eius quantitas, quam aliquot Cel. Abbatis de *Chappe* observationes anno 1761 Tobolski institutae dederunt, mora ingressus vel egressus geocentrica deprehenditur $20'. 51''$; quae si cum mora ex singulis observationibus deducta comparatur, prodit

ex observatione	semidiam. Veneris
Ad sinum Hudsonis	$\left\{ \begin{array}{l} \text{per ingressum} \dots 28''.90 \\ \text{per egressum} \dots 28''.73 \end{array} \right.$
In insula Reg. Georgii	$\left\{ \begin{array}{l} \text{per ingressum} \dots 28''.11 \\ \text{per egressum} \dots 27''.75 \end{array} \right.$
	<hr/> Medium $28''.39$.

Verumtamen cum in vltima hac observatione mora egressus $18'. 5''$ nimis parua sit; ea errorem in alterutro contactu obseruato arguere videtur; et cum insuper etiam de contactu externo in ingressu non leuis sit dubitandi ratio, aliunde sese manifestans; sumto ex duabus prioribus determinationibus medio, semidiameter Veneris tutius statuitur $28'' 8$; quae insuper, quando distantia centrorum minima aduatius innotuerit, etiam maiori cum praecisione poterit definiri.

§. 5. Cum igitur solis sit semidiameter $\equiv 15' 47''. 0$ erit semidiametrorum differentia $918''. 2$. Dimidia autem duratio transitus geocentrici inter contactus internos in prima obseruatione $2^h. 50'. 55''$
ope

ope motus horarii Veneris in orbita relativa in partes circuli conuersa praebet semichordae a Venere in disco Solis descriptae longitudinem semidiametro Veneris minutam $11'.24''$. 1, vnde colligitur longitudo perpendiculari ex centro \odot in istam subtensam ducti seu distantia centrorum minima

Ex obseru. I. per contact. internos . . . $10'.12''$. 4
et simili calculo

Ex obseru. I. per contact. externos . . . $10'.13''$. 0

Ex obseru. II. intern. $10'.12''$. 3

Ex obseru. III. intern. $10'.12''$. 2

- - - - - III. extern. $10'.15''$. 9

quae vltima determinatio cum a ceteris $3''$ discrepet, in contactu alterutro externo obseruato errorem arguit; vnde statuere licet distantiam centrorum minimam $= 10'.12''$. 5. Hac igitur posita, reperitur, si semidiameter Veneris foret $32''$, mora ingressus vel egressus geocentrica $= 20'.58''$; vnde ex his obseruationibus colligitur, sumto medio, Veneris semidiameter apparens $= 28''$. 6. hincque diameter eius in distantia aequali distantiae mediae Solis a terra $= 16''$. 5. Posita ergo parallaxi Solis horizontali pro tempore harum obseruationum $= 8''$. 55 adeoque pro distantia Solis media $= 8''$. 68; qualis quippe ex calculis tam in praecedenti, quam in hoc Tomo Commentariorum summa cum praecisione est definita; colligitur ratio voluminum Veneris et terrae 8586:10000; de qua quantum inter se dissenserint Astronomi, videre li-

N n n n 3

cet

cet in Comment. Acad. Parisinae anni 1762. pag. 261 et 491.

§. 6. Per hanc distantiam centrorum minimam et angulum inclinationis orbitae apparentis $= 8^{\circ}. 28'. 54''$ statim reperitur pro ipso coniunctionis momento Latitudo Veneris geocentrica $10'. 19''. 4$; et distantia inter punctum coniunctionis et medii transitus $1'. 31''. 3$ siue in tempore $22'. 49'' 5$; quibus a tempore vero medii transitus geocentrici subtractis colligitur

Tempus verum coniunctionis sub meridiano obseruatorii.

Ad sinum Hudsonis $3^b. 47'. 44''$

In California $2^b. 45'. 51''$

In Insula Regis Georgii . . $0^b. 6'. 35''$.

Obseruatorii Cel. *Abbatis de Chappe* in California Longitudo a Lutetiis Parisiorum in nouellis publicis assignata est $7^b. 28'. 17''$ versus occidentem; Non quidem constat, ex qualibus obseruationibus ea sit deducta; supposito tamen, eam, ne circulus committatur, non esse ex ipsa Veneris obseruatione computatum eamque tantisper pro vera assumendo, colligitur coniunctionis φ cum \odot 1769. lun. 3.

Tempus verum Parisinum . . . $10^b. 14'. 8''$

Temp. med. $10^b. 11'. 55''$

atque hinc differentia meridianorum a Parisiis

Arcis

Arcis Principis Walliae $6^b. 26'. 24''$

Obſeruatorii in inf. Georgii . . . $10^b. 7'. 33''$.

§. 7. Reperitur iam, his conſtitutis, ex tabulis Cæl. de la Caille pro ipſo coniunctionis momento longitudo Veneris geocentrica $= 2^b. 13^o. 27'. 21''$. Latitudo vero geocentrica ſupra inuenit $= 10' 19''. 4$ Latitudinem præbet heliocentricam $= 4'. 6''$ hinc ob inclinationem orbitæ ad eclipticam $= 3^o. 23'. 20''$ concluditur arcus heliocentricus inter punctum Nodi et coniunctionis $= 1^o. 9'. 20''$; ex quo pro tempore coniunctionis proſtit Longitudo heliocentrica Nodi deſcendentis $8^b. 14^o. 36'. 41''$, per quem Venus tranſiit Iun. $4^d. 3^b. 40'. 55''$ temp. Pariſino medio.

§. 8. Ex Latitudine Veneris geocentrica $9'. 37''$, in tranſitu eius per Solem anno 1761. obſeruata inueni eius a Nodo diſtantiam $1^o. 3'. 46''$; hinc cum ſecundum calculos Cæl. de la Lande (Mem. de Paris 1761. pag. 336.) momento coniunctionis fuerit Veneris Longitudo heliocentrica $8^b. 15^o. 36'. 11''$, concluditur Longitudo Nodi deſcendentis $8^b. 14^o. 32'. 25''$. Hoc ergo temporis interuallo, quod eſt $7^{an. com.} + 362^d. 16^b. 22'$, motus lineæ Nodorum Veneris deprehenditur $4'. 16''$; unde prodiit motus annuus reſpectu æquinoctiorum $32''. 03$; ſive $- 18''. 30$ reſpectu fixarum, poſita nempe æquinoctiorum præceſſione annua $= 50''. 33$. Hæc determinatio $- 18''. 3$ ab ea, quam Cæl. la Lande ex theoria attractionis vniuerſalis deduxit, diſfert quantitate $2''. 1$.

§. 9.

§. 9. Si elementa hactenus inuestigata cum his, quae in praecedenti Tomo Commentariorum pag. 556. sunt exposita, conferantur; non nisi in tempore coniunctionis discrimen 16'' deprehendetur, quod vero potissimum a praecisione pendet, qua Longitudo Castelli St. Iosephi in California est determinata.

Interim igitur ista elementa heic in conspectu ita exhiberi convenit:

Temp. Parisino medio		Differentia a tabulis	
		Halleianis	Cassinianis
1769. Iun. 3 ^d . 10 ^b . 11 ^l . 55 ^u			
Longit. ♀ helioc.	8 ^l . 13 ^o . 27 ^l . 21 ^u	+ 1 ^l . 3 ^u	+ 0 ^l . 4 ^u
Lat. helioc.	4 ^l . 6 ^u		
Dist. centr. min.	10 ^l . 12 ^u . 6	+ 6 ^u	— 7 ^u
Long. Nodi ascend.	2 ^l . 14 ^o . 36 ^l . 41 ^u	+ 2 ^l . 56 ^u	— 1 ^l . 54 ^u
Mot. Nodi secul.	53 ^l . 23 ^u	+ 1 ^l . 43 ^u	— 3 ^l . 17 ^u
Diameter ♀ in dist			
☉ media	16 ^u . 5		
Ratio voluminum			
Veneris et terrae	8586 : 10000.		

Venus per Nodum descendantem transit temp. Parisino medio 1769. Iun. 4^d. 3^b. 40^l. 55^u.

§. 9. Ad semidiametrum Veneris quod attinet; mensurae aliquot micrometris obiectivis captae cum determinatione §. 5. tradita optime consentiunt. Est enim ea ex observationibus *Norisoni* in Pensyl-

Pensylvania factis; sumto medio $28''.5$; Petropoli $28''.5$; Ponoï $28''.6$.

Distantia vero centrorum minima, quam supra § 5. inueni $10'.12''.5$, per micrometra obiectiua non maior, quam $10'.10''$ vel ad summam $10'.11''$ est deprehensa, posita semidiametro Solis $15'.47''$. Cel. *La Lande* vt consensum inter conclusiones ex duratione deductas et immediatas mensuras obtineat, diametrum Solis aliquot minutis secundis minuendam censet: vnde prodiret distantia centrorum minima $10'.7''$ vel $10'.8''$. Fortassis vero ratio dissensus inter geminas istas determinationes potius in atmosphaera Veneris quaerenda videtur.

TENTAMEN
ORBITAE VENERIS
EXCENTRICITATEM ET APHELIVM,
HVIVSQVE MOTVM ANNVVM
DEFINIENDI

Auctore

W. L. K R A F F T.

§. I.

Orbitarum, in quibus feruntur planetae, excentricitatibus, locis apheliorum, horumque annuis motibus definiendis eae prae ceteris accommodatae sunt observationes, quae in principalibus orbitalium punctis, apsidibus et distantis mediis, sunt institutae. Ex tribus huiusmodi observationibus inter se combinandis excentricitatem et aphelii positionem determinandi, ea inter reliquas eminet methodus, quam in Comment. Acad. Parisinae theoriae Solis et Martis a Celeb. Astronomis *La Caille* et *La Lande* legimus adplicatam; quae vero praeter motum planetae medium annuam quoque apheliorum praecessionem tanquam calculi elementa summa cum praecisione supponit cognita. Motuum quidem mediorum satis exactam cognitionem Astronomorum debemus vigilis, qui contra in assignan-

dis

DE EXCENTR. ET APHEL. VENER. 659

dis apheliorum motibus notabiliter a se inuicem diferepant. Id intuens operae pretium duxi periculum facere, annon modo laudata methodus eo vsque possit perfici, vt motus quoque apheliorum annui quantitatem patefaciat, quod tentamen Veneris theoriae adplicatum leuiter hic adumbrare constitui.

§. 2. Obseruationes, quibus in hac disquisitione vsus sum, sequenti tabula complector:

	1715. Ian.	1716. Aug.
Temp. Paris. med.	26 ^d . 8 ^b . 34 ⁱ . 0 ^u	28 ^d . 16 ^b . 36 ⁱ . 42 ^u
Loc. ♀ helioc.		
in eclipt.	4 ^s . 6 ^o . 22 ⁱ . 58 ^u	11 ^s . 5 ^o . 49 ⁱ . 2 ^u
Reduct. ad orbit.	+ 2 ⁱ . 55 ^u	+ 0 ⁱ . 51 ^u
Loc. ♀ in orbit.	4 ^s . 6 ^o . 25 ⁱ . 53 ^u	11 ^s . 5 ^o . 49 ⁱ . 53 ^u
	♀ prope perih.	♀ prope aphel.
	1718. April	1769. Iun.
Temp. Paris. med.	8 ^d . 10 ^b . 15 ⁱ . 11 ^u	3 ^d . 10 ^b . 11 ⁱ . 39 ^u
Loc. ♀ helioc.		
in eclipt.	6 ^s . 18 ^o . 42 ⁱ . 13 ^u	8 ^s . 13 ^o . 27 ⁱ . 20 ^u
Reduct. ad orbit.	- 2 ⁱ . 49 ^u	+ 0 ⁱ . 7 ^u
Loc. ♀ in orbit.	6 ^s . 18 ^o . 39 ⁱ . 24 ^u	8 ^s . 13 ^o . 27 ⁱ . 27 ^u
	♀ prope dist. med.	♀ prope dist. med.

§. 3. Statuto iam motu Veneris annuo medio 7^s. 14^o. 47ⁱ. 29^u; pro singulis harum obseruationum interuallis motus Longitudinis mediae possunt computari, qui vna cum motibus Longitudinis verae ex obseruationibus deductis ita se habereprehenduntur:

O o o o 2

Motus

Pro Interuallo

	I ^{ma} 1715-1716.	II ^{da} 1715-1718.	III ^{da} 1715-1769
Motus long. med.	6°.29'.47".41"	82°.11'.26'.42"	54°.6'.20'.50".6
- - - long. verae	6°.29'.24".C"	82°.12'.13'.31"	54°.7'.1'.34"

§ 4. Pro tempore primae nostrae obseruationis colligitur:

	ex tabul. Halleianis		reuera vero
Longir. aphelii	= L = 10°.6'.45".39"	5	= L + dL
Mot. aphel. annuus	= μ =	56".53	= μ + dμ
Excentricitas	= e = 0,00698		= e + de
posita distantia med.	= 1.		

vbi iam negotium in eo versatur, vt valores harum correctionum dL , $dμ$ et de ex obseruationibus definiantur.

§. 5. Hunc in finem pro singulis interuallis quatuor fingantur hypothesēs, in quarum prima elementa Halleiana modo allata assumuntur, in secunda vero tertia et quarta vel longitudini aphelii vel excentricitati vel motui aphelii annuo arbitraria augmenta tribuuntur; quo fit, vt ex errorum variationibus inde oriundis aequationes analyticae incognitas illas dL , de et $dμ$ inuoluentes formari queant, quibus satisfieri debet, vt errores illi penitus destruantur. Non immoror hic demonstrationi duorum theorematum, quibus calculi sequentes superstruuntur; nempe positis anomalis vera = v , ex-

cen-

centrica = e ; media = m ; distantia aphelii = a ;
 perihelii = p ; excentricitate = e ; fore

$$\sqrt{\frac{a}{p}} \cdot \text{tang. } \frac{1}{2} v = \text{tang. } \frac{1}{2} e; \text{ et } m = e + e \sin e.$$

§. 6. Calculus ergo intervalli primi ita se habet:

Hypothesis I^{ma} Assumantur elementa Hal-
 leiana L ; e ; μ ; quibus positis huic intervallo com-
 petit motus aphelii = $1'. 28''$. 2 adeoque ex §. 3.
 motus anomaliae verae = $6'. 29''. 22'. 31''$. 8 et
 motus anomaliae mediae = $6'. 29''. 46'. 13''$. 6. Erit
 porro ob $L = 10'. 6''. 45'. 39''$. 5, in observatione

$$\begin{array}{l} \text{I}^{\text{ma}} \left\{ \begin{array}{l} \text{Anom. vera} \\ 5'. 29''. 40'. 13''. 5 \end{array} \right\} \\ \text{adeoque in II}^{\text{da}} \left\{ \begin{array}{l} 0'. 29''. 2'. 45''. 3. \end{array} \right\} \end{array}$$

Quodsi iam per aequationes §. praecedente allatas,
 pro quibus in hac hypothesis habetur

$\text{Log. } \sqrt{\frac{a}{p}} = 0, 0030314$; et $\text{Log. } e = 3, 1582805$,
 computentur respondentes his anomalis veris anoma-
 liae excentricae et mediae; eae ita reperiuntur ex-
 pressae

	Anom. excentr.	Anom. med.
I.	$5'. 29''. 40'. 21''$. 2	$5'. 29''. 40'. 29''$. 4
II.	$0'. 29''. 14'. 26''$. 2	$0'. 29''. 26'. 9''$. 4
	Adeoque mot anom. med. =	$6. 29. 45. 40. 0$
	qui cum debebat esse =	$6. 29. 46. 13. 6$

prodit error huius hypothesis = $-0'. 33''$. 6.

O o o o 3

Hypo-

Hypothesis II^{da}. Statuantur nunc elementa
 $L + 1^{\circ} 0'. 0''$; ϵ ; μ ; quibus positis erit

	Anom. vera	respondens Anom. med.
I.	$5^{\circ}. 28^{\circ}. 40'. 13''. 5$	$5^{\circ}. 28^{\circ}. 41'. 19''. 6$
II.	$0^{\circ}. 28^{\circ}. 2'. 45''. 3$	$0^{\circ}. 28^{\circ}. 25'. 25''. 1$
ergo mot. anom. med. $= 6^{\circ}. 29^{\circ}. 44'. 5''. 5$		
atque error secundae hypothesos $= - 2'. 8''. 1.$		

Hypothesis III^{ta}. Augeatur nunc, retentis L
 et μ , excentricitas particulis 0,00017; ut ea sit
 0,00715, qualis in tabulis Cassinianis statuitur; erit-
 que in hac hypothesi

$\text{Log. } \sqrt{\frac{e}{p}} = 0,0031035$; et $\text{Log. } \epsilon = 3,1687311$
 et in observatione

	Anom. vera	respond. Anom. med.
I.	$5^{\circ}. 29^{\circ}. 40'. 13''. 5$	$5^{\circ}. 29^{\circ}. 40'. 29''. 8$
II.	$0^{\circ}. 29^{\circ}. 2'. 45''. 3$	$0^{\circ}. 29^{\circ}. 26'. 43''. 5$
motus anom. med. $= 6^{\circ}. 29^{\circ}. 46'. 13''. 7$		
adeoque error hypothesos $= + 0'. 0''. 1.$		

Hypothesis IV^{ta}. Retentis L et ϵ ; ad motum
 aphelii annum $56'', 53$, addantur $29''. 47$ ut sit
 $1'. 26''$, qualis a Cel. Cassini statuitur; quo posito
 huic intervallo competit motus aphelii $= 2'. 16''. 3$
 adeoque ex §. 3. motus anomaliae verae $= 6^{\circ}. 29^{\circ}. 21'. 43'' \cdot 7$ et mediae $= 6^{\circ}. 29^{\circ}. 45'. 25''. 5$. Est porro
 in observatione

	Anom. vera	respondens Anom. med.
I ^{ma}	5°. 29'. 40". 13". 5	5°. 29'. 40". 29". 4
II ^{da}	0°. 29'. 1". 57". 2	0°. 29'. 25". 21". 0
ergo motus anom. med. =		6°. 29'. 44". 51". 6
atque error hypotheseos =		- 0'. 33". 9.

§. 7. Cum igitur error primæ hypotheseos = - 0'. 33". 6, addito ad epocham aphelii vno gradu abierit in hunc - 2'. 8". 1 adeoque auctus sit quantitate 94". 5, idem error, si epocha aphelii augeatur quantitate dL variationem patietur = , 0, 02625. dL . Simili modo colligitur

ob incrementum	variatio erroris
excentricitatis = $d\epsilon$	- 1, 9823. $d\epsilon$
motus aphelii = $d\mu$	+ 0, 0102. $d\mu$

quæ variationes cum iunctim sumtæ totum istum errorem - 0'. 33". 6 destruere debeant; primum intervallo hanc nobis suppeditat æquationem

$$-33''.6 = +0,02625.dL - 1,9823.d\epsilon + 0,0102.d\mu.$$

§. 8. Calculi pro intervallo II^{da} inter observationem primam et tertiam potiora elementa succincte ita exhibeo.

Hypo-

	I ^{ma}	II ^{da}
Hypothesis	L; ϵ ; μ ;	L+1°; ϵ ; μ
Mot. aph. inter- vallo competens	3'. 0"	3'. 0"
Mot. anom. med.		
ex obseru.	2°. 11'. 23'. 42". 5	2°. 11'. 23'. 42". 5
ex calc.	2°. 11'. 24'. 43". 8	2°. 11'. 24'. 10". 2
Error	+ 1'. 1". 3	+ 0'. 27". 7

	III ^{ta}	IV ^{ta}
Hypothesis	L; ϵ +17; μ	L; ϵ ; μ +30"
Mot. aph. inter- vallo competens	3'. 0"	4'. 34". 8
Mot. anom. med.		
ex obseru.	2°. 11'. 23'. 42". 5	2°. 11'. 22'. 7". 7
ex calc.	2°. 11'. 23'. 37". 5	2°. 11'. 23'. 9". 6
Error	- 0'. 5". 0	+ 1'. 1". 9

quare ex secundo hoc intervallo hanc adipiscimur
aequationem :

$$+61''.3 = +0,00933. dL + 3,9000. d\epsilon \\ - 0,0204. d\mu.$$

§. 9. Eodem modo calculum pro tertio inter-
vallo inter obseruationem primam et quartam ita in
compendio exhibeo :

Hypo-

Hypothesis.	I ^{ma}	II ^{da}
	L; ϵ ; μ	L+1; ϵ ; μ
Mot. aphelii pro hoc intervallo	51'. 10''. 0	51'. 10''. 0
Mot. anom. med.		
ex obseru.	4'. 5°. 29'. 40''. 6	4'. 5°. 29'. 40''. 6
ex calc.	4'. 5°. 31'. 6''. 9	4'. 5°. 29'. 47''. 9
Error	+ 1'. 26''. 3	+ 7''. 3

Hypothesis.	III ^{ta}	IV ^{ta}
	L; ϵ +17; μ	L; ϵ ; μ +30''
Mot. aphelii pro hoc intervallo	51'. 10''. 0	1°. 17'. 54''. 3
Mot. anom. med.		
ex obseru.	4'. 5°. 29'. 40''. 6	4'. 5°. 2'. 56''. 3
ex calc.	4'. 5°. 30'. 9''. 4	4'. 5°. 4'. 9''. 7
Error	+ 0'. 28''. 8	+ 1'. 13''. 4

ex tertio itaque intervallo sequens resultat aequatio :

$$+56''.3 = +0,02194. dL + 3,3823. d\epsilon$$

$$+0,4377. d\mu.$$

ex quatum trium aequationum resolutione correctiones dL , $d\epsilon$, $d\mu$ epochae aphelii excentricitati et motui aphelii Halleianis adplicandas determinabimus.

§. 10. Statim ergo colligitur ex aequatione

$$I^{ma}. dL = -1280 + 75,518. d\epsilon - 0,338. d\mu$$

$$II^{da}. dL = +6568 - 417,857. d\epsilon + 2,181. d\mu$$

$$III^{ta}. dL = +3932 - 154,140. d\epsilon - 19,947. d\mu$$

Tom. XVI. Nov. Comm.

P p p p

at-

atque hinc porro

$$0 = +7848 - 493,375. d\epsilon + 2,519. d\mu \text{ et}$$

$$0 = +5212 - 229,658. d\epsilon - 19,559. d\mu$$

quae ulterius resolutae praebent

$$d\epsilon = +15,907 + 0,0051. d\mu \text{ et}$$

$$d\epsilon = +22,694 - 0,0852. d\mu$$

unde perspicitur, motum aphelii annuum Halleianum notabili correctione indigere; proditque

$$d\mu = +75''.16; d\epsilon = +16; dL = -1'.15''$$

quibus correctionibus admissis habetur

$$1715. \text{ Ian. } 26^{\text{d}}. \text{ Loc. aphelii } 10^{\circ}.6'.44''.24''$$

$$\text{Motus aph. annuus } 2'.11''.69$$

$$\text{Excentricitas orbitae } 0,00714.$$

$$\text{posita distantia media} = 1.$$

§. 11. Haec vero elementa quatuor nostris observationibus exacto satisfacere, ex sequenti calculo patet: Posito motu aphelii annuo $= 2'.11''.69$, colligitur per §. 3. pro intervallo

	Mot. aphelii	Mot. anom. verae	Mot. anom. med.
I ^{ma}	3'.35''.4	6'.29°.20'.34''.6	6'.29°.44'.15''.3
II ^{da}	6'.59''.3	2'.12°.6'.31''.7	2'.11°.19'.43''.3
III ^{ta}	1°.59'.11''.7	4'.5°.2'.22''.3	4'.4°.21'.38''.9

Hinc ergo, cum tempore primae observationis inventus sit locus aphelii $10^{\circ}.6'.44''.24''$ sequentes formabuntur anomaliae verae, quibus respondentes

anomalias medias secundum formulas §. 5. computatas adiungo:

	Anom. verae	Anom. med.	Mot.anom.med. ex calculo	Error
I.	5°. 29'. 41". 29"	5°. 29'. 41". 45"	6°. 29'. 44". 15"	-0". 4
II.	0°. 29'. 2". 3"	0°. 29'. 26". 0"	2°. 11'. 19". 43"	-0". 3
III.	8°. 11'. 48". 0"	8°. 11'. 1". 28"	4°. 4'. 21". 39"	-0". 0
IV.	10°. 4'. 43". 51"	10°. 4'. 3". 24"		

qui consensus praecisionem horum elementorum, quatenus his quatuor observationibus satisficiant, abunde probat.

§ 12. Incrementa ista anomaliae mediae minimo anomaliae verae vel excentricitatis augmento respondentia etiam generaliter ope differentiationis aequationum §. 5. traditarum exprimere licet. Positis enim augmentis anomaliae verae = $d v$; excentricitatis = $d e$ et anomaliae mediae = $d m$, colligitur

$$d m = d v \cdot \frac{(1 - e^2) \sqrt{1 - e^2}}{(1 - e \cos v)^3} \text{ et}$$

$$d m = d e \cdot \sqrt{1 - e^2} \cdot \frac{\sin v (2 - e \cos v)}{(1 - e \cos v)^3}$$

Ita si statuatur excentricitas Halleiana 0,00698, et augmentum epochae aphelii = 3600"; erit $d v = -3600''$; adeoque $d m = -\frac{1565'' \cdot 7}{(1 - e \cos v)^3}$. Cum igitur verbi causa in hypothese prima intervalli primi fuerit $v = 5^\circ. 29'. 40". 13''. 5$ erit $1 - e \cos v = 1,0069798$ et $d m = -3549''. 9$, uti actu facto calculo fuit inuentum.

§ 13. Anomaliam veram, cui aequatio centri maxima respondet, sequenti modo facillime deter-

P p p 2

mino.

mino. Aequationum §. 5. expositarum sumtis differentialibus, habetur

$$dm = de(1 + e \cos v) \text{ et } dv = \frac{e(1 + \cos v)}{1 - e \cos v} de$$

posito

$$f = \sqrt{\frac{a}{p}} = \sqrt{\frac{1+e}{1-e}}$$

Cum vero sit

$$\cos v = \frac{r - \cos v}{e \cos v}, \text{ erit}$$

$$dv = \frac{1 - e \cos v}{1 - e} de \text{ et } dm = \frac{1 - e^2}{1 - e \cos v} de;$$

quibus, cum pro aequatione centri maxima sit $dv = dm$, inter se aequatis, prodit

$$(1 - e^2) \sqrt{1 - e} = (1 - e \cos v)^2$$

sive cum hic potestates altiores excentricitatis negligere liceat, $1 - \frac{1}{2} e^2 = (1 - e \cos v)^2$ seu $\cos v = +\frac{1}{2}e$. Substituta itaque excentricitate modo inuenta, prodit anomalia vera, cui respondet aequatio centri maxima $2^\circ. 29'. 41''. 34''$; huic competit anomalia media $3^\circ. 0'. 30''. 40''$; ita, ut quaesita aequatio maxima sit $49'. 6''$.

DE
LATITVDINE VENERIS
GEOCENTRICA TEMPORE TRAN-
SITVS A. 1769.

Auctore

AND. IOH. LEXELL.

r.

In dissertatione de Parallaxi Solis cum Illustr. Acad. Scientiarum nuper communicata, ostensum a me fuit, observationes contactuum internorum pro transitu Veneris A. 1769. factis, præbere latitudinem Veneris geocentricam tempore coniunctionis $10^{\circ} 19''$, quum tamen mensuræ distantiarum minimarum inter centra Solis et Veneris, variis in locis captae, probare videantur hanc latitudinem aliquanto minorem fuisse. Licet vero dissensus qui inter valores latitudinis utroque modo elicitos, vix duo aut tria minuta secunda superet, adeoque determinationem Parallaxis nullo modo dubiam reddere queat; haud inutile tamen erit fusius explicare, quatenam prodeat latitudo Geocentrica ex observatis distantis marginum Solis et Veneris, nec non aliis observationibus ad eam inquirendam institutis, quia sic facile diiudicare licebit, cuinam conclusioni potior habenda sit fides?

P p p p 3

2. Quum

2. Quum plerisque Americae incolis iucundo spectaculo totius aere transitus frui licuerit, factum quoque est, vt in istis regionibus, plurimae et exactissimae obseruationes, ad distantiam breuissimam centrorum Solis et Venoris explorandam institutae sint, inter quas autem praecipuis nominari merentur, quae Noritoni in Pensylvania, et numero plurimae et accuratissime insignes captae sunt mensurae distantiarum proximarum inter limbos Solis et Veneris, quarum obseruationum, vt et reliquorum phaenomenorum circa transitum Veneris ibi obseruatorum expositionem, Illustr. Societas Scientiarum Londinensis submittere dignata est. Quamuis autem a Cl. *Rittenbouse* operatione graphica singulas has mensuras examinatas esse viderimus eumque inuenisse tantum non omnibus satisfieri, si distantia vera minima centrorum Solis et Veneris ponatur $10'. 10''$, semidiameter Solis $15'. 47''$ atque semidiameter Veneris $28'', 56$; vt tamen maiorem hac de re acquireremus certitudinem, singulas fere obseruationes seorsim computare placuit, tumque ex earum debita inter se combinatione valores pro distantia minima exquirere.

3. Dum autem conclusiones ex his calculis deductas breuiter exposituri erimus, primum quaedam monenda videntur de Methodo quam hoc in negotio nobis sequendam elegimus. Repraesentet igitur **Tab. XX.** **Fig. 1.** *AB* orbitam Veneris, \odot *L* eclipticam, sit locus Solis in \odot qui tamquam inuariabilis spectatur, dum

Venus

Venus motu relatiuo orbitam describere concipitur, sint A et B duo loca Veneris in orbita, quorum ille tempus medii transitus anteuertit, hic autem insequitur, his autem locis respondeant loca apparentia seu obseruata a, b pro quibus etiam distantiae $\odot a$ et $\odot b$ per obseruationes dantur. Centro \odot et radiis $\odot b, \odot a$ descripti concipiantur arcus am, bn , rectis $\odot A$ et $\odot B$ in m et n occurrentes, cruntque partes resectae Am et Bn eae quantitates, quibus distantiae verae $\odot A$ et $\odot B$ ob effectum Parallaxis, siue imminui, siue augeri debeant, vt in apparentes $\odot a, \odot b$ transformentur. Quum igitur pro datis obseruationum temporibus hi effectus Parallaxis determinari possint, dabuntur etiam valores linearum $\odot A$ et $\odot B$, porro quum ipsum tempus binas huiusmodi obseruationes interiacens quoque detur, innotescet valor lineae AB per datum motum horarium Veneris in orbita facile determinandus. Inuentis igitur tribus trianguli $\odot AB$ lateribus, quaestio eo reuoluitur, vt inde eliciatur valor lineae perpendicularis $\odot M$, nec non segmentorum AM et BM , quibus datis etiam tempus medii transitus cognoscetur. Breuitatis gratia dicamus latus $\odot A = a, \odot B = b$ et $AB = c$ semisummam autem laterum s , tumque ex Geometria constabit aream totius trianguli $A \odot B$ hac exprimi formula:

$$\Delta A \odot B = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

eadem autem area, quum aequalis quoque sit $\triangle A B \odot M$, inde sequens deducitur valor distantiae minimae

$\odot M$

$$\odot M = \frac{1}{2} \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)},$$

quam formulam per Logarithmos facile computare licet. Inuenta autem $\odot M$, erit

$$AM = \sqrt{(\odot Aq - \odot Mq)} = \sqrt{(\odot A + \odot M)(\odot A - \odot M)}$$

similique modo

$$BM = \sqrt{(\odot B + \odot M)(\odot B - \odot M)}.$$

Caeterum, et alia via hoc negotium exsequi licet, quaerendo primum segmenta AM et BM , tumque inde $\odot M$, si enim differentia segmentorum AM et BM dicatur p , habebitur ob

$$\odot Aq - \odot Bq = AMq - BMq, (a+b)(a-b) = cp$$

ideoque

$$p = \frac{(a+b)(a-b)}{c},$$

tum vero erit

$$AM = \frac{1}{2}c + \frac{1}{2}p \text{ et } BM = \frac{1}{2}c - \frac{1}{2}p,$$

et denique fiet

$$\odot M = \sqrt{(\odot A + AM)(\odot A - AM)} = \sqrt{(\odot B + BM)(\odot B - BM)}.$$

Quamvis autem posterior Methodus, priore aliquanto videatur facilior, hanc tamen praefendam esse censuimus, quia verificationem quandam calculi secum ferre censenda est, dum utraque observatio pro tempore medii transitus eundem valorem exhibere debet, quod commodum posteriori operatione obtineri nequit, nisi valor lineae $\odot M$ duplici modo generatur, quo autem facto, prior operandi modus huic breuitate nihil cedere videtur. Caeterum facile

intelli-

intelligitur prius allata aeque valere, si ambae observationes ante vel post tempus medii transitus cadant, quae tamen ad valorem latitudinis stabilendum, non aeque haberi possunt aptae, ac istae, quarum una tempus medii transitus praecedit, altera vero insequitur, praesertim si temporis interval- lum satis adhibeatur notabile, quo enim maior est basis trianguli $A \odot B$, eo minus errandi periculum pro determinatione lineae $\odot M$ orietur ex errore commisso in valore lineae AB aestimando.

4. Valores distantiarum apparentium inter centra Solis et Veneris ex observationibus Noritoni factis deducti, sequenti repraesentantur Tabella, adiectis simul valoribus distantiarum verarum inter eadem centra

	Temp. vero	Dist. cent.	Dist. cent.
		appar.	vera.
I.	3 ^b . 7 ⁱ . 19 ^h	813 ^u , 0	825 ^u , 83
II.	11. 39	800, 8	813, 70
III.	17. 42	784, 9	797, 86
IV.	32. 3	745, 7	758, 71
V.	40. 4	729, 8	742, 77
VI.	4. 35. 5	631, 7	642, 80
VII.	57. 9	607, 7	617, 27
VIII.	5. 7. 49	603, 9	612, 55
IX.	21. 40	603, 1	610, 43
X.	31. 46	605, 2	611, 54
XI.	42. 38	609, 5	614, 72
XII.	51. 10	613, 7	617, 93

Tom. XVI. Nou. Comm.

Q q q q

Temp.

	Temp. vero	Diff. cent.	Diff. cent.
		appar.	vera.
XIII.	6 ^b .22. ⁱ 14 ^h	648 ^h , 7	649 ^h , 90
XIV.	31. 5	659, 8	660, 26
XV.	41. 24	681, 0	680, 49
XVI.	48. 12	693, 7	692, 66
XVII.	53. 30	705, 9	704, 55
XVIII.	56. 22	709, 6	707, 93

vbi notasse iuuabit nos pro semidiametro Solis cum retinuisse valorem, quem auctores ex suis obseruationibus concluderunt, nimirum $15'.47''$, nam si haec semidiameter aliquanto minor statui deberet, facile erit diiudicatu, quantam distantia minima inde patiatur diminutionem.

5. Ne nimis prolixum et inutilem suscipere-mus laborem, circa combinationem harum obseruationum, eam nobis praescripimus regulam, vt sex priorum obseruationum cum sex vltimis instituere-mus comparationem, pro reliquis autem sex obseruationibus intermediis proxime circa ipsum tempus medii transitus factis, inquireremus qualem singulae distantiae obseruatae praebcant valorem pro distantia minima, si ad epocham medii transitus, reducantur, quod ob datos motus horarios facile perficere licuit. Sequens autem tabella, non solum valores trium laterum $\odot A$, $\odot B$ et AB trianguli $A \odot B$ sed etiam distantiae minimae $\odot M$ inde eliciendae et temporis pro media transitu, exhibet, vltimum vero momentum ideo potissimum adiiciendum esse existi-

GEOCENT. TEMPORE TRANSITVS. 675

exiflimauimus, vt inde diiudicari possit quanam
obferuationes reliquis fufpectiores haberi debeant:

Comparat. inter		☉ A	☉ B	A B	☉ M	Tempus medii transitus
I. et	XVIII.	825", 83	707", 93	516", 20	10. 9", 59	26. 26. 31"
	XVII.	- - -	704, 45	504, 73	11, 50	25. 44
	XVI.	- - -	692, 66	883, 53	10, 44	26. 20
	XV.	- - -	680, 49	856, 33	10, 60	26. 19
	XIV.	- - -	660, 26	815, 67	8, 36	26. 56
	XIII.	- - -	649, 90	779, 67	10, 31	26. 24
II. et	XVIII.	813, 70	707, 93	898, 87	9, 61	26. 23
	XVII.	- - -	vt supra	887, 40	11, 20	25. 56
	XVI.	- - -	- - -	866, 20	10, 16	26. 14
	XV.	- - -	- - -	839, 00	10, 34	26. 9
	XIV.	- - -	- - -	797, 73	8, 13	26. 48
	XIII.	- - -	- - -	762, 33	10, 05	26. 15
III. et	XVIII.	797, 86	- - -	874, 67	9, 60	26. 23
	XVII.	- - -	- - -	863, 20	11, 16	25. 56
	XVI.	- - -	- - -	842, 00	10, 14	26. 14
	XV.	- - -	- - -	814, 80	10, 35	26. 10
	XIV.	- - -	- - -	773, 53	8, 14	26. 49
	XIII.	- - -	- - -	736, 13	10, 08	26. 15
IV. et	XVIII.	758, 71	- - -	817, 27	7, 74	25. 36
	XVII.	- - -	- - -	805, 80	9, 25	25. 5
	XVI.	- - -	- - -	784, 60	8, 33	25. 24
	XV.	- - -	- - -	757, 40	8, 62	25. 18
	XIV.	- - -	- - -	716, 13	6, 69	25. 57
	XIII.	- - -	- - -	680, 73	8, 67	25. 17
V. et	XVIII.	742, 77	- - -	785, 20	9, 32	26. 16
	XVII.	- - -	- - -	773, 73	10, 75	25. 44
	XVI.	- - -	- - -	752, 53	9, 82	26. 5
	XV.	- - -	- - -	725, 33	10, 01	26. 1
	XIV.	- - -	- - -	684, 67	8, 01	26. 44
	XIII.	- - -	- - -	648, 67	9, 84	26. 5

Q q q q 2

Com-

Comparat. inter	⊙ A	⊙ A	A B	⊙ M	Tempos medii transitus
XVIII.	642, 80	707, 93	565, 12	10' 9", 31	5 ^b . 16. 27
XVII.	- - -	704, 45	553, 67	10, 29	25. 32
XVI.	- - -	692, 60	532, 47	9, 66	26. 1
XV.	- - -	680, 49	505, 27	9, 84	25. 53
XIV.	- - -	660, 26	464, 00	8, 40	26. 57
XIII.	- - -	649, 90	428, 60	9, 71	25. 59.

VI. et

Numerum harum comparationum facile augere potuiffemus, quandoquidem obferuationes quinque priores cum IX, X, XI et XII commodè combinari poffe videntur, fimilique ratione quinque vltimae cum VII et VIII; verum hunc laborem fufcipere fuperfluum duximus, fiquidem valores pro diftantia minima iam inuenti, tam arctis circumfcribantur limitibus, vt nullum fit dubium, quin medio ipforum fumto, valor huius diftantiae vero proximus obtineatur. Maxima fcilicet difcrepantia horum valorum non nifi ad 5" affurgit, quae fi combinatio obferuationis IV cum XIV excludatur, ad 3" deprimitur, fin vero adeo omnes combinationes cum IV et XIV excludantur, eadem 2" vix fuperabit, ex inuentis autem valoribus pro tempore medii transitus euidenter patet, obferuationes IV tam et XIV tam, reliquis incertiores effe habendas. Deinde pro fex obferuationibus intermediis notaffe fatis erit valores, qui ex earum reductione ad epocham medii transitus pro diftantia minima oriuntur; hi autem ita fe habent:

VII

	Distant. cent. act.	Dist. minim.
VII.	10 ^l . 17 ⁿ . 27	10 ^l . 6 ⁿ . 87
VIII.	12, 55	8, 53
IX.	10, 43	10, 28
X.	11, 54	11, 10
XI.	14, 72	10, 97
XII.	17, 93	8, 53

vbi iterum liquet observationem septimam excludi posse, quippe quae a reliquis plus iusto discrepat.

6. In superioribus calculis, eam correctionem quam distantiae centrorum Solis et Veneris subeunt, propter diversam istorum centrorum refractionem, negleximus plane, quia certo nobis habebamus compertum, distantias istas hac de causa ne semisse quidem secundi immutari. Id autem sequenti ratiocinio planius fiet. Sit $\odot A$ linea horizontalis per centrum Solis ducta, $\odot \varphi M$ recta per centra Solis et Veneris transiens et limbo Solis in M occurrens, demittantur ex φ et M in $\odot A$ perpendiculares φC et $M B$ tumque capta $M m$ aequali differentiae refractionum inter centrum Solis et punctum limbi M , si iungantur $\odot m$ recta ipsi φC in V occurrente, erit locus centri Veneris apparens in puncto V , quum enim differentiae refractionum sint differentiis altitudinum quam proxime proportionales, erit $\varphi V : M m :: \varphi C : M B$, ideoque puncta \odot , V et m quam proxime in directum iacebunt. Quum igitur ex observationibus deduxerimus distantiam centrorum veram $= \odot M - V m$, quae tamen aequalis esse de-

Q q q q 3

beret

beret ipsi $\odot M - \varphi M$, correctio huic distantiae ad-
iicienda erit $= Vm - \varphi M$, hinc si centro \odot ra-
diis $\odot V$, $\odot m$ describantur arcus circuli Vv et mp
rectae $\odot M$ in v et p occurrentes, habebitur ista
correctio $= \varphi v - M p = - (M m - \varphi V) \cos. \odot M B$,
quae quantitas pro singulis nostris aequationibus mi-
nimum adipiscitur valorem. Pro obseruatione
ex. gr. VI^{ta} habemus $\odot \varphi = 632''$; $\varphi C = 390''$;
 $\varphi V = 0'$, 4 et $M m = 0''$, 6 unde deducitur corre-
ctio $= -0, 2 \cos. \odot M B = -0, 2 \frac{g}{9}$, ideoque
viz $-0''$, 2 maior.

7. Si nunc ex omnibus 36 valoribus, quos
combinationes supra allatae suppeditant, medium su-
matur, prodibit valor distantiae minimae $10'. 9''$, 4,
si vero comparationes cum obseruatione IV exclu-
dantur, medio sumto inuenietur $= 10'. 9''$, 8 et de-
nique comparationibus cum obseruatione XIV^{ta} etiam
exclusis, valor huius distantiae prodibit $= 10'. 10''$.
Ex sex obseruationibus intermediis, medium sumen-
do colligitur distantia minima $10'. 9''$, 4 et septima
exclusa $10'. 9''$, 9. Hinc itaque medio sumto inter
omnes conclusiones accuratiores, quae non nisi 2''
inter se discrepant, exacte omnino inuenietur distan-
tia centrorum Solis et Veneris minima $10'. 10''$, 2,
sumto scilicet pro semidiametro Solis valore $15'$ et
 $47''$, inde autem liquet, si haec semidiameter sta-
tuatur $15'. 45''$, 5, distantiam istam minimam pro-
dure debere $10'. 9''$. Quod tempus medii transitus
attinet, ex conclusionibus optime inter se consen-
tient-

tientibus, quae remanent IVtam et XIVtam observationem excludendo, medio capto idem inuenitur $5^b. 26'. 7''$, quum igitur idem tempus pro Parisiis incidat in $10^b. 36'. 40''$ circiter, differentia meridianorum inter Lutetias Parisiorum et Noritonum habebitur $5^b. 10'. 33''$ optime conueniens cum ista, quam ex observationibus circa eclipses Satellitum Iouis Noritoni factis deducere licuit.

8. Quamuis valor distantiae minimae iam inuentus, ex conclusionibus egregie inter se consentientibus elicitus sit, adeo ut hoc ex capite pro exactissimo haberi deberet, diffiteri tamen nolumus nobis multum probabile videri, eundem vno saltem secundo augendum esse. Indolem enim observationum pro distantis marginum Solis et Veneris micrometro obiectiuo capiendis, institutarum qui rite perpenderit, facile concedet multo maiorem esse probabilitatem, ut harum distantiarum mensurae iusto prodeant maiores, quam ut in defectu peccarent. Ad inueniendam scilicet distantiam marginum minimam ea instrumento tribui debet positio, qua recta per centra Solis et Veneris transiens cum ipsa sectione lentium in Micrometro exacte congruit, in alio vero quocunque instrumenti situ, distantia marginum vera maior inueniri debet. Quum igitur pro vnaquaque observatione non nisi vnica positione instrumenti distantia marginum vera inueniri queat, liquet omnino maxime probabile esse, ut harum distantiarum mensurae veris aliquanto inueniantur maiores,

maiores, unde vicissim: Improbabile quoque redditur distantias centrorum veris aliquanto: minores inuentas esse. Neque tamen hunc valorem distantiae minimae plus quam vno minuto secundo augere auisim, quoniam alias statuendum esset, omnes mensusas circa distantias marginum captas in excessu peccare, quod tamen in tanto praesertim observationum numero haud credibile videtur. Quod si igitur ex ratione supra allata, singulis distantis centrorum obseruatis vnus secundi tribuatur augmentum, inde colligetur distantiam minimam centrorum fuisse $10'$, $11''$, supposita semidiametro Solis $15'. 47''$, quae autem distantia inuenietur $10'$, $10''$ dum semidiameter Solis statuitur $15'. 45''$, 5. Caeterum si cui visum fuerit hoc augmentum nulla urgente necessitate, distantiae minimae fuisse tributum, tantum abest vt sententiae a nobis propositae morose inhaerere velimus, vt potius vnique liberum relinquamus, valores pro distantia minima ex obseruationibus immediate conclusos vid. §. 7. adoptare, si ita placuerit.

9. Vt conclusiones ex obseruationibus Noritoni factis deductae tanto magis confirmentur, haud abs re erit nonnullas haec adicere obseruationes circa distantias marginum Solis, et Veneris Philadelphiae institutas, quae ita se habent:

Temp.	

GEOCENT. TEMPORE TRANSITVS. 681

Temp. vero	Distantia appar.	Dist. vera
I. 2 ^b . 55 ⁱ . 59 ^u	848 ^u , 19	859 ^u , 85
II. 3. 16. 33	786, 29	799, 22
III. 3. 46. 46	717, 89	730, 80
IV. 4. 12. 24	662, 80	674, 94
V. 6. 28. 27	660, 84	660, 98
VI. 6. 55. 31	708, 01	705, 92.

Nunc modo supra expofito binarum vltimarum fiat combinatio cum quatuor primis, ex quo pro $\odot M$ fequentes consequemur valores:

Compar. inter	$\odot A$	$\odot B$	AB	$\odot M$
VI et I.	859 ^u , 85	705 ^u , 92	958 ^u , 13	10 ⁱ . 11 ^u , 13
II.	799, 22	-	875, 87	8, 55
III.	730, 82	-	755, 00	13, 29
IV.	674, 64	-	652, 47	9, 88
V. et I.	859, 85	660, 98	849, 87	13, 09
II.	vt fup.	-	767, 60	10, 93
III.	-	-	646, 74	12, 60
IV.	-	-	544, 20	9, 83

medium vero ex his octo valoribus praebeet diftantiam minimam centrorum 10ⁱ. 11^u circiter.

10. Inter alias Methodos, quibus Aftronomi vfi funt, ad determinandam Longitudinem et Latitudinem Veneris geocentricam tempore tranfitus per Solem, quum infigni loco haberi confueuerit ea, qua momenta appulfus limborum Solis et Veneris

Tom. XVI. Nou. Comm.

R r r r

ad

ad fila horizontalia et verticalia Quadrantis notantur; e re esse duximus quasdam huius generis observationes calculo subiicere, eum in finem vt saltem diiudicare liceret, quo in pretio tales observationes habendae sunt, ad verum valorem Latitudinis geocentricae definiendum. Momenta igitur appulsuum Orenburgi a Celeb. *Krafftio* obseruata pro hoc instituto seligere constitui, quoniam eadem satis exacta et bene inter se concordantia mihi visa sunt. Antequam vero conclusiones ex his obseruationibus pro Latitudine deductas heic adferre liceat, necesse est nonnulla breuiter praefari de methodo, quam hoc in negotio mihi sequendam proposui. Primum igitur ita mihi persuasum habui, conclusiones eo certiores inueniri, quo pauciora momenta obseruata consulere necesse fuit, quamuis enim interdum fieri soleat, vt errores obseruationum se mutuo corrigant, tamen nullum est dubium, quin dum errores in eundem sensum cadant, tanto maior aberratio sit metuenda. Dum igitur heic quaestio tantum est de inuestiganda Latitudine Veneris, pro scopo sufficere iudicavi, si ad bina momenta appulsuum limbi Solis et centri Veneris ad filum horizontale attentio fieret; Longitudo enim Veneris per obseruationes contactuum adeo exacte determinata habetur, vt ea in ipsa Latitudinis inuestigatione omnino pro cognita spectari queat.

Ex modo memorata differentia appulsuum et data altitudine vera centri Solis pro momento, quo

quo limbus ad filum horizontale appellit, facile colligitur altitudo vera centri Veneris isti momento respondens, quo hoc centrum per filum horizontale Quadrantis transiisse obseruatum est. Si enim distantia vera centri Solis a Zenith dicatur D , semidiameter Solis Δ et parallaxis altitudinis pro Sole π , tum vero pro Venere statuatur distantia eius vera a Zenith tempore appulsus $= d$ et parallaxis $= \alpha \pi$, refraction autem altitudini apparenti obseruatae respondens ponatur $= r$, omnino liquet distantiam apparentem limbi Solis a Zenith esse pro tempore sui appulsus $= D - \Delta - r + \pi$, similique ratione distantiam apparentem centri Veneris a Zenith tempore transitus per filum horizontale $= d - r + \alpha \pi$, quum igitur hae distantiae plane congruant, consequimur $d = D - \Delta - (\alpha - 1) \pi$, sicque ex data altitudine vera centri Solis, eiusdem diametro et differentia inter parallaxes altitudinum Veneris et Solis cognita, facile inuenitur altitudo vera centri Veneris, pro tempore quo per filum horizontale transiisse obseruatum est. Iam igitur totum negotium eo redit, vt ex data longitudine et altitudine Veneris pro dato tempore Orenburgensi, inuestigetur eius Latitudo. Ad huius Problematis resolutionem sufficiet modo consueto, pro dato hoc tempore quaerere longitudinem et altitudinem Nonagesimi; si enim $N \vee M$ fuerit ecliptica, N punctum Nonagesimi, $\Pi Z N$ circulus Latitudinis per Zenith Z et Nonagesimum transiens, itemque $\Pi \varphi M$ similis circulus per locum Veneris φ transiens et

$R r r r a$ eclipti.

Tab. XX.

Fig. 3.

eclipticae in M occurrens, ductus autem concipitur circulus verticalis Z φ ; patet in triangulo $\Pi Z \varphi$ data esse bina latera ΠZ et $Z \varphi$, tum vero etiam angulum Π , qui scilicet ex datis longitudinibus Nonagesimi et Veneris facile inuenitur, his autem datis, iam latus trianguli tertium $\Pi \varphi$ quaeri potest, cuius complementum ad 90° est φM aequalis latitudini Veneris ipso tempore observationis. Idem vero et hoc modo facilius perfici posse videtur: pro tempore quo Venus per solum horizontale transiit computetur altitudo vera centri Solis, ut habeatur differentia altitudinum vera, deinde inuestigetur angulus, quem ecliptica tunc temporis facit cum linea horizontali per centrum Solis ducta, tunc enim ex datis differentiis altitudinum et Longitudinum pro centrīs Solis et Veneris, ipsae quoque latitudines Veneris determinari possunt. Si enim fuerit $\odot H$ linea horizontalis per centrum Solis ducta, $\odot L$ ecliptica et φ locus Veneris, ex quo demittantur in $\odot H$ et $\odot L$ perpendiculares φM et φN quarum haec producta si opus sit occurrat horizontali in puncto P, erit $\varphi P = \varphi M$. col. $L \odot H$ et $N P = \odot N$ Tang. $L \odot H$, ideoque dabitur $\varphi N = \varphi P - N P$. Hanc autem procedendi viam alteri praefendam esse iudicauimus, quia in hoc computo incertitudo quae circa Eleuationem Poli adesse poterit, negotium minime turbare valet.

Tab. XX.
Fig. 4.

12. Ut autem rem in compendium redigamus, sequenti Tabula conclusiones a nobis inuentas exponere licebit, de qua monendum est, quod I et II.

colu-

columna complectatur momenta appulsuum obseruata limbi Solis superioris et centri Veneris ad filum horizontale, III^{ta} et IV^{ta} differentias altitudinum et longitudinum inter centra Solis et Veneris pro momentis transitus Veneris per filum horizontale, V^{ta} Latitudines Veneris iisdem temporibus respondentes et denique VI^{ta} valores pro latitudine tempore conjunctionis inde deductos:

16 ^b . 10'. 10."	16 ^b . 10'. 42."	728"	576"	8'. 47"	10'. 13"
15. 26	15. 56	738	597	46	15
19. 16	19. 44	751	612	51	22
20. 22	20. 49	757	616	54	26
22. 11	22. 37	763, 5	624	56	29
23. 14	23. 41	757	628	46	20
25. 25	25. 51	763, 5	637	48	23
27. 29	27. 54	770	645	50	26.

Medium ex conclusionibus inuentis dabit latitudinem geocentricam tempore coniunctionis 10'. 22'' circiter quae sine dubio veram aliquanto excedit.

12. Quum in huiusmodi obseruationibus vtunque accurate institutae fuerint, vix euitari queat, quin in notandis momentis appulsuum vnus secundi error committatur, intelligitur inter conclusiones ex illis deductas frustra talem desiderari consensum, qui se prodit inter obseruationes distantiarum pro limbis Solis et Veneris Micrometro institutae. Neque igitur obseruationes hae appulsuum vtilis centeri debent, ad valorem Latitudinis exacte definiendum, quum

R r r r 3

vnus

vnus secundi error in appulsu, altitudinem Veneris 7'' immutet pro nostro casu, adeoque in latitudine variationem fere 8'' producat, quae autem multo sensibilior euaderet, si angulus $L \odot H$ maior esset. Quodsi igitur in vtroque appulsu tam limbi Solis quam centri Veneris error tantum vnus secundi commissus sit, atque hi duo errores conspirare concipiantur ad differentiam altitudinum vel augendam, vel minuendam, inde in latitudinem error ultra 16'' assurgens redundabit. Quod demum attinet modum procedendi a nobis adhibitum, existimamus cum sine dubio illi praefendum esse, quo ex differentiis altitudinum et azimuthorum per ipsa appulsuum momenta exquisitorum, differentiae longitudinum et latitudinum inuestigantur. De longitudine enim Veneris quum ex aliis obseruationibus tam certissimus, vt vix error vnus secundi metuendus sit, eam hoc in calculo vt cognitam spectare licuit, ne obligati essemus momenta quoque appulsuum ad fila verticalia considerare, siquidem errores in his appulsibus commissi, conclusiones pro latitudine nimium turbaturi essent. Differentias autem altitudinum potius calculi ope, quam ex obseruationibus eruendas esse censuimus, ne incertitudo refractionum negotium turbaret, quae imprimis pro exiguis Solis altitudinibus sensibilem habere potest influxum, et pro nostro quidem casu quo altitudo Solis vera 3 vel 4 gradus vix superauit, dubitari nequit, quin refractionis actualis ab ea quam in Tabulis assignatam esse inuenimus, quam maxime esse potuerit diuersa.

13. Quamuis obseruationes Cel. *Krafftii* supra allatae, tam bene inter se consentiant, ac de huiusmodi obseruationibus sperari possit, tamen haud inuicundum esse existimauimus, si inquireremus quomodo ad perfectum fere consensum redigi queant. Quicquid autem hac de re monebimus, tantum vt coniecturam proponemus. Differentias igitur temporum inter momenta appulsuum ad filum horizontale considerantes inuenimus eas non aequabili lego procedere, simul autem vidimus leui correctione adhibita, huic incommodo medelam adferri posse. Differentiam scilicet inter momenta appulsuum tam pro prima, quam vltima obseruatione semisse secundauximus, ita tamen vt pro priori altitudo Veneris inde augeatur, pro vltima autem imminuatur, prior igitur differentia hinc inuenietur $32''$, posterior vero $25''$. Subtracta hac ab illa residuum est $6''$, quod per reliquis sex obseruationes proportionaliter distribuimus, eoque facto differentias appulsuum vt et valores pro latitudine inde deductos tales inuenimus quales sequens Tabula refert:

Different. obseruat.	Diff. corr.	Latit. Geoc.	
I. $31^{\circ}, 5$	$32'', 0$	$10^{\circ}, 16''$	
II. 30	$30, 0$	15	
III. 28	$28, 5$	19	
IV. 27	28	19	
V. 26	$27, 5$	18	
VI. 27	27	20	
VII. 26	$26, 3$	21	
VIII. 25	$25, 5$	22	ex

ex quibus medio sumto prodiret latitudo $10^{\circ}.18''$, 7, sed haec uti iam supra monui coniecturae loco tantum propono.

14. Quum momenta contactuum Veneris observationum variis in locis obseruata, vnanimi consensu pro distantia centrorum minima praebant $10^{\circ}.13''$, supposita nimirum semidiametro Solis $15^{\circ}.47''$, merito iam disquirendum est, quomodo hae observationes, quae nulli suspicioni videntur obnoxiae conciliari queant, cum mensuris distantiarum inter centra Solis et Veneris, quas ex aduersa parte in eo consentire vidimus, quod haec distantia statui debeat $10^{\circ}.11''$. Ex tribus vero causis fieri potest, ut distantia minima ex momentis contactuum elicta aliquantum imminui debeat, quarum duae etiam pro conclusionibus ex mensuris Micrometricis deductis aliquam inuoluunt diminutionem, tertia autem prioris generis observationes solas afficere videtur. *Primo* scilicet si motus horarius Veneris in orbita quam assumimus, aliquantilla sui parte augeri debeat, necessum quoque est, ut distantia minima ex contactibus conclusa imminuenda sit; *deinde* si semidiameter Solis imminutionem patiatur, hoc quoque valebit ad distantiam centrorum minimam minuendam, et *demum* si vel propter refractionem radiorum Solis in atmosphaera Veneris factam, vel aliam quaecunque rationem physicam, momenta contactuum propius ad epocham medii transitus contigerint, quam ceteroquin fieri debuisset, inde quoque contingere potest, ut ex momentis

con-

contactuum maior colligatur valor pro distantia minima, quam vt cum reliquis observationibus consentiens deprehendatur.

16 Quod igitur motum horarium Veneris in orbita attinet, quum hoc in negotio maximi momenti sit, eum accurate exprimi, haud incongruum iudicauimus hoc loco formulam tradere concinnam, cuius ope motus horarii Planetarum heliocentrici in ipsorum orbitis, cum summa exactitudine computari possunt. Sit igitur Cc spatium a Planeta in orbita circa Solem \odot intervallo vnus horae descriptum, ductis itaque $C\odot$, $c\odot$ exprimet angulus $C\odot c$ motum horarium Planetæ heliocentricum in orbita, tum autem ducatur arcus cD perpendicularis ad $\odot C$. Porro si linea ES capiatur media proportionalis inter semiaxem maiorem et minorem orbitæ, eaque pro radio assumpta describatur centro S arcus Ee ita vt sector $ESe =$ sectori $C\odot c$, dabit angulus ESe motum horarium Planetæ heliocentricum medium. Quum itaque sit $\text{Sect. } C\odot c = \text{Sect. } ESe$, erit $Dc \cdot \odot C = Ee \cdot SE$, ideoque ob ang. $C\odot c$: ang. $ESe :: \frac{Dc}{\odot C} : \frac{Ee}{SE}$, erit ang. $C\odot c$: ang. $ESe :: SE^2 : \odot C^2$. Dicatur iam anomalia Planetæ vera ab aphelio computata Φ , anomalia media s , distantia media a et excentricitas e , eritque $d\Phi : ds :: SE^2 : \odot C^2$, per proprietatem autem Ellipsis est $SE^2 = aaV(1-ee)$ et $\odot C^2 = \frac{aa(1-ee)^3}{(1-ee \cos \Phi)^3}$, proinde his valoribus substitutis fiet $d\Phi : ds :: V(1-ee) : \frac{(1-ee \cos \Phi)^3}{(1-ee)^3}$, seu

Tom. XVI. Nou. Comm. S s s s $d\Phi$

$d\Phi = dt \frac{(1 - e \cos \Phi)^2}{(1 - e^2)^{3/2}}$ Facta applicatione huius

formulae ad calum praesentem, inuenimus motum horarium heliocentricum Veneris in orbita $238''$, 38, in longitudinem vero $237''$, 96 et in latitudinem $14''$, 088. Quum autem motus horarius terrae heliocentricus pro eo tempore fuerit $143''$, 50, habebitur motus relatiuus Veneris a terra in Sole visus $= 94''$, 46 secundum longitudinem, ideoque motus relatiuus in orbita $95''$, 50, ex quo deducitur motus relatiuus Veneris in orbita e terra visus $240''$, 12 fere vt Celeb. de la *Lande* inuenit, tum vero quoque habebitur motus Veneris geocentricus in longitudinem $237''$, 49 et in latitudinem $35''$, 52. Quum itaque hinc pateat motus horarios a nobis assumptos rite se habere, nullum quidem est dubium, quin ex momentis contactuum deduci debeat distantia minima $10'$. 13".

17. Examinemus autem nunc, quantus censeri debeat effectus, per quem momenta contactus pro ingressu fuerunt retardata, pro egressu autem accelerata, siue hic effectus refractioni radiorum Solis in atmosphaera Veneris, siue alii cuidam caussae physicae sit adscribendus. Quum igitur in Dissertatione de Parallaxi huius Tomo Comment. inserta ad has peruentum sit aequationes:

$y = 8,76 + 1,55. \lambda$ et $\mu - \nu = -0,91 - \frac{1}{11} \lambda$,
 duas hic statuamus hypotheses, priorem qua semidiameter Solis $947''$ et distantia minima centrorum Solis

Solis, et Veneris $10'. 11''$, posteriorem qua semidiameter Solis $945'', 5$ et distantia minima $10'. 10''$. Pro priori habemus $y = 6, 44$, ideoque

$$\lambda = \frac{\mu + y}{1} = -1, 52 \text{ et } \frac{\mu - y}{1} = -0, 40,$$

unde $\mu = -1, 92$ et $y = -1, 12$, porro erit summa semidiametrorum $= 975, 6$ et differentia earum $918'', 4$. Diminutio igitur distantiae centrorum, tam pro contactibus externis, quam internis erit $= 1, 52$, ex quo hi contactus fere $30''$ versus tempus coniunctionis promouebuntur. Pro posteriori hypothesis est $y = 5, 4$;

$$\lambda = \frac{\mu + y}{1} = -2, 17 \text{ et } \frac{\mu - y}{1} = -0, 38,$$

hinc $\mu = -2, 55$ et $y = -1, 79$, tum autem ob summam semidiametrorum $974'', 1$ et differentiam $= 916'', 9$ erit diminutio distantiae centrorum pro contactibus externis $0'', 65$, pro internis vero $0'', 69$, unde priores contactus $13''$ posteriores autem $14''$, versus tempus coniunctionis appropinquantur. Quicquid autem hac de re iam demonstrauimus, id tantum hypothetice assertum esse quiuis facile videt, ea nimirum sub conditione, quod valores pro distantia minima, tam ex obseruationibus Micrometricis quam obseruatis contactibus deducti rite se habeant, de quo quidem nulla suspicandi ratio nobis oborta est, quum consensus obseruationum vtriusque classis tantus sit, vt eum temere existisse credere non liceat. Sin autem huiusmodi quaedam adfuerit causa; quae ad moram Veneris in Sole minuendam aliquid efficere

SSSS 2

valuit,

valuit, pro certo tamen pronuntiare non audeo, cum in refractione quadam radiorum Solis per atmosphaeram Veneris facta, quaeri debere, totam hanc quationem aliis dirimendam libenter permittens. Quicquid igitur hac de re sit, quum posteriori adhibita hypothesi conclusiones non multum inter se discrepantes inueniantur, tuto assumere licebit semidiametrum Solis pro tempore transitus A. 1769 fuisse $15^{\circ}.45''$, 5 et distantiam minimam centrorum Solis et Veneris $10^{\circ}.10''$, ex quo colligitur Latitudinem Veneris geocentricam fuisse $10^{\circ}.17''$. Deinde correctio longitudinis pro Venere inuenietur $16''$, 56, adeo ut tempus coniunctionis cum Sole inciderit Parisiis in 3 Iunii $10^{\circ}.14^{\circ}.3''$, ideoque tempus medii transitus in $10^{\circ}.36^{\circ}.38''$ tempore vero. De parallaxi autem iam monuimus eam, ex tantilla diminutione latitudinis non nisi $\frac{1}{30}$ parte secundi augeri.

E P I T O M E

OBSERVATIONVM METEOROLOGICARVM,
 QVAS ANNO MDCCLXXI. SECVNDVM
 CALENDARIVM IVLIANVM PE-
 TROPOLI INSTITVIT

Auctor

IOANNES ALBERTVS EYLER.

Enarrabo hic more consueto altitudines praecipuas tam Barometri quam Thermometri vna cum phaenomenis potioribus atmosphaerae, a me primis quinque mensibus vsque ad diem 23^{am} Maii huius 1771. anni annotatas; qua scilicet die series harum observationum, domicilio meo incendio confagrato, abrupta fuit. Ne autem hoc modo lacuna in his nostris commentariis, explebo eam describendo promensibus sequentibus earum observationum meteorologicarum momenta primaria, quae sedulus ac exactissimus huius urbis obseruator, D. *Schröter*; mecum communicare voluit.

En ergo statim summarium mearum observationum, de quibus ante omnia monendum est, me eadem instrumenta et eandem methodum adhibuisse, quibus annis praeteritis vtus sum, de qua re fusus in Tomi XIV. parte posteriori horum Commentariorum locutus sum.

S s s 3

Mense

Mense Ianuarii,

Barometri altitudo maxima 28. 67. d. 27. h. IX. p. m.
altitudo minima 26. 96. d. 13. h. V. a. m.

variatio 1. 71

medium 27 81

Altitudo media inter omnes 27. 83.

Hic et in sequentibus binæ cyphrae posteriores partes centesimas pollicis, priores vero pollices integros denotant, quorum duodecim pedem *Parisinum* regium constituunt.

Thermometri altitudo minima 192. d. 19. h. IX. p. m.
altitudo maxima 151. d. 12. h. IX. p. m.

differentia 41 grad. Deslis.

Mercurius in Thermometro descendebat infra

gradum	diebus	die scilicet huius mensis
190	2	18. 19.
180	8	1 15. 16. 17. 21. 24. 25. 27.
170	9	2. 4. 7. 14. 20. 23. 26. 28. 29.
160	8	3. 5. 8. 9. 13. 22. 30. 31.
150	4	6. 10. 11. 12.

Mercurius vero ascendebat supra

gradum	diebus	die scilicet
160	11	2. 3. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 31.
170	7	4. 7. 14. 15. 22. 29. 30.
180	10	1. 16. 17. 20. 21. 23. 25. 26. 27. 28.
190	3	18. 19. 24.

Ventus

Ventus vehementer spirabat diebus 17; die scilicet 2.
3. 7. 8. 10. 11. 13. 14. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
28. 29. 31.

Dies procelloſi fuerunt 5; ſcilicet dies 4. 6. 12. 25. 26.
Flabat ventus

E regione	die	ſumma dierum
Nord	4. 7. 11. 16. 18. 19. 29.	7
N-O	1. 9. 17. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.	10
Oſt	5. 10. 15.	3
S-O	nullo	0
Süd	2. 6. 12. 21.	4
S-W	nullo	0
Weſt	8. 31.	2
N-W	3. 13. 14. 20. 30.	5

Coelum ſerenum fuit diebus 9; et quidem d. 1. 7.
15. 16. 18. 19. 21. 24. 27.

Nebulae 5, die ſcilicet 15. 17. 18. 21. 29.

Nix parca cecidit diebus 10, nempe d. 2. 3. 5. 6.
11. 13. 22. 25. 26. 29.

Nix copioſa vero die 12^{ma}.

Parhelion nitidum obſervatum fuit die 21^{ma}, et
duo alia debilia die 24 et 25^{ta}.

Aurorae boreales debiles fuerunt tres, d. 15. 27.
et 28.

Menſe

Mense Februarii.

Barometri altitudo maxima 28. 77. d. 7. h. VII. a. m.

altitudo minima 27. 50. d. 1. h. VII. a. m.

variatio 1. 27.

medium 28. 14.

altitudo media inter omnes 28. 21.

Thermometri altitudo minima 198. d. 21. h. VII. a. m.

altitudo maxima 153. d. 28. h. II. p. m.

differentia 45. grad. Deslisl.

Mercurius in Thermometro descendebat infra

gradum	diebus	die scilicet
190	4	12. 19. 20. 21.
180	6	6. 7. 14. 18. 22. 23.
170	10	2. 3. 4. 5. 8. 9. 11. 13. 15. 24.
160	7	1. 10. 16. 17. 25. 26. 27.
150	1	28.

Ascendebat. vero Mercurius supra

gradum	diebus	die scilicet
160	9	1. 10. 15. 16. 24. 25. 26. 27. 28.
170	10	2. 4. 5. 8. 9. 13. 14. 17. 22. 23.
180	9	3. 6. 7. 11. 12. 18. 19. 20. 21.

Malacia fuit die 21 et 23.

Dies ventosi 11 et quidem dies 1. 3. 6. 7. 8. 9. 19.
24. 25. 26. 28.

Dies procellosi 4. dies scilicet 2. 4. 5. 27.

Venus

Ventus spirabat

ex plaga	die	summa dierum
Nord	1. 7. 13. 17. 19. 20.	6.
N-O	2. 3. 10. 11. 16. 18. 21. 25. 26.	9.
Ost	12. 14. 15. 23. 24. 27. 28.	7.
S-O	8.	1.
Süd	4. 9.	2.
S-W	22.	1.
West	nullo	0.
N-W	5. 6.	2.

Coelum fuit serenum per 14. dies, scilicet d. 3. 5.

6. 7. 11. 12. 13. 14. 18. 19. 20. 21. 22. 24.

Nebulae 12. die scilicet 9. 10. 12. 15. 16. 17. 20.

21. 22. 23. 24.

Nix parca d. 1. 2. 8. 10. 17. 28, diebus 6.

Nix copiosa d. 9. 27: diebus 2.

Grando d. 27.

Aurorae boreales observatae fuerunt duae, die 8 et 19.

Menſe Martii.

Barometri altitudo maxima 28. 53. $\left\{ \begin{array}{l} \text{d. 4. h. XI. p. m.} \\ \text{d. 5. h. III. p. m. et} \\ \text{d. 6. h. I. p. m.} \end{array} \right.$

altitudo minima 27. 62. d. 1. h. VI. a. m.

Variatio 0. 91.

Medium 28. 07.

altitudo media 28. 10.

Tom. XVI. Nou Comm.

T t t t

Ther-

Thermometri altitudo minima 195. d. 14. h. V. s. m.

altitudo maxima 144. d. 31. h. 11. p. m.

differentia 51. Gr. Deslisl.

Mercurius in Thermometro descendeat infra

| gradum | diebus | die scilicet |
|--------|--------|---|
| 190 | 1 | 14. |
| 180 | 4 | 3. 13. 27. 28. |
| 170 | 11 | 4. 5. 6. 7. 12. 15. 19. 20. 21. 22. 26. |
| 160 | 10 | 1. 2. 11. 16. 17. 18. 23. 24. 25. 29. |
| 150 | 5 | 8. 9. 10. 30. 31. |

Ascendeat autem supra

| gradum | diebus | die |
|--------|--------|---|
| 150 | 5 | 7. 8. 25. 30. 31. |
| 160 | 17 | 1. 2. 5. 6. 9. 10. 11. 15. 16. 17. 18. 19.
20. 21. 23. 24. 29. |
| 170 | 8 | 3. 4. 12. 14. 22. 26. 27. 28. |
| 180 | 1 | 13. |

Malacia 5 diebus fuit; d. 3. 5. 6. 28. 29.

Dies ventosi 8. dies scilicet 7. 8. 9. 15. 16. 18. 21. 22.

Dies procellosus vnus fuit 23.

Ventus spirabat ex

plaga

| plaga | die | summa
dierum |
|---------------------|-----------------------------|-----------------|
| Nord | 2. 3. 4. 10. 11. 20. 26. | 7 |
| N-O | 12. 13. 14. 17. 18. 22. 27. | 7 |
| Ost | 15. 16. 24. 28. | 4 |
| S-O | 5. 6. 31. | 3 |
| Süd | 23. | 1 |
| S-W | nullo | 0 |
| West | 1. 8. 9. 19. | 4 |
| N-W | 7. 11. 25. 30. | 4 |
| ventus
variabil. | 29. | 1 |

Dies sereni fuerunt 12; dies scilicet 3. 4. 5. 6. 11.
12. 13. 14. 22. 26. 27. 28.

Nebulae 8. d. 3. 4. 5. 6. 7. 14. 19. 28.

Nix parca diebus 10; die scilicet 1. 2. 8. 9. 10. 17.
18. 25. 30. 31.

Nix copiosa diebus 4. d. 16. 19. 23. 29.

Aurorae boreales numerabantur septem. die 2.
3 et 12^{ma} tres praelucidae et die 4, 5, 6 et 22^a,
quatuor debiliores; praesertim postrema, quae admo-
dum exilis et incompleta fuit.

Mense Aprilis.

Barometri altitudo maxima 28.61. d. 8. h. II. p. m.

altitudo minima 27.86. d. 3 et 14. h. VII. a. m.

variatio 0.81.

medium 28.21.

T t t t 2

alti-

altitudo media 28. 15.

Thermometri altitudo minima 161. d. 1. h. XI. p.m.

altitudo maxima 129. d. 27. h. 11. p.m.

differentia 32. grad. Desisl.

Mercurius in Thermometro descendebat infra

| gradum | diebus | die scilicet |
|--------|--------|---|
| 160 | 1 | 1. |
| 150 | 22 | 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9. 12. 15. 16. 17. 18. 19.
20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 30. |
| 140 | 7 | 5. 10. 11. 13. 14. 28. 29. |

Ascendebat vero supra

| gradum | diebus | die scilicet |
|--------|--------|--|
| 130 | 1 | 27. |
| 140 | 13 | 5. 9. 10. 11. 12. 15. 19. 21. 22. 23.
24. 28. 29. |
| 150 | 15 | 2. 3. 4. 6. 7. 8. 13. 14. 16. 17. 18. 20.
25. 26. 30. |
| 160 | 1 | 1. |

Malacia per dies 10 obseruata fuit, die scilicet 4. 9.
10. 11. 12. 13. 14. 17. 18. 21.

Dies ventosi fuerunt 9; d. 3. 5. 16. 19. 20. 24. 25.
28. 30.

Dies procellosi 2; d. 1 et 22.

Flabat ventus

| e regione | die | summa
dierum |
|----------------------|----------------------------|-----------------|
| Nord | 8. 11. 12. 18. 22. 28. 29. | 7. |
| N-O | 16. 17. 20. 21. 25. 30. | 6. |
| Ost | 9. 10. 26. | 3. |
| S-O | 5. | 1. |
| Süd | 7. 14. | 2. |
| S-W | 2. 4. | 2. |
| West | 3. 13. | 2. |
| N-W | 1. 6. 23. 24. | 4. |
| ventus
variabilis | 15. 19. 27. | 3. |

Dies sereni fuerunt 16; scilicet d. 1. 3. 5. 7. 8. 9.
15. 17. 18. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Nebulae 4; d. 4. 5. 8. 12.

Nix parca die 2 et 30; copiosa die 6.

Pluit quinquies; die 10. 11. 27. 28. 30.

Hoc mense flumen Neva liberabatur a glacie et quidam die 19, postquam per dies 159 glacie obstructum fuit.

Mense Maii vsque ad diem 23^{mi}.

Barometri altitudo maxima 28. 52. d. 2. h. VII. 2. m.

altitudo minima 27. 90. d. 13. h. II. p. m.

variatio 62.

medium 28. 21.

altitudo media inter omnes 28. 13.

T t t t 3

Ther-

Thermometri altitudo minima 161. d. 1. h. VI. a.m.
 altitudo maxima 113. d. 21. h. II. p.m.
 differentia 48. grad. Deslil.

Mercurius in Thermometro descendebat infra

| gradum | diebus | die scilicet |
|--------|--------|------------------------------------|
| 160 | 1 | 1. |
| 150 | 3 | 2. 3. 9. |
| 140 | 10 | 4. 5. 6. 7. 8. 10. 11. 12. 13. 14. |
| 130 | 7 | 15. 16. 18. 19. 20. 22. 23. |
| 120 | 2 | 17. 21. |

Ascendebat autem supra.

| gradum | diebus | die scilicet |
|--------|--------|----------------------------|
| 120 | 6 | 17. 18. 20. 21. 22. 23. |
| 130 | 7 | 6. 10. 11. 12. 15. 16. 19. |
| 140 | 8 | 3. 4. 5. 7. 8. 9. 13. 14. |
| 150 | 1 | 2. |
| 160 | 1 | 1. |

Malacia die 4. 5. 11. 16. 17. 18 (mane). 20. 21.

Ventus vehemens die 2. 6. 7. 8. 12. 14. 18 (ve-
 sper). 22. 23.

Procella die 1. 13.

Flabat ventus

| ex regione | die | summa
dierum |
|------------|------------------------------------|-----------------|
| Nord | 5. 7. 11. 15. 16. 17. 19. | 7. |
| N-O | 1. 2. 6. 8. 9. 10. 20. 21. 22. 23. | 10. |
| Ost | 3. 4. | 2. |
| West | 13. 14. | 2. |
| N-W | 18. | 1. |
| variabilis | 12. | 1. |

Dies sereni d. 1. 2. 8. 10. 11. 16. 17. 19. 20. 21. 23.
Summa 11 dies.

Nebulae 5, die scilicet 10. 11. 16. 17. 20.

Pluuia parca d. 3. 4. 12. 13. 18.

Pluuia copiosa cecidit d. 14.

Aurorae boreales d. 1 et 2.

Progrediar nunc ad obseruationes D. *Schröter*
et quo melius eae cum nostris comparari possint,
exordiar ab ipsa prima die huius mensis Maii. Ob-
seruauit autem

Barometri altitudinem maximam 28.52 d. 2.

altitudinem minimam 27.85 d. 13.

vnde et ex obseruationibus eius, praecedentibus men-
sibus institutis, concludere licet, altitudines Barometri
quo D. *Schröter* vsus est, non multum differre ab
eis, quas nos annotauimus.

Thermometri altitudo minima 160 d. 1.

altitudo maxima 112 die 28 et 29.

in radiis Solis 66 d. 8.

Dies

Dies fereni XVIII. die scilicet 2. 5. 6. 10. 11. 16.
17. 18. 19. 20. 21. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Pluit d. 3. 4. 12. 14. 30. 31.

Tonuit d. 30.

Aurogae boreales d. 1 et 2.

Venti vehementiores d. 1 ex Nord. d. 2 et 3 ex
N—O; d. 8 ex Ost. d. 12, ex West. d. 22
ex N—O; d. 24 ex Nord et d. 30 ex West.
Procellae d. 18 ex West et d. 23 ex N—O.

Mense Junii.

Barometri altitudo maxima 28. 37 die 12.
altitudo minima 27. 71 die 9.

Variatio 0. 66; medium 28. 04.

Thermometri altitudo minima 138 die 1.
altitudo maxima 111 die 11 et 12
in radijs Solis 65 die 11 et 12

Dies fereni VI, dies scilicet 3. 11. 12. 15. 16. 17.

Nebula d. 8.

Pluit d. 1. 4. 6. 8. 9. 13. 18. 19. 20. 21. 23. 24. 25.
26. 30. per dies ergo XV.

Venti vehementiores spirabant ex Nord d. 1. 3. 4.
22 et 26; ex N—O d. 5 et 14; ex Ost. d.
2. 8; ex Sud. d. 9; ex S—W d. 17 et ex
West. d. 27. 29. 30.

Tonuit quater, die scilicet 9. 19. 25 et 26.

Mense

Menſe Julii.

Barometri altitudo maxima 28. 75 d. 6 et 7

altitudo minima 27. 52 d. 1.

Variatio 1. 23 et medium 28. 13.

Thermometri altitudo minima 132 d. 1.

altitudo maxima 199 d. 8 et 9.

et in radiis Solis 69 d. 7.

Dies ſereni numerabantur XI. ſcilicet d. 4. 5. 7. 8.

9. 10. 11. 12. 14. 25. 27. 30.

Pluit diebus XVII; die ſcilicet 2. 3. 6. 8. 9. 10. 11.

12. 13. 14. 15. 16. 17. 19. 20. 23. 28.

Grando cecidit die 29 et 31.

Tonuit octies et quidem die 10. 11 et 29 valde

vehementer; die vero 13. 23. 24. 26. 30. minus

forte.

Aurora borealis obſervata fuit die 21.

Ventus vehementer flabat ex Sud. d. 16 ex S - W.

d. 2. 4 et 6 ex Weſt die 18 et 21.

Menſe Auguſti.

Barometri altitudo maxima 28. 33 die 23 et 24

altitudo minima 27. 08 die 8.

Variatio 1. 25 et medium 27. 70.

Thermometri altitudo minima 141 d. 11 et 12

altitudo maxima 120 d. 2 et 31

et in radiis Solis 76 d. 13 et 27.

Tom. XVI. Nou. Comm. V V V V Dies

706 OBSERVATIONES

Dies sereni fuerunt sex scilicet d. 22. 23. 27. 28. 29
et 31.

Pluit diebus XVIII. et quidem die 1. 2. 3. 5. 7. 8.
9. 10. 11. 12. 15. 16. 17. 18. 20. 21. 27. 29.

Nebula fuit d. 31.

Aurorae boreales III. d. 1. 26 et 31.

Venti vehementes flabant ex N-O d. 15; ex Ost
d. 20; ex S-W d. 3. ex West. d. 19. 23 et
24; ex N-W denique d. 7. 11. 12. 24.

Procellae ex Ost d. 2 et 16; ex S-W d. 4; ex
West d. 8. 20. 21 et 26.

Menſe Septembris.

Barometri altitudo maxima 28. 34 d. 12 et 18
altitudo minima 27. 37 d. 30.

Variatio 1. 17 medium 27. 95

Thermometri altitudo minima 152 d. 27 et 28
altitudo maxima 214 d. 1.

et eodem die Thermometrum radijs Solis expositum
aſcendebat ad gradum 68.

Dies sereni numerabantur sex et fuerunt 1. 3. 4.
13. 14. 15.

Nebulae IV, die scilicet 2. 3. 8. 16.

Pluit per dies XV et quidem die 1. 4. 5. 6. 10. 11.
17. 18. 19. 20. 21. 23. 26. 29. 30.

Nix

METEOROLOGICAE. 907

Nix cecidit die 26. 27 et 28 et grandinauit die 26 et 28.

Venti vehementes Nord d. 27, Ost d. 6. West d. 17 et N - W d. 19.

Procellae West. d. 25 et 26.

Aurorae boreales numerabantur IV. scilicet d. 9. 18. 25 et 27.

Mense Octobris.

Barometri altitudo maxima 28. 40 d. 11
altitudo minima 27. 25 d. 19

Variatio 1. 15, medium 27. 83

Thermometri altitudo minima 156 d. 29
altitudo maxima 131 d. 4
et die 15 in radiis Solis 104.

Dies sereni tantum quatuor fuerunt d. scilicet 11. 16. 20. 26: nebula die 9.

Pluvia decidit diebus XVI et quidem d. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 10. 17. 18. 19. 21. 23. 24. 25. 30. 31.

Nix veso diebus VII scilicet d. 1. 20. 21. 22. 27. 28. 30.

Venti vehementes Sud d. 3. 15 et 27; S - W d. 4. 7. 8 et 31; West d. 9 et 18; N - W d. 29.

Procellae Nord d. 19; S - W d. 24. 25 et 30
West d. 17.

V v v v a

Mense

Menſe Nouembris.

Barometri altitudo maxima 28.33 d. 17
altitudo minima 27.33 d. 8 et 9

Variatio 1.00, medium 27.83.

Thermometri altitudo minima 178 d. 22
altitudo maxima 144 d. 1 et 2

Dies ſereni VII fuerunt, ſcilicet d. 1. 2. 13. 14. 15.
22. 25.

Nebula die 26.

Pluit duobus diebus et quidem d. 19 et 29.

Nix decidit XI diebus, ſcilicet d. 5. 6. 7. 8. 9. 16.
18. 21. 26. 27. 29.

Venti vehementiores Nord d. 17, S-W d. 2. 3.
18 et 27, Weſt d. 10 et 24; N-W d. 9.

Procellae Sud d. 1 et 8; S-W d. 5 et 6.

Aurorae boreales obſervabantur IV. die ſcilicet 1. 17.
20. 22 et 24.

Halo Solis cum tribus parheliis d. 1. et duae parafelenae d. 7 et 12.

Flumen Neva denique hoc menſe obduſtum fuit glacie die 13; conſequenter hoc anno per dies 208 nauigabile fuit.

Menſe Decembris.

Barometri altitudo maxima 28.28 d. 15.
altitudo minima 27.08 d. 2.

Variatio

Variatio 1. 20, medium 27. 68.

Thermometri altitudo minima 191 d. 27.
altitudo maxima 145 d. 1 et 2.

Dies sereni numerabantur VII, et quidem d. 21.
23. 25. 26. 27. 28. 29.

Nebula d. 26.

Pluit die 2 et 11 et nix decidit diebus XV, scilicet
d. 3. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 18.
19. 20. 24. 29. 30.

Venti vehementes Nord d. 24, N-O d. 5, Ost
d. 8, S-O d. 9. 17 et 29, Sud d. 2, S-W
d. 1, West d. 19; N-W d. 22.

Procellae Nord d. 26, N-O d. 25, Ost d. 27 et
28, S-O d. 30, Sud d. 14, West d. 20,
N-W d. 21.

Aurorae boreales apparebant tres, die 20. 26 et 27.

Die 26 denique tres parhelii observati fuerunt.

Vnde patet hoc 1771 anno fuisse

Barometri altitudinem maximam 28. 77
mense Februarii die 7.
altitudinem minimam 26. 96
mense Ianuarii die 13.

Variatio igitur maxima fuit 1. 81 vel 1¹⁷/₁₀₀ dig:

Medium 27. 86, et altitudo media pro primis quinque
mensibus 28. 08.

Frigus

710 OBSERVATIONES METEOROLOGICAE.

Frigus maximum 198 mense Februarii die 21.

Calor maximus 109 mense Iulii die 8 et 9
differentia maxima 89 grad. Deslil.

Status frigoris.







Mercurius in Thermometro descendebat infra punctum congelationis naturalis vel infra gradum 150 secundum D. Deslisle, mense Ianuarii per dies 31, Februarii per dies 28, Martii per dies 31 Aprilis per dies 23, Maii per dies 4, Septembris per dies 6, Octobris per dies 4, Nouembris per dies 27 et Decembris per dies 29; in toto anno ergo per dies 183.

Deinde dies sereni numerabantur 116; nebulae 43; ventosi 115, et procellosi 40.

Pluit diebus 96 et nix decidit diebus 72.

Porro aurorae boreales fuerunt 29, tonitrua 13, parhelii 5, et paraselenae 2.









Fig. 3.








Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 3.




Fig. 4.




Fig. 5.



Fig. 6.




Fig. 7.




Fig. 8.



Fig. 9.



Fig. 70.




Fig. 71.




Fig. 72.





Fig. 73.






Fig. 81.




Fig. 82.




Fig. 83.




Fig. 84.




Fig. 85.




Fig. 86.




Fig. 87.

Fig. 88.




Fig. 89.




Fig. 91.




Fig. 93.




Fig. 92.




Fig. 84.




Fig. 85.




Fig. 86.




Fig. 87.




Fig. 88.




Fig. 89.





Fig. 100.






Fig. 101





Fig. 102.



79. 103.




Fig. 104




Fig. 105.







Fig. 106.






Fig. 1.








Fig. 2.




















Nov. Com. Acad. Sc. Petropol. Tom. XVI. Tab. XVI.









Fig. 13.














Specimen in herb. N. 1000

Tab. VII.









3 2044 058 186 875



Digitized by Google

